




Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.1





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.1



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.1





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.2.5.1

Ald. 2/5.




Ex Libris Joannis Nencini
1874















ORIBASII SAR-
DIANI COLLECTO-
rum Medicinalium,

LIBRI XVII,

QVI EX MAGNO SEPTVAGINTA
librorum volumine ad nostram aetatem soli peruenierunt.


Ioanne Baptista Rasario, medico, Noua-
riensi, interprete.



PARISIIS.

Apud Bernardinum Turrisanum, via Iacobaea, sub
officina Aldina.

I 5 5 5.



IO

SA

NIC



num

petu

mop

an

qu

que, v

tibi a

in ben

dand

rum me

modi, v

te p

valde

rit, v

nom

no

per

per

per

per

per

per

per

per

per

per

per

per

per

IOANNES BAPTISTA RA²

SARIUS, NOVARIENSIS, MEDICVS,

NICOLAO SAMMICHELIO, ME-
dico, Nouocomensi, S. P. D.



*I*amta est virtus tua, Nicolae
ornatissime, vt omnium ani-
mos tum rerum cognitione, at-
que vsu, tum morum suauita-
te, & vitae integritate tibi de-
uincias: tanta verò est tui in
me officij magnitudo, vt cum
tu & consilio, & re iuuare me
nunquam destiteris, & testimonio tuo singulari me per-
petuo ornaueris, nisi ego te vehementer diligam, & sum-
mopere obseruē, meūque tibi aliqua ex parte gratum
animum ostendam, iam humanus iudicari merito possim.
quanquam enim scio, te esse animo tam excelso magnō-
que, vt nihil vnquam in me officij contuleris, vt gratiam
tibi à me referri aut expectares, aut velles, tamen sicut
tu beneuolentiam tuam in me extare voluisti, ita mihi
dandam esse operam existimo, vt aliquo saltem vigilia-
rum mearum munusculo te afficiam. id quod erit eius-
modi, vt non à me proficiscens ad te veniat, sed vt abs
te prius profectum, mihi que donatum nunc ad te reuerti
valde cupiat. itaque cū tu prater cetera tua in me me-
rita, vnum & triginta libros Oribasij misisses, quorum
nouem ad Eustathium filium missi, Latini à me facti an-
no superiore prodierunt in lucem, decem septem vero su-
persunt ex magno illo septuaginta librorum volumine,


a ij

quod totam in se artis materiam complectebatur, quod
ad Iulianum Cæsarem scriptū fuerat, quatuor denique
ad Eunapium rogasti, ac propemodum efflagitasti à me,
ne libros à studiosis omnibus maximopere expectatos pa-
terer latere diutius, tantāque vtilitate genus humanum
priuarem. Ego vero quanquam id ipsum vehementer cu-
piebam, vt hoc æs alienum dissoluerem, tamen vix au-
debam aggredi eam prouinciam, ad quam rite conficien-
dam, maiore ocio, atque copia librorum manu scripto-
rū opus esset: cum præsertim ego in publico munere quo-
tidie verfer, & duo tantum exempla librorum Oribasii
mibi suppetant: quorum alterum mihi tu dedisti, alte-
rum vero est apud virum clarissimum, & senatorem gra-
uissimum Matthæum Dandulum: à quo cætera omnia,
vt ego quidē puto, tanquā à fonte manarunt. & quam-
uis codex ille sit omnium, quos ego in hac maxima vbe
viderim, vetustissimus, tamen tute scis, quot in eo quo-
que loca sint in quibus interpretandis vel diuinandum,
vel quod maxime periculosum est, coniectura vtendum
sit. veruntamen tu me ita hortatus es, vt omnem meam
operam, omne studium, omnēque diligentiam mihi es-
se adhibendā censuerim, vt libros alioqui studiosis vti-
lissimos in linguam latinam conuerterem. his enim ea
cognitio continetur, vt omne hominum genus delectare,
iuuareq; posse videatur. nam si quis medicamenta scire
aueat, eaq; siue simplicia, siue cōposita sint, totam eorum
syluam longe, lateq; diffusam in hisce libris comperiet: si
ea, quibus vescimur, herbas, plantas, fructus, semina, ra-
dices, succos, liquores, lapides, metalla, & cætera quæ ex
terra prodeunt, hinc eidem suppetent omnia. si verò quæ
sit aquarum dulciū vis & natura, quaq; earum, in qui-
bus

3

bus aliqua medicamenti qualitas inest, & qua lauacra
 arte confici queant, vt ad omnia genera morborū sint ac
 cōmodata, velit cognoscere: id cumulatius supeditabūt
 hi libri, quam vt longe abeamus. siquidem quæ de his re
 bus non modo Hippocrates & Galenus, quorum ad nos
 scripta peruenerunt, sed etiā Diocles Carystius, Archi
 genes, Agathinus, Menemachus, Dieuches, Philotimus,
 Antyllus, Philagrius, Ctesius, Plistonichus, Athenæus,
 Posidonius, Herodotus, Xenocrates, Zopyrus, Rufus, &
 ceteri veteres medici præstantissimi, quorum libros iniu
 ria tēporis nobis ademit, cōscripserunt, in vnū hoc volu
 mē Oribasius redegit. tum vero ex eorundē sententia de
 mari & lacubus, de fluminibus & aquis pluuiis, & de
 iis omnibus, quæ in mari degunt, atq; nascūtur, abunde
 differuit. Idem quoq; cælū, cæliq; regiones & orbis terræ
 partes salubres, & pestilētes, & habitationes, vrbesq; ad
 bonā valetudinē tuendā, & morbos profligādos accōmo
 datas definiuit: deq; aëris & volatilibus egit: tū siderū
 ortus & occasus, & vim vëtorū, & quæ in superna cæli
 regione fiāt, est cumulate persequutus. Iā quid de huma
 ni corporis fabricatione dicā? qui musculus, qui nervus,
 quæ vena, quæ arteria, quæ deniq; ossa sunt, quæ in his
 libris nō descripta, sed fere depicta nō videātur? Omittā
 hoc loco tot, tāmque varia genera exercitationum, quibus
 veteres vtebātur: nihil etiā cōmemorabo, quot menda ex
 Galeni libris tum in medicamentis expendendis tum in
 hominis fabricatione explicanda sublata fuerint: nihil
 deniq; asseram, quāta sit inter huius & Dioscoridis de
 scriptiones herbarū differentia: quippe cum & tu omnia
 diligenter inspexeris, & ceteri iudicare facilius queant.
 Cum igitur hanc tantā, tāmque variā vtilitatem his li

bris contineri perspiceres, tantū abest, ut quorundā morem tibi seruandū esse existimares, qui thesauros huiusmodi reconditos petere malunt, quam egētibz impertiri, ut non prius conquiueris, quam impetraris à me, ut hos decem septem libros, quo peruenire ad omnes possent, interpretarer. quod cum fecissem, non debere eos in alio nomine apparere, quam in tuo, planè intelligebā: siquidem iure quodam domum tuā repetere videbantur, & quod tu eorum confectionis author fuisses, & quod Oribasium honorifice semper tractauisses tū in simplicium medicamentorū & dissectionis humani corporis cognitione, in qua summo opere excellis, tum in facienda medicina, in qua sic versaris, ut innumeros non sanaueris modo, sed à morte pene ad vitam reuocaueris, idq; quotidie facias. præterea vero sciebat eius nomen à te fuisse celebratum, cum tu summa cum laude in florentissima Academia Patauina reconditā scientiam tuā, & singularem medicinæ cognitionē, quæ in te elucet, cunctis patefaceres, atque aperires, & arcana senis nostri, omnis medicinæ parentis, ita ad hominum studia, salutēque accommodate reserares, ut, qui te audirent, summū fructum ferrent, tu vero laudē immortalem, & gloriā tibi parares sempiternā. Mitto igitur ad te Oribasium: qui licet alia lingua loquatur, est tamen idē, qui tecum multos annos vixit: atque ita mitto, ut si quid meo studio, & diligentia fuerit ornamenti consequutus, totum id ceteri tibi acceptū referant: sin quid offendat, id mihi, & libri mendis ad scriptum velint: laudent tamen industriam, qui, quantum possum, quantumque valeo, totum ad illorum studia libenter accommodo. Vale.




ORIBASII MEDICINA-
LIVM COLLECTORVM,

AD IMPERATOREM IVLIA-
NVM CAES. AVG.

LIBER PRIMVS,

*Ioanne Baptista Rasario medico, No-
uariensi, interprete.*



Pitomas, quas tu olim, Diue
Iuliane Caesar, mihi conficien-
das mandaueras, iam pridē, cum
in Gallia citeriore essemus, ad
finem, quemadmodum tu vo-
luisti, perduximus: quas quidem
ex iis solis cōfeceram, quæ Ga-
lenus cōscripsisset. cūq; tu eas
laudauisses, alterum mihi labo-
rem adiunxisti: vt perquisitis
omnibus quæ medici præstantissimi maxime opportuna
dixissent, & quæcunque ad medicinæ finem pertinerēt, vnū
in volumen redigerē. id quod ego pro virili parte me prō-
pto animo facturum decreui: cum existimem hæc collecta
fore vtilia iis in quorū manus incident, vt statim, quid sem-
per iis, qui auxilio indigeant, vtile sit, comperiant, Nunc ve-
ro cum superuacaneum & omnino ineptum putem eadem
sepius adscribere, & quæ ab optimis medicis, & quæ ab iis,
qui non ita diligenter res tractauerunt, scripta fuerint: ea
solum colligam, quæ nobis reliquerunt ij, qui ceteris præ-
stiterunt, sed nihil omitam eorum, quæ Galenus dixerit:

a iiij

LIBER

si quidem ex iis, qui easdem res pertractarunt, ipse & via ac ratione, & distinctione ceteris omnibus antecellit, ac principia & sententias Hippocratis imitatur. Hoc vero ordine hoc loco utar. In primis colligam ea, quæ de parte materiæ sunt: deinde de natura, atque fabrica hominis: tum de tuenda sanitate, & reficiendis corporibus agatur: quibus consecutis addam, quæ ad dignotionem, & prænotionem pertinent: ad hæc, quæ de morbis, & de symptomatibus sunt, accedent: & denique ea quæ valent ad corrigendum ea quæ præter naturam sunt, adhibebuntur. à facultatibus autem alimentorum initium dicendi sumam.

Ex Galeno de virtute & vitio Cerealium seminum. Cap. 1.

NON solum cum in alienam regionem profectus infueti quippiam comedere debeas, sed etiam apud nos ipsos cuiusque rei naturam tentare prius tum in aqua sola citra decoctionem macerando, tum etiam adhibita coctione, & assatione poteris. Semina enim quæ in tumorem elata, statim pristinam duritiam & lentorem abiiciunt, & molliora redduntur, meliora sunt omnia: at quæ pristinum tumorem una cum duritie conseruant, ea sunt deteriora, nam & difficulter concoquuntur, & terreæ substantiæ sunt, ut vix in sanguinem conuertantur. Hoc pacto & amygdalas, & nuces magnas & paruas, et castaneas probatis, at de ptissana quorsum attinet dicere? nam id vel pueri sciunt, eam quæ statim intumescit, esse optimam: quæ vero longo tempore exiguum tumorem acquirit, pessimam. Sed ex seminibus cerealibus nonnulla sunt, quæ ne cocta quidem in tumorem apta sunt efferrî, quæ veteres Greci qui dam indomita vocauerunt. quæ vero exigua mole plurimū habent substantiæ, eaque crassa est, & glutinosa, omnia optimi succi sunt, &imenti plurimum præbent: sed tamen non facile secedunt. Contra vero, quæcunque laxam mollemque substantiam habent, eorumque partes admodum furfuraceæ sunt, ea melius quidem deliciuntur, sed minus nutriunt. ex quibus sane quæ graueolentia sunt, & iniucunditatem gustui afferunt, perspicuum est ea esse omnino mali succi, & difficulter concoqui. In exigua autem mole plurimum substantiæ

stantiæ inesse, pondus ipsorum lance libratum, & farinæ copia signo tibi erunt. nam ex mole exigua seminum, quæ compactam habeant substantiam, multum farinæ efficitur. Ergo tritica quæ totam ipsorum substantiam densam, & compactam habent, ut vix dentibus frangantur, color vero eorum est flauus, ea exigua mole plurimum alimenti corporibus præbent: quæcunque vero iis sunt contraria, ut facile à dentibus confringantur, & confracta rara, & laxa appareât, ea magna mole dant exiguum alimentum. Hordeum optimum est, quod candidum ubi pinsitum est, apparet, aliquidque densitatis ac ponderis, quantum hordeo licet, habet. præterea quod totum plenum est, & externam circumscriptionem tensam habet, ei quod gracile, rugosumque sit, præstat. Sed non solum hordeum, verum etiam quæcunque semina plena sunt, & externam circumscriptionem tensam habent, optima sunt omnia: nisi forte multo maiorem, quam eorum natura ferat, molem habeant, sintque & molliora, & laxiora. nam quæ ita sunt, ea scito cum excrementitiâ humiditatem habere, tum vero etiam esse prædictis deteriora. quam ob rem cum ea collegeris, uti eisdem non debes: sed locis siccis reposita diutius permitte: ut interim pars superuacanei humoris exhalet, pars vero etiam concoquatur usque dum siccata mediocriter contrahatur. quæ namque diutissime reposita fuerint, facultatibus deterioribus fiunt. Huius autem rei terminus esto, cum iis diuisis tanquam tenuis pulvis quidam excidit. Iam vero in tritico sæpenumero frequens lolium inuenitur: in hordeo parum quidem lolij, sed frequens ægilops. In lentibus quoque ex ipsarum mutatione araci, & pelecini semina dura, & rotunda, quæque esculenta non sunt sicut aparine, & eruangina in cruo, comperiuntur. valde enim hæc perniciofa sunt semina. Quod vero melampyron appellatur, ex tritici quoque mutatione oritur: sed prauitate permultum a lolio superatur. Inueniuntur etiam aliæ nonnullæ huiusmodi in seminibus mutationes. quocirca non par est nos negligentes esse in omnibus seminibus purgandis quæ ad vescendum comparantur: cum sciamus, etiam si noxam, quæ quotidie fit, ob exiguitatem non sentiamus, tamen quod longiore temporis spatio ab ipsa coaceruatur, esse quandoque erup-

LIBER

turum. Fructus autem ad reponendum idoneos scito esse eos, qui antequam putrescant, exsiccantur. Ac probabiliter quidem tiphā paruum triticum quispiam appellauerit: utpote quæ & colore, & densitate, & caliditate similem tritico facultatem habere videatur. Sunt autem & alia permulta semina, predictis similia, quæ tamen non exquisitè eandem habent speciem: atque ea quidem partim inter hordeum & tiphā, partim inter triticum & tiphā media sunt: & partim ad olyræ, partim ad hordei, vel tiphæ, vel tritici: quemadmodum alia partim ad panici, partim ad milij naturam propius accedunt, habentque nomina alia simplicia, ut in Italia sitanium, alia vero composita, ut in Cappadocia gymnocrithon, id est hordeum nudum, & in Bithynia quod ex zea & tritico fit, zeopyron nuncupatur.

De tritico, ex Athenai commentariis, ex libro primo. Cap. 2.

Ex cibis valentissimum ad nutriendum est triticum: cuius magna differentia ut magis minusque calefaciat, & humectet, à genere, à locis in quibus nascitur, à temporum constitutione, ab aëre, & à temporibus ducitur. Ac generis quidem ratione differt triticum, quia alterum sitanium & farinaceum, alterum vero similaceum est. Sitanium vero leue est & laxum consistentia, atque album. hoc enim est elaboratum, terrea substantia multum in eo effusa, & a propria concoctione dissoluta. quocirca & promptum, & quod bene concoquatur, & ad summam, quod facile immutetur, alimentum præbet. quinetiam, quod facile perspiretur, & conficiatur: minus tamen sit, neque par ei, quod similaceum afferat: & quod magis ad bonam valetudinem, quam ad robur accommodatum sit. Similaceum vero est grauius, & densum, & flauum, & pellucidum. estque difficile ad concoquendum, distributionem tamen copiosam, & quæ non facile perspiretur, habet. & omnino potius ad robur, quam ad sanitatem est accommodatum. Ex locis autem differt triticum quod in siccis, & non pinguibus regionibus natum sit ab eo quod in fertilibus & pinguibus oriatur. illud enim cum ex minore materia, leuiorèque & tenuiorum partium, constet, facile conficitur, facileque mutatur illud quidem, sed minus alit

alit. qua re affectum est id, quod in locis, quæ exusta vocantur, feritur. Cum enim loci materia exusta sit propter cinerem pinguedine, & nutritione carentem, triticum album, laxum, & sitanium efficitur. at quod in pinguibus & fertilibus locis nascitur, copiosa & solida materia educatū, est & densum, & graue, atque etiam multum nutrit. Ac loca quidem aperta, quæque bene perspirantur, & aprica sunt, melius triticum ferunt, & quod multo magis nutriat. Differt quoque loci ratione triticum, quod in locis admodum frigidis & niualibus oritur, ab eo, quod in calidis regionibus feritur. nam quod oritur in frigidis locis, magis est elaboratum, & tenuium partium, quale est sitanium. cum enim non velut delitescat in eis vis, exiguumque alimentum, idque paulatim capiat, permultum autem concoquat, efficitur, ut pars terrea magis in eis elaboretur, & fundatur: ex quo conficitur, ut triticum cum leue sit, tum vero etiam in tenuem farinam dissoluatur. quod trimestre triticum est, leuius esse, & præsertim, quod in niualibus locis nascitur, huiusmodi esse accipimus. Quod vero in calidis locis oritur, & copiosum alimentum, & multam densitatem, & minus fusam, atque secretam capit. Palustre porro triticum alimento vacat, estque leuius, & vitiosum sanguinem facit, & corpora minus calefacit. Loca autem perhumida triticum ferunt, quod minus alit, quodque est imbecillius, & ex toto genere videtur in lolium propter aquæ vim & copiam degenerare. Quod vero in umbrosis & nemorosis locis nascitur, plus habet acris, quam vtilitatis. Ex temporum vero atque aëris constitutione existit etiam tritici differentia. atque ex temporibus quidem, cum eorum sit temperata, & moderata in frigore, calore, imbris, & postea in aquarum defluentium cohibitione commutatio: tunc enim triticum boni alimenti fieri, eiusque molem impleri contingit, ut contra sit, cum intempestiue, intemperate & immoderate quæ prædiximus, eueniunt. nam & gracile, & alimonia vacans efficitur. Aëris autem ratione, cum opportunis temporibus serenus, apricusque est, & à ventis apte perflatur. vel contra, cum nubilus est, & opacus. sæpe enim minutulam pluuiam emittit, cum iam tempus sit calidum, & triticum ad perfectionem peruenit. quo casu triticum rugibine tētatum perit. Simili quoque modo fit cum venti graues, sicci, & calidi sub tempus,

LIBER

quo spicae implentur, exoriuntur. Cumque vehementes & multo tempore spirauerint ij, qui *καύσωνες*, hoc est ardentes nominantur, spicas adurunt, & exsiccant, & idcirco faciunt, ut alimenti nihil habeant. Ratione vero temporis novum à veteri, & eo quod inter utrumque est intermedium, differt. nam recens plus succi habet, flatus gignit, & multum alit: vetustum contra, succo vacat, siccius est, & minus alit: quod vero est medium, ratione temporis habet medietates praedictorum.

De carnibus, pro anni temporibus. Cap. 3.

Sues verno tempore usque ad occasum autumnalem Pleiadum sunt pessimi, ex eo vero tempore usque ad vernum tempus, optimi. Caprae hyeme pessimae sunt, vere autem usque ad Arcturi occasum esse meliores incipiunt. Pecudes quoque hyberno tempore sunt pessimae: post æquinoctium vero usque ad solstitium æstivum pinguescunt: Boes vero, cum herba fructum ferat, & finito vere, & per æstatem totam. Ex quibus nonnullae per hyemem sunt optimae, quae nimirum hyeme apparent, ut merula, atque sturnus, & palumbus. Attagenes vero & atrica pillae, autumnis praestant, item que ficedulae, & lusciniæ, & coturnices eo tempore sunt pinguisimae. Galli vero gallinacei hyeme non admodum corpore augentur, & praesertim in austrinis locis. turtur vero autumnis excellit. Ex piscibus vero praegnantibus optimi sunt caris, carabus, & molles, sepia, & loligines, alij vero cum ovis incipiunt incubare, ut capitones. cum vero foetu pleni sunt, tenues sunt, & non nutriunt. & multo etiam magis cum partum ediderunt. Tynnus autem post Arcturum pinguisimus est, æstate vero est deterior.

Ex Galeno de tritico elixato. Cap. 4.

Triticum elixatum est edulium graue, & quod difficulter concoquitur. Vires autem magnas habet triticum, si ita sumptum concoquatur, corpusque egregie nutrit, ac robur insigni praebet iis, qui usi co fuerint.

De alica. Cap. 5.
Alica est ex genere tritici: eaque & valenter nutrit, & glut-

triticum habet
multo, aut vni
tempore vni
quandoque at
tam pulsan
ex alica confect
subsiduat.

Amylum ex
partes largian
crimoniam in
nibus lotis, sed
calefacit.

De placem

Taginae ex
qui somi expe
cea farina m
coquitur, sit
fescit, ac m
nam extrem
contingat q
tra, in sublimi
pors fuerit co
dum eis æque
hanc crasi ell
dos efficere, q
etiam qui mar
placem gene
centurum speci
tempore para
allant, deinde
cunt, ut in l
nus quoddam
melle parantur
præstantur qu
lachena vocat

tinofum habet succum, siue in aqua solum cocta ex vino mulso, aut vino dulci, aut adstringenti, (nam his singulis suo tempore vtimur) siue cum oleo, & sale frixa sumatur, ei vero quandoque acetum adiungitur, ac medici alicam ita confectam ptisanæ præparationem fuisse aiunt. Iam vero panes ex alica confecti plurimi quidem alimenti sunt, sed minus subsidunt.

De amylo. Cap. 6.

Amylum ex tritico conficitur: habetque vim exasperatas partes læuigandi: nam neque adstrictionem ullam, neque acrimoniam insignē habet. Est quæ similis facultatis cum panibus lotis, sed tamen & minus alimenti dat corpori, & non calefacit.

De placentis, quæ ex farina triticea fiunt. Cap. 7.

Taginitæ ex oleo solo paratur. oleum in sartagine igni, qui fumi expers sit, impositam iniicitur. huic calefacto triticea farina multa aqua imbuta affunditur, quæ cum in oleo coquitur, statim æque, ac caseus tener, consistit, atque crassescit. ac tunc quidem qui eam parant, vertunt, & supernam extremitatem esse infernam faciunt, vt sartagine contingat: quæ vero erat inferior, quæ iam satis erat cocta, in sublime efferunt, vt supra maneat. cumque inferior pars fuerit condensata, ipsam bis, & ter voluunt, vsque dum eis æque esse cocta videatur. Est enim perspicuum, hanc crassi esse succi, & ventrem cohibere, & succos crudeos efficere. quam ob rem ei quidam mel adiiciunt. sunt etiam qui marinum salem misceant. Iam vero fuerit hoc placentæ genus quoddam, vt sunt etiam aliæ huiusmodi placentarum species quas cum rustici, tum urbani pauperes ex tempore parant. Etenim & *πιμματα ἄζυμα* quæ in cibario assant, deinde extrahunt, & statim in mel calidum coniiciunt, vt id in se tota recipiant, placentæ quoque sunt genus quoddam. Eiusmodi quoque sunt quæ ex itriis cum melle parantur omnia. Est autem itriorum duplex species: præstantiorque est, quam rhyemata, deterior vero, quam lachana vocant. Nunc vero omnia, quæ ex his, quæque

ex similia componuntur, crassi succi, & tardi transitus sunt
& meatus iecoris, per quos alimentum importatur, obstru-
unt, & lienem imbecillum augent, & calculos in renibus
gignunt. Valenter autem nutriunt, si concoquantur, &
probe in sanguinem commutentur. Quæ vero cum mel-
le parantur, mixtæ facultatis sunt: vt cum mel succum
tenuem habeat, ea quoque quibuscum miscetur, atte-
nuet. ex quo merito fit, vt quæ cum maiore mellis co-
pia parata fuerint, & diuturniorem coctionem sint con-
sequeuta, minus tarde subducantur, & succum ex tenui &
crasso mixtum gignant, iecorique & renibus, & lienem in
iis, qui integra valetudine fruuntur, potiora sint, quam
quæ sine melle conficiuntur: in iis vero, in quibus est ini-
tium obstructionis, aut qui inflammatione, aut scirrho la-
borant, nihil minus, quam illa, nocent, & nonnunquam e-
tiam multo magis: & omnium longe maxime, quorum fa-
rina admodum glutinosa fuerit. Et tamen nihil eorum, quæ
ita confecta sunt, neque thoracem, neque pulmonem lædit.
Cæterum cum apud nos triticeam farinam cum lacte mul-
ti coquant, sciendum est hoc edulium esse ex iis, quæ in-
tus obstruunt, nam quemadmodum hæc omnia edulia cum
boni succi sunt, tum alimentum afferunt, ita etiam lædunt
eos, qui ipsis continenter vescuntur: siquidē & iecoris ob-
structiones faciant, & calculos in renibus gignant.

De panibus triticeis.

Cap. 8.

Optimus panis, ac saluberrimus homini neq; iuueni, ne-
que exercitato fuerit is, qui plurimum fermenti, plurimū-
que salis habeat: quique plurimum sit subactus, & elabora-
tus, & in clibano moderate calido sit assatus. hoc vero,
quod dixi plurimum fermenti, atque salis, tu gustu iudicato.
quod enim in copiosiore horum mixtura iam molestum est,
id noxium est. Quicumque autem panis lavandi rationem
gitarunt, ij paucioris quidem alimenti cibum, sed qui à no-
xa obstructionis absit quam maxime fieri potest, inuenerūt.
hic enim panis succum crassum & glutinosum minime ha-
bet, vtpote qui ex magis terrestri, magis sit factus aërius.
Eius autem leuitas tum ex pondere per lancem, tum vero ex
eo, quod in aqua non submergitur, sed instat suberis super-
natat,

naturat, appar-
deinde ipse
interius non
perantur, qui
assati sunt, qu-
nonij: siquidē
vero cruda. R
principem lo-
is sunt ij, qui

Panes reu-
cum affuso m-
alendi, quocir-
quoque ratio-
fuerit plena, na-
runtur deinde
erealis facti, &
dantur, & de-
sunt redditus
vero restat
le distribu-
tius nutritio-
dam caliditate

Triticum
do eo variis,
quæ, siue pot-
cum vero, qu-
ipso sunt, no-
quam olym-
fuerit: cum in
tingum ex h-

Hordeum

natat, apparet. Panes autē omnium optimi sunt clibanitæ, deinde ipnitæ, cum eodem modo fuerint confecti. Sed quia interius non assantur æque, ac clibanitæ, idcirco ab illis superantur. qui vero super craticulam, aut calidum cinerem assati sunt, quia inæqualis dispositio in eis est, sunt omnes noxij: siquidē extrema pars præter modum assata est, intima vero cruda. Post triticeos panes, qui ex olyra conficiuntur, principem locum tenent, si ex olyra bona fiant. secundi ab iis sunt ij, qui fiunt ex titha.

De panibus ex Athenæo.

Cap. 9.

Panes tenues paucioris succi, pauciorisque alimenti sunt, cum assatio magis extenuet, magisque diminuat in eis vim alendi. quocirca itria, & lachana paucioris succi sunt. hac quoque ratione assati & bis cocti panes minus alunt, quam succi pleni, nam cum sint quadantenus assati, iterum conteruntur: deinde contriti iterum assantur. contingit enim, ut exalfacti, & admodum confusi, multo magis ex attritu fundantur, & dissoluantur. sed cum tales ex secunda assatione sint redditi, quod valens est in eis consumptum fuit: quod vero restat, & leue, & laxum, & tenuium partium fit, & facile distribuitur. Iam vero calidos recentisque panes valentius nutrire, quam frigidos, & veteres est perspicuum: siquidem caliditas quoque concoctionem adiuuat.

De hordeo ex Galeno.

Cap. 10.

Triticum perspicue calefacit: hordeū vero, quoquo modo eo utaris, siue panes ex eo conficias, siue ptisanam coquas, siue polentam pares, aliquid refrigerantis habet. Succum vero, qui abstergendo est, gignit. Panes autem qui ex ipso sunt, non modo magis, quam triticei, sed etiam magis, quam olyrini, & multo magis etiam, quam tithini, friabiles sunt: cum in se glutinosi nihil habeant. ex quo planum est, exiguum ex his alimentum corporibus præberi.

De hordeo ex Athenæo.

Cap. 11.

Hordeum aliud nudum est, & expers corticis, & multi

L I B E R

succi est, ac valde nutrit, idque propius ad triticum, quam aliud, accedit. aliud vero secundum est, quod spicas habet, binis granorum versibus constantes. quod etiam minus habet excrementi, quam triticum, quod spicam habet, quæ ex vnico granorum constat ordine.

De polenta, & maza, ex Galeno.

Cap. 12.

Polenta exiguum corporibus alimentum præbet: iis vero, quæ exercentur, minus: quæ vero exercitatione non vtuntur, satis multum. Maza vero tanto est pane hordeaceo inferior in alendo, quantum ille triticeo cedit: atque etiam ægrius, quam hordeacei panes, concoquitur: & ventrem magis flatu implet: in quo si diutius maneat, turbationem quoque efficit. Hæc vero subacta & contrita diutius, per aluum potius secedit. Si vero mel eidem adiiciatur, citius descendet, atque etiam ob hanc causam aluum ad excretionem irritabit.

De titha, & olyra.

Cap. 13.

Olyrini panes post triticeos optimi sunt, si ex olyra proba conficiantur: his succedunt tithini. si vero illi ex vitiosa olyra sint facti, tithini non erunt illis inferiores. Cum vero titha est optima, calidi tithini sunt olyrinis multo præstantiores: at asseruati, deteriores illis fiunt ita, vt qui post vnũ, vel duos, & multo magis post aliquot deinceps dies huiusmodi panem comederit, lutum sibi ventriculo inesse existimet, cum vero adhuc calidus est, ab ipsis etiam vrbani expetitur, eumque cum caseo quodam familiari comedunt, quem oxygalactinum vocant. ergo hic calidus commendatus non modo à rusticis, sed etiã ab ipsis vrbani in deliciis habetur. qui vero triduo, aut quadriduo ante sit cõfectus, vel ab ipsis rusticis iniucundius mādatur: difficiliusque concoquitur, ac tardius per aluum subducitur: quæ calido minime accidunt. Atqui hic calidus corpus valenter nutrit, vt parum triticeo syncomisto sit inferior. Porro tithæ semen extrinsecus habet corticem veluti olyra, atque hordeũ. ex eo pinso panes fiunt, & vsui omnino accommodatur. Ex aqua itidem elixum manditur à rusticis sapa adiecta, nõ secus, quam quod apothermum nominant. quandoque ve-

ro

ro cum sale
cortice ita,
conferunt
effusa, sapa
ac nutes quo
intumuerunt

Hoc sem
nisi fortiss
mine confici
dero sum ex
multo veluti
que acque illa
corpus minu
fuerit est: al

Ex his
frugum et
dus est, pla
quare merr
nam eorum
leum aduul
nibus panis
difficiliter ex
Farina quor
non secus,
hoc edulcorum
lac. & ad hoc
efficienda est

Hoc sem
men quoniam

ro cum sale comeditur, Ex nobilissima autem olyra, cum cortex ita, vt par est, fuerit excussus, appellatum tragum, conficiunt: quo aqua elixato plerique vtuntur: deinde aqua effusa, sapam, aut vinum dulce, aut vinum mulsum affundit: ac nuces quoque pineas aqua præmaceratas donec plurimū intumuerint, superiniiciunt.

De auena.

Cap. 14.

Hoc semen est iumentorum, non hominum alimentum: nisi fortassis magna quandoque fame ad panem ex hoc semine conficiendum compellantur. Si vero fames non sit, decoctum ex aqua cum vino dulci, aut defruto, aut vino mulso veluti tipha comeditur. satis enim habet caloris æque atque illa, non tamen est æque durum. quam ob rem corpus minus alit, alioqui autem panis ex eo confectus infuauis est: aluum tamen neque cohibet, neque proritat.

De milio, & panico, quod etiam *μελινν* vocant.

Cap. 15.

Ex his quoque panis interdum conficitur, cum dictarum frugum est penuria, quique ex eis fit, parum nutrit, & frigidus est, planumque est, eum esse prædurum, atque friabile. quare merito humectam aluum exsiccat. Rustici vero farinam eorum elixantes, deinde suillam pinguedinem, aut oleum admiscentes mandunt. Milium vero est in rebus omnibus panico præstantius. nam & suauius editur, & minus difficulter concoquitur, minusque aluum sistit, & magis alit. Farina quoque eorum decocta ex lacte rustici quandoque, non secus, quam triticea, vescuntur. estque perspicuum, hoc edulium ita sumptum tanto esse præstantius, quantum lac, & ad bonum, & ad multum succum, & ad alia omnia efficienda excellit.

De oryza.

Cap. 16.

Hoc semine ad aluum cohibendam vtitur. difficilior tamen, quam alica, concoquitur, & item minus alit.

b

Lentes corticem habent adstringentem : quæ vero ipsarum est veluti caro , crassi succi & terrei est , & exiguum austere qualitatis habet : cuius multæ cortex est particeps. Succus in eis est astringenti contrarius . idcirco si quis lentes aqua coxerit , & aquam sale , aut garo & addito oleo præbeat , hic potus aluum deiiciet. Ex lentibus autem bis , ut diximus , decoctis lens ipsa apparata vim habet succo contrariam : ut quæ ventris fluxum exsiccet , & stomachum , & intestina , & totum denique ventrem roborer. Cui vero cortex sit detractus ut adstringendi vehementiam amisit , ita etiam magis , quam cui cortex non sit ademptus , nutrit , succique crassi est , & tarde permeat . & tamen alui fluxus non exsiccat , ut facit ea , quæ non sit spoliata cortice . Præterea vero hoc edulium mali succi est , succumque melancholicum facit . Hebetat autem aspectum integrum , eundem nimium exsiccat : qui vero contra sit affectus , eum lentis usus iuuat.

Puls fabarum & per se , & cum ptisana paratur , hæc autem corporis habitum carne non constricta illa quidem , ut suilla facit , sed quodammodo multo laxiore implet. hoc edulium , quomodocunque sit paratum , flatus gignit . Substantia vero non densa , & grauis , sed laxa & levis fabis inest . habent tamen vim abstergerendi non secus , quam ptisana . Cum vero fabarum puls flatus gignat , multo etiam maior flatus excitabitur , si quis ipsis fabis integris coctis vescatur . at frigide flatum quidem deponunt , sed difficilius concoquantur , & tardius ventrem permeant , & crassi succi alimentum corpori præbent . Cum vero virides , antequam maturæ & exsiccatæ fuerint , sumuntur , habent id , quod omnium fructuum , quos ante perfectionem edimus , est commune , ut humidius alimentum corpori præbeant.

Cum pisa totius substantiæ ratione quandam cum fabis ha-

habent sum
medantur. it
sunt haru leni
crenter que

Cicer edul
nutrit vero n
simul quom
vis, quam an
pides quom
autem sunt
ipsorum in aq
vero æque, ad
admodum est
difficilis con
poni minus u

Lupini e
ut diffinit
necesse est :
prie crudus a
tis, quæ sensu
neque ad alia
dam esse acco

De faryng

Hoc semen
quoque ex a
qui cum pane
leu cum garo
garo . antequ
um affunderet
Succus autem
nes vinu
dos valet .

habeant similitudinem, iisdemque modis, quibus fabæ, comedantur, in duobus ab illis differunt, tum quia non ita sunt flatulenta sicut fabæ, tum quia abstergendi facultate carent: ex quo fit, ut tardius, quam fabæ, per aluum secedant.

De ciceribus.

Cap. 20.

Cicer edulium est non minus, quam faba, flatulentum. nutrit vero non minus, quam illa. ad venerem incitat, & simul quoque semen gignit. in eo maior est abstergendi vis, quam in fabis. ex quo fit, ut nonnulli cicerum usu lapides qui in renibus essent, euidenter confregerint. nigra autem sunt ea, & parua, & arietina vocantur. sed præstat ipsorum in aqua coctorum succum solum bibere. Viridia vero æque, ac reliqua omnia, excrementitia sunt: quemadmodum etiam frixa flatum quidem deponunt, ceterum difficilius concoquuntur, ventremque magis sistunt, & corpori minus alimenti afferunt.

De lupinis.

Cap. 21.

Lupini dura, terrestriſque substantia est. quocirca & ut difficulter concoquatur, & ut succum crassum gignat, necesse est: ex quo in venis non probe cōfecto succus proprie crudus appellatus aceruatur. ceterum edendo qualitatibus, quæ sensu deprehendatur, expers est. par ergo est, ipsum neque ad aluum deniciendam, neque ad eandem cohibendam esse accommodatum.

De ſænogreco, quod & bonis cornu dicitur. Cap. 22.

Hoc semen cum garo præmansum aluum subducit. estur quoque ex aceto & garo, & ex vino & garo, & oleo. aliqui cum pane idem sumunt, nec capitis dolorem affert, veluti cum garo. Estur quoque ſænumgræcum ex aceto & garo, antequam eius planta fructum ferat. aliqui vero oleum affundentes cum pane vescuntur. sed ita caput ferit. Succus autem decocti ſænigræci cum melle sumptus, ad omnes vitiatos humores, qui in intestinis sunt, subducendos valet. Et quia abstergendi facultate præditus est, ideo

b ij

LIBER
intestinum ad excretionem irritat.

De phaselis, & eruilia.

Cap. 23.

Hæc quoque semina perinde ac fœnū Græcum, mortales aqua præmacerantes donec radicem præduxerint, ante alios cibos garo intingentes alui subducendæ gratia comedunt. succum vero, cum cōcocta & distributa fuerint, copiosioris alimenti, quam fœnum Græcum, habent. hæc porro media quodammodo sunt inter ea quæ boni succi sunt, quæque facile, & quæ difficulter concoquuntur, & quæ tarde, & quæ celeriter transeunt, & quæ flatulenta sunt, quæque flatus non excitant, quæ denique exiguum, & quæ multum dant alimenti. neque enim vllam qualitatem efficacem habent,

De cicercula.

Cap. 24.

Hæc vescuntur homines, vt phacoptisana, habet vero succum facultate quidem phaselis, & eruiliis quodammodo similem, sed consistentia crassiore. ex quo fit, vt cicerculæ magis fere, quam illi nutriant.

De araci.

Cap. 25.

Hoc semen est cicerculæ semini persimile: atque etiam vsus omnis, itémque eorum vis cicerculis est similis: nisi quod duriores sunt, & minus facile elixantur. ex quo sequitur, vt araci quoque difficilius, quam cicerculæ, concoquantur. Apud nos vero agreste quoddam, ac durum & rotundum semen, eruo longius in cerealibus fructibus inuentum, quod arachum per ch nominant, seligunt, & non secus, quam pelecium, abiiciunt.

De dolichis, hoc est, phasiolis.

Cap. 26.

Hos aliqui siliquas, aliqui phasiolos appellant. facilius autem deliciuntur, quam pisa, minúsque inflant: atque etiam alunt.

De

Magna quæ
suntur. mirum
quod ad flauum
costum bis fuit
suauitatem quæ
abstergeret, &
stis ei remane
ritiem excoctam

Pinguis est sed
ob rem eos, q
chumque subue
mentum pingue
co non celerit
substantia est
insuauis, &
bo vero sunt
sitim afferunt

Sedini papau
lineæ insperguntur
staz ei, quod ni
rem somnum q
fuerit, grauem
tur. Præterea ve
tur, cohibetur
et. alimentum

Alium sili
& exiguum ali
bet aliud dicitur

De eruo.

Cap. 27.

Magna quandoque fame compulsi homines hoc vefcuntur. minus vero medicamentosum est album, quam quod ad flauum, pallidumve colorem abscedit. cum vero coctum bis fuerit, & in aqua perſæpe dulce redditum, inſuauitatem quidem deponit, ſed cum ea facultatem quoque abſtergendi, & incidendi amittit, vt ſola ſubſtantia terreſtris ei remaneat: quæ facit, vt edulium citra inſignem amaritiem exciccans fiat.

De ſefamo, & eryſimo.

Cap. 28.

Pingue eſt ſefami ſemen, ideo celerrime fit oleoſum: quã ob rem eos, qui ipſo veſcuntur, celeriter implet, ſtomachumque ſubuertit, & tarde concoquitur: & corpori alimentum pingue affert. quoniam vero craſſi ſucci eſt, idcirco non celeriter ſecedit. at eryſimum corporis quidem ſubſtantia eſt quodammodo ſimile ſefamo, ſed in cibo eſt inſuauius, & corpus minus alit, & eſt omnino deterius. ambo vero ſunt calido temperamento, & ob eam quoque rem ſitim afferunt.

De papaueris ſemine.

Cap. 29.

Satiui papaueris ſemen panibus, ceu condimentum, vtiliter inſpergitur. ac ſemen quidem, quod candidius eſt, præſtat ei, quod nigrius ſit. vim refrigerandi habet, quam ob rem ſomnum quoque conciliat, ſi quæ liberalius ſumptum fuerit, grauem etiam ſoporem inducet, & ægre concoquitur. Præterea vero quæ ex thorace, ac pulmone tuſſi eiciuntur, cohibet. iuuat eos, quos tenuis a capite diſtillatio exercet. alimentum non notabile dat corpori.

De lini ſemine.

Cap. 30.

Alienum ſtomacho eſt, & concoctu difficile lini ſemen, & exiguum alimentum corpori præbet, nullam vero habet alui deiciendæ facultatem. habet quidem exiguam vim

vrinæ ciendæ, ac præcuc frixum.

De ormino. Cap. 31.

Hoc frixo vtuntur, ipsūque læuigant, & mel adiiciunt, parum vero in eo inest alimenti.

De cannabis semine. Cap. 32.

Cannabis semen ægre concoquitur, stomacho alienum est, caput ferit, mali est succi, & egregie calefacit.

De viticis semine. Cap. 33.

Credunt hoc semen venereas appetitiones cohibere. corpori vero parum alimenti, eiusque siccantis, ac refrigerantis affert. status valde discutit, quibus omnibus rationibus, iis qui se à rebus venereis puros seruare student, conuenit.

De aphace, & vicia. Cap. 34.

Horum seminum figura est fabis similis. cum fames est, iis etiam viridibus, sicuti ciceribus, & fabis, mortales vescuntur, & præsertim vere. sunt autem non solum insuaui, sed etiam concoctu difficilia, & aluum sistunt, malūque succum, atque etiam melancholicum gignunt.

De cucurbita. Cap. 35.

Cucurbita probe cocta nullam euidentem saporis qualitatem habet: quocirca merito multis modis apparatus: utpote quæ in medio excessuum omnium sit constituta, atque ipsa quidem, quantum in se est, humidum, frigidūque & propterea etiam exiguum corpori dat alimentum. Facile autem subsidet suæ substantiæ lubricitate. concoquitur vero non male, si non prius fuerit corrupta. Assata autem, aut in sartagine frixa, plurimum quidem humiditatis propriæ deponit, sed quod reliquum est, nullam insignem facultatem obtinet: veluti nec cum simplici iure fuerit parata. Merito autem propter aqueam qualitatem origano gaudet. Non-
nul-

nulli eius semina
si cant. & in li-
rino aliter vel
vacantes, & sic

Tota popu-
piola conueni-
& idcirco vti-
loppones, sub
forum relati et
cit. & potissimum
quidem casu de
quam corrupta
gastro quilibet
in succi suæ, si

De

Melope-
niti que ma-
subducunt
tum exoran-
cho idonei
stomacho su-

His quon-
inisti qui vere
pleuerint, long-
immoderate a-
et, non facile

Quod est q-
etiam horum
ci præmittit

nulli eius semen abiciunt, & partem quæ est velut caro, ex-
siccant, & in hyemem reponunt. Illis autem ita repositis om-
nino aliter vescuntur, quam vt cucurbitis: siquidem & succo
vacantes, & siccæ, perinde vt coria, redduntur.

De peponibus.

Cap. 36.

Tota peponum natura frigidior est cum humiditate co-
piofa coniuncta. habent autem quandam abstergerendi vim,
& idcirco vrinam mouent: & melius, quam cucurbitæ, & me-
lopepones, subducuntur. eorum semen potentius, quam ip-
forum veluti caro deterget. Succum in corpore vitiosum fa-
cit, & potissimum, cum non probe fuerit concoctum: quo
quidem casu cholericos efficere consuevit. Quinetiam prius,
quam corrumpatur, ad ciendum vomitum valet. siquæ lar-
gius eo quispiam vescatur, neque quicquam eorum, quæ bo-
ni succi sunt, super mandat, omnino vomitum excitabit.

De melopeponibus.

Cap. 37.

Melopepones minus, quam pepones, humidi sunt, mi-
nusque mali succi, & minus vrinam cient, & minus infra
subducuntur: neque parem vim cum peponibus ad vomi-
tum excitandum habent. à fructibus autumnalibus stoma-
cho idoneis multum absunt, & tamen non ita, vt pepones,
stomacho sunt noxij.

De cucumeribus.

Cap. 38.

His quoque ciendæ vrinæ vis, vt peponibus, sed minor
inest. qui vero eos probe concoquunt, cum iis assatim se ex-
pleuerint, longo temporis spatio accidit, vt succum crassum
immoderate aceruent, qui in ea concoctione, quæ in venis
fit, non facile in probum sanguinem commutetur.

De ficibus.

Cap. 39.

Quod est omnium fructuum nō modo autumnalium, sed
etiā horæorum cōmune, id quoque ficus habent, cum suc-
ci prauitatem effugere nō potuerint: minus tamen, quam re-
b iij

liqui omnes horæi fructus, eius participes sunt, in eis hæc insunt bona, ut ventrem pertranscant, & per totum corpus facile secedant. habent etiam vim abstergendi notabilem. cum vero autumnales fructus omnes parum alimenti corpori præbeant, id minime omnium in ficus cadit: carnem neque compactam, neque firmam, sed sublaxam, ut fabæ, faciunt. sed & ipsæ flatu ventrem implent. verum quia celeriter descendunt, ideo breuem flatum cient. Quæ vero exquisitè matura ficus est, prope est ut nihil omnino lædat, sicut etiam caricæ, quibus multa quidem insunt commoda, sed noxam tamen quandam iis, qui liberalius eis vescuntur, afferunt: siquidem non admodum probum sanguinem faciunt. ex quo fit, ut ex eorum usu pediculorum copia exoritur. habent autem attenuandi, incidendique facultatem: qua & ventrem ad excretionem impellunt, & renes expurgant. Iecori lieni inflammatis noxiæ sunt. nõ propria facultate quadam excellenti, sed communi omnium dulcium eduliorum ratione: obstructis vero, & scirrho obsessis ipsæ per se neque prosunt, neque obsunt: at cæteris medicamentis abstergentibus & incidentibus adiectæ, non parum utilitatis afferunt. Quicumque autem caricæ, ficusque cum aliquo crassi succi cibo mandunt, ij non parum læduntur.

Ex Rufo de ficubus.

Cap. 40.

Ficus sunt cæteris autumnalibus meliores: & tamen noxam quandam afferunt. caricæ satis alere corpus queunt: quam ob rem veteres permittebant, ut athletæ caricis vescerentur. Goras primus Eurameni Samio carnem afferens hunc usum antiquavit, atque ita illa viuendi consuetudo est sublata.

De vuis ex Galeno.

Cap. 41.

Ficus & vux inter autumnales fructus primas ferunt. nam & magis, quam reliqui omnes fructus horæi, nutriunt, minimumque pravi succi habent, & præsertim cum exquisitè maturæ fuerint. caro tamen, quæ ab eis efficitur, neque firma, neque densa est, sed laxa, atque fluida. quam ob rem celeriter contrahitur. Vux autem minus, quam ficus nutriunt: maximum

simum vero
circa si quod
ficubus non in
tur, innoxium
horum habent
dum in securi
unt, qui in san
per ventrem
stringunt nam
mutentur. In
uatur, ventres
tentum exorta
gius et quip
conditur, mag
ledit, neque al
complicatarum
dulces calidior
runt: absterge
ter calidum
cunt: præsert
stere non t
culo fit, sur
mus, cum v
maturis qu
mam matum
spensione sic
de acida, aut
de gratia cor
sum idque di
subducitur, quo
ad omnia pe
dam vinnam

Quemadmodum
quoque vult
quærobant
acribus id est
medium quo

ximum vero hoc eis bonum inest, quod cito subsident. quod
 circa si quando contineantur, egregie nocent, cum hoc vitij
 ficibus non insit. nam si non, ut consentaneum est, deiciantur,
 innoxium alimentum corpori præbent. at vuæ neutrum
 horum habent. nam retentæ neque probe concoquuntur, &
 dum in iecur, venâsque distribuuntur, succum crudum faci-
 unt, qui in sanguinem non facile commutatur. Potius enim
 per ventrem transeunt, si grana sine acinis deglutiantur. ad-
 stringunt namque acini, cum neque concoquantur, neque
 mutantur. Inter eas, quæ reponuntur, quæ in vinaceis asser-
 uatur, ventriculum roborat, ac cibum fastidientibus appe-
 tentiam excitat: non tamen per aluum subsidet: sique lar-
 gius ea quispiam vescatur, caput feriet. quæ vero in musto
 conditur, magis etiam caput tentat. at pensilis neque caput
 lædit, neque aluum sistit, neque proritat: est autem omnium
 compositarum vuarum concoctu facillima. Cæterum vuæ
 dulces calidiorem succum habent: & propterea sitim affe-
 runt: austæræ vero, & acidæ frigidiores: vinosæ denique in-
 ter calidum & frigidum sunt mediæ. Dulces aluum subdu-
 cunt: præsertim vero ubi humidæ fuerint: acidæ vero & au-
 stæræ non modo huic rei, sed etiam coctioni, quæ in ventri-
 culo fit, sunt incommodæ. Omnium vero usus est tutissi-
 mus, cum vuæ suapte natura sint carnosæ, & eisdem optime
 maturis quispiam moderate vescatur: idque siue in vite sum-
 mam maturitatem sint consequutæ, siue, quod deerat, ex su-
 spensione sint adeptæ. Secundo vero loco censentur humi-
 dæ acidæ, aut austera qualitate vacantes: quas alui deiicien-
 dæ gratia copiose possumus ingerere. nonnulli quoque mu-
 stum idque dulce eiusdem rei causa bibunt. id enim maxime
 subducit. quod vero ex vuis austæris, aut acidis exprimitur,
 ad omnia pessimum est. Iam vero dilutum vuarum ad cien-
 dam vrinam valet.

De vuis passis,

Cap. 42.

Quemadmodum vuæ passæ dulces calidiores sunt, ita
 quoque austæræ temperatura sunt frigidiores, stomachum
 que roborant, & ventrem constringunt. sed perspicuum est,
 acerbis id etiam magis, quam austæris, efficere. dulces vero
 medium quodammodo statum inducunt: utpote quæ neque

L I B E R

Stomachum aperte dissoluant, neque ventrem subducant. Et tamen vis quædam contemperandi, sicut etiam facultas modice abstergendi semper inest dulcibus: ut utriusque facultatis ratione exiguos oris ventriculi morsus obtundant. si quidem planum est, maiores morsus valentiora remedia postulare. Inter vuas passis cæteris præstant pinguiore, quæque veluti corticem habent tenuem. Nonnulli autem, & recte quidem, è dulcibus magnisque, cuiusmodi sunt Scybeliticæ, prius quam vescantur, semina eximunt. atque eæ quæ inueteratæ duram, crassamque cutim habent: easque in aqua prius oportet macerare. ita enim semen facilius eximitur. Aliæ quædam sunt his contrariæ, austæræ & parvæ, quæ nullum omnino semen habent. Quod autem ex passis alimentum corpori affertur, tale qualitate est, quales passæ fuerint. Quantitate vero, copiosius ex pinguibus & dulcibus: parcius ex austeris, & macris, cæterum magis, quam caricæ, stomacho sunt idoneæ.

De sycaminis, quæ & mora nominantur.

Cap. 43.

Sycamina si in ventriculum purum inciderint, primoque loco sumpta sint, celerrime pertranseunt, & aliis cibis præeunt. sumpta vero post alios cibos, aut si malum succum inuenerint, in ventriculo celerrime corrumpuntur absurda quadam corruptela, quæ explicari verbis non potest, ut in cucurbitis usu venit. Cum autem minus noxia sint horæis cibis, si non celeriter subsederint, noxiâ habent corruptelâ peponum corruptelæ consimilem. quanquam pepones si celeriter subducantur, nullam magnam noxam inuehant. Tempus autem, quo sycaminis, est id, quo etiam peponibus, utamur, cum squalidum æstusque pressum est ventriculi corpus. tunc enim tale quodammodo iecur itidem esse necesse est. habet sycamina vim quandam adstringendi. omnino vero humectant, non tamen omnino refrigerant, nisi frigida sumantur. alimentum minimum dant corpori, ut etiam pepones faciunt.

De rubi fructu.

Cap. 44.

Rubi fructus magis, quàm mora adstringunt: siquæ largius quispiam

spiam eis vescatur, capite dolebit, alij stomacho etiam angū-
tur, ergo diligenter abluendus fructus est prius, quam eum
comedere aggrediamur, quod nō minus in sycaminis est fa-
ciendum, ventrem tamen nō subducit hic fructus, sed potius
cohibet.

De canini rubi fructu.

Cap. 45.

Canini rubi fructus paulo maiorem adstringendi
vim, quam rubi fructus habet. quam ob rem aluum quoque
magis cohibet, corpori vero exiguum alimentum præbet.

De fructibus iuniperi.

Cap. 46.

Iuniperi fructus exiguum dulcedinem, minorem
que adstrictionem habent, præterea aromatici quippiam
eis inest, & eos calefacere propter acrimoniam perspicuum est,
corpus parum alunt. Si que liberalius eis quispiam vescatur,
stomachum mordent, caput que calfaciunt, & dolore vexant,
Vrinas vero mediocriter cient.

De persici.

Cap. 47.

Horum quoque succus, & quæ veluti caro est, facile cor-
rumpitur, praua que est omnino. quocirca non debent, ut à
quibusdam fieri consuevit, post alios cibos sumi, nam super-
fluitantia corrumpuntur, & cetera quoque simul vitiant.

De armeniæ & præcocius.

Cap. 48.

Hæc quoque persicorum genere continetur, illis tamē boni-
tate nōnihil præstāt. neque enim eque, atque illa in vetricu-
lo corrumpitur, neque acescūt. Vulgo autē iucundiora apparēt:
& propterea stomacho magis idonea, porro his fructibus exi-
guā alēdi vim inesse, prius dictū est. cæterū præcocia sunt ar-
meniæ præstantiora.

De malis.

Cap. 49.

Mala, quæ adstringunt, succū frigidum ac terreum habent:
quæ acida videntur, succum quidem frigidum habent, sed

qui sit tenuium partium: mediæ vero temperaturæ sunt dulcia, quæ ad calidius vergūt: vt quæ plane qualitatis sunt expertia, & veluti aquea ad frigidius inclinant. Est autem perspicuum mala adstringentia alui deiectiones cohibere: acida vero crassum succum, quem in ventriculo inuenerunt, incidūt, ac deorsū subducūt, & propterea deiectiones humectāt. cū vero purū ventrē inueniunt, eū magis sistūt. Dulcia poti⁹ distribuūtur. quæ vero qualitatis sunt expertia, cum neq; iucunda sint, neque ventriculum roborent, neque ipsum sistāt, merito dispiciuntur, & suis proiiciuntur. quæ vero probe in plantis maturuerunt, ac reponuntur, in morbis sæpenumero sunt vtilissima, siue ad modū cataplasmatum cum farina adhibita, siue in calido cinere mediocriter assata, siue in vapore bullientis aquæ probe cocta. statim autem à cibo danda sunt: quandoque vero cum pane, ventriculi & stomachi roborandi gratia iis, quibus prostratus appetitus, quiq; tarde concoquunt, & vomitu, fluore alui, ac torminibus vexantur. ad quem vsum acerba sunt accommodata. appa-
rata enim, vt nuper dicebam, mediocrem adstrictionem habent: cum ea, quæ mediocriter austera sunt, omnem in ea præparatione adstrictionem deposuissent: & ob eam causam similia iis, quæ ab initio aquea sunt, euasissent.

De cydonijs & struthiomelis. Cap. 50.

Eximium quid inest his, quod alia mala non habent. cum enim adstrictionem maiorem habent, tum vero eorum succus perdurat, si quis coctum ex melle velit adseruare, aliorum autem malorum succus repositus cum copiosum frigidum humorem habeat, acescit. Struthiorum vero malorum succus diutius durat atque adeo in multos annos manebit, cum os vasculi densam crustā habuerit: quæ in melle atque aliis quibusdam sæpenumero concreuit: hancq; adiacentem seruare oportet, cum diutissime citra mutationem seruare medicamentum velis. Cydoniorum vero succus minus suauis est, & magis adstringit, idcirco ad roborandum ventriculum dissolutum. hoc etiam quandoque vtemur.

De piris, & punicis. Cap. 51

Si

Si ea, quæ de malis diximus, ad pira, & punica transfe-
ras omnia, nihil erit, quod nos noui quicquam de eisdem
afferamus. Puuica vero omnino perexiguum alimentū cor-
pori dant: ac pira, & præsertim magna, quæ menatæ à nostra-
tibus dicuntur, aliquantulum nutriunt.

De mespilis & sorbis.

Cap. 52.

Hæc adstringunt ambo, sed mespila multo magis quàm
forba. quocirca utilissimus est ventri fluenti cibus: forba
tamen sunt in cibo suauiora. Constat autem, omnibus huius
modi parce, non autem large, ut uis & ficubus, esse vescendum.

De fructu palmarum.

Cap. 53.

Ex palmis quædam sunt siccæ & adstringentes, ut Aegy-
ptiæ, quædam molles, humidæ, & dulces, ut quæ cario-
tæ appellantur: quæ præstantissimæ in Palæstina Syria in
Hiericonte nascuntur. cæteræ vero aliæ palmæ omnes in-
ter hoc genus utrunque medium locum tenent, ut aliæ magis,
aliæ minus sint humidæ, siccæ, dulces, & adstringentes. Verum
extremis constitutis, iam quodcumque in medio est, facillime
deprehenditur. Ostendimus enim dulcem succum alendo
esse, austerum vero stomacho idoneum, & ventrem sistere.
Palmæ autem omnes difficulter concoquantur, & copio-
sius sumptæ, capitis dolorem excitant: quædam vero morsus
etiam cuiusdam sensum ori ventriculi afferunt. Succus porro
qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassius est omnino, habet-
que lentoris aliquid, cum pinguis palmula est. cumque huic
succo aliquid dulcedinis mistum fuerit, iecur ab eo celerrime
obstruitur: atque ab earum esu maxime læditur, inflamma-
turque, & scirro obsidetur. post iecur vero, lien quoque &
obstruitur, & læditur.

De oliuis.

Cap. 54.

Ipsæ quoque exiguum alimentum dant corpori, &
potissimum caducæ, & quemadmodum caducæ succum pin-
guem habent, ita quæ halmades, & colymbades appellantur,
adstringentem. quocirca stomachum roborant, appetitum-

L I B E R

que excitant, ad hoc vero aptissimæ sunt, quæ cum aceto cōponuntur.

De nucibus.

Cap. 55.

Nuces magnæ, & auellanæ corpus non multum alunt; auellana tamen magis. Vtraque autem mediocriter adstringentis qualitatis est particeps, quæ progressu temporis in oleosum commutatur. Viridis autem nux neque qualitatis perspicue adstringentis est particeps, neque oleosæ: sed est expers quodammodo qualitatis, & aquea. nux vero melius, quam auellana concoquitur. estque stomacho magis idonea, & multo magis, si cum caricis edatur, est præterea manifestū humidam nucem ad deiectionem aptiorem esse, siccam vero minus. sed hæc quoque aqua macerata, & abiecto putamine, similem viridi facultatem habet.

De amygdalis.

Cap. 56.

In his attenuandi & abstergendi facultas excellit. nonnullis vero tanta vis inest crassos glutinososque succos incidendi, ut præ amaritie mandi nō possint: oleosæ tamen & pinguis qualitatis, ut etiam nuces, sunt participes. exiguum vero alimentum dant corpori.

De pistaciis.

Cap. 57.

Minimum quidem alimentum præbent: sed ad iecur firmā dum sunt utilia: habentque subamarum & subadstringentem qualitatem.

De prunis.

Cap. 58.

Pruna minimum alimentum corpori præbēt, utilia tamen sunt. iis, quibus humectare, & refrigerare mediocriter ventrem est propositum. hæc vero etiam exsiccata possunt vsui esse. quæ vero Damasi nascuntur, ceteris præstant omnibus.

De sericis.

Cap. 59

Est hoc mul-
tum nutritum.
idonea, minimum

Malis sacci sunt
non celeriter de-

Capari facit
per minimum
luta visquidum
rit, parum quide
stergit, & ex ac
sumpta viscera

Hæc p
lem fert, null
ceps est hum

Hæc ite
apud Persas ite
intermar, in A
zque mandi ac

Tres sunt
eica quæ est v
quæ est tegunt
hoc odoratum
concoctionem
to vident, parce
Parie autem aci
coniciat, ut a

Est hoc mulierum, & puerorum effrenatorum edulium, pa-
rum nutriunt, difficulter concoquuntur, non sunt stomacho
idonea, minimum alimenti corpori præbent.

De siliquis.

Cap. 60.

Mali succi sunt, & lignosæ, & difficulter concoquuntur, &
non celeriter deiciuntur.

De cappari.

Cap. 61.

Cappari facultas inest tenuium partium: ex quo fit, vt cor-
pori minimum alimenti distribuat. Sale vero condita, & ab-
luta vsquedum facultatem, quam ex sale contraxit, deposue-
rit, parum quidem alit, sed tamen pituitam ex ventriculo ab-
sterget: & ex aceto mulso, aut aceto & oleo præ ceteris cibis
sumpta viscera liberat obstructione.

De Sycomoris.

Cap. 62.

Hæc planta nascitur Alexandria. fructum ficui simi-
lem fert. nullam acrimoniam habet, exiguae dulcedinis parti-
ceps est. humidæ quodâmodo & frigidioris est facultatis.

De persio.

Cap. 63.

Hæc itidem planta Alexandriae est, huius fructum
apud Persas ita esse noxium commemorant, vt eo vescentes
interimat. in Aegyptum vero translatus, fieri esculentum, &
æque mandi ac pira atque poma.

De citrio.

Cap. 64.

Tres sunt huius fructus partes: acida, quæ in ipso medio
est: ea quæ est veluti caro, quæ mediū ipsum ambit: & tertia
quæ est tegumentum extrinsecus circumdatum. est autem
hoc odoratum, & aromaticum, sed difficulter concoquitur.
concoctionem autem adiuuat, si quis eodem vt medicamen-
to vtatur. parce vero sumptum stomacho robur adiungit.
Parte autem acida, & quæ non estur, ita vtuntur, vt in acetū
coniciant, vt acidiores reddant. quæ vero inter duas alias

L I B E R

media est, quæque corpus etiâ nutrit, difficulter cōcoquitur.

De fructibus plantarum agrestium. Cap. 65.

Hi fructus præterquam quod exiguum alimentum præbent, malum etiam succû omnes faciunt. ac nonnulli noxi stomacho sunt, præter spinosos, qui in terra optima, exoriuntur.

FINIS PRIMI LIBRI.

ORIBASII MEDICINAE
LIVM COLLECTORVM,

L I B E R S E C U N D V S.

De lactuca. Cap. 1.



mus.

VM olera omnia paucissimum, malique succi sanguinem gignât, lactuca non multum illa quidem sanguinis, sed qui non sit pravi succi, nec tamen omnino probi, gignit. Succum autê humidum, ac frigidum habet, sed qui mali succi non sit, uti diximus.

De intybo. Cap. 2.

Intyba similem lactucis facultatem habent: à lactuca tamen & suauitate, & aliis, quæ supra de lactuca diximus, superantur.

De malua. Cap. 3.

Malua lentoris quippiam habet, quod lactucæ non inest. perspicue vero à refrigerando abest. hoc olus facile subducitur, ac præsertim si quis ex oleo & garo copiose ipsum sumat, nutrit autem mediocriter.

De

Betarum succu
ventrem quo
rendum mordi
dit alimentum
fert. accommod
cum ex sinapi
et vtilis.

Brassica succu
ipsum commun
ad extreuerem
lens. quam ob
ter naturam sit
lium est, sicut
habet.

Hæc sunt
spiam, omnia
olera ad facili
me, cum vna e
quia nulla ac
vehementem h
perspicui, par

Hæc, ut dicit
frigidum & gl
una stuporom

Lapathum

De beta.

Cap. 4.

Betarum succum abstergentem esse planum est: quiquidem ventrem quoque ad excernendum irritat, ac stomachum interdum mordicat. idcirco copiosius sumpta stomachum laedit. alimentum vero exiguum, ut cætera olera, corporibus affert. accommodata est ad iccoris obstructions: ac præcipue cum ex sinapi, aut aceto estur. quo modo lienosis quoque fit utilis.

De brassica.

Cap. 5

Brassicæ succus vim quandam purgandi habet. at corpus ipsum communi exsiccantium ratione magis cohibet, quàm ad excretionem impellat. exsiccatur ergo brassica æque, ac lens. quam ob rem aspectum hebetat, nisi totus oculus præter naturam sit humidior. & tamen non ita boni succi edulium est, sicut lactuca: sed prauum & graucolentem succum habet.

De blito, & atriplice.

Cap. 6.

Hæc sunt cæteris oleribus magis aquea, & ut diceret quispiam, omnino qualitatis expertia. cæterum dictum est, hæc olera ad facilem deiectionem propensa esse: ac tum vel maxime, cum una cum humiditate lubricum quid habeant. sed quia nulla acris, ac nitrosa qualitas eis inest, ideo fit, ut non vehementem habeant ad inferna propensionem. estque plane perspicuum, parum admodum corpus ab his nutriri.

De portulaca.

Cap. 7.

Hæc, ut cibus, exiguum alimentum, idque humidum, & frigidum & glutinosum præbet. ut medicamentum vero detumtum stuporem, suo lentore, morfus experte, curat.

De oxylapatho

Cap. 8.

Lapathum crudo nemo vescitur, quemadmodum nec beta.

L I B E R

ac rustici oxylapathum crudum edunt. id vero non nutrit,
atque etiam multo minus, quam lapathum.

De lapatho.

Cap. 9.

Lapathum non solum gustu, sed etiam facultate est betæ
hortēsi adsimile, verum quia beta est suauior, idcirco omnes
homines eadem potius vescuntur.

De solano.

Cap. 10.

Inter olera, quibus vescimur, nullum noui, quod tantam
quantā solanum, adstrictionem habeat. iure igitur ut alimē-
to perraro, ut medicamēto sæpe utimur. est enim efficax in
ea, in quibus adstringentis refrigerationis est usus.

De plantis spinosis.

Cap. 11.

Plerique rustici huiusmodi plantis è terra nuper exorien-
tibus vescuntur, alēdi vis minima eis, ut cæteris oleribus, inest,
eaque tum aquea, tum vero etiam tenuis. Ac spinosa quidem
mediocriter stomachum iuuant. inter hasce plantas est car-
duus, atractylis, spina alba, dipsacus, cnicus, tragacatha, atrac-
tis, & quam magis, quam par est, æstimant, cinara. est enim
prauisucci edulium, & præsertim cum iam sit facta durior.
nam & biliosum succum in se copiosum habet, & totam sub-
stantiam, quæ ad ligni naturam magis tendit, ut ex ea melā-
cholicus succus, ex succo vero ipsius, tenuis & admodum bi-
liosus gignatur. ergo satius est, eandem elixatam comedere.

De hipposelino, sio, smyrnio, & apio.

Cap. 12.

Hæc urinam cient omnia: apium vero inter ea est vſitatif-
simū, suauius, & stomacho magis aptum. Smyrnium vero acri-
us, calidiūque est multo, quam apium, & hipposelinum, & si-
um. cætera cruda etiam comeduntur: hipposelinum vero, &
sium elixata: siquidem horum vtrunque crudum insuaue ap-
paret. quidam vero apium & smyrnium lactuæ foliis admi-
scentes offerunt. nam cum lactuca sit olus inspidum, habeat
que frigidum succum, & suauior & vtilior efficitur, si acrium
oleū

elerum quod

Hoc olerum
fuit foliis m
que semen g
tare. Capiti et
vescatur.

De mela

Vim habet
mo vultu: ut
alium deueni

De g

Gingidium
fuit crudo, su
fert. adstima
uceps.

Hoc pesti
derunt, si tra
cis diebus sc
noxium.

Asparagus
aliorum oleru
tem asparago
tur, oxymyrti
ad his diuersi
infusum alius
stomacho id
tunt.

Drepi, que

Sirapi m

SECVNDVS.
olerum quoddam assumpserit.

18

De eruca.

Cap. 13.

Hoc olus manifeste calfacit. quocirca ipsum solum, nisi la-
etucæ foliis misceatur, non facile manditur. Creditur quo-
que semen gignere, & rerum venerearum cupiditatem exci-
tare. Capiti etiam dolorē affert, ac præsertim si quis eo solo
vescatur.

De urtica, quam *κνίδρυ* etiam vocant.

Cap. 14.

Vim habet tenuium partium, & merito ea, vt alimento, ne-
mo vitur: vt obsonium vero, ac medicamentum vsui est ad
aluum deiciendam.

De gingidio, & scandice.

Cap. 15.

Gingidium est scandici persimile, stomacho valde idoneū,
siue crudo, siue cocto vescariis. diuturniorem coctionem nō
fert. adstrictionis vero & amaroris non mediocris est par-
ticeps.

De ocimo.

Cap. 16.

Hoc pessimi succi est: idcirco nonnulli de eo falso prodi-
derunt, si tritum in ollā nouam coniiceretur, celerrime pau-
cis diebus scorpiones generare. est autem etiam stomacho
noxium.

De asparagis.

Cap. 17.

Asparagus brassicæ minus, quam ipsa brassica exsiccat.
aliorum olerum caulis magis exsiccat, quam folia. Aliud au-
tem asparagorum est genus, quod in plantis fruticosis nasci-
tur, oxymyr sine, chamædaphne, & oxyacantha. Alij quoque
ab his diuersi sunt vt regius, & qui palustris nominatur: cu-
iusmodi alius quoque est bryoniæ asparagus. Omnes vero
stomacho idonei sunt: urinamque prouocant, & parum nu-
triant.

Derapis, quæ *βουβιάς* quoque nominantur.

Cap. 18.

Si rapæ minus, quā vlla alia planta quæ sit eiusdē generis,

c ij

L I B E R

nutrarent, vtique mirarer, succum in corpus distribuunt moderato crassiores. ita fit, vt qui liberalius eisdem vescatur succum crudum sit aceruaturus. bis vero cocta laudatissima redditur. Si vero crudior sumatur, difficulter concoquitur, flatu excitat, & mali succi est: nonnunquam vero morsus ventriculum vexat.

De aro.

Cap. 19.

Ari quoque radix eodem modo, quo rapæ, manditur. in quibusdam vero locis acrior prouenit ita, vt prope ad draconij radicem accedat: eamque bis coctam mandere oportet. Cyrenæ vero minime est medicamentosa, & acris, vt rapis etiam sit utilior. constat enim hanc ad alendū esse potiorē, ad educendum vero ex thorace & pulmone acrior præstat. estur quoque elixa cū sinapi, vel aceto ex oleo & garo. est nāque perspicuū, alimentū, quod ex ipsa in corpus distribuitur, non secus quam ex rapis, esse quodammodo crassius.

De draconio.

Cap. 20.

Huius itidē radicē bis, tērvē elixatā, vt quod medicamentosum in ea est, deponat, mādēdā damus, cum vehemētiore facultate opus est ad humores ex thorace, & pulmone eiicēdos.

De asphodelo.

Cap. 21.

Asphodeli radix parata, vt lupini, amaroris plurimū depōnit. Fame autem vagāte hanc complurimis elixationibus, & aquæ dulcis macerationibus vix factam esse esculentam vidī. eius facultas est, vt quemadmodum draconij radix, aperiat, ac incidat.

De bulbis

Cap. 22.

Horum quoque radices comeduntur: interdum vero & eorum asparagi verno tempore. amaram, austeramque facultatem habent: vnde etiam stomachum exolutum ad appetendum excitant. non aduersantur autem iis, qui ex thorace & pulmone expuere aliquid volunt, licet substantia corporis crassiore, & glutinosiore sint: sed

sed amaritudo
et, crassius
aceto, oleo &
tus cient, plus
roer ipsorum
res venereas pro

Et p

Radibus
quam rapæ, &
ciunt, & arom
alix quoque rat
liberalius quā
melioris tamen
egreſſem palli
cre, medicamen
li, perantidum

De

Tuberibus
condimenta
suum qualita
nium commu
tribuntur, non
te vero tale, q
tuberibus cras
tionem humed

De

Ex fungis be
penum edulio
præſta pūtor
en vīat, mali
sunt maxime
vero totum el
et eorum vīu p

sed amaritudo, quæ suapte natura glutinosa, crassaque incidit, crassitie obstitit. præstabit vero tunc eos conditos ex aceto, oleo & garo comedere. quo etiam modo minus flatus cient, plus alunt, & facilius concoquuntur. nonnulli vero ex ipsorum esu liberaliore, & semen sibi inauctum, & ad res venereas promptiores redditos aperte senserunt.

De pastinaca, dauco, & caro.

Cap. 23.

Radicibus quoque horum mortales vescuntur. minúsque quam rapæ, & arum cyrenaicum nutriunt, manifeste calfaciunt, & aromaticum quiddam præ se ferunt. sunt tamen, ut aliæ quoque radices, concoctu difficiles. urinam cient, sique liberalius quispiam his vescatur, modice peioris succi erunt. melioris tamen succi est carus quam pastinaca. quidam vero agrestem pastinacam daucum nominant: qui urinam magis cient, medicamentosiórque est, ac si quis comedere ipsum velit, permultum erit elixandus.

De tuberibus.

Cap. 24.

Tuberibus nulla perspicua qualitas inest: ipsis tamen ad condimenta excipienda vtuntur, sicuti cæteris, quæ ad gustum qualitatis expertia & aquea nominant, quorum omnium commune est, ut alimentum, quod ab eis corpori distribuitur, non calfaciat: sed subfrigidum quidem sit, crassitie vero tale, quale id est, quod sumptum fuerit: quódque ex tuberibus crassius est, quod vero ex aliis ad horum proportionem humidius, atque tenuius.

De fungis.

Cap. 25.

Ex fungis boleti aqua rite elixati prope ad qualitatis expertium eduliorum naturam accedunt. alimentum, quod præbêt, pituitosum, frigidúmque est, sique copiosius quispiam eis vtatur, mali succi. Atque hi quidem cæterorum omnium sunt minime noxij. secundæ tribuuntur amanitis, cæteros vero tutius est ne omnino quidem attingere. plerique enim ex eorum usu perierunt.

Vim habet attenuantem, ac perspicue calefacit, in eaque qualitas acris excellit.

Hæc facultatem insigniter acrem habent, & pro eius ratione corpora calefaciunt, crassosque humores, quibus obsidentur, attenuant, & glutinosos incidunt. bis tamen, terve elixata acrimoniam quidem deponunt, sed attenuant adhuc, & paucissimum alimentum prebent: cum prius, quam elixarentur, nullum darent. Ampeloprasa vero tantum à porris differunt, quantum in cæteris omnibus, quæ sunt generis eiusdem, sativa ab agrestibus differunt. Cæterum à continuo acrium omnium esu abstinendum est, ac præcipue cum is, qui vescitur, sit natura biliosior. hæc enim edulia iis solum, qui succum acervant pituitosum, aut crudum, aut crassum, aut glutinosum conueniunt.

Omnes animalium partes non eandem facultatem habent: sed carnes cum probe fuerint concoctæ, sanguinem optimū gignunt, ac præcipue, si animalium boni succi fuerint, quale est suillum genus. partes autem neruæ, pituitosiores sunt. omnium ergo eduliorum suilla caro valētissime nutrit. bubula vero præbet ipsa quoque alimentum non mediocre, nec quod facile per halitum digeratur, sanguinem tamen crassiores, quam par sit, efficit. ac si quis suapte natura sit temperatura magis melancholica, si bubula vescatur largius, aliquo melancholico affectu corripitur. quantum enim totius suæ substantiæ crassitie bubulæ carnes suillas superant, tanto suillæ bubulis lentore præstant. & tamen suillæ sunt ad concoquendum multo præstantiores. Vituli melius, quam perfecti boues, concoquuntur: ut etiam hædi melius, quam capræ. capra vero minus sicco est temperamento, quam bos: at sui comparata, multum superat. Porcelli vero alimen-

alimenrum
quo ipsi sunt
trunt. agnoru
sed & pecudum
ci est: caprarum
cina autem &
dom est pelsu
In his autem
sunt: Annotaz
& ad alimen
quomus hum
fibrosam, sic
bent. Leporis
ciat, tamen me
Nihilominus
difficilis ad
gresses bene
norum domi
mi succi sunt
cho, atque e
rum & car
& corpori
& his pe
ro quid
ac præfert
medant, cum
caras veni
est sciendum
re, ea hyeme
lori boues, q
res manifeste
& ad semen
nutriti queu
veluti pecud
tucum germit
quenu summa

Cochlear

alimentum nobis dant eo magis excrementis redundans, quo ipsi sunt magnis humidiores: ac merito etiam minus nutriunt. agnorum quoque caro humidissima pituitosaque est. sed & pecudum caro plura habet excrementa, ac peioris succi est: caprarum vero caro habet præterea acrimoniam. hircina autem & ad coquendum, & ad succum bonum faciendum est pessima: hanc sequitur arietina, tum vero taurina. In his autem omnibus castratorum carnes præstantiores sunt: Annosæ vero ad concoctionem, ad succi bonitatem, & ad alimentum sunt deterrimæ. quocirca sues quoque ipsi, quamvis humidæ temperaturæ sint, si consenuerint, carnem fibrosam, siccâque, & propterea concoctui difficilem habent. Leporis autem caro licet crassiore sanguinem faciat, tamen melioris succi est quam caro boum, & pecudum. Nihilominus his mali succi est ceruina caro, estque dura, & difficilis ad coquendum. huic propinqui sunt asini agrestes bene habiti, ac iuvenes. atqui nonnulli quoque asinorum domesticorum senio confectorum carnes, quæ pessimi succi sunt, difficulter concoquuntur, alienæ sunt stomacho, atque etiam insuaues, comedunt: quemadmodum equorum & camelorum carnibus vescuntur, cum ipsi & animo & corpore sint asinini. Quinetiam sunt, qui vrsorum carnes & his peiores, leonum, ac pardorum edant. De canibus vero quid iam attinet dicere, quos itidem iuvenes & pingues, ac præsertim cum castrati fuerint, apud nonnullas gentes comedant, cum pantheris quoque vescantur? Vulpium vero carnes venatores apud nos autumnino comedunt. Hoc vero est sciendum, animalia quæ herbam altiore debent pascere, ea hyeme, & primo vere gracilia ac prauis succi fieri: veluti boues, qui progressu temporis melioris succi & crassiores manifesto apparent, cum herbæ crescunt, ac densæ fiunt, & ad semen ferendum properant. quæ vero humili herba nutriri queunt, ea primo ac medio vere præstantiora sunt, veluti pecudes: ætate autem prima, & media, capræ: cum fruticum germina, quibus velci capræ consueverunt, sunt frequentissima.

De cochleis.

Cap. 29.

Cochlearum dura est caro, ob idque difficulter concoqui-

c. iij

tur: quæ si concocta fuerit, valentissime nutrit. Succus eis, vt etiam testaceis, inest, qui ventrem subducit: quam ob rem quidam oleo, garo, & vino eas condiunt, ac iure, quod conficitur, ad aluum deiciendam vtuntur. Sin autem huius animalis carne, vt solo cibo esculento, vti velis, cum prius in aqua elixaris, in aliam aquam transferes, in qua iterum coques, & ita condies, donec caro diligenter flaccida reddatur. ita enim præparata aluum quidem sistet, cæterum corpori alimentum egregium dabit.

De animalium pedestrium partibus extremis. Cap. 30.

Porcellorum pedes ptisanæ incocti aptissimi sunt. Extremæ vero corporis partes omnes vt minimum pinguedinis, ita quoque naturæ carnosæ minimum habent. neruea enim cutaceaque natura in eis excellit: cuiusmodi etiam cutis & nerui sunt in toto corpore: sed in extremis magis exercentur, & idcirco magis lenti sunt. etenim nervus atque cutis omnis dum elixantur, ad talem naturam perueniunt. ergo iure fit, vt corpus minus alant: sed propter lentorem facilius per aluum deiciantur. Pedes autem porcellorum sunt grunno præstantiores, sicut etiam grunus auribus præstat: siquidem ex sola chartilagine & cute constant. ac chartilago quidem in adultis animalibus omnino concoqui non potest: in iis vero, quæ adhuc augescunt, si in ore probe læuigata, & in ventriculo concocta fuerit, exiguum alimentum dabit. Quod vero nunc diximus, in aliis animalibus ad proportionem est intelligendum: quantum enim ipsorum carnes alimenti bonitate suillis cedunt, tanto etiam illorum partes extremæ partibus suillis extremis deteriores sunt.

De terrestrium animalium lingua. Cap. 31.

In hac parte substantiæ proprietas quædam inest, vt carnem laxiorem, ac magis sanguineam habeat. musculi enim, & potissimum ipsorum partes mediæ, sunt carnes exquisitæ.

De glandulis. Cap. 32.

Quantum lingua à carnis substantia, tantum glandulæ à lin-

à linguae substantia distinctæ sunt . ergo glandularum omnium commune est, vt in cibo suaves, ac friabiles appareant: quæ vero mammillarum sunt, cum lac habent, ipsius quoque dulcedinem præ se ferunt. quapropter cum lacte sunt plenæ, magnopere à gulosis expetuntur. alimentum autem, quod ex iis probe concoctis præbetur, prope ad carnis alimentum accedit. si vero minus, quam par est, conficiantur, crudum, aut pituitosum succum faciunt. Cum vero testes ex glandularum sint genere, non tamen tam boni succi sunt, vt glandulæ mammillarum: sed habent virosi quippiam, seminis quod gignunt, naturam referentes: vt etiam renes, vrinæ. quinetiam animalium terrestrium testes multo difficilius concoquuntur. nam gallorum gallinaceorum altilium cum suaves sunt, tum vero etiam optimum alimentum corpori præbent.

De renibus.

Cap. 33.

Renes prauī admodum succi sunt, ac difficulter concoquuntur.

De testibus.

Cap. 34.

Omnium quadrupedum animalium testes sunt concoctu difficiles, ac prauī succi: probe vero concocti nutriunt. Soli autem gallorum gallinaceorum, ac præsertim altilium, sunt omnium præstantissimi.

De cerebro.

Cap. 35.

Cerebrum omne cibus pituitosior, prauīque succi est, ac tarde permeat, & difficulter concoquitur, & nō minimū stomacho nocet. Quidam eius mollitie decepti, ipsum offerūt: cum præter cætera, nauseam quoque excitet. cūque crassi succi sit, & excrementitium, melius redditur cum incidentibus, & calfacientibus paratum. si vero bene concoquatur, alimentum corpori notabile præstabit.

De osium medulla.

Cap. 36.

Medulla, quæ in osibus inuenitur, est cerebro dulcior,

LIBER

suavior, ac pinguior ita, ut si quis facta cōparatione gustet, cerebrum aliquid etiam austeri habere videatur. Præterea medulla largius sumpta perinde, ac cerebrum, nauseam ciet. quæ quidem si belle concoquatur, ipsa itidem nutrit.

De spinali medulla.

Cap. 37.

Pinguedinis minimum habet: idcirco nauseam non provocat. si vero probe concoquatur, non mediocri alimentum dat corpori.

De pinguedine, & adipe.

Cap. 38.

Et pinguedo & adeps exigui alimenti sunt, & potius car-nium, quibus alimur, sunt condimenta.

De terrestrium animalium visceribus.

Cap. 39.

Iecur omnium animalium crassi succi est, difficultérque concoquitur, ac tarde pertransit. est vero omnium præstan-tissimum non modo ad voluptatem, sed etiam ad alia om-nia, quod *σικωτὸν* appellatur, quod quidem inde nomen in-venit, quia macerandi animalis iecur, multarum siccarum fi-cuum esu sic præparent: quam rem in suis maxime faciūt, propterea quod suilla viscera sunt aliorum visceribus mul-to suaviora. Ex reliquis autem visceribus lienis non est gu-stui suavis. perspicua enim acerbitas quædam in eo inest. ac-merito quoque pravi esse succi creditur, quippe qui melan-cholicum sanguinem gignat. ac pulmo ut est rarior utroque, sic etiam est ad concoquendum facilior: quantum vero ad alimentum pertinet, est iecore multo inferior: & quod ali-mentum corpori præbet, est etiam multo pituitosius. Cor, substantia quidem caro est fibrosa, atque dura, ideóque dif-ficulter concoquitur, & tarde permeat: sed tamen si probe conficiatur, alimentū corpori non paucum, neque mali suc-ci præbet.

De quadrupedum animalium ventriculo, utero, & intestinis.

Cap. 40.

Hæ partes carnibus duriores sunt. quocirca etiam si probe conco-

concoquantur
sed frigidiore
indigent, ut
nutrientur.

De

Domestico
midior. agre
hil omnino
eorum caro
& in oco
alimentum
habere: quod
extremum

De

Avium
præferin
volucrum
cipue per
ei, tardo
ter quos si
dictorum
caro turtur
concoctio
similis: volu
coctu diffi
bus autē ut
bus generat
esse carne
novellorum
siquidem sit
concoquent
que nuperr
& ideo ex
cedunt.

concoquantur, succum tamen non exquisitè sanguineum, sed frigidiorē, ac crudiorē faciunt: multoque tempore indigent, vt conficiantur, ac in sanguinem probum commutentur.

De agrestium, & domesticorum animalium differentia. Cap. 41.

Domesticorum animalium temperatura est agrestium humidior. agrestium vero est durior, pinguedinisque aut nihil omnino, aut certe paucissimum habet. quam ob rem eorum caro pluribus quoque diebus quam domesticorum, & in ocio educatorum imputris seruatur, Estque perspicuum, alimentum quod inde prouenit, multo minus excrementi habere: quod vero à domesticis, atque ociosis sumitur, esse excrementitium.

De alimento, quod à volucribus animalibus sumitur. Cap. 42.

Auium omnium volucrum genus gressilium generi, ac præsertim suillæ carni comparatum minus alimenti præbet. volucrum tamen caro est ad concoquendum facilior, præcipue perdicis, attagenis, columbæ, gallinæ, & galli gallinaeci. turdorum vero & merularum & paruorum passerum, inter quos sunt etiam, qui turricolæ nominantur, caro est prædictorum carne durior: atque horum quoque multo magis caro turturis, palumbi, atque anatis. Phasianorum, quod ad concoctionem & alimentum attinet, gallinarum carni est similis: voluptate tamen in edendo excellit. his durior, concoctu difficilior, ac fibrosior est psuonum caro. In omnibus autem volucribus animalibus perinde ac in quadrupedibus generatim sciendum est, carnem augefcentium multo esse carne declinantium meliorem: prauam vero admodum nouellorum: sed longe alia ratione, quam senio confectorum: siquidem senum caro dura, & neruca est, & idcirco praua ad concoquendum, & alimenti exigui est: at corpora animalium quæ nuperrime in lucē edita sunt, mucosa, humidaque sunt, & ideo excrementorum plena. omnino vero per aluum secedunt.

L I B E R

De anseribus & struthiocamelis.

Cap. 43.

Horum caro excrementitia est, multoque ad concoquendum difficilior, quam prædictorum animalium caro. ac potissimum quæ parua sunt, & carne dura sunt prædita. alarum natura fibrosa est, ac dura. quorundam vero caro tota est huiusmodi: quales sunt grues: quas comedunt, cum prius multos dies mortuas tenuerint. Inter grues autem, & anseres, caro tardarum, quæ *στρίδες* appellatur, est quodammodo media.

De volucrum animalium visceribus.

Cap. 44.

Horum ventriculi esculenti sunt, ac nutriunt, quidam vero sunt etiam periucundi, ceu anserum, deinde gallorum gallinaceorum altilium. & quemadmodum iecur in suis adhuc viuentibus esu caricarum iucundum præparant, ita in anseribus alimenta sero lactis imbuuntur, ut iecur non modo suauissimum sit, sed ut etiam valentissime nutriat, optimi succi sit, & non difficulter deiciatur: & pariter, ut in ventriculo probe concoquatur. Alæ quoque anserum ad concoquendum, & alendum sunt idoneæ: & his magis gallinarum. pessimæ sunt annosorum, optimæ vero iuniorum, ac probe nutritorum. Gallorum autem gallinaceorum testes sunt optimi: præcipue autem altiliū: ac multo magis, si cibus eorum sero lactis fuerit imbutus. nam & boni succi sunt, & nutriunt, & facillime concoquuntur. Nonnulli autem struthiocameli ventriculum, tanquam medicamentum concoctione adiuuans, falso laudant: alij vero magis mergi ventriculum commendant: verum hæc neque facile concoquuntur, neque medicamenta sunt alios cibos concoquentia.

De ovis.

Cap. 45.

Gallarum, ac phasianorum oua cæteris præstant: anserum vero, ac struthiocamelorum sunt deteriora. recentia quoque veteribus: quæque minus cocta sunt iis, quæ plus, præstantiora sunt. tremula autem ad corpus alendum sunt om-

omnium præ
quidem, sed
ter concoqu
sonant. et
alimento
ro in fart
cuntur, ali
cata appell
oleo garo
tur, caccabo
culo torum
crem con
creta sunt
diocritati
superne cal
permutamus
auteramus.

Caro m
crementit
eorum, q
ui sunt, q
uis versam
bilis est, int
tur in flum
qui vero n
gustus tibi
rior enim
est caro, ac
teniores sunt
aleni, præ
no eos parat

Hic p
terque p
statur, qu
prole non

omnium præstantissima: sorbilia vero minus nutriunt illa quidem, sed facilius subducuntur. elixa vero & assa, difficulter concoquuntur, tarde transeunt corpûsque alimêto crasso nutriunt. quin multo etiam tardius transeunt, crassiûsque alimentum præbent, quæ in calido cinere assantur. Quæ vero in sartagine inspissata sunt, & ταχυυια propterea dicuntur, alimenti sunt ad omnia pessimi. Quæ vero suffocata appellantur, elixis & assis meliora sunt. ea sic parant. oleo garo, ac modico vini inspergunt, vas, quo continentur, caccabo, in quo aqua calida insit, imponunt, ipsum operculo totum obstruunt: ignem substruunt, quoad oua mediocrem consistentiam sint consequuta. nam quæ supra modum crassa sunt, elixis & assis similia redduntur. Eidem etiam mediocritati consistentiæ intentos esse nos oportet in ovis, quæ superne caldariis infunduntur, ut ne ipsa omnino incrassari permittamus: sed cum adhuc succum habeant, vas ab igni auferamus.

De mugile,

Cap. 46.

Caro mugilum, qui in aqua palustri sordidâque viuunt, excrementitia est, atque admodum mucosa: optima vero est eorum, qui in puro mari degunt. Sed mugiles quoque prauis sunt, qui in stagnis vitam ducunt: ac præsertim qui in paruis versantur, & magis etiam, cum aqua non effluit, sed stabilis est. inter fluuiatiles autem præstantiores sunt, qui oriuntur in fluminibus, quorum aqua rapide fertur, ac copiosa est: qui vero in stagnantibus, ij non boni sunt. Iam vero gustus tibi mandenti præstantiorem mugilem indicabit. acrior enim, iucundiôrque, & pinguedinis expers eius est caro. at pingues, & gustui exoluti, cum ad vescendum deteriores sunt, tum peius concoquuntur, & à stomacho sunt alieni, prauumque succum faciunt. quam ob rem ex origano eos parant.

De lautace.

Cap. 47.

Hic piscis pelagius est. alimentum vero quod ex hoc, cæterisque piscibus habetur, sanguinem facit tenuioris consistentiæ, quam id, quod animalia terrestria suppeditat: ut copiose non nutriat, & citius discutiatur.

Inter pelagios hic quoque numeratur. omnium ferme aliorum carnem habet durissimam, & friabilem. nutrit, cum probe concoctus fuerit, valentius quam cæteri pisces. hi vero tum propter purum mare, tum propter cibum, ut etiam alij pisces omnes, optimi sunt. ergo qui cancellos comedunt, & grauius olent, & insuaues sunt, & difficulter concoquuntur, & prauis sunt succi. hos dignoscas, si prius quam vescare, ventrem referaris: inter vescendum vero primus statim odoratus, atque gustatus tibi eosdem indicabit.

His omnibus scarus excellere suauitate creditur. secundo loco censetur, merula, ac turdi: tertio iulia, fux, ac perca. Alimentum vero, quod suppeditant, non modo est concoctum facile, sed hominum etiam corporibus, ut quod sanguinem mediæ consistentiæ gignat, est saluberrimum.

Gobius littoralis est piscis ex eorum numero, qui parui semper manent. præstantissimus autem ad suauitatem, concoctionem, distributionem, & succi bonitatem est is, qui in arenosis littoribus, aut saxosis promontoriis degit. at qui in ostiis fluminum, aut stagnis maritimis viuit, neque ad concoquendum facilis est, neque boni succi. Si vero limosa quoque fuerit aqua, aut fluuius urbem expurget, gobius ibi genitus erit pessimus: quales sunt cæteri pisces omnes, qui in eiusmodi aquis vitam exigunt. porro gobiorum caro ut est saxatilibus durior, ita est mulorum carne certe mollior. ergo yescientium corpora pro portione nutrit.

Aselli si probo alimento vtantur, & in mari puro degant, carnis bonitate cum saxatilibus cõtendent; at qui alimen-

ro prauo vtut
dem carnis ne
runt, propter
que alimentum
Cæterum in o
rimus, memon
rem, qui laurim
teorum sordet
huiusmodi aqu
ro & mollior
certi vero min
lis caro est, & e
piscium appari
albo iure conti
aquam copiosi
anehi & portu
salis adhibet
paratus vel sp
rem prædictæ
exerceatur, q
qui vero ex
sape aures
eo, quod e
modatissim
nitas ad rae

De

Dracones
duram habent
duram ipsi qu
Romanos in
mollis est car
scorpij, trachu
meritur. Est v
quam eos, qui
concoctio qu
gumis origo
assimilatio in
ematur, præ
mollioribus

to prauo vtuntur, & in aquis mixtis versantur, mollitiē quidem carnis non amittunt, sed tamen pinguedinem acquirunt, propter quam non æque, vt prius, suaues manent: atque alimentum excrementorum plenum corpori præbent. Caterum in omnibus piscibus hoc est communiter, vt diximus, memoria tenendum, pessimos gigni in ostiis fluuiorum, qui latrinas, aut balneas, aut culinas, aut vestium ac linteorum sordes expurgant. Iam caro etiam murænæ, quæ in huiusmodi aqua versatur, pessima inuenitur. buglossus vero & mollior, & suauior, & omnino melior est passere. Lacerti vero medium, quodammodo inter pisces quorū mollis caro est, & quorum est dura, locum tenent. horum autē piscium apparatus ad concoctionem optimus est, is, qui ex albo iure conficitur, quod quidem paratur hoc modo. In aquam copiosam olei quod satis sit effundito, parūque anethi & porri addito, cum pisces semicocti fuerint, tantum salis adhibeto, vt totum ius nōdum salsum videatur. hic apparatus vel ipsis ægrotis est accommodatus. Omnium autem prædictorum piscium alimentum hominibus, qui non exercentur, ociosis, imbecilibus, & ægrotantibus aptum est. qui vero exercentur, cibos valentioris materiæ postulant. sæpe autem diximus, molle, friabileque alimentum, vel ex eo, quod optimi succi est, ad bonam valetudinem esse accommodatissimum. nihil enim est, quod magis, quam succi bonitas ad tuendam sanitatem pertineat.

De piscibus, quorum dura caro est.

Cap. 52.

Dracones, ac cuculi omnibus iis, qui eos comederunt, duram habere carnem perspicuo videntur. galeonymi vero duram ipsi quoque carnem habent, præter eum, qui apud Romanos in summo pretio est, quem galaxiam vocant: qui mollis est carnis, est vero hic etiā ex genere mustelorum. Iam scorpij, trachuri, orphi, & muli duræ carnis piscibus adnumerantur. Est vero perspicuum, pisces duræ carnis difficilius, quàm eos, qui molli carne præditi sunt, confici: siquidem & concoctio quæ in ventriculo, & quæ in iecore, & venis sanguinis origo. & quæ in singulis corporis partibus alendis assimilatio fit, in mollioribus facilius, in durioribus ægrius efficitur. præterea ex durioribus piscibus crassus succus, ex mollioribus vero tenuior gignitur.

Buccinæ, purpuræ, ostrea, hiatulæ, cæteraque his similia, cū integumentum quo extrinsecus ambiuntur testæ sit persimile, testacea nominantur. Est autem horum omnium commune, ut succum salsum in carne contineant alio subducendæ idoneum, qui in unoquoque magis, minusque ad hanc rem pro qualitatibus, ac quantitatis ratione sit proprius. siquidem ostrea carnem aliorum omnium testaceorum molliissimam habent: at parvæ hiatulæ, & purpuræ, & buccinæ, & quæcunque huiusmodi sunt, duram. ergo iure fit, ut ostrea potius alium subducant, minusque corpus alant: duriora vero difficilius concoquantur, & magis nutriant, quemadmodum enim ex animalibus testaceis quæ duræ carnis sunt, carnem ad concoquendum, ita etiam ad corrumperendum difficilem habent. quam ob rem ea sæpe iis damus, quibus cibus vitatur in ventriculo ob praeuos succos: qui vel ex iecore in ipsum confluant, vel in suismet tunicis contineantur. nam ex eis plurimus succus crudus, quem vocant, ex iis, qui mollioris carnis sunt, pituita gignitur. ut igitur, cum succum salsum abiecerint, eorum caro difficulter corrumpitur, aliumque sistit, ita si quis confectum ex ipsis ius biberit, alius quidem ei abunde delicietur, id tamen corpori nihil alimenti offeret.

De molli testa intestis.

Cap. 54.

Astaci, paguri, cancri, locustæ, carides, & alia consimilia tenui testa, duritie quidem simili testaceis, sed quæ minor sit, conteguntur. habent tamen salsum succum, eumque non exiguum. dura carne in totum constant: & idcirco difficulter concoquantur, & firmiter alunt, cum scilicet in aqua potabili præcocta fuerint. Horum etiam caro, ut ostreorum, cum ex aqua, ut dictum est, præcocta succum salsum deposuerit, alium cohibet. hæcque ægre non secus, quam testacea duræ carnis corrumpuntur.

De mollibus.

Cap. 55.

Mollia vocantur, quæ neque squamas, neque asperam

neque testaceas
dent. huius
hæc namque
mis sunt, diffi-
cum in se cont-
parum nutritur
di generant.

Aspera, non
idcirco non
rem habeant
ipsa autem ro-
atque suam
non difficulter
ut alia quoque
omnibus com-
paribus sunt
bus, nam part-
in se tabida
thiaz, omni-
dum diffi-
corpus alia

Phoca, b
canes, cæter
plenam ex
prius condie
Ex X

Narantia n
in delictis est
bus rationem
compage siqu-
re quid sunt
quales sunt plu-
di, merula, plu-
hos medi sunt
reales, quida
tota, qui qui
feruntur. lam

neque testaceam cutim: sed mollem, qualis humana est, habent. huius generis sunt polypus, sepiæ & cætera his similia: hæc nanque tangentibus mollia videntur: duræ tamen carnis sunt, difficulter concoquantur, & exiguum salsum succum in se continent. Si tamen concoquantur, corpus non parum nutriunt, cæterum hæc quoque plurimum succi crudi generant.

De chartilagineis.

Cap. 56.

Aspera, noctûque splendens est horum animalium cutis. idcirco nonnulli ἀπὸ τοῦ σέλας ἔχεν, hoc est, quia splendorem habeant, ea σέλας nominata fuisse dixerunt. inter ipsa autem torpedo & pastinaca carnem habent mollem, atque suauem, quæque mediocriter per ventrem transeat, & non difficulter concoquatur. nutriunt etiam mediocriter, ut alia quoque omnia, quæ molli testa sunt instructa. Est vero omnibus commune, ut partes, quæ ad caudam sunt, mediis partibus sint carnosiores: id quod præcipue inest torpedinibus, nam partes horum animalium mediæ videntur habere in se tabidâ chartilaginé quandam. Bati autem, Liobati, & rhinæ, omniâque huiusmodi, duriora sunt, & ad concoquendum difficiliora: & valentius, quam pastinaca & torpedo corpus alunt.

De cetaceis animalibus.

Cap. 57.

Phocæ, balenæ, delphines, libellæ, grandiores thynni, itæque canes, cæteraque cetacea his similia duram, mali succi, ac plenam excrementorum carnem habent, quapropter sale prius condientes ad usum ipsa redigunt.

Ex Xenocrate de alimento, quod ex aquatilibus existit.

Cap. 58.

Natantiû natura cibus extitit, qui in conuiujs splendidis in delitijs est habitus: ac magnum quoque ad salubrem victus rationem usum præstitit. Differunt vero pisces ex ipsa compage, siquidem alij duræ, alij mollis carnis sunt, ac duræ quidē sunt carnis phagri, synodontes, buglossi, & lati, quales sunt phesæ, & rhombi: mollē vero carnem habēt turdi, merulæ, phucæ, & eiusmodi, qui facile digeruntur. Inter hos medijs sunt aselli, bacchi, vmbellæ. Præterea quidam saxatiles, quidam pelagij sunt, ac magis alunt, qui prope littora, quâ qui aqueductuū meatibus mali succi, & ori ingrati feruntur. Iam maria quoque in hac re differunt. sunt namque me-

d

L I B E R

diocres pisces qui in Adriano, sed qui in Tyrrheno degunt, suauissimi. quinetiam verno tempore quamplurimi, quod oua pariant, sunt præstantiores, vt muli: æstate vero phagri, & synodontes: autumno vero hepatus, qui cum annum excedit, mali succi est, mugiles, & lupi delicatiores sunt. Ex ætate vero parui & noui facile corrumpuntur: cetacci vero difficulter in succum commutantur, duri sunt, ac stomacho noxij: qui vero medium locum tenent, ij medio quoque modo ad distributionem sunt affecti. In partibus quoque differunt, nam in partibus quæ ad caudam sunt, cum motu exerceantur, bonum alimentum afferunt, ac delicati sunt: in iis vero quæ ad ventrem pertinent, cum pingues fuerint, tum fluitant, tum vero ad excretionem rite sunt affecti. in dorso vero, dura caro est: at capita omnino propter salsum humorem, & pinguedinem non nutriunt, & difficulter distribuuntur. at facile admodum excernuntur maraugiæ & paguri: sed maxime omnium muli. Ex apparatu, assi magis nutriunt, sed difficultibus transeunt. elixi vero parum nutriunt, sed facillime deiciuntur. itémque marini ori suaues, apti stomacho, facillimi ad distribuendum, flaccidas, ac molles carnes faciunt, nam & coloratos faciunt, & sanguinem creant: aluiq; subducunt. At fluuiatiles & qui in stagnis degunt, stomacho noxij sunt, crassam materiam faciunt, difficulter excernuntur. & nonnulli nõ sunt marinæ materiæ expertes, vt coracinus qui in Nilo nascitur, & perca in Rheno, & in Tyberi lupus, qui est subsignatus. itémque Annienis, palusque in Phlernis eiusdem naturæ pisces gignunt. nam pabulum quod illic eis suppetit & boni succi est, & valde accommodatum. Ex omnibus vero piscibus antepponendi sunt ij, qui virus non habent, & præpingues sunt, ac boni succi, & moderati. Cæterum ex piscibus alij natantes, alij chartilaginei, alij molles, alij testa operiti. quorum exponendæ sunt qualitates. Apua minimus est, gregarius, & in olla paratur. Alopeces, Lippuri, Thrissi, Lerusque ex mari in flumen confugientia difficulter in succum mutantur, stomacho non conueniunt, difficulter concoquuntur, & exiguum alimentum præbent. acharnes vero duræ est naturæ, a gre corrumpitur, nec est stomacho accommodatus, nec probum succum gignit. Velonæ, quæ rostri cornei sunt, ineptæ stomacho, malique succi sunt, non nutriunt, facile corrumpuntur phocæ, Iulides,

Tra.

Trachuri, q
ceteri omne
dendo apti
facile corrumpuntur
thrinus on gr
dum valet: &
suffocantur
est piscis, &
ber, diuulso a
quam ob rem
eiusque presta
nis, collas, ap
macho sunt. m
ad excernend
lamiscolas re
nis et subon
nes, brachice
lei, canes, &
us odoris sui
autem mens
macho id
terea vero,
pelagiæ ac
puntur, diti
ac quæ in lig
li fuerit, &
ram carnem
tamen succi su
po (est enim i
sparo, ellops
cem gignit, al
mediocriter ad
ter vero conc
mugil vero pel
dens, præterea
le subducitur.
mannam duri
vero in rubid
dens est, diffi
est reddendus, &

Trachuri, qui Sauri ab aliquibus nominantur, & Canni, & cæteri omnes, qui sartagini conueniunt, ori quidem comedendo apti sunt, sed tamen stomacho non sunt idonei, & facile corrumpuntur, fluitant, ventrem non alunt, erythrinus ori gratus aluum sistit. duræ compagis est, ad nutriendum valeri: & ad res venereas excitandas, si quis cum vino suffocatum bibat, aptus est, thranis, aut xiphias cetaceus est piscis, & in frustra secatur. ori autem ingratus est, scaber, difficilis ad conficiendum, valenter nutriens, graue olēs. quam ob rem & cum sinapi comeditur, & in olla paratur. eiusque præstantior pars est imus venter. tynnus, & tynnus, colias, orycinus, pelamis, scombrusque non apti stomacho sunt. mali succi sunt, flatum gignunt, scabri, difficiles ad excernendum, nutriunt: quorum valentissime nutrit pelamis: colias vero & ori ingratus est, & nullus succiat tynnus ei subiicitur. tynnus vero difficulter concoquitur. Sionnes, brachicephali, pectines, chelidones, vranoscopi, galei, canes, & qui sunt generis eiusdem, mali succi, & grauis odoris sunt: segnem materiam trahunt, & gignunt, apti autem mensæ sunt sargi, melanuri, canthari, suntque stomacho idonei, boni succi, ac facile distribuuntur. præterea vero alunt, & apti ad excernendum. Salpæ autem pelagiæ acris sunt saporis: ori gratæ, difficulter corrumpuntur, difficulter separantur, alunt, facile excernuntur. at quæ in littoribus capiuntur, duræ sunt carnis, & mali succi, & ori insuaues. buglossi vero, & palleres duram carnem habent, ac difficulter corrumpuntur: boni tamen succi sunt, & facile excernuntur: glaucus, cum lupo (est enim in omnibus ei similis) minus. præstat autem sparo, ellops: stomachoque est idoneus, succum dulcem gignit, alit, facileque excernitur, hepatus: hemaxias, mediocriter alit: delicatus, solutus, ori gratus, difficulter vero concoquitur, & alit, & facilis excretionis est. mugil vero pelagijs optimus, ori gratus, acer lupo non cedens. præterea hic quoque præter quam quod tener est, facile subducitur. in limpidis autem ac puris fluminibus natans marinam duritiam dulcis temperiei beneficio remittit: qui vero in turbidis, & stagnis in quibus aqua stat, grauioris odoris est, difficillime distribuitur, cumque ex fimo pinguis sit redditus, admodum inertem carnem habet. cum vero in

L I B E R

magnitudinem excreuit, indurefcit. nonnulli vero mugilē,
plotem vocant. Citharus & rhombus lati sunt. rhombusque
solidus est, difficulter corrumpitur, qui quidem si magnus
fit, quoniam difficulter conficitur, & satis alit, per vnum diē
adferuatus coqui debet. ac citharus mali succi est, & stoma-
cho non idoneus. ægre corrumpitur, facile excernitur. Ciclæ,
cottyphi, phæcides teneræ sunt carnis, boni succi, facile di-
geruntur, non nutriunt, ad alui deiectionem accommodati.
Coraxus duræ carnis est: & cū maior est, atque auctior, gra-
uis odoris, difficilis distributionis, ori aptus: alienus tamen
à malæ materiei sobole. estque cæteris similibus suauior. Lu-
pus vero variatur. nam quanto maior est, tanto durior effi-
citur, bimestris est optimus, stomacho idoneus, boni succi,
tener. Vrsa dulcem succum facit, nutrit, facile distribuitur, &
facile excernitur, atque ita quidem de pelagia censendum
est. at quæ in piscinis degit, omnia habet contraria, quem-
admodum in aliis quoque piscibus vsu venit. ori nanque
insuaues sunt ij, qui conclusi viuunt. quæ vero in flumini-
bus degit, eo quod ex mari frigidam aquam subit, ori grata,
teneraque est. quæ vero in portus transit, limosa, & coangu-
stata, & pinguis reddita ori ingrata est. asellus non acris sa-
poris est, boni succi, difficilis distributionis, facile subduci-
tur, alit. Scorpenæ duræ carnis propter succos sunt, & ob
eam causam apparatu indigent: & cum ad excretionem aptæ
sint, ori quoque sunt gratæ. Umbellæ ori suaues, boni succi,
facilis distributionis, non admodum nutriunt, facile excer-
nuntur. Scarus ori gratus, difficulter digeritur: facile corrū-
pitur, & deiicitur, qui vero nuper captus est, neque viuariis
fuit inclusus, multa habet interiora, & ori gratus est, &
fluitans. facile corrumpitur. Synodus habet ille quidem
carnem duram, sed tamen non est alimenti expers. boni ve-
ro est succi, ac facile distribuitur, & mediocriter nutrit, & fa-
cile excernitur. mulus obsoniorum præstâtissimus est, & sto-
macho idoneus, & boni succi, & ori gratus, caro plana,
difficilis ad corrumpendum: & mediocris ad excernendum.
differt autem pelagius à saxatili, quod rufus sit, cinnabariq;
atque auro similem aspectum habeat. itémque barbam fert.
his autem inferiores sunt ij, qui in littoribus viuūt. phagrus
duræ carnis est, difficulter corrumpitur, non facile secerni-
tur. aurata candidæ carnis est, solida, condensâ, boni succi,
facilis

facilis distri-
Gongrus m
concoquant
cans.

Vertice, qu
cho non men
modiores
purgationem
mixta, atque
posuit, & ali
carbonibus
Cum pello au
concoquant
oleo elixant
vunt vt labrit
culter conco

Glandes
vescamur. q
miscetur. n
petris edu
que sunt, n
accommod
rinam clem
decoctum
tam non deg
se ferunt. &
glycymerides
peloribus. h
dura est illa
gis, quam pele
ti, indurefcun
genere pelorit
vane, & longe
in portu sunt
ro & Dioco
gladibus que
ducentes, aliq
mi iuat, qui ad

facilis distributionis, alitque, & non difficulter excernitur. Gongrus nec ori gratus, nec mali succi est, modice aptus ad concoquendum, & alendum: & ad excernendum vitio vacans.

De Vrtica.

Vrticæ, quæ etiam acaliphe dicuntur, grata ori, & stomacho non mediocriter ineptæ, sed affatæ sunt elixis accommodatiores. alui cient, vrinamque magis mouent quæ post purgationem exortæ iuxta calculos, lotæ, & perexiguo sali mixtæ, atque ita parum aspersæ sunt, vt mediocriter mandi possint, & affatione concretæ aut verubus, aut furculis super carbonibus maluæ, aut sarmentorum, vt valenter soluant. Cum passio autem, aut vino mulso gustum excitantes facile concoquuntur, facileque excernuntur. quæ vero ex passio & oleo elixantur cum alio etiam condimento, id quidem seruant vt lubricæ sint, atque attrahant, sed & explent, & difficulter concoquuntur, & aluum magis relaxant.

De testa operis.

Glandes optimæ sunt, quæ estate capiuntur, aptæ, vt eis vescamur. quæ quidem exoriuntur, vbi aqua dulcis mari admiscetur, nam & alunt, & dulces sunt. plerunque autem in petris educantur. Suauissimæ enim sunt quæ alunt, friabilissimæ sunt, multumque succi faciunt, & ad aluum molliendam accommodatæ: & stomacho idoneæ, ori gratæ, teneræ, & vrinam cient, succus earum simplex confici non potest, at ius decoctarum ad excretionem valet, quæ vero in petris vitam non degunt, acres sunt, & medicamenti facultatem præ se ferunt. & plus ventrem citant, quam vrinam moueant. glycymerides præstantiores sunt trachibus, inferiores autem peloridibus. hæc nanque stomachum disgregant, earum caro dura est illa quidem, sed non expersimenti. & vrinam magis, quam pelorides cient. affatæ autem, mea quidem sententia, indurescunt. elixatæ vero & conditæ ori sunt gratæ. Ex genere peloridum, sunt hiatulæ. diuersæ autem sunt, atque variæ, & longæ, vt Dicearchiæ in lucrino lacu: & Alexandriæ in portu. sunt enim dulces, & boni succi. quæ vero sub pharo, & Diolco, & ponte, & insula oblongæ sunt, & asperæ. glandibus quercinis similes: & æque ac phagi echinum producentes. albæ autem sunt, duræ, atque acres. Pectines optimi sunt, qui ad iustam magnitudinem peruenerunt, cauti, co-

d iij

lore nigriore. præstant autem vere, atque estate: siquidem eo tempore ad lunę incrementum maxime augentur. omnibus autem antecellunt Mitylenę magnitudine, natura, humoris bonitate. his similes Ionium mare iuxta Illyrida, Hetruriā, Salonas, & Latium producit. Iam vero & Chios, & vicinę insule, itēque Alexandria huiusmodi pisces ferunt. Pontus vero multos fert, sed minutos, & qui ægre augeantur. dulces sunt, ac facilius, quam ostrea concoquuntur. ex aceto sumpti ad excretionem accommodantur. & cum ex posca coquuntur, dulcitudinis participes sunt, quam assando deponunt. pari quoque modo contriti aluum solvunt. idque siue recētes, siue vetusti fuerint, parum autem vrinam cient. qui buxei coloris sunt, sicut ostrea, non facile corrumpuntur. elixi sunt assatis ad aluum subducendam aptiores. quique magis assati sunt, minus succi habent, & difficulter excernuntur. Existimādum quoque est, eos, qui in suis testis assantur, minus eos perturbare. valentiores autem assati sunt. quique expurgati plane, purēque fuerint, ij grati ori sunt, & facile concoquuntur. & testaceis anteferendi sunt illi, qui sale conditi sunt: nec admodum perturbant. natiuam autem dulcedinem in muria conseruant: & vrinam mouent. ac candidi quidem & lati sunt dulciores. atq; albi sunt duri. rufi vero sunt virosi, & vrinam cient. varij autem medij sunt, & eorum aliqui fucis sunt similes. qui per se dati, difficulter concoquuntur, & tamen vrinam mouent. assumpti vero peccines remedio sunt iis, quorum vesica vlceribus sordidis, & crustam habentibus vexatur: siquidem ea expurgant. Buccinę sunt duriores purpura. & magnitudine ac loco differunt: triplicēque vires habent testæ, colli, & excrementi in testa contenti. nam scabra substantia piscis aluum sistit, ac præcipue si assetur. contra magis facit elixa. collum earum aluum soluit, difficulterque concoquitur. idcirco ex sinapi, vel aceto, aut liquore, aut pipere corrigere ipsum debent qui eodem vescuntur. aqua denique quæ ex eis emanat, calefacta ventrem subducit. cum eo vero excremento quod testa continetur, cocta, magis gilua fit, & piscis qualitatem præfert. si vero totæ decoquantur, maiorem sistendi vim habebunt: & sium afferent. quidam vero eas elixantes laui-gant, & æque ac vrticas condiunt: fiuntq; ori gratę. Luna ex oriente plenæ, & estate graciles. purpuræ maiores duriores

res sunt: & et
ficulter confic
apæ stomach
ta fundum ver
facile fecerit
sodorem moue
lem, nou seam
tes autem ad
que eiusdem fi
aptissime: caru
se emittit ori g
tem, dulcium v
ad cochlearum
conciat: ad vir
satis vero, duræ
netur, sicut mor
ter concitanti
do sustinet: roci
magna sunt. p
sa sunt, duræ
taceque sicut
so, aut cum
quinque di
queque hui
dem carnis, &
& superdum
sumptę, acco
ventrem pertu
res: suntque te
ues comparati
res ad excrecio
rum pars stom
tur: cum aceto
pinguecant. ac
notæ sunt, in q
non absumit
ma, nascuntur
conciuntur, &
te ori. Munces
rura, & aceto,

res sunt: & earum coria mediocriter corrumpuntur: colla difficulter conficiuntur, ægre secedunt, ægréque corrumpuntur. aptæ stomacho, pauci humoris sunt, vix mandendo dissolutæ: fundum vero aut earum excrementum, facile conficitur, facile secedit, maiorem piscis facultatem affert, vrinam ciet, sudorem mouet, sputum creat. si quis eo largius vescatur, bilem, nausæamque facit, & atri humoris copiam gignit. partes autem ad caudam pertinentes, aut extremitates earum, quæ eiusdem sunt generis, quæ turbinatæ sunt, omnium sunt aptissimæ: earumque vsus elixando, & assando humorem ex se emittit ori gratum, ventriculo idoneum, aluum subducen- tem, dulcium vrinarum motorem, parum tamen carnis facit, ad cochlearum proportionem. sed & ori suauem odorem conciliat. ad vini potum incommodæ: elixatæ nutriunt: assatæ vero, duræ sunt, earum excrementum, quod testa continetur, sistit more buccinarum. Cochleæ duræ sunt, difficulter conficiuntur. harum species sunt hæc: teres, quæ tubæ modo sufflat: rotunda, quæ oleum effundit. harum quæ nimis magnæ sunt, ineptæ ad comedendum censentur, quia virosæ sunt, duræque, ac bilim creant, & multa eis caro inest, cetaceæque sunt. breuius vsus nonnullis placet cum aceto mulso, aut cum foliis viridibus rutæ, cum oxypipere. quæ vero quinque digitorum sunt, & imam partem acutam habent, quæque helices, aut actinophori nominantur, minus quidem carnis, quam ceteræ cochleæ habent, sed tamen explent, & superfluunt. at præmadefactæ, & assatæ, atque ex aceto sumptæ, accommodatiores sunt. ac cochleæ omnes incoctæ ventrem perturbant, marine vero vertices habent dulciores. suntque teneræ, boni succi, difficulter corrumpuntur, leues comparatione terrestrium: valentiores enim & molliores ad excretionem cēsentur, suauiorisque odoris, & ima eorum pars stomacho idonea. cochleæ porro egre concoquuntur: cum aceto vero & succo aperiunt: ut qui eis vescuntur pinguescant. ac cum eruca etiam comeduntur. Lopades minutæ sunt, in quibusdam vero locis sunt magnæ ut ab ostreis non absimiles videantur. maximè in India, sicut cætera omnia, nascuntur. cæterum duræ, & pauci succi, difficulterque conficiuntur, & excernuntur. coctæ autem conditæ sunt gratæ ori. Murices salsi, virosi. eis succurritur liquore cyrenaico, ruta, & aceto. ventrem turbant. vrinam ciet, ori non grati.

d. iij.

L I B E R

concoctu difficiles. obstruunt crasso sanguine . pituitam gi-
gnunt, & magis adeo recentes . idcirco parandi sunt cum a-
cribus, vt sinapi, crucæque. assi difficulter sedunt, magnam si-
tim inuehant, grauant: elixari, contriti, & conditi minus vi-
rosi sunt. sed eadem quæ turbinati faciunt. mures rotundio-
res quidem sunt muricibus, sed minores, & hirsuti: testam-
que tenuem ferunt . caro magis tenera est, ac dulcior : succi
magis varij. minus etiam nutriunt, os mordicant, faucium
deglutitionem conuellunt: vocem condensant, aut absin-
dunt. qui large eis vescuntur, tusses siccas, & raucitates eis ex-
citant. arenosi vero boni nō sunt, vel qui in siccilibus figulo-
rum, vel in petris, vel in alga nascuntur. sunt enim acres. o-
strea vero pelagia rara, & inutilia sunt. quia ea sol non aspi-
cit. & exigua magnitudinis sunt. amaraque sunt, nec escu-
lenta, quia ventrem mordicant. gaudent dulci temperamen-
to immixta, quod carnes dulces auget. idcirco ad Nili ostia
præcipue in Aegypto, & in Epheso ad Caistri ingressum in-
clusa, vt semina ponunt, & ita crescunt. Vere igitur crassef-
cunt expleta albo humore & lacteo: præterea Brundisij,
Tarracone, Narbonæ, Dicæarchiæ, in Lucrino lacu, Cheli-
donia, Leucade, Actio, & lybico sinu idem fit. pelorides ve-
ro, aut melænides optimæ sunt, quæ similes sunt ostreis in
stagnis, & limosis paludibus, vbi aqua dulcis immiscetur. quæ
vero in fundo degunt, cum raræ sunt, tum vero etiam insua-
uiiores. his accommodate vttere ex iure conditis ad alui sub-
ductionem, adiuuant concoctionem. mediocriter secedunt.
Pinnæ locorum causa aptæ sunt. teneræque bene alunt: ex
lutulentis locis captæ, & in quibus aqua dulcis & tranquilla
miscetur, quia ab vndis non offenduntur, teneræ permanent.
Pinophylaces vero qui sunt eiusdem alimentum participes, ti-
tillantes ac pinnas admoventes, pinnæ consulunt, atque au-
xiliantur. ac potius in lapidosis & pinnis assuetis locis mo-
rantur. magnitudinis autem causa pinnæ minores sunt mag-
is teneræ quam maiores. Verno autem tempore, atque æsti-
uo captæ longe excellunt iis, quæ alio tempore capiuntur.
nam præterquam quod bonam alimoniam dant, dulces etiam
sunt: cum tunc oriantur. & magnitudinis ratione, quæ non
magnæ sunt, aliis præstant. mediæ carnem habent mollem,
albani, dulcem. earum dura sunt colla: cōcoctūque difficilia,
& quæ ægre diuiduntur, & ægre corrumpuntur. sed earum

cor-

corpus facilius, quam collum, corrumpitur. elixantur oleo
 dulci, melle, similiter & vino. quæ vero ex aqua elixantur, iis
 præter naturam conchularum, ex sinapi vefcimur. assæ durio-
 res sunt elixis: & præsertim quæ vino parantur. præstat enim
 eas ex liquore, aceto, & sinapi parare. at earum quæ in vino
 & aceto maduerunt, magis tenera est caro, sed flatum ciet.
 Strombi vero duri sunt, egre conficiuntur. ac magis etiam
 ij, qui auriculis maiores sunt. cum sinapi vero & liquore in
 aceto læuigati accommodati sunt. Solenes, aut auli, aut do-
 naces, mares ac fœminæ sunt, quæ vngues nominantur. dif-
 ferunt autem, nam fœminæ mundæ sunt, & vrinam cient: hu-
 mestant. parantur vero aperte, recentes vero ac magni, quæ-
 que nigris quasi virgis distincti versicolores sūt, mares sunt:
 vrinamque turbant. sed omni molestia vacantes redduntur
 sale & aceto parati. at vitiosi, & excrementorum pleni ex o-
 leo & sale sumpti, & ac loligines ad potum parantur. opti-
 mi sunt maiores & crassiores assati. minimi dulces sunt. ac
 dulciores quoque fœminæ vnius coloris. vere autem vigent,
 & florent. sale cōditi, insuaues sunt. Tethea in limo nascun-
 tur, & littoribus algæ feracibus: inueniunturque in musco,
 alga, & fuco: similiaque sunt fungo plantæ marinæ. præterea
 vero qualitatem manui indunt, quæ difficulter abstergetur.
 maximæ vero eorum coria non conficiuntur. auxiliantur au-
 tem renibus, aut quibus vitiatus est stomachus: & quos ti-
 nesmus exercet: & coxendicis morbis laborantibus & ventri
 superiori vna cum ruta. Secantur etiam, & lauantur, ac liquo-
 re cyrenaico, & ruta, muria, & aceto, vel ex aceto condiun-
 tur, estque operæ pretium ea cum viridi mēta conficere. præ-
 stantissima vero in Smyrna insula Asiæ nascuntur. Aegyptus
 vero hæc non fert omnino. Telinæ, siue xiphydria aluū sub-
 ducunt. locis arenosis proueniunt, & portubus vndis agita-
 tis. fluuiatiles telinæ maiores sunt, & plus succi habent. qua-
 les Aegyptiæ sunt. elixatæ sunt dulces, earumque ius aluū sol-
 uit. clausæ vero sale sparguntur, & per testas humorem tra-
 hunt. frigida lauantur aqua, & ex oleo & aceto, vel menta,
 vel ruta comeduntur. qui aluum soluere voluerint, eas solu-
 bili apparatu cum oleribus condient. quæ florē ætatis agunt,
 si comedantur, vere sunt optimæ. Ex chemis asperas nonnul-
 li glycymeridas appellant: alij conchas vocant: quæ longius-
 culæ sunt, sed minores quam quæ in Aegypto visuntur, quæ

L I B E R

in sectione asperitates habent glandium quercinarum asperitatibus non dissimiles: in longitudine vero virgatæ sunt, & eruptiones à cæteris differētes habent. quæ vero gustatui maris odorem repræsentant, durioris sunt carnis: danturque imbecillis. aqua ab eis manans stomacho est idonea, & ventri in transitu. eadem sale conditæ trahere urinas possunt. os itidem iuuant comedendo, & præsertim ex sinapi, aut aceto, & ruta. Leues autem chemæ maxime differunt ab asperis. habent enim latam testam, & pellucidam, ac facile concoquuntur, boni alimenti, bonique succi, ac dulces sunt, & non in iucundæ stomacho. ex liquore cyrenaico, & sinapi eis elix & asis vescimur. coctarum iusculum soluit ventrem. at glycymarides iucundiores sunt conchis, quæ leui testa sunt: sed minus quam pelorides. Differunt autem ex locorum situ, ut pelorides varietate, ac figura. nam quæ in portu Alexandria inueniuntur, optimæ sunt: quæ vero prope Diolcum & Pharium & pontem teretes sunt, atque asperæ. quæ vero auriculæ nominantur, prope petras nascuntur, duræque sunt, difficulter cōcoquuntur, ori insuaves, & alienæ stomacho: & per aluum secedentes. cum ruta exhibētur: cum non alia ratione gratæ fiant. magnæ in Illyria nascuntur in Ionio sinu: atque ex cyrenaico liquore, aceto, & ruta comeduntur.

De piscibus cetaceis sale conditis.

Sale conditi pisces communiter quidem sunt ori grati: sed mali succi, & stomacho alieni: leniuntque ac vrbant aluum. ex sale vero conditis alij duræ carnis sunt, alij suapte natura humidæ compagis sunt: alij teneri, alij medij inter hos: alij carnosissimi, alij ex pinguedine constant: alij vetustissimi, alij medij. alij recentes, ex quibus pelagij extensi sunt, nuper capti cedentes: medij vero diuturni, mediocres. atque alij quidem valde pingues sunt, & excrementorum pleni: minus illi nutriunt. de cæteris, qui duræ sunt carnis, ij difficulter vitiantur: qui magis teneri sunt, facile corrumpuntur. Colij sunt ori grati, aluum mouent. Iberici cæteris præstant omnibus. Pelamis exigua nascitur in Mæotide. ori grata, facile corrumpitur, facileque excernitur. Cybium, hoc est cōcisa, pelamis, quæ post quadraginta dies à Ponto in Mæotim reuertitur, ori grata, & boni alimenti. quod vero Leoræum appellatur, suaue est, boni alimenti, suum non inuehit. Triton sectum cybium ægre vitiat, solidius est cybio, in cæteris par. Orycalus est
pela-

pelamis max
quia difficil
nefrabitor
buitur, atque
ex Oceano ve
appetunt ex
on gratos. diff
Parius. Sallam
se differentiam
tura: alia diffi
gratum est. &
durissimum. C
est ad comed
mcho idoneu
ci facileque co
mentum parit
similitudinem
habent. appet
ditis sunt. ex
corrumpant
vocabulo
& phagii
ter purior

Ex sinu
producti, qu
comeduntur
de media ma
ij, qui ad sp
vero marini
sunt, qui etia
Ex mugilibus
& alijs comedi
coracinis qui
sui assumpti
non omni tem
minima sal
dem est. sed
co cum acris
sesta tracta

pelamis magna, quæ in paludē non redit, tritoni similis, sed quia difficilius vitiatur, ideo insignē vetustatem fert: tritone friabilior, sed oris suauitate illi cedens, facile vero distribuitur, atque concoquitur. Sarda, ita vocatur pelamis longa ex Oceano veniens, ori grata est, acrimonia cybio præstans, appetitum excitans, facile ad excretionem lubricās. Scomber ori gratus, difficilis corruptu, sitim afferens, laudatissimus est Parius. Salsamenta vero quæ ex tynnis sunt, magnam inter se differentiam ostendunt, alia enim eorum facile distribuuntur: alia difficulter. eorum ceruix fit salsamentum, quod ori gratum est, & ægre vitiatur, quia est pinguedine vacans, laudatissimum Cumis. Tynni vero venter cum recēs est, aptus est ad comedendum: sed vetustatem non moratur. estque stomacho idoneus, ut in genere sale conditorum: boni est succi, facileque corrumpitur. sed propter pinguedinem excrementum parit. cæteræ partes melandryæ dicuntur propter similitudinem quam cum nigricantibus quercus radicibus habent. appetitum excitant sinapi adiuncto. & quia pinguedinis sunt expertes, ideo fit, ut difficilius, quam imus venter corrumpantur. atque hæc quidem partes proprie & vñtato vocabulo τὰ ἐῖχα hoc est salsamēta nominantur. multi enim & phagri ex India duri existimantur: suntque cetacci, nec inter puriores marinos adnumerati.

De salsamentis fluuiatilium, & palustrium.

Ex fluuiatilibus, ac palustribus Nilus mures, & phagros producit, qui quoniam pinguiissimi sunt, ideo elixi ex sinapi comeduntur. si maior eorum copia assumatur, supernatant. de media materia ex mugilibus in salsamenta condiuntur ij, qui ad spinam dissecti sunt, & mendesij vocantur: eugies vero marini sunt. hi que in fistilibus sale conditi cibo apti sunt, qui etiam crudi detracta pelle, & euulsa comeduntur. Ex mugilibus quoque qui acropasti vocantur, suaves sunt, & assii comeduntur, non secus quam marini, & mendesij. Ex coracinis qui sale conditi sunt, hemineri dicuntur. ipsique assii assumpti vicem gerūt alicuius autumnalis fructus. hi que non omni tempore, sed hyeme nascuntur. sunt quoque alia minima salsamēta, quibus crudis vescimur. Auris proba quidem est, sed aruinam peculiarem quandam inducit, & idcirco cum acris oleribus ea vescuntur. quorū, ut sit hæc perfecta tractatio, commemoratio facienda est nobis. vocantur

ergo alia eorum coracidia, alia boridia, alia colia, alia typhli-
nidia, alia abramidia. quæ omnia stomacho aliena sunt, dif-
ficulterque corrumpuntur, & aluum subducunt.

Galenus de lacte & caseo.

Cap. 59

Bubulum lac crassissimum est, ac pinguisimum. camelinū
vero liquidissimum, & minime pingue: deinde vero equinū,
tum asininum: at caprillum, moderatæ consistentiæ est. quo
crassius est ouillum. habita vero anni temporis ratione lac
post partum est liquidissimū. & temporis progressu semper,
ac magis, magisque incrassescit. media autem æstate ipsum
quoque in medio naturæ suæ consistit: post vero hoc tēpus,
paulatim iam crassescit, donec prorsus deficiat. Vere ut liqui-
dissimum est, ita maxima eius est copia. porro ex contrariis
substantiis sero, & caseo lac constat. præterea vero habet ter-
tio loco, ut pinguis succi particeps sit: cuius plurimum habet,
ut diximus, lac bubulum. ideoque butyrum, quod vocant, ex
eo conficitur. ouillum vero, ac caprillum lac habet quidem
aliquid pinguedinis, sed minus quam bubulum. quam ob re
efficitur, ut quandoque in ventriculo alicuius sit coagulatum,
si statim, ut emunctum est, calidum fuerit epotum. si vero
sal, aut mel addatur, neque concreescere, neque coagulari in
ventriculo poterit. Ad lactis vero bonitatem magnopere fa-
cit pastio bestiarum. Perspicue autem videmus lac earū, quæ
scammoniam, aut tithymalum depastæ sunt, purgandi vim
habere. ex quo planum est, lac esse acre, & acidum, & auste-
rum ubi vitiatæ pastiones sunt: eum semper herbarum natu-
ræ assimiletur. non ergo opus est pastus bestiarum neque
acres, neque acidos, neque austeros nimium esse: ut lac asse-
rant, quo tanquam optimi succi usuri simus. iam vero debe-
re esse animal florentis ætatis, & præditum corporis habitu,
qui vitio careat, clarum utique est, & nihil est, cur ego id
pluribus explicem. sed mirum in modum usus eius frequens
dentes & gingivas lædit. nam gingivas flaccidas, dentes pe-
trefactioni, & erosioni obnoxios facit. ergo sumpto lacte os
vino diluto colluendum est: erit etiam accommodatius, si mel
eidem adicias. Dignoscitur autem lac cum vel calefit, vel
coagulo cogitur, aut alio quouis modo. nam & scissio, quam
appellant, vel citra coagulum, idem efficit, cum lacte abunde
excalfacto oxymel frigidum instillamus. quod idem vino
mulso

multo efficiunt
frigidissime ph
id lac, quod po
nus coagulat
latur autem id
pobus. Ex case
ac latus densior
valde glutinosu
Quod autem p
erit, omnium
mentem qualita
litates excedit
cremalem, qui
Postquam vero
bit ex rufu qua
qualitas paulat
rat, is non boni
curari, & diffi

Acidum la
ut pote quib
cum, lædi
dum ab eo
est, vir ipsum
tinet. Verum
tum abest ut le
ex quo patet,
succum efficere

Ex Ruffo
lib

Qui lac potat
porionibus deb
nat partes defe
molitur, necit
tum fuerit, con
multum, & post
vicare, necesse

mulso efficitur, ac quandoque nihil ei instillâtes vase aquæ frigidissimæ pleno in lac demisso ipsum scindimus. Præterea id lac, quod post partû emunctum est, absque coagulo protinus coagulatur, si parûper super calidû cineré calefiat: appellatur autem id, quod ita confectum fuerit, pyriastes, & pyriophthus. Ex caseis mollior est durior præstantior: rariorque ac laxus densiore, & compacto: cum etiam vitiosi sint, & qui valde glutinosus, & qui ad asperitatem vsque est friabilis. Quod autem pertinet ad eam cognitionem, quæ ex gustatu existit, omnium optimus censendus est is, qui nullam vehementem qualitatem habet: sed dulcitus parum cæteras qualitates excedit. est etiam præstantior, ac suavior, qui medio-crem salem, quam qui permultum, aut prorsus nihil habet. Postquam vero caseum sic examinatum sumpseris, tibi licebit ex ructu qualisnam optimus sit, cognoscere. cuius enim qualitas paulatim aboletur, præstantior est: cuius vero perdurat, is non bonus est. nam planum est huiusmodi caseû ægre mutari, & difficulter alterari.

De acido lacte.

Cap. 60.

Acidum lac eos lædit, qui frigida sunt dentium téperatura: ut pote quibus dentium stuporem inducat. est etiam perspicuum, lædi ventriculum, qui sit frigidior, nec commode acidum ab eo lac confici. qui nanque moderatæ temperaturæ est, vix ipsum concoquit: non tamen penitus immutatum cõtinet. Verum si ventriculus fuerit quam par est, calidior, tantum abest ut ledatur, ut etiam aliquo commodo perfruatur. ex quo patet, acidum lac frigida temperiei esse, & crassum succum efficere.

Ex Rufo de potu lactis. hoc autem in medio quinto libro continetur, cum de lacte loquitur.

Cap. 61.

Qui lac potare in animo habet, ab aliis abstinere cibis, & potionibus debet: donec ipsum fuerit concoctum, & ad infernas partes descenderit. nam si parû quidpiâ cuiusvis rei lacti misceatur, necesse esse & ipsum lac, & id quoque quod assumptum fuerit, corrumpi. præstat igitur mane bibere lac recens multum, & post nihil sumere: eoque tempore nimios labores vitare. necesse enim est, ut in iis acefcat, qui tum se labori de-

dunt: sed melius est quiete inambulare, & interim vigiles qui
escere. nam hoc pacto lac quamprimum per aluum descen-
dit. vbi hoc defectum fuerit, aliud bibendum est. cumque hoc
descenderit, aliud deinde bibendum. atque in initio quidem vtiliter
ex alia corporis mole non admodum multum purgat, sed ea
quæ in ventriculo sunt, & quæ cum illa secesserint, ex propin-
quis partibus eò dilabuntur. qua re confecta venas ingredi-
tur, & optime nutrit: & non amplius secedit: sed ventrem si-
flit. ergo ei, qui alui subducendæ causa lac bibit, maior
eius copia non erit incommoda, at qui alendi gratia, eius ad-
huc cupidus ab eodè abstinere: quia multa considerare opus
est. nam & corpus inane cruda recipit. & inani facillimum est
impleri, ob eam causam in euacuationibus seruare modum con-
uenit. nec debet quiniis bibendi lactis causa ad aliam victus
rationem mutari: præsertim vero in morbis thoracis diutur-
nis, & quos tussis affert. Si vero sputum decidat ac defluat,
longior lactis oblatio cõferet. sed aliquid temporis est inter-
mittendum, deinde iterum dandum. Ad erodentes humores,
& echymomata potui dandum melle admistum. ita enim &
præstantius est, & aluum magis deicit. sapa quoque, & vi-
num dulce ei admiscetur. Sed aluum quoque deicit, si sal ad-
iiciatur, verum fit insuauius. In torminibus, & biliosis fluxioni-
bus, & omnino in is, quos ieiunum intestinum vexat, &
cum ad ventriculum colliquationes confluunt, decoctum
lac dari conuenit. ac primum quidem lente, & paulatim coque-
tur, vt pars descendat. pars vero absumatur. deinde magis ma-
gisque coquetur adhibita diligetia ne aduratur, ne ve caseus,
aut serum ex eo fiat. curabitur hoc diligentissime, si leniter
coquas, & agitando id ex omni parte detrahas quod secesse-
rit. Ferula autem leni, & tenui agitando est. ac si quid labris
ollæ infederit, id spongia abstergendum. sæpe enim fit, vt in-
de totum fuerit deprauatum. Lac igitur vsque dum crassum
æquabiliter, & crudo dulcius euaserit, coquatur.

Galen, de optimo melle. Cap. 62.

Mel præstantissimum est, quod dulcissimum est, atque æ-
cerimum. colore vero pallidum, consistentia neque crassum,
neque concretum, neque valde dilutum: sed vnitum in om-
ni parte, & tenax ita vt si eius particulam digito substuleris,
& defluere

& defluere per
inde ac viscum
descendantale
quod confectu
fit quoque me
Ad melius aute
cedere ex plani
culam laudat
thymi, & alia
& itici tempe
thymo imposit
optimum tunc
odorem eius
si quis mel deli
ducat, si quis h
elina sine aqua
ita subducit. se
quam id quod
trit, non mult
bus. & ceter
aurat floren
ratur, præ
prius in bil
gat, ipsam

Ex

Articum
ra omnia ad
neque etiam
que alibi etia
ut. & in primi
quidem hyme
fratissimum
mellis, & id
tunc sed præ
scythicum, &
tis Cycladib
Beonicum, q

& defluere permiseris, sibi ipsi continuum extendatur, & perinde ac viscum non abscissum, non in particulas dissectum descēdat. tale autē est hymettium, tasiū, & vno verbo, attici. quod consequitur id, quod ex insulis Cycladibus aduehitur. fit quoque mel optimum inter pergamum, & Elæam urbem. Ad mellis autem bonitatem, aut malitiam videtur aliquid accedere ex plantis, in quarum foliis mel colligitur. & ob eam causam laudatissimum conficitur mel in iis locis, in quibus thymi, & aliarum quarundam herbarum & fruticum calidi & sicci temperamenti plurima copia est. nonnulli id vitiant thymo imposito. quod vitiatum esse ita cognosces. nam mel optimum thymi quidem acrimoniam præ se fert. sed tamen odorem eius non reddit, vt etiam nec ita est gustui vehemens. si quis mel delingat, minus nutrietur: sed aluum magis subducet. si quis id largius sumat, vomitum excitare consuevit. elixū sine aqua, neque pari modo vomitum ciet, neque aluū ita subducit. sed distribuitur, & nutrit, atque id vrinas minus, quam id quod cum aqua coctum est, mouet, verum cum nutrit, non multum alimenti corpori affert. ex quo fit, vt senibus, & cæteris quorum frigida est temperatura mel conueniat: at florentis ætatis hominibus, & calidis in bilim conuertatur. præterea exiguum nobis alimentum inde accedit, si nō prius in bilem mutetur. in quo sciendum est, si id ei contingat, ipsum eo tempore nihil prorsus nutrire posse.

Ex Rufo de optimo melle. habetur hoc in secundo de ratione victus, hoc est, de potionibus, ad finem.
Cap. 63.

Atticum mel commendatur, estque celeberrimū: ac cætera omnia ad huius comparationē nihil esse censentur. at ego neque etiam omne id, quod ibi conficitur, laudo. existimōque alibi etiam inueniri, quod bonitate & virtutibus præstet. & in primis quod in Marathone fit, pessimum est, non quidem hymettio comparatum: siquidem hymettium est præstantissimum: sed etiam vt alio sit inferius. est etiam malum milesiū, & id quod ex Aphidna, quodque ex Sicilia compertatur: sed præter atticum bonum est mel Chium, Syrium, & Scythicum, & Siphnum: & quod aliunde aduehitur ex multis Cycladibus insulis. & Siculum hyblæum, & Creticum, & Bæoticum, quod Oechaliæ gignitur.

In singulis differentiis, quas inesse alimentis diximus, media quædam interiecta sunt. etenim inter ea quæ molli sunt carne, & quæ dura, medium quid inuenies, quod nec duræ, nec teneræ carnis sit. pari quoque ratione inter attenuantia, & incrassantia, vel calfacientia, & refrigerantia: vel exsiccantia, & humectantia. ac animantibus quidem naturalem temperaturâ vicio carentem seruantibus cibi suis naturis similes cõueniunt. at quibus praua temperies aut innata est, aut post acquisita, non similia suę naturæ sunt idonea: sed contrariorum vsus vitiatam temperaturam ad propriam naturam atque suam adducit.

De his quorum liquida & dura consistentia est.

Cap. 65.

Quorum liquidior substantia est, exiguum alimenti corpori dant omnia, atque eiusmodi, vt cito in vapores abeat, & digeratur, vt alterius non ita multo post indigeat. quæ vero dura sunt, ac terrea, multû & firmum quodque difficulter digeratur, alimentum præbent. quod si glutinosi particeps sit, multo magis hæc omnia valenter præstabit. est etiam perspicuum, hæc nõ facile concoqui, nec in sanguinem abire neque assimilari solidis animalis particulis. quod si ita sit, ne celeriter quidem nutriunt: sed vbi fuerint superata & elaborata atque confecta, tum corpori multû alimentum suppeditabunt.

Qua ratione fiat, vt pomorum adstringentium, aut pitorum esus ventrem deiciat.

Cap. 66.

Quibusdam contingit, vt poma adstringentia comedendo, alius deiecerit, cum prius scænum græcum, & radiculam, & maluas ex oleo & garo, & omnino ea quæ subducere aluû consueuerunt, sumpsisset: & postea austera pira, aut poma, aut mala punica comedissent. Vêter enim tum maxime emolitur, cum imbecillus est, & ab adstringentibus roboratur, & ad excretionem impellitur. si quid contra feceris, & prius sumas austera, deinde ea, quæ molliunt, contra quoque compri-
metur. quocirca si quis alius succus ventrẽ subuertat, id quod solet pallida bilis in quibusdam efficere, in quibus maior eius copia sit coaceruata, qui ita affectus est, si quod adstringe-
tium

tum golan
Cum igitur
poris gratia
secura fuisse
mi, & ventris
lesere & ani
gentis, aut p
set, à pertu
ma confecti
dum, iis qui
post alios cib

Ex M

Omnibus se
qua necessari
apriora reddi
ra sunt, leuia
iuniora sunt
agere confus
exoritur
enim rad
se mor, et
suis fructu
utiles.

De m

Solidarum
est. omnibus
rum, quæ
strum: quæ
qui diligenti
quorum, p
pessimæ om
secundas fere
corporis hab
post pisces
facile conco
in his etiam
so fuerit al

64
 tiū gustarit, is statim succum vexantem deorsum excernet. Cum igitur olim iuuenis quidam scammoniam purgādi corporis gratia sumpsisset, iamq; horis quinque lapsis nulla subsecuta fuisset excretio, quereretur autem stomachum sibi premi, & ventriculū intumescere, atque grauari, & idcirco pallescere & animi pendere, iussit, ut exiguum quid mali adstringentis, aut punici, aut piri comederet, qui simulatq; comedisset, à perturbationibus illis fuerit liberatus: facta copiosissima confertaque ventris excretionē. Hæc satis sint ad ostendendum, iis qui imbecillo ventriculo sunt, aluum subduci cum post alios cibos aliquid adstringentium assumpserint.

Ex Mnesithei Athenæi de facultatibus alimentorum. Cap. 67.

Omibus seminibus communis quædam inest affectio: de qua necessario dicendum est, cum enim superioris anni sunt, aptiora redduntur ad bonam concoctionem: at quæ vetustiora sunt, leuia sunt illa quidem, sed minus nutriunt. quæ vero iuniora sunt semestribus alimentum graue, stabile, & quod ægre conficiatur, exhibet. atque hæc quidem proprietas quæ exoriuntur, ferme omnia, ut ita dicam, consequitur. quorum enim radices maxime comeduntur, eorū semine minime vescimur. contra etiam quæcunque semina nobis alimentum suis fructibus præbent, eorum radices sunt ad vescendum inutiles.

De iis, quæ solidis vngulis sunt. Cap. 68.

66
 Solidarum vngularum animantium esus admodum vilis est. omnibus tamen præstant, læuissimæque sunt carnes asinorum, quemadmodum aiunt ii, qui Asiam peragunt, syluestrium: quemadmodum vero nos ibidem vidimus eorum qui diligentissime fuerint educati. secundo loco censentur equorum, pessimæ sunt muli. equorum vero syluestrium sunt pessimæ omnium. sed ex iis ubique latentium sunt optimæ, secundas ferunt recentissimorum. Quæ autem bifidæ sunt, corporis habitum, qui imbecillus sit, alere præcipue possunt: post pisces vero, hædorum, & agnorum latentium. nam & facile concoquuntur, & alendo sunt, & aluū humectant. atque in his etiam quærenda sunt ea animalia, quæ ab ortu lacte ipsæ o fuerint abunde nutrita, & non multas herbas in pascuis sint

L I B E R

de pasta. nam eorum omnium & teneræ sunt carnes propter
 ætatem, & propter alimentum, quod eis lac affert. facile con-
 coquuntur. Vitulorum vero & porcellorum lactentium caro
 & odoris suauitate, & iucunditate ac deliciis nullius carne est
 inferior: sed ægrotis, aut iis qui se reficiunt, non est eius usus
 accommodatus. nam vitelli grauiorcs sunt, & porcelli nimis
 humidi: & ventrem perturbant. at victimæ, quæ non ampli-
 us lac sugunt, nec tamen adhuc venerem sunt expertæ, præ-
 stantiores sunt porcis, cum ad eam ætatem peruenerunt: si-
 quidem humectans vis, quæ ex lacte prodit, in eis non inest.
 at pinguedo naturalis, & tenera ætas temperatum ex utris-
 que esum facit. Cætera porro genera victimarum cum ad
 eum gradum peruenerunt, duriores quam lactentes sunt, &
 difficilius concoquuntur. & si conficiantur, durius alimentum
 corpori præbent. Quæ vero deinceps hæc conficiuntur, &
 rebus venereis iam vtuntur, quæque ex eis maxime florere vi-
 dentur, vtilia sunt illa quidem iis, qui ea possunt concoquere
 cæterum molestia afficere consueuerunt. iis præterea qui ro-
 bur ex usu carniū quærunt, necesse est deteriores esse vetu-
 stas, quia ætas semper in deterius vergit. quocirca non sunt
 sponte assumenda. si vero quandoque necessitas cogat ma-
 gis coctis vescemur. Caninæ carnes aluum subducunt: non
 semper tamen afferunt eam leuitatem, quam ex multis aliis
 consequimur. nam & mucosæ sunt, & glutinosæ. & tamen te-
 nerrimorum catulorum caro præstantissima redditur. Vul-
 pina & vrsina caro mucosa est: & quodam autumnī tempore
 fit crassior. & inter eas præstantissima est ferarum quæ car-
 nem vorant, vt luporum, & leonum, & omnes qui eiusmodi
 ferarum carnes comederūt, eas agre cōcoqui aiunt, grauesq;
 esse, & intestina dolore vexare: mures qui in arboribus vitā
 agunt, aluum deiicere sed nihil nutrire comperiuntur. at qui
 mures domesticos & mōtanos testudines, & lacertos agrestes
 & palustres, & eiusmodi beluas comedunt, eos animo valde
 placatos esse quispiam dixerit.

Ex Philotino de facultatibus alimentorum.

Cap. 69.

Sorbitio omnis, non magnæ admodum confectiōis, quæ
 in ventriculo fiat, indiget. nam & humoribus est mixta, &
 liquata est, & calfacta, & computruit, & multā propaia molis
 alterationem est fortita. aceris diluta, succum acerbum, qui-
 que

que tormina
 siquidem in
 dictas molestia
 cinus. Carnes
 sentur: vt noue
 maior copia car
 facilibus vtunt
 erioribus, & n
 que erecta ante
 pares vires hab
 excellunt ac des
 partes inferiore
 tes partibus ad
 cilis conficiunt
 tur ea quæ intra
 fra. Porro elix
 ri hinc: & ore ali
 nora afficiunt
 deamus. credid
 & ab ore cōf
 me, & max
 ita simul co
 suerunt, &
 omnium præ
 leram maxime
 citant: & ficut
 quæ vero pyr
 dem, quæ nig
 nus etiam ea, q
 pinguem, gluti
 gignunt in cor
 ta oritur. Ol
 ile quidē cōf
 alia vero ex m
 te, conficiuntur
 & acerbis, ex q
 frustis denique
 tur, vtumtiam

que tormina & fletus vehemēter excitat, corpori distribuūt: siquidem in ore facultatem habere acerbam ostendūt, & prædictas molestias, simulatque sumpta sunt, ex eis oriri conspiciamus. Carnes conuenienter animalium naturæ meliores censeantur: vt nouellæ sint præstantiores vetustioribus, & quibus maior copia carnis inest, gracilioribus: quæ pabulis cōcoctu facilibus vtuntur iis, quæ non huiusmodi, & pinguioribus maioribus, & inter has, carneæ partes cæteris præstent: itemque execta animalia nō dissectis: & fœminæ maribus, quibus pares vires habeant. Ex partibus vero animalium, posteriores excellunt ac dexteræ sinistris anteponūtur. De pedibus vero partes inferiores & internæ crurum externis, & tergoris partes partibus ad ventrem & pectus sitis duriores sunt, & difficilius conficiuntur. Simili quoque modo affecta esse videntur ea quæ intra spinam sunt, & latera, ad ea quæ extra sunt sita. Porra elixa ægre conficiuntur. flexibilia enim in modū lori fiūt: & ore difficulter læuigātur. cæterū vero alimentū nulla noxa afficiunt: ex quo sequitur, vt nullam eius cruditatem videamus. cruda facilius concoquuntur: quia magis tenera sunt: & ab ore cōficiuntur. Cucurbita ex iure carnis cocta, celerissime, & maxime cōcoquitur. at quæ minutatim dissecta, atque ita simul cocta est, quemadmodum quā plurimi coquere consueuerunt, difficilior quā illa conficitur. Ex oliuis nigræ sunt omnium pinguiſsimæ, difficillimæ ad conficiendum, & choleram maxime omnium efficiunt, & diuturnas nauseas excitant: & secessiones per aluum paulatim, & plures mouent. quæ vero pyrallides nominantur, faciunt illæ quidem eadem, quæ nigræ, cæterum quia minus pingues sunt. minus etiam ea, quam nigræ faciunt. vtræque tamen succum pinguem, glutinosumque, & in quo acerbitas quædam insit, gignunt in corpore. quam ob rem fit, vt succus vitellinus ex ea oriatur. Oliuæ autem quæ in aceto composiæ sunt, facile quidē cōfici possunt, sed acidū succū in corpus distribuūt. albæ vero ex muria paratæ minus difficulter, quam prædictæ, conficiuntur: verum salsas afferunt facultates, amarasque & acerbis, ex quibus succi vitellis oui similes creantur. Confractæ denique oliuæ facilius quidem, quam albæ conficiuntur, verumtamen salsus ex eis succus in corpore generatur.

ORIBASII COL LECTORVM

LIBER TERTIVS.

De attenuante, & incrassante victus ratione,
ex Galeno. Cap. 1.



Attenuans diætā transitus angustos aperit:
& adhærescentē humorum tenacitatē ex-
trudit: inciditque crassos humores, atque at-
tenuat. sed si quis in ea diutius immoretur,
sanguis serosus, aut biliosus, aut melanco-
licus progressu temporis fiet: siquidem hu-
iusmodi omnia calefacere vehemēter, & exsiccare apta sunt.
quam ob rem calculi tophacei in renibus gignuntur. ergo ca-
uēdus est omnium acrium vsus continuus: ac præsertim cum
iis, qui illis vtitur, sit natura biliosior: quandoquidem hæc e-
dulia solis iis, qui pituitosum, aut crudum, aut crassum & glu-
tinosum humorem congregauerunt, idonea sunt, ac plerique
etiam diuturni morbi solo vsu diætæ attenuantis plerumque
sublati fuerunt. & multo melius est, vt in iis, in quibus sola
victus ratione finem optatum consequimur, a medicamentis
abstineamus: quēadmodū ego multas nephritidas, athritidas
non paucas, quæ etiam cum tophis articulos nudauerāt, alias
quidē hac vict^o ratione omnino persanatas, alias vero mitio-
res redditas fuisse cōspexi. noui etiā qui difficultate spirandi
laborarent nō paucos adeo adiunctos, vt vel prorsus conua-
lescerent: aut longo temporis interuallo parū affligerentur.
hec eadem attenuans victus ratio lienes magnos, & iecur
induratū eliquat, & morbos comitiales, adhuc paruos, & in-
cipientes curat: ad diuturnos, & inueteratos non mediocri-
ter iuuat. Omnia igitur quæ irritant, ac mordent olfactum,
& gustum, ea acria sunt, & attenuant. Iam vero quęcunque
nitrosa & quęcunque amara sunt, quendam incidendi vim
habent. sed non exigua differentia erit, si quid horum cum
oxymelle, aut aceto, aut sale, aut oleo propines. nam acetum
& oxymeleorum vires intendit: oleum vero diminuit. Ergo
ex eduliis attenuantibus plurima quispiam medicamenta,
quam

quā alimēta nominarit, quæ vero crassos, glutinososque humores gignūt, valētissimi sunt alimēti: si quæ probe & in vētriculo, & in iecore concoquantur, bonum efficere sanguinem consueverunt. & tamen lienem & iecur obstruunt. si quæ in visceribus paruum quoddam inflammationis initium fuerit, eam valde augment non secus, quam inflationes, & scirrhasas affectiones exacuunt. & abscessus etiam gignunt. Sed quædam sunt, quæ tantummodo crassum succum faciunt: sicut lens: quædam glutinosum, vt malua: quædam vtrunque, vt animalia testa operata, & quæ mollia nominantur. ac ad tuendam quidem valetudinem planum est accommodatiorem esse attenuantem, quam incrassantem victus rationem. firmam tamen corporis affectionem & robur præstare corpori propter alimenti exiguitatem non potest. idcirco necesse est quandoque edulia attingere, quæ valde nutriunt, quæ quæ crassos succos faciunt. id tamen moderate faciendum est, atque illis præsertim temporibus, in quibus perspicue sentiunt se alimenti indigere. porro iis hominibus, qui multis se credere exercitationibus possunt, et dormire, donec velint: quique vitam elegerunt à Reip. negotiis liberam, iis vsu venit, vt edulia glutinosa, & crassi succi possint comedere, ac præcipue si cum se illis expleuerint, nullum vnquam sensum aut grauitatis, aut tensionis in hypochondrio habeant. Quicunque vero aut ætate, aut imbecillitate impediti sese ante cibos exercere non possunt, ij penitus ab huiusmodi eduliis abstinendi sunt. qui vero omnino in ocio vitam degunt, ne ij quoque talibus cibis vescantur. etenim ad bonæ valetudinis tutelā cum maximum malum est quies corporis: tū vero summum bonum censetur moderatus motus. quibus quidem fit rebus, vt tuti⁹ sit abstinere à cibis crassis & glutinosis eos, qui solum bonæ valetudinis habent rationem, & non firmæ constitutionis corporis, cuius studio athletæ tenentur. Minime ergo reprehendenda inter edulia sunt ea, quæ media interiecta sunt inter attenuantia & incrassantia: vtpote quæ in moderatione, & medio excessuum sint constituta: & sanguinem consistentia moderatum faciant: hoc igitur alimentum est corporibus nostris optimum: quod vero crassos succos gignit, deterrimū: quod est perpetuo fugiendū. & eduliorū varietas, & præsertim cū ex cōtrariis viribus cōstāt, maxime noxia

est censenda: quippe quæ res assumptas nõ probe concoqui permittat. ac vires quidẽ vniuersales, tales quẽdam sunt: eorum vero materias deinceps adscribemus.

Quanam alimenta attenuant.

Cap. II.

Allia, cepa, nasturtium, porra sinapi, piper, smyrnium, pyrethrum, origanum, nepita, mentha, hyssopum, sisymbrium, pulegium, satireia, viridia adhibita. nam exsiccata, iam medicamenta sunt, non alimenta. omnino enim quicquid siccum est, viridi valentius est. & quæ in montibus, aut locis siccis crescunt, iis quæ in plantis, aut hortis, aut paludibus, sunt fortiora. quæ sunt de omnibus communiter sunt intelligenda. prædictas vero ordine consequuntur eruca, sum, apium, petroselinum, ocima, radicle, brassica, beta, carduus, heryngium, vrtica, foeniculum, coriandrum, ruta, anethum, libypticum, cuminum, capparis, terebinthi fructus. itemque semen cari, anisi, sinonis, ameos, dauci, seseleos, tordili, ac denique omnium odoratorum, & acrium, & perspicue calidorum. Vehementer autem attenuat rutæ semen, & cannabis, ut medicamenti similitudinem habeat. ex reliquo cerealium seminum genere ad victus rationem attenuantem solum hordeum molestia vacat. secundum locum tenent triticei panes in clipeo cocti. à cæteris abstinere homo debet. maxima quoque si volueris, copia tibi ciborum ad rationem victus attenuantem accommodata suppetet à piscibus saxatilibus, & ab auiculis montanis. nam quæ in montibus degunt animantes naturæ siccioris, ac calidioris sunt earumque caro minime pituitosa, glutinosaque est. sturnos igitur, turdos, merulos & perdices poteris comedere: itemque passeret turricolas, & quæcunque in vineis vitam agunt. ex columbis vero quæ turre in habitant, domesticis præstât, & omnino quæ exercetur ociosis, & quæ siccioribus pabulis, iis quæ humidioribus vntur, quæcunque purum, & tenuem aerem inspirant, iis quæ contrarium, anteponenda sunt. Ex piscibus saxatilibus vesci poteris iulide, luca, merula, turdo, scaro, & ad summam quicunque mollem simul ac friabilem carnem habet. ab iis vero quorum quidem est caro asellorum: verum minus friabilis, quam piscium saxatilium. at mulorum friabilis est illa quidem, sed non mollis. Friabilitas igitur & mollities due notæ sint ut cuius-

q; ani-

que animalis
cui inesse vtran
ris comedere
das: cui alterut
aliquando refe
ob rem aiellos
licet, cum for
meduntur, que
dam genera an
dixi, inest, sed
rum vltu abstin
laginei pisces m
glutinosi & p
ctu attenuante
turtur solum ap
viti, cum saxatili
facilitatis bugle
qui exercentur
tum, qui in mo
sed prædie ad
nibus, quæ
pisces autem
his eligendi
ceum genu
ditas gustan
libus iiqui v
igitur potius
medere licet,
vehementer
contrarij, om
nutes pullacie
vt eas neque
modo e' culen
cam, succum it
fos humores
sua lactis inte
dura: sed ory
accommodan

que animalis carnē cognoscas : quibus attentus eā carnem, cui inesse vtrāque conspicias, ad satietatem vsque poteris comedere: cui neutram, eius vsus omnino circuncidendus : cui alterutrā tantum, ea cum aliā tibi non suppetant, aliquando vesci, non tamen ad saturitatem vsque. quam ob rem asellos, mulos, aliōsque pelagios pisces mandere licet, cum saxatiles desunt : & præsertim qui ex sinapi comeduntur, quemadmodum scorpius. Sunt vero alia quædam genera animalium, in quibus altera ex iis notis, quas dixi, inest, sed propter alterius notæ exuperantiam ab eorum vsu abstinendum est. nam anguillæ, & plerique chartilaginei pisces mollem quidem habent carnem, sed quoniam glutinosi & pituitosi sunt, satis noxæ afferunt iis quibus victu attenuante opus est. ex chartilagineis vero torpedo & turtur solum accommodati sunt. potēsque eis nonnunquā uti, cum saxatiles non suppeditantur. sunt quoque eiusdem facultatis buglossi, & passerēs. Gallinis vesci non veto eos, qui exercentur, itēque columbis, & turturibus, & præsertim, qui in montibus degant. oportet autem eos, non recēs, sed pridie ad minus esse mactatos. quod etiā in cæteris omnibus, quæ carnem modice duram habent, observādum est. pisces autem saliti exquisitissime attenuant, & incidunt, ex his eligendi sunt qui suapte natura tenera sunt carne. cetaceum genus est cauendum. Iam vero suillas carnes sale conditas gustare quispiam tuto poterit. Ex fructibus autumnalibus ij qui ventrem molliunt, minime nocebunt. molliores igitur potius, quā duros, & quā eos qui tarde transeunt, comedere licet, nō tamē ex vllō genere ad satietatem. qui autē vehementer austeri & acerbi sunt, huic rationi victus sunt contrarij. omnibus vero aliis accommodatiores sunt caricę, nuces, pistacia, & amygdalæ subamaræ. oliuæ eiusmodi sunt, ut eas neque laudem, neque vituperē. ex dulcibus autem nō modo esculentis, sed etiam poculentis, solum mel, ut ita dicam, succum tenuē exquisite gignit. vina alba & tenuia crassos humores incidunt, & per vrinas expurgant. Iam vero serū lactis inter ea numeratur, quę attenuandi vi sunt prædita : sed oxymel ad victus rationem attenuante multo est accommodatius.

c. iiij

Crassos succos faciunt panes, qui sub cinere coquuntur, quique rite non conficiuntur: & qui tragus appellatur, & placenta ex musto & simila: & lagana, & placenta, quæ itria nominantur: & quodcunque ex triticea farina sine fermento conficitur: & placenta, quæ ex eadem materia elaborantur, præterea simila & alica abunde crassi sunt succi: amyllum vero mediocriter. lobi quoque crassi succi sunt, & lupini, & interna pars lentis: fabæ frictæ, sisami semen, trifolii semen, pisces qui molles appellantur, loligines, sepia, polypodes, & cetaceum genus. valde autem crassi succi sunt ostrea, buccina, purpura, chema, patella, pectines, pinna, & uno verbo, omnia quæ testa conteguntur. itemque anguilla, cochlea, carnes ceruina, caprina, bubula, porcina, leporina, iecur, renes, testes, cerebrum, spinalis medulla, mamma, lingua, glandula mediocriter. lac nimis coctum, casei omnes, recentes vero, & qui ex acido lacte constant, minus. lac acidum igni decoctum. ex ouis, quæ ad perfectam concretionem sunt cocta: & assata etiam magis: & longe maxime quæ in sartagine fricta sunt. palmarum, castanearum, glandes, bulbi, rapa, fungi, ari radix, tubera, nuxes pineæ, ficus non probe maturæ: citrii caro, cucumeres vberius sumpti, poma nondum matura. inter vinâ, quæ dulcia sunt, ea crassum sanguinem gignunt: & magis etiam id, quod defrutum nominatur: & mustum eodem modo, itemque crassa & nigra vina.

Media attenuantium, & crassos succos facientium.

Cap. 4.

Panes optime confecti, sunt eiusmodi, & carnes gallinarum, gallorum, gallinaceorum, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenum, turturum, turdorum, merularum, & paruarum auicularum omnium: itemque piscium saxatiliū, littoralium, & pelagiorum, & gobiorum, murenarum, buglossorum, & absolute omnium piscium, qui neque lentorem, neque fectorem edendo referant. & ficus maturæ, & ex oleribus agrestibus seris. atque id est commune multorum genus. singulorum vero speciales appellationes apud Atticos sunt, ut lactuca, chondrile, gingidia, & alia innumera.

huius

huius vero sunt generis palustris, myacanthinus & chamæ-
daphnes ac bryoniæ asparagus. vinum flavū simul & dul-
ce, & pellucidum, quale est aruifium, & Lesbium, & faler-
num, & tmolite. hæc enim omnia & bonum, & moderate
crassum sanguinem gignunt.

Quæ viscidum succum faciunt.

Cap. 5.

Triticum omne, quod graue, densum, & interius flaues-
cens est, viscidum succum gignit: quod vero leue, rarum, câ-
didūmque intus est, minus est huiusmodi. Simila quoque
& alica abunde viscidæ sunt. itémque tendines, & musculo-
rum extremitates nerue: & partes quæ circa labra sunt, &
lingua, omnis suilla caro, itémque agnina: sesami semen,
bulbi, & pingues palmulæ.

Quæ crudos in nobis humores pariunt.

Cap. 6.

Palmulæ virides crudis humoris explent eos, qui ipsis
vescuntur, vt rigoribus, qui calefieri difficulter possint, ca-
pianur: & radix rapæ, si quis ea liberalius utatur: & caro tes-
taceorum, quorū est dura caro, quæque falsum succū ex ni-
miæ coctione amisit: & quæ mollia nominantur, polypodes,
sepia, & quæ sunt generis eiusdem: omne cetaceum genus
in mari degentium animalium: ventriculi, intestina, vte-
rus quadrupedum, duræ glandulæ incoctæ, acidum lac,
caseus, panes in sartagine cocti, lupini, vua in ventricu-
lo contenta.

Quæ frigidos humores creant.

Cap. 7.

Qui se cucumeribus valde explent, iis vt frigidum succum
coaceruent, natura comparatum est, cum non facile pos-
sint in probum sanguinem commutari. eiusmodi etiam suc-
cum ventres, intestina, vterus quadrupedum bestiarum, aci-
dum lac, boleti, poma immatura, & bulbi pariunt.

Quæ pituitam gignant.

Cap. 8.

Succum absolute pituitosum gignunt neruæ animalū
particulæ, cerebrum, pulmo, spinalis medulla, glandulæ in-
coctæ, agnina caro, boleti amanitæ, caro testaceorum mol-
lis carnis, poma nondum matura.

Quæ res melancholicum succum pariant. Cap. 9.

Carnes bubulæ, caprinæ, & his multo magis hircinæ, & taurinæ melancholicum succum faciunt, & magis etiam asininæ, camelinæ, vulpinæ, caninæ, leporinæ, & suum agrestium, carnes animalium terrestrium sale conditæ, liones animalium. ex marinis huiusmodi succum pariunt carnes thynni, balenæ, phocæ, canis, delphinis, & omnium cetaceorum. itémque cochleæ, brassicæ, arborum germina, quæ muria, vel ex acida muria sunt condita, vt lentisci, terebinthi, rubi, & canini rubi germina. cinaræ etiam caro, & lens edulium est melancholicum vel maxime: post hanc panes furfuracei, quique ex tipha, & aliis vitiosis seminibus conficiuntur, triticum tenerum, aphace, & vicia, & vina crassa & nigra.

Quæ succum biliosum pariunt. Cap. 10.

Siliquæ, cinaræ succus tenuis est, & amaram bilim facit. præstat igitur cinaram coctam edere mel quoque facile in bilem vertitur in calidis corporibus. omnia enim dulcia alimenta, & vina item dulcia materiam flauæ bili gignundæ suppeditant.

Quæ gignant excrementa. Cap. 11.

Palumbi, anseres, præter alas, viscera omnia, spinalis medulla, cerebrum, aues palustres, & quæ in stagnis ac pratis vitam ducunt, cicer, fabæ virides, faba ægyptia, porcelli nuper in lucem editi, caro pecudum, & omnium animantium recens natorum, quæque in ocio vitam transigunt: & pisciū fluuiatilium, ac palustriū, quique in limo degunt: & omnes cetacei generis in mari, excrementa faciunt.

Quæ vacant excrementis. Cap. 12.

Animalium colla, caudæ, alæ, agrestium animantium caro, & eorum, quæ in siccis locis viuunt, excrementis carent.

Quæ valde nutriunt. Cap. 13.

Suum domesticorum caro præ omnibus eduliis maximū alimentum præbet, bubulum cerebrum, testes, cor, spinalis, & item

item alia modu
volucrum vora
ces, quæ dara
na, & cætera ge
lam vero altat
itemque molles
confimiles: & e
te nutriunt ite
tem, & gobij
vero liquidus
aligine, deinde
quibus etiam
canem gignit
potius latorum
foli, & ochri
bos & phaselo
lunt etiam luy
ces, & pingui
maxime nute
& ad diltu
darum, ut
portione
omnium
cundo lo
& crallum
crallum, &
summam o
tur, malum

Extreme p
tus, venter, in
lecrum gen
trit, caro eor
eorum, quæ
si quonem
to digerant
carne, velu

item alia medulla, alē anserū, & magis etiā gallinarū, omnium volucrum ventres, cochleę, & præcipue ter coctæ. ex testaceis, quę dura carne sunt prædita, vt chemę, purpurę, buccina, & cætera generis eiusdem plurimum alimenti afferunt. Iam vero astaci, paguri, cancri, locustę, squillę, & iis similes: itemque molles appellati, vt polypodes, sepię, loligines, & consimiles: & ex chartilagineis torpedo & turdus moderate nutriunt: itemque bati, liobati, & rhina magis, muli autem, & gobij minus. Lac magis alit quod crassius est, quod vero liquidius est, id minus alit. ex panibus magis nutriunt filiginei, deinde ij, qui ex simila parantur, tertio loco ij, in quibus etiam furfur sit. triticum elixum, simila, alica, fabæ carnem gignunt non firmam illam quidem, & densam, sed potius laxiorem. cicer magis nutrit quam fabę. magis phascoli, & ochri magis quam scenum græcum. dolichi, quos lobos & phaselos vocant, non minus, quam pisa, nutriunt. alunt etiam lupini, castaneę, lentes, palmulę dulces, vix dulces, & pingues, glandes, rapa, quam napum nominant. bulbi maxime nutriunt, & magis etiam bis cocti. mel despumatum & ad distributionem, & ad nutritionem redditur accommodatum: itemque melicratum probe coctū. omne vinum pro portione crassitiei nutrit, rubrum ergo & crassum maxime omnium ad sanguinem gignendum accommodatum est: secundo loco nigrum simul, & dulce, & crassum, tum rubrum, & crassum, & adstringens. his minus nutrit album, simul & crassum, & austerum. minime omnium album, & tenue. ad summam omnia, quę crassi sunt succi, si probe concoquantur, multum alimenti præbent.

Quę res minus nutriunt.

Cap. 14.

Extremę partes animalium parum nutriunt, itemque vterus, venter, intestina, cauda, aures, pinguedo, adeps: omne volucrum genus terrestrium generi comparatum, minus nutrit. caro eorum, quę senio confecta sunt, minus alit, quam eorum, quę adhuc augescunt. alimentum quod pisces dant, sanguinem magis tenuem facit, vt neque satis nutriat, & cito digeratur. ex iis quę testa intacta sunt, quę molli sunt carne, velut ostrea, exiguum alimentum præbent. panes

hordeacei quomodocunque conficiantur, minime omnium aliorum nutriunt. æque vero ac ij nutrit polenta ex eis confecta. itémque panes furfuracei, & impuri omnes, ac loti, amyglū, maza ex polenta hordeacea, auena, milium, eóq; magis panicū, oryza, fabę virides, semen papaueris, semen lini, ormina, sycamina, rubi canini fructus, iuniperi bacce, myrta, amygdale, pistacia, pruna, persica, armeniaca præcocia, oliuę, & præsertim matureę, nuces auellanae, & magis etiam regię, nuces, serica, corna, pruna, rubi fructus, fructus arbuti, zizipha, iuglandes, halicacabus, capparis, & præsertim sale condita, brassica, beta, lapathum, oxylapathum, portulaca, solanum, raphanus, rapa, sinapi, nasturtium, pyrethrum, asparagi omnes, pastinaca, daucus, carus. cepa autem, & allium, & porrum, & ampeloprasum cruda quidem alimentum nullum præbent: bis autem, terte cocta paucissimum, mala punica parum nutriunt, pira vero & præsertim magna nescio quid alimentum in se continent. cucurbitæ quoque modicum alunt. itémque vuz passæ austeræ, & non pingues. porro inter ea quę multum, & ea quę parum nutriunt, medij interiecti sunt phaseli, ochri, araci, cicercule, & ficus, quæ non eque ac alij autumnales fructus, parum nutriunt. laxam enim carnem faciunt, id quod efficiunt etiam vuz. ipsæ vero minus, quam ficus alunt, laxamque & humectam carnem gignunt, omnia autem edulia, in quibus aliqua vehemens medicamēti qualitas insit, cum eam qualitatem aut assando, aut elixando, aut parando deposuerint, exiguum alimentum corpori dāt: prius vero nullum præbent.

Quæ res boni succi sunt.

Cap. 15.

Omnium ferme earum, quibus vescimur, lac optimi est succi. est autem optimum lac animalium integræ valetudinis, cum nuper expressum potatur. oua tremula, & forbilia boni succi sunt, præstantiora autem sunt gallinarum, & phasianorum, deteriora vero sunt anserum, & struthocamelorum. aues autem & pisces ferme omnes boni succi censentur: præter eos, qui in paludibus, ac stagnis, & fluminibus limosis degunt: ac præsertim si aqua è ciuitate aliqua prodeat, cuius cloacas, balneas, & culinas expurget: vel aqua admistam habeat, quę fullonibus ad vestes tinctas abluendas vsui

huiusmodi ergo
rari quod aqua
les sunt, qui pel-
ci bonitate, tum
quidam sunt, qui
ro, lupus, asellus
querendum est
statu discernen-
runt, & si ceteri
in suaves, ac rari
conferis pascen-
et gustu atque
muli pascuntur
rum vero caro
dicula, rhombus
quodam modo
nem habent, &
non exercent
cunt, friabile
accommoda-
ereat, carne
tur, optimu
ni succi ani-
suum & ad
tissima: & n-
ti, vetustissim
qui nuper na-
eorum, qui re-
mamia boni
& cetera: exte-
minus quam c-
be, proxime ac
succi, pedes me-
tilago in persi-
im vero, quæ
concreta, concre-
carne: a porco
ratio partes e-
brum volatili-
strum caro

cui fuerit. ergo tutius erit, semper eos pisces offerre, qui de
 mari quod aquæ dulci mixtum non sit, excepti fuerint, qua-
 les sunt, qui pelagij, & saxatiles appellantur: hi enim tum suc-
 ci bonitate, tum iucunditate cæteris longe præstant. si vero
 quidam sint, qui vtraque in aqua vivere sint soliti, vt capi-
 to, lupus, asellus, cobio, murena, cancri, & anguillæ, statim
 quærendum erit, vbinam sint capti: deinde odoratu, ac gu-
 statu discernendum. etenim qui in aqua vitata vitam duxe-
 runt, & si cæteris pinguiore sunt, tamen & male olent, &
 insuaues, ac mucosi sunt, & citò putrescunt. atque etiam ex
 consuetis piscium alimentis aut meliores, aut deteriores esse
 ex gustu atque odore facile cognoscuntur: quemadmodum
 muli pessimi omnium sunt, qui caneros comederunt: alio-
 rum vero caro durior est illa quidem, sed non mali succi. fi-
 dicula, rhombus, hepatus, buglossus, passer, & lacertus medij
 quodam modo sunt inter eos, qui teneram, duramque car-
 nem habent, alimentumque eorum est optimum iis, qui se
 non exercent, quique imbecilli sunt. iis vero qui conuales-
 cunt, friabile & molle alimētum est ad bonam valetudinem
 accommodatissimum: quocirca optimum omnium succum
 creat. carnes animalium quadrupedum si probe concoquan-
 tur, optimum sanguinem gignunt, & præsertim eæ, quæ bo-
 ni succi animalium sunt: quale suillum est genus. nam caro
 suum & ad iucunditatem, & ad concoctionem est præstan-
 tissima: & maxime eorum, qui in media ætate sunt constitu-
 ti. vetustissimi namque suis caro deterior est: itémque eius,
 qui nuper natus comeditur. nimis enim humidæ sunt carnes
 eorum, qui recens sunt nati, & pituitæ plurimum faciunt:
 mamma boni succi est, iecur, partes quæ circa labia sunt, alæ,
 & cæteræ extremitates, itémque intestina, & vterus, & cauda
 minus quam carnes boni succi sunt. glândulæ concoctæ pro-
 be, proxime ad carnes in alendo accedunt. cor non mali est
 succi. pedes meliores sunt rostro, atque auribus. etenim char-
 tilago in perfectis animalibus omnino cōcoqui non potest.
 in iis vero, quæ adhuc crescunt, cum exquisitè fuerit in ore
 contrita, concoquitur. cæterarum vero animantium quanto
 carnes à porcorum carnibus, in alimenti viribus superantur,
 tanto partes extremæ in eisdem partibus suillis cedunt. cere-
 brum volatiliū longe præstat cerebro terrestrium. sylue-
 strium caro melioris succi est, quam cicurum, panis purus, &

rite confectus boni succi est: itémque alica, priffana probe co-
cta, fabe, castaneę que non mali succi sunt: ficus mature, vna
matura & pensilis non sunt reprehendende. caricę statim di-
stributę boni succi sunt: quę vero diutius in ventriculo mo-
rantur, mali succi euadunt, & pediculos gignunt. hę cum nu-
cibus in cibo acceptę prestantissimum edulium faciunt. qui
vero ficus & caricę cum aliquibus aliis eduliis comedunt,
non mediocriter offenduntur. lactuca inter olera bonum gi-
gnit sanguinem, deinde vero intiba. vina odorata boni suc-
ci sunt, optimi vero sunt succi falerna, & potissimum dulcis-
sima: itémque aruifium, & fuluum tmolite dulce.

Quę res malos succos faciunt.

Cap. 16.

Mali succi non vna species est, nam alius frigidior & pi-
tuitosior est, alius calidior, & biliosior, alius denique magis
melancholicus: ab omnibus autem mali succi eduliis, etiam
si ab aliquibus facile concoquantur, abstinendum esse con-
sulo. succus enim malus ex eis acervatus longo tempore la-
tet in venis: cūque vel paruam occasionem ad corrupte-
lam nanciscitur, febres malignas gignit. mali succi sunt hęc,
pecudum caro, & caprarum simili modo, adiuncta etiam a-
crimonia. hircorum caro pessima est: proxime succedit caro
arietina, deinde taurina. inter has omnes caro castratorum
est potior. seniorum vero carnes sunt pessimę. leporum ca-
ro gignit illa quidem sanguinem crassiores, sed tamen qui
melior sit ad succos bonos faciendos, quam boum, aut pecu-
dum. ceruina quoque caro non minus quam ex succi mali
est. renes, & testes nimis adultorum animalium, preter testes
gallorum, gallinaceorum, mali succi sunt. cerebrum, spinalis
medulla, cor, lien, minus autem suillus, omnia viscera, oua fri-
cta, casei veteres, boleti, amanitę mali succi sunt: ceteros fun-
gos non esse tutius est. scenum gręcum, lens, tipha, auena, &
panis ex eis confectus non boni succi sunt. olyra tanto est
tritico deterior, quanto est tipha, atque auena prestantior.
panicum, milium, & cetera generis eiusdem non boni succi
sunt. Pisces vero dracones, cuculi, galeonymi, scorpij, trachu-
ri, muli, orphi, glauci, & cetera animalia cetacea in mari de-
gentia, mali succi sunt omnia. fructus omnes, qui horęi di-
cuntur, mali succi sunt: ficus vero minus quam alij horęi fru-
ctus: at caricę, si quis liberalius eis vescatur, non admodum
pro-

pecudum sangui-
dorum vis e-
ra antequam ma-
craa cuoque, &
mores, & pepom-
bis omatibus pre-
mali succi abude-
dum inter res m-
ritiba, & mala u-
lapatum. Rad-
conque acres fi-
lorum, radicul-

Facile con-
omnes, cocti
um nanque ca-
coquitur, preste-
ne galli gallina-
quendum sunt
e bene educat-
pessime vero m-
ctu educata sunt
luer abatur, ne-
cilime concoqu-
sunt. vni meli-
tur, nemque huc
caro lactus, qu-
cus, quam etia q-
cilus, quam au-

probum sanguinem gignunt, & ob eam causam magna pediculatorum vis ex eis consequitur. poma nondum matura, pira antequam maturuerint, terebinthi fructus mali succi sunt. cinara quoque, & praesertim eum durior est, itemque cucumeres, & pepones, & melopepones, sed hi minus. Cucurbita his omnibus praestat: sed ipsa quoque in stomacho corrupta mali succi abunde est. Ex oleribus nullum boni succi est. medium inter res mali, & res boni succi locum tenet lactuca, & intiba, & malua, deinde atriplex, & portulaca, & beta, atque lapathum. Radices plantarum olerum mali succi sunt quaecunque acres sunt, quales sunt, caparum, porrorum, aliorum, radicularum, & dauci. mediae sunt radices ari, rapae, quae napus appellatur: & eius, quem carum nominant. ocimum succi est pessimi, rapa crudior, brassica, bulbi non probe cocti: cepae, porra, allia, ampeloprasa bis cocta succi prauitatem deponunt. omnino vero pessimi succi sunt olera omnia quae agrestia nominantur, ut agrestis lactuca, chondrile, scandix, gingidium, feris, & cicorium. vina quae crassa sunt & foetida, & austera, quale est vile bithynum, quod in magnis doliis coportatur, mali succi sunt: nam quod in paruis conuehitur, neque boni, neque mali succi est, sed medium inter utrumque locum tenet.

Quae facile concoquuntur.

Cap. 17.

Facile concoquuntur panes rite confecti, saxatiles pisces omnes, cobio, torpedo, turtur, omne genus volucrum. auium nanque caro terrestrium carni comparata facilius concoquitur, praesertim vero perdicis, attagenis, columbae, gallinae, galli gallinacei, phasiani. alae anserum faciles ad concoquendum sunt: sed gallinarum sunt faciliores. & ad summam alae bene educatorum, & iuniorum optime concoquuntur, pessime vero macilentorum, & seniorum. quae vero sero lactis educata sunt, & iecur anserum, & ceterorum quae similiter aluntur, itemque testiculi gallorum gallinaceorum, facillime concoquuntur. carnes porcorum facillime concoquuntur. vituli melius, quam adultorum bouum caro concoquitur, itemque haedi melius quam caprae. omnium crescentium caro facilius, quam declinantium: & eorum quae siccis in locis, quam eorum quae in aliis degunt, concoquitur. iuglans facilius, quam auellana concoquitur. bulbi facilius concoquuntur.

tur, qui bis cocti sint. itémque oua tremula, & sorbilia, lactu-
cæque & intiba ac malua, & cucurbita elixa, cum in ventri-
culo non corrumpitur. Vinum dulce facilius quam austerum
côcoquitur. porro ex iis quæ æque salubria sunt, id esse con-
coctu facilius sciendum est, quod sit iucundius.

Quæ difficulter concoquuntur. Cap. 18.

Caprina, bubula, ceruinæque caro ægre côcoquitur, pessi-
me vero hircina: deinde arietina, postea taurina, animalium
vero annosorum caro pessime concoquitur: & suum annis
confectorum, ventriculus ægre conficitur, itémque intestina,
uterus, cor, & adultorum testes: sanguis omnis, anseres, præ-
ter alas. palumborum vero, sturnorum, merulorum, ac par-
uarum auium caro est durior: ac magis etiam turturis, atque
anatis: & his magis caro pavonum, otidumque. ventres om-
nes volucrum egre concoquuntur. quam ob rem quidam
struthocameli & mergi ventrem falso commendant, vt me-
dicamentum ad concoquendum valens: cum neque ipse fa-
cile concoquatur, neque aliorum ciborum concoquens sit
medicamentum. Cochleæ difficulter concoquuntur, atque
etiam lac acidum, & præsertim in iis, quorum frigidus ven-
triculus est, caseus itidem vetus est huiusmodi: at recens, &
præsertim ex acido lacte confectus, præstantior habetur. Pur-
purarum autem caro, & buccinarum, & aliorum testa inte-
ctorum, quorum dura caro est, difficulter concoquitur. asta-
ci quoque, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & cæteri huius ge-
neris. polypodes, sepiæ, loligines, & omnes, qui molli cute
præditi nominantur, bati, liobati, rhinæ, drachones, cuculi,
galeonymi, scorpij, trachuri, muli, orphi, glauci, zyzænx, sal-
pæ, gongri, phagri, amix, aquilæ, oua tosta, elixa, fricta, triti-
cum elixum, tragus, farina crassiuscula, quæ difficiliter conco-
quitur quam polenta, tipha, auena, panes ex eis confecti, fa-
bæ, ochri, dolichi, phaseli, cicercula, araci, cicer, oryza, lupini,
panicum, milium, & his consimilia, lens, tussilago, sesamum,
erysimum, castaneæ, glandes, poma, pira, ficus, & sorba ante-
quam maturuerint. vuæ acidæ, & austæræ, palmulæ omnes,
siliquæ, citrium, cuius parte exteriori si quis pro medicamen-
to vtatur, & ad concoctionem faciet, quemadmodum alia
pleraque acria consueuerunt. ocimum, rapa etudior, bulbi
crudiores, pastinaca, daucus, carus, & omnes olerum radices,
&

& ipsa itidem
etiam modi. vinum
etiam aqua ad

Quæstio

Stomacho au-
tia, oliuæ sale
cero sunt para-
ta, nux regia, &
caneis comeda
diocriter. horu
labrum veneris
est, honor est ha-
æque scindis.
prum stomacho
que coctionem
pyreturum, reg
daphnes, oryza
nemque capp
roborat in m
triculum, &
ter medicam
borant.

Ledunt ite-
ctus arbuti, an-
cho aliena est,
que lapatum,
azero, oleo, &
subuertit, & en-
gido ventriculi
nidorem tranli-
quit, vero lac ei-
non probe com-
ut, etiam priu-
dum et idonei
quicquam que
ritum cibum
ne stomacho

& ipsa itidem olera omnia, præter lactucam & intibum, sunt eiusmodi. vinum quoque crassum, & nouum tale est, atque etiam aqua admodum difficulter concoquitur.

Quæ res stomacho idoneæ sunt, ipsæque roborant.

Cap. 19.

Stomacho autem aptæ sunt palmulæ austere, mala cydonia, oliuæ sale conditæ: præstantiores autem sunt, quæ ex aceto sunt paratæ: vux passæ austere, vua in vinaceis reposita, nux regia, & magis quam auellana, & multo magis si cum caricis comedatur. spinosa omnia stomacho apta sunt: mediocriter. huius generis sunt carduus, atractylis, leucacantha, labrum veneris, cyix, tragacatha, atrace, cui maior, quam par est, honor est habitus, cinara, fiseris radix elixa, gingidium æque ac sandix, quod quidem & crudum, & coctum assumptum stomacho mirum in modum idoneum est: longiorémque coctionem non fert. sinapi, raphanus, rapa, nasturtium, pyrethrum, regius asparagus, palustris, oxymyrtilinus, chamedaphnes, oxyacanthæ, & bryoniæ. bulbi appetitum excitant. itémque capparis sale condita. extima citrij pars stomachum roborat in medicamenti vicem sumpta. vinum austerrum ventriculum, & præsertim calida intemperie affectum iuuat, inter medicamenta vero absinthium, & aloë eundem corroborant.

Quæ res alienæ stomacho sunt.

Cap. 20.

Lædunt stomachum bacce iuniperi, magis vero cedriæ, fructus arbuti, amaranthus, viticis semen. beta vero ita stomacho aliena est, ut si estur largius, morsum etiâ inducat. itémque lapatium, ocimum, rapa cradior, blitum, attriplex, nisi ex aceto, oleo, & garo comedatur. fœnum græcum stomachum subuertit, & eodem etiam modo sesamum. Lac in iis, qui frigido ventriculo sunt, acescit: in iis vero, qui calido sunt, in nidorem transit: ex quo fit, ut febricitantibus iure noceat. si quis vero lac cum melle propinet, vomitum excitabit. pepo non probe concoctus cholicos inducere morbos consuevit. etenim prius quam corrumpatur, ad vomitum prouocandum est idoneus: si quæ copiosius eo quispiam vescatur, ne quicquam quod boni succi sit, post comedat, omnino vomitum ciebit. idem facit melopepo. Iani vero cerebrum omne stomacho alienum est, & nauseam ciat: ut facit etiam olera

L I B E R

sum medulla . Vinum nigrum & austerum facile acefcit: & ad vomitum impellit : crassum quoque & nouum . inter medicamenta abrotonum , seriphum , & spuma nitri stomacho non conueniunt.

Quæ res caput ledunt. Cap. 21.

Caput lædunt mora, fructus rubi, & arbuti, iuniperi bacca, cedria, semen canabis, radix mei, palmulae omnes, eruca, foenum graecum, viticis semen . Vinum suluum & austerum caput lædit, & mentem tentat magis, quam nigrum & austerum: odoratum quoque caput petit . at vinum aquosum neque capitis dolorem excitat, neque neruos pertingit, at quod *δαλντοφόρον* dicitur, sedat etiam capitis dolores, quos succi ventriculo contenti excitant. lac non est aptum capiti, nisi quis caput admodum validum habeat . aqua in qua vix maduerint, quæ sex quoque nominatur, capiti dolorem infert, itémque vix, quæ fuerit in vinaceis reposita.

Quæ res non inflant. Cap. 22.

Pisa, phaseoli, cuminum, lybistici radix, & semen, viticis semen, canabis fructus, fabæ frictæ, bulbi multum, aut bis cocti, & ex oleo, garo, & aceto sumpti, mel despumatum, oxymel flatus discutit . panes hordeacei quomodocunque conficiantur, flatus sunt expertes . inter ea quæ inflant, & non inflant, medij sunt phaseoli, ochri, cicerculæ, atque araci.

Quæ res inflant. Cap. 23.

Cicer, lupini, phaseoli, ochri, panicum, milium, & similia inflant, itémque faba fresa magis inflat cum per se, quam cum aliter cocta estur. maza ex polenta flatum gignit: subada vero, diuque contusa magis per aluum ducit: præcipue vero si mellis portio ei fuerit addita. Zythus, & liquores omnes inflant, præ cæteris vero cyrenæicus, satyrium, si phij liquor, & radix . ex ficibus brevis flatus excitatur, quia facile deiciuntur: quæ vero exquisite maturæ sunt, parum abest, quin nihil penitus noceant, veluti caricæ . palmulae virides ita flatum excitant, vt ficus, rapa crudior . lac in ventriculo facile ciet flatum, bulbi crudiores, mel non plane coctum . vina dulcia flatus diurniores cient: dulcia vero simul & austera, quæ neque distribuuntur, neque digeruntur, sed in ventre superflua

non manent
sunt.

Quæ

Præstina ab
pepo, vix pass
lapides etiam
nulum partium
turam, quæ in
structiones exp
melite, aut ac
succus absterge
cur infestatur,
ellur. laparia qu
tenuum partiu
di, & aperiendi
vt luumum re
præsa attenuat
quæ redundat
niam depor
morum cra
rem multæ
caricæ exte
cæ iuniperi
solique ac tem
& attenuat, vi
quæ per spum
reddunt, pistac
gandos humer
radicula attena
uandivim, q
quæ circa etiam
commodata, c
neque crassa on
gar: morbis qu
qui succi crasso
frigidi quoque
crimonia conti
pione eductio

riore manent diutius, flatum inducunt. mustum quoque in-
fiat.

Quæ res abstergeant, incidant, aperiântque.

Cap. 24.

Piissana absterget, itémque fœnum græcum, melopepo,
pepo, vux passæ dulces, fabæ, cicer, ac magis nigrum: quod
lapides etiam in renibus egregie frangit. capparitis satis te-
nuium partium est: quæ vero sale cõdita est, absterget, & pi-
tuitam, quæ in ventriculo est, deducit: & lienis, & iecoris ob-
structiones expurgat: ad quem usum adhibenda est cum oxy-
melite, aut aceto, & oleo ante alios cibos omnes. betarum
succus abstergendi vim habet, easque obstructions, quibus ie-
cur infestatur, dissolvit, ac præsertim cum ex aceto & sinapi
estur. lapatia quoque, & vrtica. ari vero & asphodeli radix
tenuium partium est. bulbi vim habent extergendi, attenuan-
di, & aperiendi, quocirca & asparagum asphodeli histericis,
vt summum remedium, præbent. cæpe, allia, porra, ampelo-
prasa attenuant, secântque crassos & glutinosos humores,
qui redundant in corpore: atqui bis aut ter cocta acrimo-
niam deponunt, & tamen etiam attenuant. serum lactis hu-
morum crassitudinem attenuat. ficus abstergent: quam ob-
rem multæ arenulæ ex ficuum usu in nephriticis excernuntur.
caricæ extenuant, & incidunt: ex quo renes expurgant. bac-
cæ iuniperi ea quæ in iecore & renibus sunt, purgant, cras-
sôsque ac tenaces humores attenuant. amygdalæ extergent,
& attenuât, viscerâque expurgant, & humorum reiectiones,
quæ per sputum ex pectore, & pulmone sunt, expeditiores
reddunt. pistacia ad iecoris firmitatem vtilia sunt, & ad pur-
gandos humores, qui in eius meatibus infarcti sunt, valent.
radicula attenuandi vim habet. mel habet maiorem atte-
nuandi vim, quod ex calidis & siccis plantis factum est.
quocirca etiam aqua mulsa ad sputum educendum est ac-
commodata. oxymel ea facile deducit, quæ neque tenacia,
neque crassa omnino sunt: viscerâque sine molestia expur-
gat: morbisque thoracis, & pulmonis mirifice conducit. iis
qui succû crassum acervant, vina tenuia conueniunt. quod si
frigidi quoque humores illi fuerint, tenuia, & antiqua, & cû a-
crimonia conferent. Vinû vero aquosum ad humorû ex pul-
mone eductionem aptum est: roborat enim, & succos humo-
rum

f ij

L I B E R

stat, & secat mediocriter. Vinum dulce in morbis acutis, veluti in peripneumonia, & pleuritide, cum iam sit facta coctio, ad sputa elicienda est accommodatum.

Quæ res obstruunt.

Cap. 25.

Lac in quo plurimum feri sit, minime periculosum est, etiam si semper eo vescare: quod vero feri parum, caséique multum habet, non tutum est ei, qui in eius usu longo tempore permaneat. renes enim calculo obnoxios lædit, & iecoris obstructions facit in iis, qui in hosce morbos facile possint incidere. palmule sunt iecori, & spleni inflammatis noxiæ, veluti etiam ficus, non aliqua propria & præcipua earum facultate, sed communi omnium dulcium ratione: omnia enim dulcia lienem & iecur obstruunt, & scirrhus laborantia lædunt: ipsæ vero suapte natura neque obsunt, neque prosunt vehementer: additæ vero iis medicamentis, in quibus abstergerendi, & incidendi vis est, non mediocrem utilitatem afferunt, aqua mulsæ incommoda est iis, quorum viscera in tumorem elata aut scirrhus, aut œdemate, aut inflammatione laborant: quandoquidem mel suapte natura in biliosum succum celeriter mutatur. Papaveris semen ea retinet, quæ ex thorace prodeunt, palmulæ pingues, & dulces obstruunt: id quod virides magis faciunt. præterea omnia librorum genera, & quæ ex similia conficiuntur, obturant, & lienem augent, & lapidem in renibus faciunt. idem efficit triticea farina ex lacte. alica etiam incommoda est iis, quorum iecur obstruunt, & quibus renes sunt lapidi gignendo idonei. vinum dulce obturat, & viscerum tumoribus incrementum addit.

Quæ tarde transeunt.

Cap. 26.

Tarde transeunt omnia, quæ ex itriis, & similia conficiuntur. fabæ frictæ, panes puri, lens detracto cortice, cerebrum, spinalis medulla, iecur, cor, triticum elixum, ova elixa, & magis assata, & multo magis fricta, lupini, phaseli, pisa, sesamum, erysimum, glandes, mala. pira non matura, siliquæ, vinum dulce, & magis quod austerum est, & nigrum dulcedine vacans: itemque crassum, & novum omne. aqua valde tardi transitus est.

Quæ facile corrumpuntur.

Cap. 27.

Perfica, armeniaca, præcocia facile corrumpuntur. omnes

iti-

indem fructu
facile vitiantur
tera omnia ve
quique deducit
enim simul ce

Quæ

Chamulæ
ita infecta, quæ
rum maliciam
bis & ter in co
ferimus, cum
quoque sunt a
que carmen ha
tella connecta.

Quæ

Aluum sub
ria, quæ re
equilibratione
que corpori
ro ad exce
brassicam
dini, coqua
diat, tum pe
spiciet. quin
rum omnium
licam si velis
sunt cocta, p
& garum non
pines furtur
extremum fac
nigri succu
uox humore
poxa quoque
extremum it
oportet, ne
ex quo comes
intellus, ne
idoneus: &

fructus horæi, quorum natura humida est, in ventre facile vitiantur, nisi prius cito deiciantur: idcirco his ante cætera omnia vesci oportet, ita enim celeriter secedunt, & alia quoque deducunt. Si vero post alias dapes comedantur, eas etiam simul corrumpunt.

Quæ difficulter corrumpuntur.

Cap. 28

Chamulæ parvæ, purpuræ, buccina, & cætera omnia testacea, quæ duram carnem habent, his qui propter humorum malitiam cibos corrumpunt, dare consuevimus: eaque bis & ter in optima aqua incoquimus, & in aliam puram transferimus, cum prima iam falsa facta esse videatur. eiusmodi quoque sunt astaci, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & quæcunque carnem habent, quæ difficulter vitietur, non secus quam testa contestæ, quorum caro est dura.

Quæ res aluum subducunt.

Cap. 29.

Aluum subducunt lens, brassica. ex marinis vero sere omnia, quæ testacea nominantur, compositam ex contrariis qualitatibus habent naturam. ipsi enim solidum cuiusque corpus tarde permeat, & aluum cohibet: humor vero ad excernendum proritat. Si quis igitur aut lentem, aut brassicam, aut aliud quippiam ex marinis animalibus, ut dixi, coquat, deinde eius decoctum oleo, garo, & pipere condiat, tum potui det, cui velit, ventrem eo potu subduci conspiciet. quin etiam marinorum herinaceorum, & conchularum omnium, & veterum gallorum iuscula ciēt aluum. Brassicam, si velis aluum subducere, cacabo vna cū aqua, in qua fuerit cocta, prope collocata extrahimus, & statim in oleum & garum iniicimus: ea enim non est admodum coquenda. pines furfuracei aluum mouent, & quia in ventre multum excrementi faciunt, & quia furfur extergendi vim habet. fœni græci succus cum melle coctus, & sumptus, ad omnes vitiatos humores, qui in intestinis sunt, subducendos est idoneus, ea quoque abstergerendi vi, quæ in eo est, intestinum ad excretionem impellit. mel vero quod ei miscetur, parum esse oportet, ne morsum excitet. oliuæ salitæ si ante alios cibos ex garo comedantur, aluum mouent. quemadmodum testa intestis, ita etiam conchulis succus inest ventri subducendo idoneus: & propterea nonnulli eas ex oleo, vino, garoque

f iij

parant, & iure, quod inde fit, ad ciendam aluum vtuntur. Lac
quod liquidius est, magis subducit: quod crassius est, minus.
serum lactis valde aluum mollit, ei que tantum optimi mellis
adiiciendum est, quantum satis sit ad condiendum citra sto-
machi subuersionem: eodemque modo tantum salis impo-
nendum, quantum sufficiat, ne gustus offendatur. quod si ve-
lis magis subducere, plurimum salis indito. Carnes anima-
lium, quibus parum admodum ætatis accessit, ac similiter
etiam eorum extremitates per aluum facilius transeunt. Ex
piscibus chartilagineis torpedo & turdus mediocriter tranf-
eunt: beta, & lapatium, vrtica, caseus recens cum melle, atri-
plex, blitum, cucurbita, pepones, melopepones, ficus, ca-
rice, vix dulces, & præsertim cum humidæ fuerint. Mo-
ra in purum ventericulum incidentia, & præ cæteris cibus sum-
pta celerrime subducuntur, & cæteris quoque cibus viam pa-
rant: at post alios cibos accepta, etiam si vitiosum succum in
ventriculo comperiant, tamen eque ac cucurbita, celerrime
corrumpuntur. nuces recentes ad alui excretionem faciunt.
Sed & sicce si prius in aqua permaduerint, æque ac virides
ad aluum subducendam valent. pruna humida subducunt:
ficca vero in aqua mulsæ, in qua multum mellis sit, infusa,
etiam si quis ea sola comedat, satis abunde ventrem leniunt:
sed multo magis, si mulsam etiam ebibat. est enim clarum fa-
cere ad ventris subductionem, vt postquam ea sumperis,
aliquo post tempore vinum dulce bibas, neque statim pran-
deas. mora, cerasia, præcocia, persica, & omnia humida, & a-
quea, & omnino quæ nullam insignem habere qualitatem
ea gustantibus, & odorantibus videntur, si recte affectus sit
venter ad infernâ deiectionem, facile deiiciuntur: si vero nō, &
ipsa supra cætera manēt, & nil venter ad expellendum iuuat: quia
nulla in eis acrimonia, aut nitrosa qualitas est. hæcque eduli-
orum materia est quodammodo media inter ea quæ aluum
subducunt, & ea, quæ sistūt: parūper ad alterā partem vergēs,
cum neque venter admodum languidum ad excretionem, ne-
que validum ad distributionem fortiatur: quādoque enim sistit
aluū. ex quo fit, vt aqua mulsæ, in quibus celeriter distribuitur,
in iis nō solum aluū ad excernendum exciter, sed ceteros etiā
cibos cōmixtos deducat: si vero nō properet distribui, statim
irritet ad excretionem: quia habet aliquid acrimoniæ. quin ip-
sum quoque mel solum si quis non coctum lambat, aluum
recte

reſte ſubducit. aqua autem mulſa parumper, vel nil cocta, antequam diſtributio fiat, ſubducetur. oxymel imbecillius inteſtinum radit. Vinum dulce non nihil adiuuat ventris excretionem: paſſum aluum ſubducit.

Quæ res aluum ſupprimunt.

Cap. 30.

Palmulæ austeræ, vuæ paſſæ austeræ, mora, rubi fructus alui ſupprimunt, magis etiam liſtit rubi canini fructus, myrta ſylueſtria, agreſtia pruna, quæ etiam pruna dicuntur. mala adſtringentia ventrem detinent, acida vero cum in ventriculo ſuccum craſſum inueniunt, eundem incidendo aluum ſubducunt: & ob eam cauſam feces liqueſciunt: at ſi purum vetriculum inueniant, eum magis cohibent. quæ dulcem ſuccum habent ſine acrimonia, ea facilius diſtribuuntur: cum acrimonia vero adiuncta, ſecedunt. aquea vero, & qualitatis expertia, iniucunda ſunt, & nihil commodi habent in ſe. quod de malis dictum eſt, idem quoque de malis punicis, de quæ piſis dictum eſt. Si quis lac excoquat, ſerumque conſumatur, aluum non ciebit. nam ſi lapides ignitos toties in lac immitas, vt ſerum conſumptum ſit, lac ita paratum adſtringet: idque iis, quorum acria excrementa ventrem morſu infeſtant, dare conſueuimus. Sed non minus etiam quæ ex lapillis ignitis, imo vero magis idem facies ferreis orbiculis igne candentibus. verum lac, quod ita confeceris, in caſeum facile coit in ventre: iccirco ei mel & ſalem admixcemus: ſed tutius eſt aquam ei affundere. neque mirum videri debet, ſi conſumpto ſero lactis aquam adhuc infundimus, quia non ſeri humiditatem, ſed acrimoniam, qua ventrem ſubducit, fugere volumus. aſtaci, cancri, paguri, locuſtæ, ſquillæ, & cætera omnia, quæ molli teſta inteſta ſunt, aluum ſupprimunt: ſed minus quam ea, quæ dura teſta ſunt operta. habentque hæc ſalſum in ſe humorem, quem ſi in aqua depoſuerint, non minus, quam oſteorum, & aliorum dura teſta contextorum carnes, ventrem compriment. Léticula quoque & braſſica bis coctæ, & cum ſuccum depoſuerunt, ventrem liſtunt. cumque humidum ventrem exſiccare in animo habemus, braſſicam mediocriter coctam prima aqua abiecta, ſtatim in aliam calidam coicimus, atque in illa iterum eam coquimus donec flaccſcat. idque quod bis coquendum eſt, neque aerem, neque aquam frigidam debet contingere: ſiquidem non poterit exquiſite flaccidum

f iij

L I B E R

reddi, etiam si plurimum decoquas. si corticem à lēticula auferas, vehementem adstringendi vim amittet, neque ita fluxiones quæ in ventriculo fuerint exsiccabūt: si vero eam contundas, bisque excoquas, prioremque aquam abicias, deinde medicum salis, aut gari permisceas, & aliquid eorum, quibus aluus constringitur, addas, ita ut gustus non lædatur, iucundissimum, accommodatissimumque medicamentum, & edulium parabis. polenta ex vino austero cōpota, exsiccat, oryza cohibet aluum: itemque panicum, milium, fricta leporis caro, vinum austereum, & fuluum atque austereum.

Que res calefaciunt, acresque & calide sunt.

Cap. 31.

Calefaciunt autem hæc, triticum coctum, panes ex eo confecti, tithymalus, auena, fernum græcum, iuniperi baccæ, palmule dulces, poma dulcia, sesamum, erysimum, & ob id sitim inducunt: canabis semen, vuæ dulces, & ideo sitim afferunt. vuæ passæ dulces, malua mediocriter, apium, smyrnium, cruce, raphanus, rapa, radícula, sinapi, cardamum, & pyrethrum. Acría vero & calida sunt hæc, pastinaca, daucus, & carus manifesto calefaciens: allium, cæpa, porrum, ampeloprasum satis acria sunt, sed tamen bis, terve cocta deponunt acrimoniam. cæsus vetus calidus est, & idcirco sitim affert. vinum dulce mediocriter calidum est, & ideo sitim inducit: fuluum est nigro calidius: flauum vero est extreme calidissimum, deinde fulvum, tum rubrum, postea dulce, postremo album minus, quæ cætera omnia caletacit: at vetustissimum vinum abunde calefacit.

Que refrigerant. Cap. 32.

Refrigerat hordeum, quibuscunque modis conficiatur, milium, panicum, tubera, cucurbita elixa, melopepones, cucumeres, pruna, austera & acida, vuæ, et passæ austere. mala adstringentia frigida, & terrestres succi sunt: acida vero frigidum tenuium partium succum habent: atque ea etiam quæ plane qualitatem sunt expertia, & veluti aquea. idem de piris & malis punicis iudicato. non pauci quoque sunt aliarum arborum fructus, qui refrigerent, & præsertim ij, qui reponi, & asseruari non possunt, itemque palmulæ adstringentes frigidi succi sunt, lactuca, intubus, sed moderatius: portulaca, papaveris semen,

semen, cuius si plus sumatur, soporiferū fier, & nimiam pro-
pensionem in somnum afferet: eos vero, quibus tenuis destil-
lacio fuit à capite, iuvat: in qua re præstat id, quod candi-
dus est. myrta refrigerant, sed non cum adstrictione, quādo-
quidem acrimoniam quandam habent. solanum efficax est
in refrigerando & adstringendo. aqua, vinum aquosum non
aperte calefacit: quam ob rem cum minore periculo febrici-
tantibus datur. Vinum album, & austerum, & crassum, & no-
uum manifesto refrigerat, & acetum: estque tenuium partiū,
& ideo cum intimas partes magis, quam alia refrigerantia
penetret, nervos lædit. media vero quodāmodo inter ca-
lefacientia, & refrigerantia sunt panes loti, amyllum, & vix
vinosē.

Que res exsiccant.

Cap. 33.

Lens & brassica pariter siccant, & ob eam causam aspec-
tum obtundunt, nisi forte contingat, ut totus oculus sit hu-
midior: eius vero asparagus, minus quam brassica siccatur, ali-
orum vero olerum caules est siccior. cōtra vero est radiculæ,
rapæ, sinapis, nasturtiique, ac pyrethri, & cæterorum omniū,
quorum acrem esse asparagum contingit. polenta siccatur, vi-
ticis semen, eruum bis coctum, & sæpe in aqua dulce reddi-
tum, edulium exsiccat: fit: præstantius autē est album. quæ-
cunque autem assata, aut fricta comeduntur, siccus alimen-
tum præbent: at quæcunque in aqua prius elixantur: humi-
dus: quæcunque vero in sartagine condiuntur, medium in-
ter hæc locum tenent. quodcunque autem plus vini & gari
habet, siccus est quam id quod non habet: quæ vero minus
horum, aut defruti plus habent, aut in simplici & puro albo
iure coquantur, multo sunt prædictis humidiora: quæ
vero ex aqua sola coquantur, sunt etiam his humidiora. ma-
gna enim differentia ex conditura accedit seminibus, oleri-
bus, & plantis, omnibus quidem exsiccantibus, sed aliis ma-
gis, aliis minus, pro facultate earum rerum, quæ eis adici-
untur.

Que res humectant.

Cap. 34.

Prissana, cucurbita elixa, pepones, melopepones, cucume-
res, nux viridis, pruna, sycomora, mora non corrupta omni-
no humectant: non refrigerant autem omnino, nisi frigida

L I B E R

fumantur. humectat quoque lactuca, intubusque, sed minus portulaca, ac malua, & blitum, atque atriplex maxime omnium olerum aquea sunt. quin etiam alij plerique fructus aliarum arborum humidi sunt: ac præsertim ij qui vt seruentur, reponi non possunt. Iam vero lactucæ & papaueris semen humectat: itemque fabæ virides, cicerque viride. aqua porro humectat & refrigerat: calfacta vero humectat, & calefacit.

FINIS TERTII LIBRI.

ORIBASII MEDICINALIUM COLLECTORVM,
LIBER QVARTVS.

Ex Galeno de apparatu alimentorum.
Cap. 1.



EX nobilissima olira, detracto, vt par est, cortice, tragum quem nominant, conficiunt. nam & ex hac ipsa, atque ex typha, non secus quam ex hordeo, cum detractus cortex est, siquidem extrinsecus corticem habent, panis conficitur. Tritico vero mollito siquis tenuissimam farinam excusserit, ex reliqua panes qui fursuracei dicuntur, efficiet: siligineus vero & similaceus panis ex purissimo fit. ac pueri quidem panes copiosiore fermento indigent: & subigendi quoque diutius sunt. nec statim post fermentum, & subactionem assandi: fursuraceis satis est paucum fermentum, leuis subactio, & tempus exiguum. pari quoque modo puri assationem diuturniorem, fursuracei vero breuiorem exigunt. inter purissimos vero, & sordidissimos non parua maioris, minorisque ratione latitudo intercedit. est autem inter hos exquisita media species panum, qui αὐτοπύροι, & συγχωμισοί ἀρτοποιεῖται.

pellantur: qui ex farina indistincta, & surfure ac farina non
sejunctis fiunt.

De polenta.

Ex nouo hordeo mediocriter fricto præstantissima polenta fit. Si hoc desit, plerunque ex alio eam conficimus, cumque polenta omnis, quæ rite facta sit, boni odoris est: tum vero optimi odoris erit ea, quæ ex optimo atq; nouo hordeo, quodque aristam non admodum siccam habeat, confecta sit. Est hoc in more positum multorum, qui sani sunt, ut polentam sapa, aut vino dulci, aut mulso, & quandoque sola aqua conspergant, & æstiuo tempore duabus, tribusve ante balneum horis eam bibant: aiuntque sentire se huius porione siti liberari. Iam vero ex polentis aqua temperatis mazæ quoque conficiuntur.

De alica.

Alica ex genere tritici est. adhibere vero diligenter mentē debemus iis sorbitionibus, quæ ex ipsamet alica parantur. est enim hic eius succus aqua commixtus: plurimamque coctionem expostulat: qui veluti satis coctus, decipit eos qui ipsum parant, & non mediocriter ægrotos lædit. nam cito concreuit, & densatur, quia lentus ad modum glutinis est. ergo permulta aqua admixtus super carbones plurimum coquendus est, atque mouendus anetho, donec coctus fuerit: atque eo tempore sal quoque adiiciendus est: oleum vero, etiam si in initio indas, nihil incommodi erit. Sanis vero, cum interdum propter vehementem ventriculi morsum, aut biliosi humoris transitum sorbitionis indigēt, alicam plurimum coctam vsque dum extabuerit, tum percolatam, ut ptissanæ succo percolato similis sit, tunc sorbendam damus. eadem quoque est alicæ lotæ parandæ ratio.

De ptissana.

Parabitur autem ptissana, sicut decet, cum coquendo in tumorem plurimū elata fuerit: deinde lento igni longo temporis spatio in succum abeat. quo quidem tempore cum plane intumuerit, acetum ei inditur: cumque probe fuerit cocta, paulo ante quā edatur, sal tenuis iniiciendus est. si vero olei ab initio imposueris, coctioni nihil incommodaueris.

LIBER

aliud vero nihil admiscendum est, nisi porri modicum, & anethi, idque in ipso statim principio. oportet autem crudam ptisanam in aqua aliquandiu præmaceratam, deinde in mortarium coniectam confricare manibus asperam quampiam rem in se habentibus, cuiusmodi est spartus, ex quo iumentis soleas nectunt. usque eo vero confricanda, dum præpositus cortex abiectus sit. si vero totum acus non deciderit, ptisana elixa magis absterget, & nullam præterea noxam contrahet. pessima vero ptisanæ confectio est, cum coqui crudam in mortario ex aqua contusam parumper coxerint, & defrutum, ac sapam iniiciunt. nonnulli vero mel, & cuminum cum iis etiam imponunt, ut cinnum potius, quam ptisanam parare videantur.

De phacoptisana.

Ex lentibus & ptisana præstantissimum edulium fit, cui phacoptisana est nomen. non tamen pari mensura lentes & ptisana commiscetur, sed ptisanæ minus iniicitur, quippe quæ in succum vertatur, & in maiorem molem extollatur: lentes vero coctæ perexiguum tumorem nanciscantur. & tamen huius quoque edulij confectio eadem est, quæ ptisanæ: præterquam quod satireia aut pulegio indito suavius simul, & ad concoquendum accommodatius redditur, cum ptisana anetho, & solo porro contenta, illa minime exigat. pessime autem à coquis lens ex sapa diuitibus apparatus. si vero suillam incoquere simul velis ptisanæ recentem, ac præsertim pedes, lentibus vero sale iandiu conditam, convenire comperies, quemadmodum ea quæ inter has media est, quæ nuper sale condita sit, phacoptisanae convenit.

De teutlophaca.

Præstans edulium est quod ex beta & lentibus confectum, teutlophace nominatur. multæ autem betæ imponendæ sunt, & paulo plus salis, ac gari dulcis. siquidem ita facilius subducetur.

De cucurbita.

Cucurbita vero propter aqueam qualitatem sibi innatam organo merito gaudet. omnia enim quæ eiusmodi sunt, acris, aut acidis, aut austeris, aut salis succis admiscenda sunt,

sunt, si neque insuauia sunt futura, neque iis, qui ea sum-
pserint, nauseam allatura. ex cucurbita quoque iucundissi-
mum edulium fit, si ea cum aliquo balsamento ex ponticis,
quæ mylla dicuntur, in sartagine paretur.

De rapis.

Rapæ, quas *βρύειδες* etiam vocant, diuturniorem coctio-
nem postulant: suntque laudatissimæ, quæ bis aut ter coctæ
fuerint.

De radice ari.

Ari autem radix æque ac rapæ estur. ea in quibusdam re-
gionibus acrior nascitur. ad Cyrenem hæc planta oritur à
nostrate diuersa: siquidem in illis locis arum minime medi-
camentosum, acréque est: ut rapis quoque sit vtilius. Sed &
dracontij radicem bis, terve coctam mandendam damus.

De asphodeli radice.

Asphodeli radix, ut lupini, apparatus. nam cum eiusmodi
bis elixauerimus, cum mediocriter cocta videantur, aqua prio-
ri abiecta statim in aliam calidam coniicimus, & deinde in
ea iterum coquimus, donec colliquetur. in quo illud est ca-
uendum, ne quod bis coquendum est, aut acrem, aut aquam
frigidam attingat: quia licet plurimum coqueres, nunquam
tamen tenerum redderetur.

De cochlearum coctione.

Cochleas secundo loco elixare oportet. deinde paratas
tertio elixare, donec intabescant: ita enim alent. verum ad
aluum deiciendam in ipso statim initio parandæ sunt ex
oleo, garo, & pauco vino: & iusculo, quod inde fit, vtédum.

*Quæ corpora animalium, & quorum, apta sunt,
ut sale condiantur.*

Corpora ad saliédum apta sunt, quæ & dura sunt, & car-
nes excrementis affluentibus habent. quæ vero aut valde mol-
lem, aut valde siccum, & excrementis vacantem corporis ha-
bitum nacta sunt, non sunt ad saliendum accommodata. ete-
nim sicca corpora sale conspersa exarescunt, & inepta cibo
redduntur, ut in lepore conspicitur. Suum vero ætate floré-

L I B E R

tium, & pinguium carnes apte ad saliendū sunt, cum vtriusque incommodi, & siccitatis annosorum, & immoderate nouellorum porcellorū humiditatis sint expertes. Vt enim corpora sicca sale condita coriis similia redduntur, sic contra fit in iis, quę humore nimio diffuūt, vt salis commercio colliquētur. quam ob rem nec pisces mollis carnis, & excrementorū expertes, quales sunt, qui saxatiles appellantur, nec aselli, qui ex puro mari capiūtur, saliēdo sunt, Graculi vero, & muli, & pelamides, & sardę, & sardenę, & quę saxatina dicūtur sunt ad saliēdū idonea. Cetacea quoque marina sale cōdita, quoniam ipsa quoque carnē excrementis redundantē habēt, pręstantiora sunt. muli vero, quod eorum sicca, & vacas excrementis caro est, incommoda sunt, vt saliantur. Ex his autē perspicuum est, quęcunque sale conditā dura, neruea, & fere coria redduntur, esse concoctu difficillimā: quę contra affecta sunt, & ipsa tenuium fieri partium, & crassos, ac glutinosos humores attenuare. Laudatissima vero omnium, quę mihi vsu cognoscere licuerit, sunt Gaditana salsamenta, quę nunc Sardę appellantur: deinde muli, qui ex Ponto aduehuntur: post hos secundum locum tenent graculi, pelamides, & quę saxatina nominantur.

De cerebro coquendo.

Cerebrum omne cum incidentibus, & calfacientibus apparatus fit ex omni parte pręstantius.

Quomodo ius album conficiatur.

Album ius, atq; simplex ex sola aqua, & oleo, pauco anethi & porri, & sale modico iniecto post idoneam cōctionem, conficitur.

De decoctionibus.

Decoctum plurimorum, aut etiam omnium, quādiu coquas, eo magis falsum fit: postea vero etiam amarum. corpus vero solidum quod in aqua elixatur, qualitates, quę eidem primum inerant, in ea deponit, vt tandem qualitatis expers, & aquosum reddatur: nec quicquam salsedinis, aut amaroris, aut adstrictionis habeat. atque amara quidem si bis, aut ter, elixare volueris, ea amarorem in aqua plane deponent: erūntque similia iis, quę expertia qualitatum dicuntur.

tur.eodémque modo acria elixata deponunt acrimoniam.
eadem quoque adstringentium est ratio.Iam vero aqua per
se ipsa cocta diutius,magis se ipsa salsa redditur.

*Ex Rufo, de parandis eduliis. Est autem hoc caput in
primo libro extremo de victus ratione.*

Cap. 2.

Quæ assa præbemus,ea vim habent exsiccandi: quæ vero
elixa sunt,ea humectât,licet suapte natura diuersam vim ha-
berent.éstitque inter hæc differétiâ ex condimentis , quæ ad-
mifcentur,vt ex coriandro,& anetho,& cumino , & porris,
& cæteris,quæ vt condimenta & carnibus imponûtur, mi-
nime autem adiiciendæ sunt notæ condimentis . nam quæ
ita sunt parata , etiam si ventri non sunt nota , tamen si in
principio indantur , præstantissima sunt , postea vero ad-
mixta,fiunt deteriora:cum non sit æqualis elixatio.atque eo
quidem tempore valentioribus conueniunt.ac sal copiosus
ad pinguedinis colliquationem accommodatus est,& quod
pingue est,salem recipit:& plurimo igni coquédum . at gra-
cilia,& sanguine vacantia si assare volueris , magis lêto igni
admouebis, Ex carnibus autem caprarum,aut pecudû, quas
sub æstiuo solstitio elixabis (siquidem eo tempore grauior-
is odoris sunt)itémque arietis,& magis etiam hirci, (assata
enim grauius olent)in elixando operculum auferendum est:
& ex plurima aqua elixare,& condimentis alterare oportet.
ossa quoque carniû mali odoris præcidenda , & confrin-
genda sunt omnia.medullę enim in primis putrescunt : quæ
cû putres non sunt,& pinguiissimæ sunt,& suauissimæ. Co-
gnoscere vero debemus, quę statim , & quę post elixanda
sint. Carnes ergo omnium agrestium post , cicurum vero,
suis , ouis , & capræ statim coquendæ : bubulę autem inter-
iecto spatio,aues quoque magnæ , & palustres, itémque gal-
linæ,palumbi , perdices , pauones atque attagenes. sed tur-
tur,columba,turdûsque statim. Pisces vero omnes quamprî-
mum etiam festinando coquere debemus : quia non com-
mode adseruari reponiq; possunt. quæ autē adseruâda sunt,
sed elixanda,ea fragiliora fiunt aceto . gallinas vero adser-
uare possumus infuso aceto : quandoquidē ita perdurât. Si
vero agrestes,cum primum eas venatus fueris , elixes , non

L I B E R

eris magnopere reprehendendus. Calazas quæ in carnibus fieri solent, maxime ne laudabis: quæ vero suis obueniunt, exiguas carnem facere suauiore existimato, maiores vero humidiores, atque iucundiores. dandæque opera est, ut horum usus circuncidatur: si vero oporteat, parû ceræ adijcito, & assando veru cera inungito. ac viuis quidem adhuc animalibus, utrum calazas habeant, cognoscas ex lingua. quæ tibi signa dabit. itémque ex pedibus posterioribus: si quid consistere non possunt. Iam vero qui celerius elixare aliquid volunt, alij nitrum, alij silphij succum, alij ceram, alij ramû ficulnum, & magis etiam caprificum indunt: cum caprificus etiam rebus assandis acceleret assationem. intrita vero ut myrtotum, quod ex allio & aliis quibusdâ rebus fit, & mēta, & apium, itémque omnia quæ ex caseo & aceto parantur, omnia ad coctionem maxime faciunt. myrtotum vero aliis * secedit. Senibus appositæ sunt carnes, quæ ante coctionem extractæ fuerint, & parumper in aqua salem, thymum, aut tragoricanum habente maduerint. Pisces non sinendi sunt inueterascere, nisi nimis duri sint: neque quatiendi, nisi molles: sed omnes æque ac carnes præmadescere in aqua salem & thymum habente debent. atque ita quidem carnes quadrupedum rite elixatas coquas, ut celerrime conficiantur: cæteræ vero neque prius elixandæ sunt, neque assandæ: sed soli igni admouendæ. ita enim maxime pisces moriuntur: quodque glutinosum est, exfugitur. quos vero assare nō possumus, hos tenuissime elixare conuenit. idem de aurbus, & carnibus, cum quispiam elixis delectatur, est faciendum. Si quis ostrea sinat prius feruere, deinde assat, exiguum sinapi, ac piper addendo sumat. ac nunc non opus est ea * minuire: aut testes gallorum gallinaceorum vescos etiam ægrotantibus commendare. Cydonia mala non admodum corumpuntur. eaque ex melle sumēda sunt. eadē ex vino quoque detracto cortice coquuntur, aut abiecto semine mel inditur. toti denique cydonio crusta ex farina aqua subacta circūlinitur: & mel imponitur, & coquitur vsquedum crusta adusta sit: quo sane tempore & totum cydonium est coctum, & mel totum est exhaustum.

Ex Diocle de alimentorum præparatione. Cap. 3.

Quoniam pleraque edulia alicuius apparatus indigent, fiuntque

fiuntque meliora, ut alia eis quidpiam addendo, alia ab eis-
dem auferendo, alia omnino aliter disponendo, fortasse non
erit incommodum, hac de re pauca dicere. etenim eorum
purgatio, cum adhuc cruda sunt, non mediocriter ad bonam
valetudinem, & ad iucunditatem momentum affert: nec vlla
in parte huic rei minore studio incumbendum est, ut quæ
inutilia sunt, abiciantur, & fœda, atque incommoda sunt,
perpurgentur, purgantur autem omnia vel elixando, vel ma-
cerando, vel persape lauando. elixanda porro in aqua sunt
ea in quibus amarities, vel adstrictio inest quædā: quæ mor-
dent, quæque acrimoniam habent, aceto temperanda: mace-
randa vero sunt ea, quæ salsa sunt: lauanda denique ea, in
quibus aliquas immunditias conspiciamus. In elixis atque as-
sis ignis ipse, & condimenta ad fœdum odorem, ad insipi-
ditatem, & ad succi malitiam auferendam maxime conue-
niunt. ad hæc vero omnibus inspargenda est ruta, cumi-
num, coriandrum, & cætera viridia condimenta, ac nullum
quidem contritum, sed cui conueniat, eorum contusorum
succus imponetur: itemque origanum, fatureiam, thymum,
salem, acetum, & oleum, in quibus omnibus suæ virtutes
insunt, adiciemus. Caseus est prædictis deterior: minime ve-
ro insensus caprinus ex coagulo concretus, non vetustus,
odoratus, exiguus, & potius tostus. Silphium vero, sicubi eo
opus fuerit, candidissimum, odoratissimum, & minimum ca-
pietur. odoribus enim condimentorum suauitates atque
virtutes continentur. Quæ vero crassa sunt, & ex copioso
re caseo, sesamo, silphio, & copia contritorum fiunt, nihilo
maiores voluptatem afferunt, sed sæpenumero molestia con-
ficiunt. at obsonia, quæ exigua, aut nulla correctione indi-
gent, ea, ut vno verbo dicam, aqua sunt elixanda: quæ vero
virosa, & humida, & insipida sunt, cum aceto: quæ deterioris
succus sunt, magisque austera, aceto dulci. Maximi autem re-
fert, ut res omnes conuenienter & succis, & odoribus citra
contritionem componamus, & temperemus: quod præcipue
consequetur is, qui diligenter animaduertat, ut neque odo-
re, neque succo aliquo res commixta satietur: sed vnus om-
nium odor, vnusque succus appareat, qui singulis rebus con-
fectis conueniat. Super carbonibus equaliter coquantur
omnia. Cum elixa edulia sunt, è vasis extrahi debet teruentis

L I B E R

tibus adhuc humoribus, nec sunt infrigidantibus immittenda. Quæ cum humoribus non comeduntur, ea lento, & æquabili igni assanda sunt omnia. & quæ vitiosos succos habent, magis siccanda: quæ bonos, succi reddenda pleniora.

Ex Mnesitheo cyzicino, de brassica.

Cap. 4.

Brassica quam acutissimo ferro concidenda est, deinde abluenda, & aqua abiicienda, & coriandri, atque rutæ quantum satis sit, vna contundendum: tum oxymelite totum aspergendum, & perexigua filphij portiuncula super abradenda. Huius si tantum, quantum acetabuli mensura continet, sumere velis, nihil tibi vitiosi in corpore concreſcet: imo vero si quid prius inhæserat, extrudit: sedat præterea caligines oculorum, itémque suffocationes. si quid etiam incommodi vel circa septum transuersum, vel hypochondria accidit, subuenit: emendatque ea, quæ lieni obſunt: si quæ lien permagnus sit, eundem extenuat, ad melancholicos vero mire facit cruda sumpta: si quidem venas expurgat. ad morbos vero articulorum, nihil æque efficax est, ac brassica ita composita, & ieiuno & mane data. Ad tormina intestinorum ita paranda est, vt brassicam diligenter plurima aqua maceremus, deinde in calidam aquam coniectam elixemus donec intabuerit: tum aqua tota abiecta oleum indere: postea sinemus, vt simul ferueant: tum in vas coniecta interemus, & cum aliquo cibo, aut solam brassicâ, eamque frigidam mandendam dabimus: idque non semel, sed singulis diebus mane longo dierum spatio faciendum est, sed non multum eius propinandum, ne obſistat.

Ex Dieuche, de conficiendis panibus.

Cap. 5.

Panem conficere oportet ex farina tritici maxime inconglutinati, & leuiter fermentati dulci fermento, vt ex massa firmissima: estque multo tempore subigendus. Præterea vero assatio in furno mihi tutior, quam quæ in clibano fit, apparet: & multo etiam tutior, ea, quæ fit crustis circumdantibus: siquidem mollis, & longiore tempore fit assatio. ad hæc quoque ignis non facile adurit rem, quæ assatur, quia exustio externas partes congrassatur. at panis qui in clibano coquitur, siccior est ille quidem, & ori iucundior, quam is, qui

qui in furno conficitur: sed tamen assatio non est tuta, sed exteriora statim exuruntur, interna pars cruda remanet. Subcineritius vero est omnium siccissimus: atque etiam difficilior est eius assatio, quam quæ clibano conficitur. Prunas enim multas esse oportet, & ad hæc cinerem copiosum adesse. massa vero ex farina triticea, non ex simila, & abunde subacta est præstantior: debetque maiorem habere mollietate, quam panis in clibano confectus. deinde in cinere imponi, qui igni incumbat: tum desuper alio cinere massam contegere, & super eo cinere prunas quamplurimas conijcere, & maxime supernam partem incendere, quo loco assatur. hic panis omnium est siccissimus: eritque ad ventres humidos, & non concoquentes, quibuscunque pituitæ copia redundat, accommodatissimus.

Ex Dieuche, de polenta.

Cap. 6.

Polenta uti quispiam potest, & potionem, & pulvere quæ in aqua coquitur, confecta: vel si farinam in gallinæ ius coniectam feruefaciat, ut maxime assata polenta euadat, cum eam non agiter, sed sinat coire sensim calfaciens igni, vel aqua calida ita, ut bis coquatur. in agninum quoque, & in hædium non omnino pinguedinis expers, atque in suillæ carnis ius coniecta, & simul cocta, dysentericis facit. Satis autem est, in quartupla parte choe polentæ optimæ, & ponderosissimæ cyathos duos lactis, & aquæ tertiam partem indere, & cum ab igni abstuleris, papaueris, aut eius capitum, vel dum adhuc ad ignem est, * cucumeris læuigati quantum holcæ triobolus contineat, admiscere, & simul incoquere: & ad sorbitionis crassitudinem redigere, ac propinare. Hæc ita confecta cessationem quandam resurgendi, & somnum affert: nec debet quisquam hac uti sæpius, sed ter, aut quater: & præcipue in robustis corporibus: quia imbecillitate quædam inducit: & iis, qui eadem utuntur liberalius, urina raro procedit. Ex auena quoque polenta conficitur, tota enim cum acere frigitur, repurgaturque, ac subigitur, & quemadmodum hordeacea, polenta trahitur: sed tamen hæc præstantior est, & minus, quam hordeacea, flatus ciet.

Ex Dieuchis commentarii, de parandis alimentis.

Cap. 7.


Qui imbecilli admodum sunt, & crassius alimentum quam

g ij

LIBER

aqua sit, sumere amplius non queunt, optimum est, vt eis al-
 limentum in portione data maceretur, coquatur, & teratur,
 ita enim fit vt totius alimenti distributio tenuis, & in vapo-
 rem dissoluta distribuatur, & excrementa in ventre non re-
 maneant, & toto die & alimentum, & potio distribuatur.
 Hęcque propinatio præcipue utilis erit iis, quorum ventres
 consistunt, & non turbantur, indigentque tenui, & quod
 pondus habeat, alimento. macerabit ergo quispiam polenta
 tam calidam, & quæ ericides dicuntur. magnam vero facul-
 tatem panes quam calidissimi amittunt, cum franguntur, &
 macerantur. Simili quoque modo triticum tostum, & con-
 fractum macerabitur. eorum enim quæ magis etiam coquun-
 tur, melior est potus, & magis etiam alit. Febricitantibus
 ergo, & quibus crises non facile fiunt, hordeum confringē-
 dum non est, sed lotum in aqua elixandum: priórque aqua
 cum intepuerit, abiicienda, tum alia imposita coquendum.
 ac recte quidem coquetur, si decem aquæ heminas in vnam
 hordei heminam coniicias. coquitur autem vsque dum hor-
 deum crepet. deinde aqua tenuissima excolanda est, & mel-
 le admixto, vel per se sola danda. hæc enim cum aluum pro-
 be soluit, ciētque vrinam, tum vero etiam abunde nutrit.
 Datur etiam hordeum in polenta frictum, quod tostū hor-
 deum nominant. priusquam vero hordeum tundatur, ab-
 stergendum leuiter est acus illud adustum, & vbi macera-
 tum fuerit, coquendum. sed ventrem magis, quam superius,
 cohibet. est vero in aqua coquendum, non secus quam cru-
 dum. Ericidas quoque in aqua ab agitatione abstinendo
 quispiam decoquet, vt quam tenuissimum sit decoctum. de-
 coquet etiam quispiam panes, & fermentum: siccūque ac
 recens triticum crude, & frictum, & milium, & omne fer-
 me alimentum, quod ægrotanti accommodatum esse existi-
 mauit: idque in portione data, & in iure gallinæ, & in aliis
 plerisque humoribus. Quæ vero subtrita sunt, ea maceratis &
 coctis esse crassiora, & validiora videntur, ac omne quidem
 memoratū alimentū, in portionibus quæ dantur, ferme subteri
 posset. itēque multis arborū fructibus, & leguminibus, alendi,
 & vires quibusdā ægrotantibus addēdi causa vitur aliquis
 eadē incidēdo, cōtundendo, & succū exprimendo, vt potui
 dato indat. Iā vero panes & siccōs, & recentes, & placentu-
 las macerare aqua immerfas, & ex linteolo percolare ex-

pc



pedir. ad candorem vero, ne color ex pane appareat, cucu-
 meris semen tostum, itémque amygdalas, & nuces pineas, &
 sorba admiscero: & cum vnoquoque horum, & cum aliqui-
 bus, vel etiam his omnibus anisi, aut fœniculi semē adiungi-
 to: idque febricitantibus ex aqua mulsa, non febricitantibus
 vero ex vino propinato. Milium vero, & panicū contusa de-
 tracto cortice conueniunt iis, quibus vter biliosa affectio-
 ne premitur: & quibus tenues, ex quæ multæ excretiones
 per aluum fiunt. hæc autem conterendo aqua diluenda sunt:
 non minus, quam quod acetabulum contineat, si viro des:
 excolato ex denso linteo, & in aquæ heminam vini austeri
 modicum adhibe, & ieiuno da. Accommodatum quoque
 fuerit vna cū milio nuces euboicas cum internis membranis
 non multas contundere, nam in succum redactæ vna cum
 milio, sorbitionē febricitantibus idoneam faciūt. sed omniū
 infirmissima sorbitio est, quam *καχρύδα*, i. ex hordeo tosto
 confectam vocant. hæc verò ita fit, vt in semichœnice hemi-
 næ sex aquæ insint, si bis coquatur, vt crepet, erit præstati-
 or. Iam ex ptissana quoque succum exprimimus: & ventrem mi-
 nus, quam ptissana deiicit: succusque fit tenuior. Avena au-
 tem maxime omniū leguminū est ad concoquendum accom-
 modata: & eius est præstantissima sorbitio, valentiórque quam
 quæ *καχρύς* dicitur: sed ptissana imbecillior, & suauior, co-
 quitur eodem modo quo ptissana, vt hemina in decē aquæ
 heminis incoquatur. sorbitio vero quæ ex lētibus fit facien-
 da est, vt non torreatur tenuissimo cinere circumposito. quæ
 vero atype dupla, quam lens sit, efficitur, deuiter cōcutienda
 est, donec quicquid est aceris diligenter excidat: tum cribro
 tenui agitando: cinis vero infra erit. lentem vero sæpe lotam,
 & anethi, aut pulegij portionem absque oleo indens, salē-
 que modicum addens elixabis, & aceti parum effundes, cum
 iam erit discocta: nō febricitantibus, & quibus aluus profuit,
 vini odoratissimi cyathum pro aceto infundes. sed & ventri
 profunt pira, & mala cydonia dissecta in partes, & in lenti-
 bus absque vino & aceto incocta. atque hemina quidem
 lentium in septem aquæ heminis coquetur. In iis præterea,
 quorum aluū humectare oporteat, vti poterit quispiam no-
 uellarum betarum foliis puris, simul coquendo aut maluam,
 aut cucumerem, aut cucurbitam in minutas dissectam para-
 tes. Amylinę vero sorbitionis vsus febrim habentibus aptus

L I B E R

erit iis, quorum in febribus aluus profuit: & alui causa, leni-
tes admisceri poterunt. sed & in lacte quoque uti ea licebit,
& aqua itidem admixta, & ipsa etiam per se data. ac magis
quoque dysentericis, & fluxionibus, quæ tussi excitantur, cō-
ueniet. ita vero coques, ut decem eius drachmæ in quatuor
heminis aquæ coquantur, at milium non conueniet febrici-
tantibus: veruntamen iis, quos turbata aluus exercet, est
maxime accommodatum: eiusque acetabulum in decem aquæ
acetabulis bis coques. atque etiam id ipsum in mortario cō-
tundes, & prædictam aquæ mensuram infundes, liquabisque,
ac percolabis, & in illa ipsa aqua ita coques, & anethi, fa-
lisque parum iniicies. Præterea vero quod ex milio perco-
latum est, & lentibus, & ptissanæ admiscebitur, ac in omni
sorbitione, præter eam, quæ ex lentibus conficitur, pro oleo
crudum cucumeris semen miscebis, quod ubi eliquaueris, &
ptissanæ, & cæteris decoctionibus indes, vel pineam nucem,
aut ponticas, aut thalias nuces: ac præsertim in iis, quibus
admiscere aliquid lactis loco volueris: ut in iis, quos tussis
vexat, maxime cōueniet, si amygdalas subtritas sorbitioni-
bus imponas. at iis, quos perturbata aluus infestat, pro oleo
subteres papauer album leuiter tostum cum vtriculo suo:
atque ex eo succum in decoctionem exprimes. id quod etiā
ad somnum conciliandum facit. Iam ad aluum quoque Eu-
boicæ nuces, quas Sardianas vocant, cum internis membra-
nis, quæ cū nucibus ipsis sunt, teres, & aquam papaueris ex-
primes. Similā vero coques, ut quartupla eius portio in de-
cem aquæ heminis imponatur, parūque olei, & anethi ad-
datur. prius vero lauanda similia est. alicæ quoque, si facere
sorbitionem ex ea velis, eadem est habenda ratio. Coques
etiam lac addendo, ut cum iam coctæ decoctiones fuerint,
calidum lac indas, nec diu simul coquere permittas. Alica
vero debet aqua prius macerari, tum quarta pars chenicis
capi, ut septem heminis aquæ, duæ hemine lactis accedant.
Coquenda super carbonibus leuiter, & agitanda, & vas ma-
nu tenendum, ne aduratur. Sed lac omni sorbitioni poteris
ad eundem modum adiungere. Placentula vero, quam itriū
quidem nominant, minus molestiæ asferet, si confringas, cō-
tundas, tenuemque facias, & cum amygdalis, vel cucumeris
semine coquas: sin secus, ut mos est, ex oleo, & anetho. ute-
tur hac re quispiā ad aluum, vel sola, vel lentibus admixta:

at febricitatibus nullum alimentū dari posset inutilius. Coquunt id rite illi quoque qui in gallinaceo iure, aut agnino coquunt: quandoquidem id faciunt in iure copiosiore, atque in ollis, nec quicquam tangunt, neque commouent, ut vel hac ratione maxime intabescant, & percoquantur. Panis aridus leuissimum decoctum facit: ac febricitatibus quidem est ad ignem tepidus reddendus, & ubi maceratus fuerit, in lauorē terendo redigendus, & eius decem drachmę in duabus aquę heminis coquendę, donec ad sorbitionis crassitudinem perueniant. sed cū hoc subterendę quoque sunt aut amygdalę, aut cucumeris semen, atque iis, qui febrem nō habent, confringes ad similę, aut slicę magnitudinem, & breui tempore macerabis, ac decem eius drachmis tres aquę semiheminas affundes, & aliquid eorum, quę dicta sunt contundes, & ad spissitudinē alicę rediges, & ex melle, vel ut agrotanti placebit, propinabis. Valebit etiam ad ventriculos, qui non concoquūt, quique flatibus torquentur, & qui nimium humecti sunt, idque vel per se, vel cum lentibus. Præterea ad aluum consistentem in maiore gallinacei iuris portione macerabis, aut decoques.

Quomodo ex amylo, & reliquis subsidentia fiant.

Cap. 8.

Ex omnibus leguminibus, quemadmodum ex amylo subsidentia conficiuntur, fiūt autem hoc modo. Similam quam purgatissimam capimus, leuiter maceratam lauamus, linteo ex copiosissima aqua percolamus: collā, ut maxime fieri potest, auferimus: in vase fictili subsidere permittimus, aquam deinde percolamus, aliāque eodē modo affundimus: tum ita faciendo vsque eo permutamus, dum id quod excolatur, purum sit. postremo vero subsidentia extrahimus, atque in vase fictili ad solem, donec perfecte sicca sint, exsiccamus.

De iis quę ex eruo fiunt.

Eodem modo in eruo faciendum est, præcipue autem album fresum, & cum feruendo acus abiicit, madefaciendum est, & conterendum ut lauum reddatur. quod cū copiosiore aqua eliquatū fuerit, abiicienda per diē aqua est persæpe, donec ea, quę effunditur, pura sit. atque ita siccabis, & repones. hoc vteris ad suppuratos: itęque ad mulierū purgationem,

g iiij

I I B E R

carne[m] augendam, & bonum colorem comparandum: id-
que ex vino mulso, vel polenta propinabis: ex quo satis erit
scetabulum & viro, & fœminæ bene valentibus.

De iis, quæ fiunt ex lentibus.

Fiunt etiam ex lentibus subsidientia, cum seruēdo acus ab-
iecerunt, madueruntque, ac contusæ, vt de eruo dictum est,
fuerunt: & aqua vsque abiecta, dum ea, quæ exit, pura sit. hæc
subsidientia siccata miscebis decoctionibus in iis, quos tur-
bata aluus vexat, & præsertim post milium, post panem sic-
cum, post ptissanā, & post alias cōplures sorbitiones, qui-
bus aliquis vsus esset. Iam decoctiones quæ ex leguminibus
fiunt, incommodiores febricitantibus sunt, quam prædictæ:
quippe quæ & minus alant, & flatus magis cieant. Vtoretur
etiā quispiā eisdē ex crudis leguminibus lomenta conficiens.

De lomento fabarum.

Lomentum fabarū si flatus expers conficere volueris, mul-
tam aquam affundes, atque elixabis: cūmque perfrixum, &
decoctum fuerit, totum effundes, & calidam aquam iterum
indes: satis autē erit, si quartuplæ chœnicis portioni lomen-
ti, quod iam effuderis, & confeceris, duas heminas aquæ, &
olei admisceas. eius vsus esse potest in grauedinibus & de-
stillationibus addita faui portiūcula. eo quoque vtetur quis
ad dysenterias, & tinesmos, si pinguius reddat, nec prius ex-
coquat, nec aquam abiiciat, ad quem vsū medulla quoque
ei addetur, itēque cera, & caseus, & præcipue frigus: & oleū
copiosius in iis, quos eiicere stercus volumus. Cum ptissana
quoque, & lentibus lomentum componetur ad dysenterias,
& tinesmos. Iam vero lomentum non excoctum elixabitur,
vt in quartupla chœnicis portione sex heminæ aquæ impo-
nantur. Pisorum vero lomentum minus flatum ciet, quam fa-
barum, & facilius conficitur: atque ideo imbecillis erit accō-
modatius. idque dari potest iis, qui defluxionibus, & tussi ve-
rantur. huius quoque quartupla pars chœnicis in senis aquæ
heminis incoquetur. At lomentū quod ex phaselis fit, omni-
bus dulcedine præstat: sed & difficulter coquitur, & cætera
habet prædictis similia: atque id quoq; in pari humore elixa-
tur, quod deniq; ex dolichis, & aracis fit, omniū pessimū est:
& ad nullam rem ægrotantibus utilis eorum est decoctio.

De

Legumina omnia, hordeum, & triticum coquenda sunt osculo ollæ crusta obturato. diutissime autem coquenda sunt, & igni quo magis lento fieri potest. tunc enim licet quantumvis coquantur, nunquam comburuntur. debemus ergo leguminibus iam valde decoctis ita vas manu continere, ut agitando non comburantur: & ad decoctiones, & ad obsonia oleo quod minime odorem habeat, & nullam omnino facultatem ori præ se ferat, uti huiusmodi est omphacinum. Pisces vero qui statum excitant, in patinis elixandi, & assandi sunt. si vero elixes, distribuenda conditura est, & satis olei indendum, & prius muria elixanda, deinde in eam feruentem piscis coniiciendus, si sic condias, piscis succi plenior fiet, & proprium succum in se continet. idē quoque in patinis assatus, & melior, & maxime tener, & plurimi alimenti reddetur. sed conditura cum oleo distribuenda est: & salabunde inspargendus, itēque tenuis farinæ quod satis fit.

EX Philotino, de milio condiendo. Cap. 10.

Milium crudum tritum, & leuigatū, & affusa aqua iterum contritum, & percolatum, & coctū, & molito simile factum, in collæ modum redditur, habetque adstrictionem, & ventrem sistit, & difficulter in ventriculo conficitur. sed si totum coquatur, ut faciunt, est multo ad conficiendum difficilius: & quandoque aluum molliorem facit, & non admodum in excrementis alteratur, & glutinosum est: succum vero qui dulcem adstrictionem habet, corpori distribuit.

Ex Antyllo, de alimentis, quæ continenter agrotantibus dantur, deque ratione eorum apparandorum. Sūntque hæc in tertio de auxiliis libro, de iis quæ in cibis adhibentur, capite secundo.

Cap. 11.

In morbis continuis eligendum alimentum est, quod facillime concoquatur, celerrime distribuatur, & non admodum nutriat, & facile perspiretur. nam quæ continentur in corpore, febres pariunt. atque has quidem virtutes panis aqua lotus in se omnes continet. Sed esto panis ipse ex tritico trimestri, & non admodum puro, siquidem valde purum,

valde etiam nutrit. conteratur vero diligenter, atque affetur.
 Ex simila vero confectus, neque ex huiusmodi tritico, neque
 ex aliis propter sui vehemētiam capiatur. Sitque potius he-
 sternus, & cum fermento: isque calida aqua maceretur, alia
 atque alia continenter effusa: nec totus panis, sed pars inte-
 rior. nam exterior eius pars quæ cutis vicem gerit, ad distri-
 butionem & ad concoctionem inepta est. macerandi vero
 terminus sit, vt non solum panis in tumorem efferatur, sed
 vt fermentum euanescat, & illius odorem non referat. alica
 quoque lota est generis eiusdē, cum succus expressus, & ipsa
 fatis lota sit, & elixa detur ex aqua, vel mulsā. Similis quo-
 que generis est ptissanæ succus ita coctus, vt in vna eius par-
 te quindecim aquæ partes indantur. cū enim coquēdo quin-
 ta pars remaneat, & percoletur, succus modica mulsā addita
 potui datur. Ipsam quoque mulsam in horum alimentorum
 genere posset quispiam constituere. Coquitur, vt ptissanam
 coqui diximus, cum mel in multas aquæ partes conicitur, &
 in quintam partem coquendo redigitur. Ex alica etiam sor-
 bitio conficitur ad hunc modum. alica lota, & aqua sæpe ab-
 iecta, iterum aqua pura vnius horæ spatio maceratur: deinde
 manibus in aqua confricatur, donec aqua colorem & spissi-
 tudinem lactis acquirat. deinde alica ita percolata, ipsa qui-
 dem extra remanet: quod vero lacteum ab ipsa est effectum,
 parū salis capit: & in iis quorum stomachus & intestina mor-
 si infestantur, parum anethi adiungitur: in iis vero, quibus
 stomachus peruertitur, & nausea vexatur, pulegij, & thymi:
 in iis, qui flatus pleni sunt, cumini. coquitur ad consistentiā,
 & datur antequam refrigerata sit, hoc alimenti genus si rite
 conficiatur, & dandi promptitudine, & concoctionis facili-
 tate, & celeritate reficiendi, cum alicā, & panē preferimus. *
 atque alimenta quidem quæ in morbis acutis conueniunt,
 hæc sunt, quæ exposuimus. Sed persæpe ordo variatur, vel
 quia hæc non suppetant, vel quia non rite affecti ad ea sint
 ægrotantes, aliis alimentis vti necessitas nos cogit: in quorū
 numero sunt itria, olera, & polenta, & oua. Itrium igitur est
 ex tritico, cū sit ipsum quoque panis recte assatus, debet au-
 tem tenue esse magnopere, siquidem crassum inæqualiter as-
 satur: debetque præcipue quam tenuissime conterī, vt sit po-
 lentæ persimile: atque in aqua elixari, & præsertim pluuia: si
 ea non suppetat, alia purissima: idque plurimum, vt coquen-
 do

do in vnum conducatur. modicum quoque salis insit: oleique sit expers: vel parum omnino olei imponatur: & prius quam iterum eo perspergatur, oleum cum aqua sit incoctum. alica vero cum iisdem condimentis coquitur. Omnium vero oleorum accommodatissima malua est, quæ ex garo, & oleo cocta comeditur: vel sorbitio, quæ ex ea fit hoc modo. folia maluæ nouella, absque fibris elixantur, deinde in mortario contunduntur, & iterum ex aqua, sale, & oleo elixantur. Secundum locum tenet cucurbita. Sed admodum nouellas cucurbitas debemus eligere, atque totas non abrasas coquere: ne elixatæ aqua impleantur. vbi vero elixatæ fuerint, tum abradantur: denturque præcipue in aqua & muria. nam hoc pacto ori non erunt ingratis: sin secus, ex garo dentur, & oleo. Oua in aqua sunt coquenda, atque continuo agitanda: siquidem ita commota, neque simul cohærent, neque densantur. sed præstat etiam ea in posca coquere, quoniam magis etiam liquida permanent.

FINIS QVARTI LIBRI.

ORIBASII MEDICI.

NALIVM COLLEC-
TORVM,
LIBER QVINTVS.

Ex Galeni libris, de aquis.

Cap. 1.



Qua optima omnis qualitatis non modo gustatui, sed etiam olfactui expers esse debet. atque eiusmodi quidem erit bibenti iucundissima, & plane pura. Si vero etiam hypochondria celeriter permeet, nulla est querenda præstantior. at quæ puræ, limpidae, potuique non insuaues sunt, sed tamen diutius in præcordiis morantur, ex quæ, aut ventrem feriunt, aut flatu implent, aut prægrauant, semipræuæ sunt existimandæ: cuius sane generis multæ sunt, de quibus mihi præcipue videtur Hippocrates, ut eas ab optimis aquis discernere;

L I B E R

mus, scripsisse, cum ait, aqua quæ cito calefit, & cito frige-
 fit, leuissima est. etenim neque in cœnosis, neque in graueo-
 lentibus, neque in iis, quæ gustatui medicamenti facultatem
 aliquam afferunt, utilis est huiusmodi dignotio, cum eæ vel
 omnibus perspicuo sint notæ: sed in quibus nihil quidem ta-
 le est, verum alia quedam prauitas ob corrupti aëris admisti-
 onem, aut aliud quoddam vitium ipsi aquæ innatū, ab igno-
 ta causa proueniens, aquis inest: siquidem in eiusmodi præ-
 dicta dignotio optimum iudicandi instrumentum est. nam
 quæ tales sunt, neque cito frigescunt, neque cito calefiunt. A-
 lia quoque huic similis dignotio ex oleribus, aut legumini-
 bus, aut carnibus, aut fructibus, aut denique radicibus, quæ
 aquis incoquantur, sumi potest. celerrime namque in opti-
 mis, traditisime vero in paruis res elixatur, ac nonnulli ex ve-
 teribus aquas ita prauas, indomitas, & crudas, æque ac legu-
 mina, quæ difficulter elixantur, appellauerūt. ergo tutissimū
 fuerit, vt experientia de huiusmodi aqua iudicium fiat, ac si
 quis est, qui ex notis potius vim eius prænosse aueat, is sciat,
 quarum fontes è petra scaturientes, ad Septentrionem fluūt
 solemque auersum habent, eas omnes difficulter coqui pos-
 se, tardiūque transitus esse iudicandum est: idque eis statim in-
 esse, vt tarde calefiāt, ac frigescāt: quarū vero fontes ad oriētē
 solem erumpunt, & per meatum aliquem, aut terram puram
 colantur, ac celerrime calefiunt, & frigescunt, eas esse optimas
 sperandum est. Pluuiæ vero ex Hippocratis sententia leui-
 simæ sunt: sol enim quod leuissimum in aqua, tenuissimū-
 que est, attollit, & sursum rapit. id quod non ex aliis aquis
 solum, sed etiam ex mari, & ipsis itidem humanis corporibus
 facit. idcirco fit, vt celerrime omnium computrescant, maxi-
 me enim corpora, quæ vnicam in se qualitatem habent, cum
 nulla aliunde causa subsit, quam ob rem difficulter, aut facile
 putrescant, ea difficilior, quam quæ multas qualitates habēt,
 computrescunt. sed animaduertendū est, ne quis putet aquā,
 quæ celerrime putrescit, esse pessimam. potest enim eadem
 esse præstantissima, cum aliæ omnes optimarum aquarum
 notæ, quas ante diximus, ei adsint. nam facilitas immutatio-
 nis in qualitate, potius bonitati aquæ, quam uitio attribuenda
 est. Aquam vero pluuiam bonitate præstare argumento
 est quod etiam à solis calore coquitur. nam & cætera quæ eli-
 xantur, dulciora se ipsis fiunt omnia. cumque cœpit putres-
 cere,

cere, omnino est inepta potui: siquidem qui aquam adhuc putrescentem bibunt, hos raucitates, tusses, ac vocis grauitates corripunt. Ex pluuiis autem aquis æstiuæ, quam horæam Hippocrates vocat, quæque ex tonitruo fit, præstantior est, quæ quæ nimbis est demissa. quæ vero ex glacie, & niue soluta sunt pessime sunt. in iis enim, quæ ex frigore concreverunt, tenuissima pars omnis excernitur. porro palustres, & fœtidæ, & in quibus absurdæ qualitates insunt, coctione alteratæ offerantur. Quin etiam in alium usum aquam prius calefacimus, & postea refrigeramus: tamen si neque gustatui, neque odoratui ullum vitium afferat: ac plane pura sit: cum eam in ventriculo morari diutius, & noxam aliquam inferre, experti fuerimus. nam caliditas totam aquam, quæ elixatur, fundens aptam ad secretionem facit: dum aqua refrigeratur, partes terrea innata grauitate descendentes in fundo vasis residebunt: aqua vero super eis fluitabit: qua sensim in aliud vas transfusa, citra noxam uti poterimus. Post decoctionem vero cum frigidissimam reddere aquam voluerimus, si nix nobis suppetat, aquam prius calefacimus, deinde niuem extrinsecus ei circumfundimus. si nix non adsit, è puteis, vel aquæ ductibus refrigeratione ei comparamus: eam itidem prius calefacientes, ut facilius alteretur. nam quicquid prius excalfactum est, id citius in se totum alterationem à rebus vicinis proficiscentem capit. Cum autem vas in puteum demittimus, aut aquæ ductibus subiicimus, tum vasculum operculo claudimus necessario, & ipsum ex omni parte diligenter obturamus, nec vasculum implemus, sed aliqua ex parte vacuum permittimus, ut aer, qui inter operculum & aquam interiacet, prius refrigeratus, eo tactu vicinam aquam refrigeret. Vbi vero nihil horum nobis suppeditatur, ut in Aegypto vsu venit, ibi vasculum suspendimus, & quo aerem suscipiat, sine operculo sinimus. Quoniam vero aqua neque incidendi, neque calefaciendi vim habet, ideo iure fit, ut aqua omnis tardi transitus sit, ægre concoquatur, & ægre subducatur, licet alioqui sit optima. nam & multum temporis manet in ventriculo, & fluctuationes plerumque parit: sique biliosus ventriculus sit, ipsa quoque simul corrumpitur. cumque à ventriculo ad ieiunum intestinum ægre perueniat, non facile distribuitur. quam ob rem neque ad ciendam vrinam, neque ad sputum educendum apta est: quin ne sitim quidem sedat, etiam si in ventriculo diutius-

L I B E R

sine moretur, cum nec in totū se profundum immergat, nec quod squalidum est, irroret. porro aquam nō alere, sed vehiculum tantum modoimenti esse, & Hippocrates, & cæteri præstantissimi medici dixerunt: ob eamque causam non potest vitalem facultatem roborare. & hoc fuit in causa, ut Hippocrates ab aquæ usu in ægrotantibus abstinens, ad mulsam, oxymel, & vinum se contulerit, atque his quidem rationibus nemo vnquam aqua vteretur. plerique tamen in aliis decepti ad aquam confugiunt, in qua nihil est, quod magnopere contra animi sententiam succedat, cū ipsa quoque non magna vi sit prædita, at oxymelitis, vini, & mulsæ vsus est vitiosus propter repentinas mutationes: & propter sinceram permixtionem, quæ à medicis plerunque fieri solet. Vinum enim quod tanquam manus quædam ad distributionē aquæ trahat, est omnino paucissimum aque miscendum, ut aquæ sinceritatem tollamus. eademque ratione oxymel aquosum laudo. cum minore quoque periculo aquosa mulsæ quis vti poterit. nam impermixta, nisi subducere aluum properet, maxime noxia est, & præsertim in amaræ bilis hominibus, quique magna habent viscera, quibus ipsa quoque aqua est noxia, cū in bilem cōuersa in hypochondriis diutius manet. ad hæc enim omnia mala, quæ in ea sunt, hoc accedit etiā, quod cum stercoreis sit expers, aluum non subducit. aquam vero in principiis accessionum potam lædere, perspicuum omnibus est. Ecquando igitur aqua potui vtiliter datur? nimirum cū ægrotus ex sola potione viuit, nec adhuc ptisanæ cremorem sumit. tunc enim in medio aliarum potionum aquam in tempore quispiam dederit, & præcipue cum ægrotus siti enectus sit: quandoquidē eo tempore inundationem quandam, hoc est humiditatis copiam ab ea induci, scriptum reliquit Hippocrates. quocirca inter mulsam & oxymel, parum aquæ ad humectanda ea quæ expuenda sunt accommodatum præbet. quin etiam vbi vinum magnopere noxium sit, tum etiam aquam exhibet. nocet enim vinum cum ægrotans vel delirat, vel capite vehementer dolet. Hanc autem propriam naturā humidā & frigidam habet aqua. aduentitia vero caliditate acquisita calefacit & humectat ipsa quidem ea, quibus admouetur: sed tamen ut virunque æque faciat, non est ei natura comparatum: verum humectat quidem summe, siue tepida, siue tepida, siue etiā calidior sit: calefacit vero nō summe, nisi

me, nisi quæ extreme ferueat. quod dicimus, in temperata natura prius exploremus. ergo si huic naturæ aquam temperatam calidam offeras, siue lauans, siue perfundens partem aliquam, profecto ipsam partem humidiores, & calidiores in ipso perfusionis tempore factam videbis: si postea quiescas, nec corpus frigida contrahas, & cōstipes, paulo post eandem partem se ipsa factam frigidiores cōperies, quod calor innatus immoderatus perspirauerit. non tamē quemadmodum frigidius postea, aquæ calidæ vsus, ita etiam siccior corpus destituit, & tamen hoc quoque debere fieri videtur, cum ob meatuum raritatem, & corporis mollitudinem, tū vero ob substantiæ fusionem. plus enim in huiusmodi affectionibus euacuetur necesse est: vapor autem est humor attenuatus, verū tamen non ita se res habet. humores enim, qui in vasis, aliisque vacuis spatiis continentur, omnes exhauriuntur: corpora vero vasorum, & vniuersum carnosum genus humidius se ipso redditur. atque hanc solam facultatem, vt videtur, aqua nunquam deponit. neque enim cum feruens comburit corpora, facit vt quæ ambusta sunt, sicca sint, vt quæ igni assata fuerunt. simili quoque modo cum summe frigida facta est, totoque die, aut etiam longiore tempore super aliquam partem perfunditur, eam non efficit sicciorē: quamuis rugosa, & admodū exilis videatur. verū hæc ideo eueniunt, quod qui in vasis, aliisque spatiis est humor, euacuatus est: partes vero genuinæ, atque solidæ nihil seipsis sicciores redduntur.

*De aqua frigida, & oxymelite agrotantibus potui
dando. Cap. 2.*

Quoniam ostendimus omnem corporis affectionem, quæ præter naturam est, à sui contrariis curari: planū est, febrem quoque à frigida extinctum iri omnino, cum ipsa sola fuerit sine vlla affectione, quæ à frigida ledatur, nā si febrī adiūcta sit alia affectio, quā frigida lædat, licet ea febris, quæ ex ipsa affectione orta est, confestim à frigida sit restincta, altera tamen deinde febris grauior accendetur aucta affectione, quam potio frigide oblæserat. Læduntur autem à frigida affectiones partium quæ inflammatione obsidentur, & in quibus incocti humores sunt: quorum indicium est vrinarum incoctio. si igitur concoctæ vrinæ sint, nullaque princeps pars inflammatione vexetur, satis erūt, vt ad frigidā potui

dandam impellamur. si vero æstiuo tempore vehementia febris quâdoq; vrgeat, laboransque iuuenis sit, & frigide potioni assuetus, si cum aspectu & consistentia vrinarum laudabile sublimamentum videas, tum, etiamsi pars aliqua inflâ-
 mationem patiatur, frigidam dando non errabis: si quidem debes antepone, vt febris vehemētiâ eo tempore sedes, pluribus diebus, quibus ad reliquias inflammationis tollēdas opus sit: quas quidem & magis scirrhasas, & solutu difficilio-
 res euadere necesse est. Si vero non admodum adurentes febres sint, & frigidam dederis particulis inflammatione laborantibus, magnopere tua te fallit opinio. febres enim, quæ vehementer flâmæ sunt, inflammationem & erysipelatis speciem referentem quodam modo subesse nobis ostendunt: & ideo frigida quoque eandem iuuat: vt in exterioribus etiam partibus perspicitur. ergo in iis, in quibus incipiūt in iecore, vêticulo, & alijs huiusmodi particulis inflâ-
 mationes, diligentius cōsiderandū est. nam ij omnes magnopere læduntur, etiā si in tēpore sumperint, si potio fuerit paulo largior. Etenim cū principia inflâ-
 mationū, quæ sine ictu, & vulnere sunt, vel ex particularū imbecillitate, vel ex ignea caliditate quadā oriātur: eas quarū origo est imbecillitas, frigida semper lædet: quæ vero ex ignea quadā caliditate existunt, moderata frigida potio iuuabit. periculum enim est, ne in largiore portione propināda pars ad contrariū excessum traducatur. præterea vero huiusmodi potio tales affectiones magis iuuabit, si dum bene valerent, ea vtebantur. ergo vehementes morbi, qui in ventriculo, in iecore, in collo, & toto capite sunt, prius considerari debent. artus enim fortasse non magnopere læduntur: & tamen ipsi quoque offenduntur in quibusdam affectionibus, quas deinceps exponam. Sed horum fore tantam noxā quantam partes vehementer affectæ contrahent, ne ignarus quidem affirmaret. Si igitur affectio erysipelatis, aut herpetis speciem referens in hypocōdrio sit, aut inflammatio erysipelatis naturam referens, aut aliqua alia affectio summe calida ex intemperie sine succis exorta, frigida potio iuuabit: sicut eadem mirum in modū lædit cum abscessus, œdema, scirrhus, vlcus, & frigida affectiones partes obsederint. Ac quoniam de artubus me dicturum promisi, illud sciendum est inflammationes neruosarum partium, quæ in eis sunt, à quibus alioqui periculum cōuulsionis imminet, frigida potione lædi
 vel

vel maxime, si vero in carnosis artuum partibus inflammatio
gignatur, & bibere frigidam homo poterit, & si parti inflam-
matae foris admoueat, noxam quidem inuehet, sed neque
notabilem, neque manifestam: ac praecipue si frigidae potio-
ni fuerit assuetus. Ergo cum febris sit, non adiuncta vlla alia
affectione, quam frigida possit ledere, tantum frigidae dandū
est, quantum vno haustu aegrotus possit haurire. Oxy-mel vel
aestiuo tempore frigidum datur, ne laborantis sitim exacuat.
quam ob rem aestate frigidum oxy-mel dare audemus etiam
ante morbi concoctionem, cum aquam frigidam in eiusmodi
affectione ad satietatem daturi non essemus. tunc enim in-
flammationem desaret, si febris ex inflammatione orta esset:
ac succos incoctos seruaret, si illi morbi causam attulissent.
Sed tunc parum oxy-mellis damus, vt quod in ventriculo pri-
us inte-pescat, quam ad costam vsque frigiditas eius distribu-
atur. quod si quid exiguum fuerit etiam distributum, id ab ip-
so oxy-melite, in quo vis incidendi inest, corrigetur.

*Ex Ruffi commentariis, de aquis. est in secundo libro de dia-
ta, vel de potionibus.*

Cap. 3.

Resides aquae (ita enim aquas puteorum voco) quia non
fatigantur, ideo non admodum sunt tenues. & cum intro in-
gressae fuerint, minus madefaciunt cibos, atque dissoluunt, mi-
nusque concoquuntur, & praecraesitudine, & quia frigidae sunt,
non bene per vrinam excernuntur. aptiores autem potui
redduntur crebro hauriendo, ac si effluerent, & puteorum ex-
purgatione, quae vero fluunt, multo tenuiores sunt & praestā-
tiores ad madefaciendum, & concoquendum, & ad vrinam
reddendam, quae est stagnis sunt, pessimae sunt omnes. nam &
odorem absurdum, veluti putrescentes habent, & aestate cali-
dae, atque hyeme frigidae sunt, quod ego vitij aquarum ma-
ximum esse signum statuo. ideo fit, vt aestate ventres pertur-
bent, & tarde in vesicam transeant: ac sepe etiam tormina, &
leuitates intestinorum hominibus pariunt, ex quibus in aqua
intercutem cadunt: hyeme vero, quae frigidae sunt, ventres
non admodum perturbant illae quidem, sed tamen & ruptio-
nes, & lateris dolores, & tussis afferunt: & ad lienem etiam
repunt, & postremo in aquam intercutem desinunt. ex liene
autem etiam pedes vlcantur, eaque vlcera non celeriter cu-
rantur. Sole paludes Aegyptiae inter omnes, quas quidem ego
h

nouerim, salubres sunt: quia hyeme aqua non putrescit, siquidem non supercalfit: autumno vero Nilus paludes explens, veterem aquam proiicit, & aliam nouam inuehit. De aquis pluuiis ita statuo, aquæ pluuiæ leues sunt, tenues, puræ, & gustanti dulces: siquæ in eis aliquid elixes, celerrime elixabitur. siquæ eas calfacias, celerrime calefient. & vino perexiguo tēperantur. quocirca bonæ sunt & ad concoctionem, & ad vinarum excretionem, itemquæ accommodatę iecori, leni, renibus, pulmōni, neruisquæ. cum enim vis non admodum refrigerans in eis sit, idcirco benigniores hisce partibus sunt. Vernæ igitur atque hybernæ maxime opportunæ sunt, atque optime, quas ego laudo vel maxime. autumnales vero atque æstiuę fuerint quidem aliis meliores, sed non omnes omnibus, nam viribus quidem antecellunt eas, quæ sunt in terra: verum quantum superentur à vernis, atque hybernis, ne dici quidem potest. nā æstate atque autūno terra sicciores vapores edit, aërquæ multas terræ sordes habet, quæ pluuiā expurgantur. Idcirco fit, vt tales aquę sicciores, & nitrosiores sint, & ad abstergendum, ac per intestina descēdendum accommodatæ: sed neque renibus, neq; pulmōni, neque arteriæ idoneæ. quinetiā plus vini has ferre necesse est, vt nitrosa facultas vincatur. Iam vero aquæ nō parua differentia ex ventis aquilonalibus, & austrinis accedit. nam flantibus aquilonalibus, dulcior pluit quidem, sed frigidior: austrinis vero spirantibus, minus dulcis, sed calidior. Ad summam vero tempora pluuiā, dulciores, non nimboſa & squalida magis nitrosam aquam efficiunt. quęcunque autem ex niue fluunt, & glacie, duræ omnes sunt, & frigiditate excellūt: sed gustati dulces, at aqua dura, & frigida neque ad concoquendum, neque ad meiendum accommodata est. itemquæ noxia est neruis, pectori, & costis, nam & conuulsiones, & tetanos inducit, & ruptiones facit in pectore, vt nōnulli subcruenta expuant, & suppurentur. Fontanæ aquæ ad orientem vergētes ceteris præstāt humiditate, tenuitate, odoris suauitate, & moderate refrigerādo, moderatequæ calfaciendo. quæ ad septentrionem, dulces sunt illæ quidem, sed immoderate refrigerant. quæ ad occidentem, violentæ sunt & refrigeratione, & duritie: quam ob rem raucitates, laterum dolores, & conuulsiones pariunt. quæ ad meridiem spectant, magis salsæ sunt, & calidiores, & ad meiendum non idoneæ: sed ad descēdendum

dum per intestina, præstantiores. quanquam autem aquas quæ ad meridiem fluunt, non laudo, Nilum tamen ita commendo, ut aquæ bonitate paucis fluminibus comparari posse videatur. nam & aluum subducit, & purgationes mulieribus ciet, si in puerperio bibatur. sed pleræq; ex aquis ad meridiem, residues sunt, quibus duplex est noxa coniuncta, altera è regione contracta, altera quod non effluant. Pro terræ autem natura sic de aquis decernendum est. Terra enim alia plana est, alia collibus, alia montibus cōtinetur. plana est ad aquarum effluxiones deterior: multiq; in ea putei fossiles, & residues fontes. colles vero & montes potiores sunt, nam & puriores & tenuiores, & odoratiores, & dulcedine suauiores aquas emittunt. cæterum ex planis alia salsuginem & nitrum æstate & autumnno producit, alia nihil: sed eam terram, dulcē vocant. in hac igitur præstâtior, & potui aptior, in illa vero salsa, & nitrosa aqua est. Ex montibus præterea alij terrei, alij petrosi sunt. terrei aquas ferunt præstantiores & mollitie, & quod minus frigidæ sint. saxei aquas habent deteriores tum duritie, tum frigore: puriores tamen quam alia sunt, minimeq; habent subsidientia. Maxima autem maximeq; notabilis differētia aquis inest ex metallis, & ex herbis eis innatis, ac metalla quidem cum ad aliā habitationem, tum vero ad aquarum potum sunt noxia. herbæ vero quandoque mirū in modū lēdunt quandoque etiam valde aquam corrigunt: tale autem est sium, nepita, & adiantū. etenim hæ plurimæ riuus innascuntur: quæ quidem bonam aquam vitiānt, malam vero alioqui iuuant, cum ab eis quoddam quasi medicamentū aquæ impertiatur. suntq; huiusmodi aquæ ad meiendū potiores, ergo diligenter etiā atque etiā considerandum est, ne vllum vitiū aut à terra, aut aliūde aquis accedat: cum non satis sit è fontibus hic quidem præstâtiores, potuique aptiores, illic vero salsam & nitrosam aquam scaturire, nisi etiam quæ per riuos deriuantur, sint eiusdem generis. hæcenus quæ maximi momenti sunt, oratione cōplexi sumus: nunc alia quoque aquarū bonitatis signa recenseantur. aquæ omnes quæ hyeme calidæ, æstate frigidæ sunt, optimæ esse quodammodo videntur. quæ vero frigiditatem & caliditatem habent anni temporibus parem, pessimæ. æstate enim calor extimam terræ partem occupat: hyeme vero mergitur in profundū, atque ideo mihi videtur fontes, qui à profundis

h ij

L I B E R

diffimis partibus fluūt, & spelūcas, cauas omnes hyberno tēpore calidissimas aquas cōtinere, æstate frigidissimas. idcirco aquæ omnes quæ in terræ sunt extremitate, ad temporum varietatem, quoquo modo tempora frigida fiunt aut calida, commutantur.

*De fonte, qui in Lycia ad Chimeram montem est,
quem à Pegaso fuisse apertum ferunt.*

Mirabile est, aquam hyeme euanescere, æstate autem apparere: & tamen contra deberet contingere, sed huius etiam rei causa calor est, qui profundas aquas secum vehit: siquidem hæ quoque calorem sentiunt. omnes enim profundos fontes, quique parum admodum ab externis imbribus suscipiūt, hyeme, & per vehementissima frigora minimos, æstate maximos comperies: vt stagnū itidem, quod in Delo est, id ipsum propter eandem causam patitur: atque etiam putei, qui Pythopoli visuntur. Est autem vna hæc bonarum, prauarumque aquarum dignotio, si hyeme calidæ sint, æstate vero frigidæ: altera vero est, si nihil ori gustantis notabile afferant: & ita non multo vino ad eas temperandas opus erit: atque omni vino conuenient, est vero etiam pura ea, quæ præstantior est neque alioqui colore infecto: nec fecem habeat, nec subsidentia. nam & quæ pura est, eadem etiam pondere est levis. nam quæ pondere levis est, semper terræ impermixta est: quæ vero grauis, terræ ratione plus grauat. sed & hæc non minus considerata sunt, vt si cito calefiat, ac refrigeretur, quoniam hæc cæteris præstat. & quomodo ad coctiones, quomodo ad secessionem affecta sit. nam quæ citius coquuntur, præstantiores sunt: quæque secedunt, meliores, si per vesicam secedāt: at aquæ per intestina secessio, deterior est. quarū vero nostræ artis non est effecta perdiscere, ea debemus ab incolis perquirere. nullo autem pacto facile est, ea quæ præter rationem fiunt, intelligere.

Historiæ rerum admirabilium, quæ in aquis contingunt.

Ac ne longe abeam, aqua in leontinis est, ex qua si quis bibat, moritur. alia talis in Phæneo Arcadiæ est, quam aquam Stygis vocant. alia quoque talis in Thracia visitur. itemque stagnum apud Sauromatas, quod ne aues quidem trāsuolare queunt: aliudque apud Medos, in quo nigrum ichorem dicunt super

supernatare: quo vbi vsus sit quispiā, si igni se admoueat, accenditur. eo medicamento Creontis filiā à Medea fuisse perditam ferunt. Est etiam Susis aqua, quę epota dentes excutit. Sybares fluuius homines facit infecundos. Aqua vero quę apud Aethiopes est, quam rubram nominant, furorem inducit. at quę in Aegypto est, capita bibentium pilis nudat. Harum rerum nihil sciri sane potest, quam ob rem plerique qui illis nulla consideratione adhibita vsi fuerūt, mortui sint, alij vero aliquod aliud incommodum sint perpeSSI.

Hec verba ex tractatione de aqua descripta adiuncta sunt, quę eiusdem Rufi sunt.

Sunt etiam alię quamplures aquarum facultates: quę non communi natura affectę sunt, nam quę in Lycestis est, bibētes ebrios facit. in aqua vero quę in Clitorio Arcadię est, si quis se lauerit, vini odorem ferre amplius non potest. Aqua Arethusę in Chalcide mulieribus prodest: alię vero animantes ex eius potu dolores pedum contrahunt. Cydnus dolores pedum sedare creditur, quamuis frigiditate excellat. Qui habitat, vbi praua aqua est, dare operam debet, vt eam potui magis idoneā reddat. erit ergo optimū, vt in vas fictilibus elixetur, & vbi nocte refrigerata fuerit, atque iterum calfacta potui detur. In exercitu vero si ex praua aqua reddere bonā opus sit, foueas ex ordine ex locis altissimis ad decliues fodere, per quę eas aquam ducere oportet: terra dulci ac pingui, quę faciendis fictilibus idonea sit, in foueas coniecta: siquidem ita semper aquę prauitas in foueis remanebit.

Dioclis, de aqua corrigenda.

Cap. 4.

Aquam maxime imbecillam facies, si tertiam partem decoquas, & alba ouorum similiter incoquas. in hac ipsa inicienda est argillę siccę gleba, donec maceretur. mensura vero est, vt semisextarius amphorę indatur. vbi decoxeris, bibatur. odorem etiam ab aqua remouebis, si calfactam manu ad ventum serias, & sub dio in vase immenso teneas, & in multa vasa paulatim diffundas.

Athenai, aquę purgatio.

Cap. 5.

Aqua defecatur partim stillicidiis, quę ita ita dicuntur, vt
h ij

L I B E R

fit Alexádriz, partim colis, iisq̃ue interdū simplicibus, interdū vero duplicibus, vel triplicibus, vt aqua purissima per eadē excipiat̃. Fiunt etiā iuxta mare, & iuxta stagna foueæ, illic cum aquam potabilem à mari secernere volumus, hic vero, vt cum stagnū fuerit turbatū, hirudinésque, aut alia quædem vitia contineat, aqua purissima, & maxime innoxia per terram transiliens in fossis colligatur. Vbi vero multa aquæ copia sit haurienda, vt in exercitu fieri solet, latera foueæ lapidibus, lignisq̃ue ambiunt, & cum pauimentum simili modo instrauerint, puras seruare aquas nituntur. aquæ autem quæ purgantur, leuiiores, ac puriores fiunt: & ob eā ipsam causam etiam frigidiores, multæ vero, licet fuerint percolatæ, tamen facultates à sordidis corporibus contractas adhuc seruant.

De vino. Galeni.

Cap. 6.

Vinum aquosum homines vocant, quod colore & consistētia aquæ simile est. nam & pellucidum, & splensens, & purum est. & consistentia tenue videtur: & gustanti nullam affert qualitatem insignem: siq̃ue ipsum aqua diluas, non multum aquæ feret: quam ob rem pauciferum veteres appellarunt. huiusmodi autem vinum nō plane adstriktionis expers est: sed languidam omnino adstriktionem habet: quoniam si ipsum aquæ compararis, ex ipsa aquæ comparatione exiguam adstriktionem quandam factam fuisse senties. ac facultate quoque est aquæ persimile. nam neque imbecillum caput tentat, neque neruos debilitat: cum ne perspicue quidem calefaciat: quinetiam nullam aliam qualitatem insignem, vt neque austeritatem, neque acerbiteratem, neque dulcedinem, neque acrimoniam gustui afferat. Accommodatum hoc vinum est ad educēdum è pulmone, cum vires roboret, succosq̃ue humectet, & mediocriter incidat. hoc quoque cum minore periculo, quam cætera vina omnia, febricitantibus datur. quod vt aquæ, et vini prauitates effugiat, ei soli inter reliqua cōtingat. Iam vero præter quam quod caput non lædit, etiā sæpe prodest: sedando paruos dolores, quos humores vêtre cōtenti procrearunt. Inuenies etiā nonnullos, quibus ex aquæ potu dolor capitis oriatur. cum presertim aqua vitiosa fuerit: vt ipsa corrupta natiuū ventriculi robur exoluat: quo imbecillo ichores biliōsi ex corpore

ia

in ipsis caua solent confluere, quemadmodum etiam ieiunantibus vsu venit: à quorum vitiiis, & noxis prædictum vinum hominem liberat, ac statim quidem ratione contemperationis, paulo post vero robur ventriculo addens, qui res noxias à se deorsum propellit. Homini vero temperaturæ valde calidæ, vtilior est aquæ potus, quam vini. si vero quandoque vinum dare oporteat, dandum quod tenue sit, & mediocriter austerum. Mouent etiam vrinâ vina aquosa, & tenuia. & minimum alimenti corporibus præbent: eaque sola bono esse possunt, si nouella bibantur: quale est id quod Gaurianum vocant: & quædam eorum, quæ in Sabinis nascuntur. & vbique fere gentium facile est huiusmodi vina reperire. quamprimum vero apud nos ad bibendum apta sunt Tibenum, & Arsyinum, & post hæc, Tiracazenum. Dulce vinum exquisite tenue, & splendidum nunquam reperies: sed magis & minus ab his remota, & eorum neutrum habentia, vinum omne dulce & crassum, consistentiæ ratione calefacit: eiusque singulæ facultates, quas epotum ostendit, ex hisce duabus qualitatibus consequuntur. color enim sui ratione, ad iuuandum, aut lædendum nullam vim habet. quanto igitur tale vinum consistentia crassius fuerit, tanto etiam tardius transibit: vt non solum aperturum non sit partes aliquas obstructas, sed etiam easdè obstructurum. quam obrem iecori male affecto vinum huiusmodi maxime nocet: ac præsertim vbi inflammatione, aut scirrho obsideatur, minus vero nocet, si viscus à crassis humoribus sit obstructum, aut si quid propter imbecillitatem patiatur, quemadmodum in affectionibus, quæ proprie hepaticæ nominantur, vsu venit. Post iecoris noxam, lienem vina dulcia lædunt. at pulmonem non item, cum in eius alis crassus humor sit impactus. præterea vero dulce vinum in morbis acutis, vbi facta concoctio sit, ad sputum eliciendū, vt in peripneumoniæ, & pleuritide, valet, vbi particula non amplius inflammatione vexantur. quantum autè dulcia absunt à vehemēti caliditate, eo minus etiā caput grauāt, & mentē lædunt. melius vero per aluū secedunt, & viscerū tumores augēt: nec sunt accommodata iis, qui amarā bilim acceruat, quoniā omnes succi dulces, materiæ sunt flauæ bili gignendæ. hæcque vina, non solū quia multus calor huiusmodi succos amaros facit, non sunt febricantibus idonea, sed etiam

L I B E R

quia crassa sunt, neque per vrinas cito excernuntur, neque secum cætera deducunt, neque biliosos humores simul euacuant. idque vnum in se bonum continent, quod aluum emolliunt, quocirca ea præ reliquis bibunt, quo bono si frustrentur, omnino lædunt: nam ad cætera mala hoc accedit etiam, vt sitim inducant: qua re ostendunt, se facile in bilem converti. sed flatus etiam gignunt: verum inferiori intestino non sunt noxia, quamuis flatus qui ab eis excitatur, tardi sit transitus, & in hypochondriis moretur, donec plene concoquantur, & perfecte attenuentur. si vero semel concoquantur, naturam habebunt, qua celerius commebunt, & partium tenuiorum fient. dulce autem simul & austerum vinum, quale est in Cilicia Abates, atque ex contrariis qualitatibus constans, prauum est: cum neque distribuatur, neque deorsum secedat, sed diutius in ventre superiore maneat, ipsumque flatu impleat, at quod sine dulcedine nigrum est, atque perspicue acerbum, aut austerum, id satiat, & tarde permeat. & vtrunque excretionem, tam eam quæ per aluum, quam eam, quæ per vesicam fit, cohibet: & in hypochondriis diutissime commoratur: facile quoque accessit, & ad vomitum impellit: ac solum ventris defluxionibus est accommodatum. sed ita affectis non est bibendum ad satietatem. Austerum vero vna & album non est ipsum quoque ciendæ vrinæ aptum: verum si crassum sit, in hypochondriis moram trahit: si crassum non sit, neque tandiu permanet in ventre, quando nigrum: neque ita per vrinam expellitur, sicut vina, quæ alba sunt, & mediocriter austera. Fuluum vero austerum conuenit ipsum quoque ventris defluxionibus. estque duplex fuluum, sicut etiam nigrum: alterum dulce, austerum alterum. sed fuluum caput & mentem magis tentat, quam nigrum, quoniam est etiam eo calidius: at flauum summe calidum est: sicut post ipsum tale est fuluum: post hæc, rubrum: tum dulce. album vero minus quam alia omnia calefacit. nullum autem album vinum dulce est: sed quedam austera sunt, & crassa, quedam aquosa, & tenuia. Ex flauis autem & fuluis, alia dulcia mediocriter sunt, vt Hyppodamantinum, & Phaustianum: alia neutiquam dulcia sunt. Rubra sunt his crassiora, quæ colore proxime accedunt ad nigra. quæ omnia ad proportionem crassitudinis nutriunt. quam ob rem iis, quibus recreatione opus est, dulcia vina sunt concedenda: ac præfer-

tim si nihil eis vitij fuerit in iecore, liene, ac renibus. Quibus vero crassus humor in venis colligitur, vinum tenuis consistentiæ ex usu est. verum si frigidi humores in venis collecti fuerint, acria & antiqua conueniunt: si frigidi non sint, ea apta erunt, quibus neutrum horum insit. ad succi vero bonitatem præstantius est odoratum: cæterum caput ferit. Vinis austeris vtimur, vt citatam aluum sistamus, alioqui non vsuri, quod neque deducendo alimento, neque sanguini gignundo, neque succi bonitati, neque ciundis vrinis, neque sudoribus eliciendis, neque vero subducendæ aluo conferant. ergo corporibus quæ biliosiora sunt, nec falernū, nec tmolite fuluum, & dulce, neque aruissimum, neque Lesbium, odorum, & fuluum, antedictis simile, accommodatum est, siquidem hæc calidiora sunt omnia. quisque huiusmodi biberit, facile caput dolebit, & in febrem incidet: & nervi quoque patientur. tale igitur vinum nec biliosis naturis, nec perustis, neque in æstu multo, aut inedia, aut mœrore, aut anni tempore, aut regione, & calida constitutione concedendum est. Idem vero è diuerso probatur in iis, quibus ex-calfactione opus est, pituitosis, ac frigidis temperaturis, crudiorumque humorum copiam colligentibus, vitam in ocio ducentibus, regione frigida, atque hyeme, & cœli statu frigido, atque humido. Vinis autem omnibus, quæ quidem nec crassa valde, nec dulcia nimium sunt, quale est thereum, & scybelite, commune est, vt temporis progressu flauum colorem acquirant: & aliquid splendentis, instar ignis, habeant. nam nigra quoque, cuiusmodi est apud nos perperinum, si inueterarint, in rubram aut fuluam prius qualitatem, deinde vero in flauā abeunt. ita etiam album, quale est bithynum aminæum. hocque ita inueteratum Romani Cæcubum vocant. iamque huiusmodi vinum amarum est, & ob eam causam minime potui accommodatum. ergo ita veterum potus fugiendus, sicut etiam nimis nouellorum. ac maxime quidem à vinis suapte natura crassis, cum nouella sint, abstinendum est: siquidem tantum abest, vt quicquam ad ciborum concoctionem conducant, vt ipsa etiam vix concoquantur. præterea vero nec aluum subeunt, nec facile distribuuntur, nec vrinam cient, nec gignendo sanguini, nec nutritioni conferunt: manent vero diutius in ventre suspensa, sicut aqua: sique paululum quid eorum quispiam

L I B E R

bibat, facile acescit. porro vetustissima vina tantum ab albo vna & austero, & nouo, & crasso differunt, vt illa vehementissime calefaciant, hæc vero sic refrigerent, vt sensus ipse percipiat. Quemadmodum vero mustum flatus plenum, & concoctu difficile, & crassi succi sit, omnes norunt: quod etiam id solum boni habet, vt aluum subducatur: quod si quandoque non faciat, perniciosissimum est. Ceterum celerrime omnium alba, & aquosa inueterascunt, hoc est, celeriter in vetustorum qualitatem commutantur. est autem ea qualitas, acrimonia primum, qua plane calefaciunt, postea vero amaritudo. ad quam aquosa vina nouennio, aut quandoque decennio peruenisse vidimus, nisi primis tribus aut quatuor annis acescere properauerint. at potentibus, & austeris, & albis sed crassis, quandoque contingit, vt etiam post decennium cum rite non asseruarentur, acescerent. Sed contingit etiam, vt plurimo tempore inueterascant. talia sunt in Italia tiburtinum, signinum, marsum, & furentinũ: quod ferme ante vigesimum annum factum, potui aptum diu perdurat, nec facile amarescit: & cum falerno præstantia, virtutemque contendit. his contrarias affectiones patiuntur vina aquosa, quale est, sabinum, gaurianum, arsynium, titacazenu, tibenum, & cætera generis eiusdem: quæ omnia contrarias qualitates, acidam inquam, & si perdurarint, amaram, facile suscipiunt, locus tamen, in quo reponuntur, vt ad alterutram mutantur qualitatem, multum facit. optimus igitur in principio locus frigidus est: post calidus: quoniam tepidus acida vina facile reddit, quanquam vina, quæ duobus aut tribus annis frigido loco reposita, bona manserunt, in cellam calidam satis postea transferenda sunt: nec vnquam tepida, & temperata indigent. quædam tamen vsque adeo debilia & aquosa reperiuntur, vt frigus ne à principio quidem ferant. Vasa autem vinaria, quæ reclusa sinis, in causa sunt, vt vinum facile acescat: veluti contra, cum operculum habent, clausa quæ sunt, id minus eis contingit. & multo etiam minus id vasa plena patiuntur. nam quæ aliquantulum vacua sunt, quoniam aërem inclusum habent, per illum intermedium celerius ab extrinsecus ambiente immutantur. plena vero ita, vt operculum vinum attingat, per illud quidem imbecilliter admodum, & obscure consueque vitiuntur, quousque tegumenti densitas peruenit. ex quo fit, vt

vt picata, & gypsata dolia diutius vina sincera conseruare comperias, sed quæ solo corio, sicut ea etiam quæ cuneis, obstruuntur, minus durant. Cæterum in Asia apud nos tria vina fulua sunt præstantissima, tmolite, Lesbium, & à veteribus laudatissimum aruissium, quod in Chio conficitur: quod omnes ad optima medicamenta, & præsertim ad antidota conficienda adhibuerunt.

Rusi, de vino, est libro xij de diæta, vel potioni-
bus. Cap. 7.

Vinum sic ad sanitatem, vt rem vllam aliam commendo: sed oportet bibentem scientia præditum esse, si velit non grauissimas pœnas dare. etenim vinum potest calorem accendere, corpus viribus implere, alimentum omnino concoquere: neque vllum vinum tam prauum est, quod hæc non faciat: sed hic quoque, vt in cæteris, & deterius, & melius comperies. quin etiã vinum poterit animum quodammodo afficere: quippe cum vinum sit mœroris medicamentum, atque Helena quidem mihi videtur hoc crateri infudisse, vt mœrorem sedaret, ei ergo qui moderate bibit, & voluptatem, & humanitatem, & bonam valetudinem affert: is vero, qui immoderate potat, aliquid quidem iucunditatis in nimio potu, sed incommodi quoque aliquid capit. nam qui fieri potest, quin incommodo afficiatur is, qui nimium bibit, cum animus in tanto vino immersus sit, vt eo calidissimo frigeat? Sunt autem tibi hæc argumenta. nam ebrij corpus impotens priquam fit, tum somno grauatur: & calore quoque alimentum concoquitur, atque hæc quidem ebrij patiuntur, vt statim frigescant: postea vero, ne ego quidem explicare queam, quot malis circunueniantur. nam & verisimile est, eos attonitos reddi, & articulos vitiari, & partem aliquam debilitari corporis, & iecori, spleni, capitique proprios cuiusque morbos afferri. Ac mihi quidem talia cogitanti, videri solet admirabile, qui fiat, vt cum in vino tot bona, totque mala plane appareant, liceatque ex vino optima quæque sumere, homines tamen pessima potius eligant.

Galenî, de sapa. Cap. 8.

Sapa ex musto fiat, id autem nõ ex austeris vuis, sed quam dulcissimis paretur. neque ex primo fluente, sed postremo.

L I B E R

tale mustum si fuerit, vsque eo coquendum est, dum ad dimidium eius, quod initio iniectum fuit, redigatur. sin minus tale fuerit, ad tertias erit coquendum.

*Rufi, de sapa. Sumptum ex secundo libro de
victus ratione. Cap. 9.*

Sapa vim habet ipsa quidem calfaciendi, sed non tamen æque, ac vinum. qua de re quidam etiam eam frigefacere putauerunt. mihi vero non probatur, dulce ita refrigerare, vt existimant: quoniam necesse est, dulce, suaue esse: quod vero suaue est, effusionem aut dissolutionem facit: hæc vero calor efficit. Verum neque per vrinam expellitur, neque ad distributionem facile mouetur: sed in ventre moram trahit, eumque propter crassitiem implet: & sua crassitudine sanguinem quoque crassum facit. præterea crassum iecur, crassumque lienem efficit.

Galen, de aceto.

Cap. 10.

Acetum ex mixta substantia, frigida, & calida, quarum vtraque tenuium partium est, constat. veruntamen frigida facultas, quæ tenuium est partium, in eo excellit, quocirca vim habet repellendi.

*Rufi, de aceto. ex secundo libro de dieta.
Cap. 11.*

Aceti vsus in ratione victus est plurimus. nam ex eo præstantissimum condimentum obsoniis accedit: multaque sine aceto vesea non sunt. sique aliquis eo non vtatur, maxime lædetur: non secus, quam si etiam sine sale cibus vesceretur is, cui sal cõueniret. Est autem cordi accommodatissimum, & cibo aptissimum, & concoctiones adiuuat, & pituitæ inimicum. Laudatissimum vero acetum ex potentissimis vinis fit. talia sunt, quæ acerbiora sunt.

*Rufi, de potione quadam, qua ex vinaceis fit
ex eodem libro. Cap. 12.*

Ex vinaceis huiusmodi potio conficitur. expresso ex vuis vino, aquam vinaceis immiscent, easque calcant: deinde exprimunt, tum decoquunt, donec tertia totius pars restet. fit potus dulcis quidem, vt sapa, sed neque crassus, neque potus. sique

si que aliquis diligenter decoquat, & suavis, & ad urinam aptus, & flatus expers reddetur: vt etiam ægrotanti confidenter dare queas, si quando opus sit. si nō decoquas, acetum inde prauum fiet. Dioscorides vero singulis eius vini decocti congiis sextarios duos salis miscet: & post hyemem in dolia condi iubet: suadetque vt post annum eo homines vtantur: quoniam cito exolefcit.

Ex Dioscoride, de vino impotenti. - Cap. 13.

Est etiam aliud, quod ἀδύναμον vocant. par autem musti & aquæ mensura miscenda est, tum lento igni leniter decoquenda, donec aqua tota consumatur, cūque refrixerit, id in picatum dolium fundemus.

Galenī, de melicrato. Cap. 14.

Melicratum nō admodum vtile est iis, qui amaram bilem coaceruant: quoniam in eis in bilem vertitur, nisi prius vel intestina, vel vesicam pertranseat. quod si faciat, non modo non lædit, verum etiā maxime iuuat. nam secum biliosa excrementa deducit. ergo huiusmodi naturis dilutius melicratum dare conuenit: vt nec sitim afferat, nec bilim gignat. Vt autem iis, in quibus amara bilis redūdat, ita iis, quibus in tumorem elata sunt viscera, siue ex scirrho, siue inflammatione, siue ordemate, est incommodum. nam in eis prauum fit, quia cito pertransire viscera ipsa non possit, & facile in bilem cōuertatur, præsertimque in inflammationibus propter caloris magnitudinem. Mel igitur quoniam rerum omnium est dulcissimum, cum in calidam corporis temperaturam incidit, statim mutatur, & in biliosum humorem in ventre cito conuertitur, priusquam in venas distribuatur. si vero absque huiusmodi mutatione distribui properet, omnino in venis commutatur. cætera vero, ad proportionem dulcitudinis, suscipiūt eadem ratione citius, aut serius mutationem: vt in calidiore natura citius, in frigidiore tardius immutentur. Cum igitur mel in acutis morbis in bilim conuertatur, & ob eam causam eis sit noxium, aqua autem tarde penetret, & in hypochondriis diutius moretur sitque idcirco fugienda: id quod ex vtrisque mistum est, idoneum redditur, cum ea temperatura constat, vt, aquæ plurimæ tantum mellis misceatur, vt viam aquæ paret, & eam ad distributionē du-

L I B E R

cat. his enim ita temperatis vrinę facilius transibunt, & spū-
tum ocius educetur. si vero multum mellis imponas, sitim fa-
cit, & sputum viscosum reddit, ad hęc igitur melicratum di-
lutius est magis accommodatum: meracius vero ad alui de-
iectionem. ac melicratum quidem crudū, magis aluum sub-
ducit: probe autem coctum, valentius alet. Fit autem ad hunc
modum. primum multum aquę melli indimus: deinde tan-
tis per coquimus, quoad spumare desinat. spumā autem, cum
primum emergat, tollere ab eo oportet. atque ita quidem
paratum acrimoniam deponet.

De apomelite, Galeni.

Cap. 15.

Apomel aquę frigidę mixtum, vt refrigeret, ac sitim ex-
tinguat, æstiuo tempore bibunt, estque vtile iis, qui crudos
humores coaceruant, ac præsertim vbi coacuit. id quod ei
sæpe contingit, alias magis, alias minus: vt pote quod ex a-
qua non pluuiā, sicut hydromalum, sed qualibet, confectum
sit, ad hunc vero modum conficitur. ē fauis non vitiosis ex-
pressum mel in lebetem, in quo sit aqua fontana, quę pura,
& suavis sit, coniciamus: deinde coquendum, donec faui om-
nem eorum humorem deposuisse plane videantur. tum repo-
nimus, atque adseruamus, eoque in potu vtimur, quem vete-
res ἀγλυκὺ, hoc est, acidum dulce nominauerunt.

De hydromelo, quo veteres utebantur. Galeni.

Cap. 16.

Cum aqua pluuiā cessat putrescere, tum dulcedinem ac-
quirat. hac mel prius decoctum, & à quo spuma sit abiecta,
permiscemus, eoque vtimur. hæcque potio consueto nomine
hydromalum nominatur. Dioscorides vero id hydromeli
vocat: atque confici, vt vni mellis parti duę partes aquę plu-
uię veteris misceatur, & ad solem teneantur: traditque non-
nullos aquam fontanam admiscere, & ad tertias decoquere,
& reponere.

*Philagrij, de apomelite. ex libro de potionibus sua-
nibus.*

Cap. 17.

Tempus apomelitis potioni accommodatum est, cum si-
gnum coctionis apparer: ac in febribus quidem, ex vrinis:
in pulmone vero, si quippiā sit, quod hac potione indigeat,
quod

quod ea quæ expuuntur, nobis indicent, nō importune quoque ante concoctionem dabitur: siquidem vim quādam habet incidendi, & abstergendi, potestque ipsum concoquere: sed melius etiam concoquit quam melicratum. præstantius ergo tempus apomelitis est posterius, utpote quod vinosi quidpiam acquisuerit. euenit enim ut febres magis accendantur ex vini potione, nisi iam morbus declinat. quo sane tempore causæ extenuatæ sunt, & meatus aperti fuerunt. ac tum quidem vinum potui datum permeat, nec febres auget, & ad cutim calorem trahit: & humores temperans, statim acrimoniam extrahit: paulo post vero sudores quosdam, & vrinas commouet. ex quo fit, ut tempus declinationis sit vini, & aliorum potuum vinosorum potioni accommodatum. Sed quoniam apomeli est vino itidem, in calore debilius, habetque vim incidendi, & abstergendi, idque vim habet præparandi solutionem febrium, quæ ex putrescentibus humoribus accenduntur: idcirco fit, ut etiam ante declinationem apomeli potui detur, at melicratum compositum statim præbetur. oxymeli vero dari poterit statim cōfectum: sed si melius sit diutinum, illud dato, tunc enim facultates inter se diligenter sunt distinctæ. Rhodomeli vero, & omphacomeli, & diacodyon inueterascere valde postulant. pars enim in eis crassa & feculenta est, pars vero contra utilis, & potabilis: & tempore opus est, ut secernatur: idque præsertim in apomelite: quod prius quam vinosi quidpiam, quod tractu temporis acquisuerit, & gustanti, & odoranti afferat, nihil à melicrato differre videtur. Coctū enim, & sex mensium spatium asseruatum, nō solum ea, quæ dixi, præstat, sed vim etiam roborandi, more vini, demonstrat: nec caput tentat, ergo diu ante factum apomeli, bibendum est. Hæc vero est eius confectio. Fauos mellis plenos, albi coloris, pellucidūque mel continentes capimus, manibūque humorem exprimimus: aquam fontanā optimā indimus. si mel crassius sit, vni mellis parti quatuor aquæ partes iniicimus: si mediocre, tres & dimidiū alterius: si tenuius sit & liquidius, tres, partē vero terreā faui, reliquias inquā, ex quibus mel expressum fuit, manibus multum confringimus, & in tenues partes dissectas in aqua exprimimus: deinde humorē in vnum adductum, & totū mel dissolutum in ollam nouā, in qua prius ad terreum odorem tollendum aqua pedetentim ferbuerit, conicimus, & igni

L I B E R

ex carbonibus, aut tenuiore flamma ex lignis fumum non reddentibus, decoquimus, ablata iugiter spuma, & quicquid veluti sex feruendo reiicitur. Post primam vero coctionem, auferimus quicquid terreum est, ac nimirum etiam spumam, ollam ab igni tollimus: deinde plane frigere sinimus. vbi iam frigida sit, quod supra fluitat, abiicimus. totum postea sic frigidum igni excalfacimus, & vbi ferbuerit, tollimus. & vbi frigescat, iterum quodcunque superfluitat, excipimus. vbi vero tertio ferbuerit, frigidum sit, & excrementum abiectum, apomeli coactum in vas fistile coniiicimus. sunt autem ad hoc accommodata, quæ philadelphia, & caryena, & omphacera nominantur. id reponimus in cella vinaria, vbi vinum reconditum moueri non solet. Est vero perspicuum, hoc esse diutius decoquendum. nam si ollam auferas, vbi feruere incepit, aut parum ferbuerit, imperfectam coctionem facies: & excrementum terreum in ea relinquetur, quod efficere poterit, vt potus putrescat, & corrumpatur. Est autem duplex apomelitis compositio. alterum fit, cum soli faui, posteaquam mel expressum fuerit, in aqua decoquuntur: quod rustici plerunque faciunt: quod & vinosum, & crassum, & nigrius est: alterum vero, quale ego descripsi: in quo mellis potius: quam fauorum vsus cernitur: quandoquidem faui in aqua tum lauantur, non coquuntur: cum tamen mel totum cum aqua decoquatur. hacque compositione nos semper vtimur, aque solius potione vt plurimum deuitata: siquidem ea ægrotis febricitantibus neque pauca, neque exigua mala solet inuhere.

De confectione, quæ δία κωδύων dicitur, Galeni.

Cap. 18.

Vni aque sextario capita papaueris decem iniiciuntur: præmaceratur vnum diem & noctem, si humidiora, & molliora fuerint. si vero duriora & sicciora sint, etiam diutius, quam vnum diem. melius vero est, nondum indurata accipere. estque perspicuum, valde mollia abiicienda esse. nam sicciora exiguum succum habent, humidiora vero multum quidem, sed inconcoctum adhuc, & aquosum, & debile. quam ob rem ex humidis, & palustribus locis accepta fugienda sunt. numerum vero, quem dixi indi oportere, iuxta aquæ proportionem, de iis, quorum est mediocris magnitudo, intelligere oportet.

oportet. quædam nanque sunt moderatis maiora, quædam
 minora, quædam vero media, ut plerunque esse solent. ex his
 prædictum numerum ad sextarium coniice. Coquendi ter-
 minus esto, non ut tertia, aut quarta, aut aliqua alia talis pars
 aquæ restet, verum cum primum tota flaccida facta fuerint:
 quippe cum eorum succum velimus exprimere, id quod satis
 vsu veniet, eis flaccidis effectis. huic succo mellis dimidiam
 mensuram adiiciendam censeo: & igni fumi experti coquen-
 dum simul ad atticis mellis consistentiam. coquenda præte-
 rea sunt in aqua pluuiæ, aut fontanæ. Vfus eius est in iis, qui-
 bus somno opus est: quibus etiam sæpe medicamenta ex o-
 pio confecta damus. quibus tenuis defluxio à capite ad aspe-
 ram arteriam destillat, quæ propter tussis insequentes dor-
 mire non sinit. in hisce consueui etiam medicamenti confec-
 tionem ex sapa parare. satis autem ad eiusmodi coquitur,
 cum capita papaueris ad aquæ medietatem fuerint decocta.
 quinetiam ex passo, & sapa cretica melius, quam ex melle co-
 quitur: vbi fluxus valde tenuis sit. mel enim attenuandi vim
 habet. & tunc fugiendū est, quoniam tennes defluxus auget.
 huic etiā medicamento, dum coquitur, radix glycyriæ ad-
 denda est, quo simul coquatur. vbi hæc non suppetat, succus
 imponendus, qui ex Creta aduehitur. si vero copia defluxus
 à capite delati in pulmone consistat, cōfectio ex melle est ac-
 commodatior. ergo ad id quod vrget, animū aduertens, vbi
 in somnū vertitur æger, aut quod ex melle constat, aut quod
 sine melle apparatū est, medicamentū dabis. aliquādo etiam
 vtrunque permiscebis, ad id quod vrget, in miscendo inten-
 tus, ut scias cuiusnam maior imponenda sit copia. datur ve-
 ro cōmoderata mensura, duorum satis magnorum cochlea-
 rium magnitudo. hanc mensurā augebis aut minues, habita-
 ratione magnitudinis corporis, cui das, itémque ætatis, an-
 nique, temporis, & regionis. In his enim omnibus, frigidio-
 ribus minimum dabis, calidioribus amplius. habita vero et-
 tiam ratione quantitatis, & qualitatis ipsius defluxionis, re-
 plus, minúsque daturum plane patet: siquidem hoc in omni-
 bus auxiliis est commune.

*De eadem confectione ex capitibus papauerum. Philagrii, ex
 libro de potionibus suauibus. Cap. 19.*

Ego non solum iis, qui se quieti tradidissent, somnóque

L I B E R

indigerent, cōfectionem ex capitibus papaueris exhibui, aut ad tusses arcendas dedi, in quibus & dandi tempus, & mensuram rite Galenus definiuit: sed etiam iis, qui vehemēti febris iactarentur, quique calore, quem ferre non possent, affligerentur, & os ventriculi ardore opprimeretur: itēque in erysipelate, & alio calido quouis affectu. in quibus etiā valde quantitatem auximus, vt quinque & sex cochlearia daremus. idque non semel, sed & bis, & ter: idque sapius in die. nec solum in statu morborum, quos febris affert, sed etiam ante statum, & vero etiam ante concoctionem euidentem: in quibus vigilia, calorque acer aut magnus quidam hominem oppugnabat. Idcirco recte facere mihi videtur, qui ante statum morborum, qui ex febre existunt, bibere hanc cōfectionem volunt, vt oxymel admisceant: quādoquidem oxymel eius materiæ crassitudinem attenuat: seruātque cōfectio suam vim refrigerandi, & celeritati concoctionis nullum affert incommodum. nec solum vero in febribus ex humorum crassorum corruptela accensis, oxymel admiscere, & præsertim cum ante statum damus, sed etiā in visceribus obstructis, vt iecore, pulmone, liene, & eiusmodi febribus adurentibus oportet. tūc autē quinque aut sex perfecta cochlearia damus, nec frigiditatem nimia, quemadmodū in iis, quos tussis absque febre vexat, pertimescimus. Calorem enim, qui præter naturā est, corrigimus, cui etiam conuenit quantitas medicamenti, vt ad naturalē calorem redigatur: cū minime videlicet vehementibus potionibus accenditur. sed non solū febris, verū etiam accessio debent cōuenire: vt vterq; vigor, & priuatę accessionis, & morbi ipsius, in vnum incidat. Vehementes autem potiones voco eas, quæ magnopere augentur, cum morbum crisi dissolutū iri speramus. nam ante morbi vigorē, cū nobis persuademus, crisin nihil mouere posse, nos refrigerationis causa potione vtimur: eiūsq; moderatam mensuram damus. sed eandem etiam dare poterit quispiam in statu, vel solam, vel cum oxymelite: & cum omphacomete, modicum tamen admiscens. & alioqui etiam cum rhodomele, & vino aliquo eorum, quæ permeant: ac præsertim si cōfectio ex aqua facta sit: cum aqua suapte natura tardi sit transitus. Est autem paulo melius ad capita papauerum decoquenda, vinum quod magis tenue ac perlucidum sit, quam aquam, assumere. ita enim melius penetrat, & roborandi

di quoque vim habet. quinetiam in cute densiore hoc vinum admixtum melius adiuuat: quemadmodum etiam omphacomeli aptius est in corporibus rarioribus, aut ore ventriculi imbecilliore, & magis etiā si cibi fastidio teneatur. iis præterea, qui dulcia bibunt, aut aliquē in ventre habent medicamentoſum humorem fluentem, aut bilioſum, iis qui ita affecti ſint, rhodomeli admiſcebis. atque hæc quidem in febribus ſatis diſtincta ſint nobis. cæterarū vero affectionum deinceps eſt facienda commemoratio. Hic igitur potus non ſolum pulmoni ſuppurato, & deſluxione oppreſſo, & tuſſiēti vtilis eſt, ſed cæteris itidem viſceribus. quā ob rem damus non modo hepaticis, & ſpleneticis, ſed etiā quibus renes, & veſica vitium contraxerunt: ſi modo calida ſit affectio. ergo vrinæ ſtillicidia, quæ ex lotij acrimonia ſint exorta, præcipue vero in balneo, aut ante balneū, copioſe datus efficaciffime comprimit. inſtituendāque iis eſt victus ratio craſſior, & ſucci melioris. Ad renum autem vitia, & cum iliis, atque lumbi calidiores ſunt, hic potus valde facit. itēque accommodatus eſt iis, quibus diabete, & cholericæ affectiones periculū minatur. in quibus vtriſque ſi nihil vetet, frigida temperatus, ſæpe eſt vtiliſſimus. etenim extremū cholicorum affectuum remediū frigidus potus eſt. ſed totus venter prius roborari debet melino, & maſtichino, & vix acerbæ ſucco, & aliqua portiuncula aluminis ſciſſilis, & cæteris generis eiufdem: totāque egroti cutis diutius confricanda eſt manibus inunctis, aut etiā linteis mollibus: tum cucurbitulæ doſo, ſcapulis, & thoraci affigendę: poſtremo hunc potū calido omphacomelite temperatū dabimus. ſi vero his peractis inanitio valde perduret, ſitque aliqua ſyncopes, & conuulſionis ſuſpicio, atq; timor, ad frigida potionem neceſſe eſt confugere. thoracē vero euacuabis, ſi hoc quoque opus eſſe propter vigilias, aut calorem immoderatū videbis. ſi vero concoquendus morbus ſit, butyro, & terebinthina, & iride, vna cum eis vti poteris. ſi inueterarit, mel quoque & ſimilia danda erunt, & cum ſomno ſe tradiderit, potum ipſum dabis. ſi vero humores contentos ſecare, & abſtergere oporteat, tum hæc ipſa, tū vero etiā pulegij comam, itēque hyſſopi, & adianti, & panacis ex aqua decoques: atque etiam oxymel ſolum, vel cū herbarum decoctione propinabis. id quod facies eo tempore, quod ante dixi, vna cum medicamento, quod

L I B E R

ex papauerum capitibus conficitur: & si opus fuerit, etiam de die, aut alio quoque aliquo nocturno tempore, cum febris ardens aliqua, aut vigilæ vergeant.

Philagrii, de confectioe ex malis cydoniis, & quæ ex cornu & aqua fit, ex eodem libro excepta. Cap. 20.

Confectio ex malis cydoniis ad hunc modum paratur, auferitur cortex, & medulla: & coquuntur ex optima aqua fontana, donec tertia pars aquæ consumatur: reliquæ vero duæ partes vasis fictilibus recte infunduntur, & prædictis locis accommodatis reponuntur. Fit hoc vinosum & austerum, & potum cœliacis prodest: & os ventriculi imbecillum atque hepar corroborat, cum seipsis humidiora quandoque sunt facta, quandoque autem optimum mel admixtum perfectam iam coctione inditur: idque non solum voluptatis causa, sed etiam ut compositio conseruetur. humor enim, si in eo mel sit, non facile putrescit, est ergo perspicuum, id convenire iis morbis, in quibus abstergendum vna, & adstringendum sit: quales sunt partium internarum ulceratarum: ut oris ventriculi, atque stomachi. Huic similis quidam potus ex aliis quibusdam fit, & præsertim ex iis, quæ corna dicuntur: qui & eodem modo conficitur, & parem ei, qui ex cydoniis fit, usum habet.

De omphacomelite. Philagrii, ex eodem libro. Cap. 21.

Acrestæ racemos prope initiū maturationis capere oportet, cum acidam qualitatem consistentem adhuc seruant, neque adstrictionis sunt expertes: deinde loco temperato reponere tribus, aut quatuor diebus: ac præcipue si aer ambiens sit humidior, postquā vero repositi fuerint, exprimendi sunt, succusque in vitreum vas excipiendus: tribusque succi partibus vna mellis optimi despumati adijcienda. multis vero diebus id insolabis, usque dū acrestæ humor seruefactus consistat: id quod longo tēpore fieri solet: deinde in sublimiore parte domus seruato, ne putrescat, ita ego medicamentū hoc facere, & ad prædictas affectiones uti consueui. itēque in iis, quorū intestina diuturnis & tenuibus defluxionibus infestantur sic, ut continū excretiones ex quadā intemperie calida fiant, id etiā dare soleo iis, quibus os ventriculi propter calidā simul, atque humidā affectionem nō appetit: cū prius
per

per alia quædam absterfero ea quæ ad ipsum ventriculi os humores quosdam vitiosos mittunt, & ne appetitus excite-
tur, prohibent. do etiam non præmissa absterfione iis, qui-
bus succus non fuit epotus. probe enim inappetentias om-
phacomeli potū sedat: ac præcipue si meracius potui detur.
confert etiam iis, qui propter corporis raritatem ex tenuita-
te humorū fluentium, animo linquntur, & præsertim in fe-
bribus: quorum repentina purgatio, sine perspicua excretio-
ne facta, morbi naturam valde producit. in quo genere affe-
ctionis tota curationis vis in vino quod permeet, & alicuius
adstrictionis particeps sit, collocata est. si tale nō adsit, pote-
rimus vino tenuis substantiæ, & flauī coloris hunc potū mi-
scere, & ita ex pane propinare. atque æstate quidē aqua frigi-
da temperatū, si nulla in partibus principē locum tenentibus
inflāmatio sit: hyeme vero, calida necessario. Cūque hæc
syncope vehemens accidit, semper calida tēperare oportet.
est etiam, cū acutissima distributione in acutissimis syncopis
indigemus. atque iis quidem, qui ita exoleuntur, accommo-
datū est, quod & cito distribuitur, & quod ad continendum
valet. talēq; erit merito, quod calidā, & adstringentem in se
vim habeat. nam vi caloris penetrat, adstrictionis autem vi
permanet. his ergo rationibus omphacomeli est accommoda-
tum. nam mel in se habet, vt penetret: itēque acris qualita-
tis adstrictio vero, quæ suapte natura tarde permeat, est perma-
nens. sed erit præstantius, si vinū assumpserit, vt acidū in co-
facultatem, qua succi attenuantur, obtundamus. ideoque vi-
num fuluū & subdulce, & non admodū tenue, est ad miscen-
dum accommodatius. ergo ad calidas intemperies, & mor-
bos, vtilē comperies vtrunque potū, & qui ex capitibus pa-
paueris, & qui ex acresta, & melle sit, & post hos, eum, qui ex
rosis, & melle conficitur: quod etiam omphacomeli superat.
& ob eā ipsam causam his, qui propter mordaces & calidos
humores, atque etiā febris acutissima exuruntur, vtilissimum
est: in quibus videlicet non est molesta ventris solutio. nam
in eiusmodi illud est præstantius. februm enim affectionem
simul concoqui par est, vt ita vtrunque eorum postea detur.

De rhodomelite. Philagrii, ex eodem libro.

Cap. 22.

Mel rosaceum tres succi rosarum excolati partes, vi ā. n.
i. iij

L I B E R

que mellis capit. coquitur ad solem eodem modo, quo omphacomeli. leuiter autem adstringit, & refrigerat, & nonnihil etiā absterget, & nescio quid acrimoniæ nanciscitur. ideoque ori confert, quod calida inflammatione, & quod ob talis fluxionis defluxum laboret. leuiter enim id quod delabatur, cōprimit: & quod feruet, moderate refrigerat: potestque acrimoniā retundere nō secus, quam potus ex capitibus papaueris facit. ita etiam facit in humoribus, qui in profundo sint siti. nam vi abstregendi eluit mordaces humores, & refrigerium affert iis, qui calore, & morfu vexantur: & adstrictione naturales facultates corroborat. Præterea vero aqua mixtum, cum aliis, tum vero etiam febricitantibus damus, cū vigor accessionis, & morbi ipsius iam constiterit. iis quoque, in quibus non est humorum redundantia, dari potest absque omnimoda euacuatione: itēque iis, in quibus accensi sunt humores, aut noxia euomuerunt, aut excrementa infesta per inferiora expulsa sunt, sed in iis qui exuruntur, eius potio cōtinua erit, vt aliquis medicamentofus humor ad os ventriculi ex partibus adiacentibus intercidat. ac sæpenumero etiam in febribus vna tantum potio copiosior, in tempore cōgruo data, integram morbi solutionem potuit asserre, prouocato sudore, aut citata aluo, aut vomitu moto, quæ ex cæteris quoque potionibus in vigore datis consequi consueuerunt.

De selinato, Philagrii, ex eodem.

Cap. 23.

Apij decoctum, & flatum inconcoctum & crudum facit: & copiam humorum per vrinas ducit. idque dari conuenit iis, qui febri iactantur: & præsertim si acuta febris sit: cum non confertis crisi- bus earum solutio perficitur, sed concoctione ea, quæ adiuuans nominatur. sed præstat radices modice decoquere, ne ita vehemens sit. & antequam humores febrim accendentes discernantur, non erit potui dandum.

De oxymelite, Galeni

Cap. 24.

Cum melicrati facultas cætera omnia habeat, quæ ad acutos morbos opus sunt: in vno tamen duntaxat eis est contraria, quod supercalfacta in bilem conuertatur. hanc eius mutationem aceti permixtio cohibens, præstantissimum medicamentum efficit. tantūque aceti melicrato addendū est quantum satis sit, vt facultas in bilem conuertendi corrigatur. id enim

enim sitim non afferet, sputaque non omnino crassa & glutinosa, facile educet. has vero ambas eius actiones, sequitur etiā oris & faucium humectatio, & qua ratione hæc efficit, eadem quoque iecori, & lieni summe est accommodatum, cum viscera absque molestia expurget. In pulmonis vero, thoracis que affectionibus eius vsus est plurimus, maximamque affert utilitatē propter commodatam aquæ, aceti, ac mellis mixtionem. tale enim oxymeli spiritum crassum, & flatuosum in hypochondrio secat: & flatus rumpens, viasque omnes expurgans, ad vrinas serosa, & biliosa excrementa deducit. Oxymeli igitur mediocriter temperatum, noxas omnes, quæ ex mellicrato, vino, & aqua oriuntur, effugiens, solum nocet interdū quod intestinum radit: idq; facit iis, qui intestinum imbecillius habent natura, & quod ad patiendum sit idoneum. Cum igitur mel facultate calidum sit, & in bilim cito in calidis corporibus, vertatur, idcirco edulium est pituitosioribus naturis & senioribus, ac morbis frigidis accommodatum. at oxymeli omni ætati, & naturæ ad tuendam valetudinem utilissimū est, cum omnes angustos meatus aperiat, sic vt crassus, aut glutinosus humor nusquam contineatur. quam etiam ob rē medicamenta, quæ tueri valetudinem à medicis dicuntur, attenuante facultate sunt prædita. ac tibi quoque & ratione & experientia perpendēti ea, quæ ad victum attenuantem faciunt, oxymeli accommodatissimum videbitur. nam neque mali succi est, neque stomacho insensum, neque vllam aliam absurdā facultatem habet. Si vero scilliticum acetum fuerit, ita non modo eorum, quæ ad victus rationem, sed omnium medicamentorum accommodatissimum ad incidendum est. conuenitque hoc vti, itēque vino, & aceto eos, qui summe incidere & attenuare morbum, qui in corpore sit, quod crassum, glutinosum, & pituitosum excrementum contineat. atque infinitos prope vidi, qui ex aceti scillitici, atque etiam vini vsu ad vitæ finem vsque sani vixerunt. oxymeli vero hoc modo conficiendum est. Melli optimo super carbonibus spumam aufer: in ipsumque tantum aceti conijce, quantum gustanti nec acidum nimis, nec dulce videatur, ac denuo semper carbones coque, quoad plane in vnum coierint amborum facultates, nec appareat gustanti acetū adhuc crudū. hinc ab igni auferes. cumq; vti voles, aquā misceris, ita tēperās, vt vinum. ergo melius erit ex sumētis gustu, quam nostro, iudicium de

modo facere, id esse sumentis naturæ aptissimum oxymeli ex
istimantes, quod utique est iucundissimum: proindeque utile:
aduersissimūque esse, quod est iniucundissimū. Eius tamen pri
mam mitionem, ut quamplurimis conveniat, talem esse oport
et. vni aceti parti, mellis, à quo abiecta spuma sit, duplum
miscendum est. Cum aqua vero statim ita in initio facies. mel
li quadruplum optimæ aquæ admiscebis. deinde coques me
diocriter, quoad spumare desinat. ac malum quidem mel mul
tum spumæ egerit, quam ob rem est etiam coquendum diu
tius: optimum vero, ut brevissimo tempore coquitur, sic mi
nimum spumæ emittit: unde nec pari ei coctione opus est.
plurima igitur coctio quartā partē eius, quod initio inditū est
amittit. Cōficitur etiam oxymeli, tribus statim ab initio mix
tis, ut sit aceti pars vna, mellis duæ, & aquæ quatuor. hæcque
ad tertiam, aut quartam partem coquuntur: spuma interim
detracta. sique valentius facere volueris, tantundem aceti &
mellis iniicies.

*Aceti scillitici, & vinorum confectio, ex Diosco
ride. Cap. 25.*

Acetum scillinum fit hoc modo. Scillæ purgatæ & candi
dæ minam concidimus, & in boni aceti sextarios sex conii
cimus, & vase diligenter operto sex menses ita sinimus. tum
exceptam Scillam exprimimus, atque abiicimus: defecatum
vero acetum in vase funditur, ac reponitur. Datur quotidie
ieiunis sorbendum, inter initia modicum, paulatim ad augen
do usque ad cyathum. nonnulli tamen duos cyathos, aut plu
res etiam dederunt. Scilliten autem vinum sic facies. Scil
læ purgatæ & dissectæ minas tres in multi boni metretam
Italicam demittito. operculo obducito, ac semestri spatio sic
dimittito. post id tempus excolatum vinum recondito. vetu
state fit præstātius. eius tamen usus in febribus, & cum inter
næ partes ulceratæ sunt, fugiendus est. Quod vero meliten
appellant, datur in longis febribus. nam & aluum mollit, &
vrinas cit: prodest articulorum doloribus, & iis qui infirmo
capite sunt. Ita vero condies, ut ad quinque austeri multi cō
gios mellis congiū, & salis cyathum addas. in amplo vase
conficiendum est, quo magis ad efferuescendum locus detur:
sālque prædictus paulatim inspergendus, donec ferueat: cū
que feruere cessauerit, in aliud dolium diffundetur.

Mu's

Mulsi confectio.

Mulsum præstat id, quod ex vetere, austeroq; vino, & melle probato conficitur. minus enim inflat. mulsum vero plerumque fit, ut duabus vini metretis vna mellis adiiciatur. Quidam vero, ut celerius præberi possit, mel cum vino decoquunt: sicque in vasa diffundunt. alij, utilitatis gratia, musti sextariis sex vnum mellis addunt: & ubi deferbuit, in dolia diffundunt. dulce autem permanet.

Vini ex cotoneis malis confectio.

Cydoniten vinum quod meliten aliqui vocant, ita condies. mala seminibus purgato, & raporum modo concidito: tum in musti metretam malorum minas xij demissas triginta diebus finito. vinum postea defecatum recondito. Quin etiam malomel, quod cydonomel itidem nominant, hoc modo fit. mala seminibus purgata in eam copiam mellis coniiciuntur, ut eo demersa obruantur. mitescit hoc post annum mulso simile. Vtrunque vero adstringendi vim habet, stomacho prodest: dysentericis, hepaticis, renum vitiis, & urinæ difficultati accommodatum.

Hydromali confectio.

Fit hydromalum, ut malorum cotoneorum succi sextariis quatuor, mellis octo, & aquæ duodecim sextarii misceantur. sub canicula insolato. eandem, quam prædicta, vim habet.

Alia eiusdem confectio.

Mala cydonia optima xxij seminibus purgata calamo in tenues partes dissecato, eaque in mellis præstantissimi sextarios octo coniicito. post octo menses aquæ pluviæ veteris sextarios duodecim addito: & in æstu caniculæ insolato: à pluvia, & rore custodito.

Vinum ex punicis confectum.

Ex punicis conficies hoc modo. Sumito matura punica sine nucleis, ab acinis eorum succum exprimito, & ad tertia decoctum reponito. hoc contra internas fluxiones, & fluidas febres efficax est: stomacho prodest, atque alium adstringit.

L I B E R

De rosaceo vino.

Rhoditen hoc modo condies. Rosarum siccarum, & tufarum minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito, & operculum obducito. post tres menses defecatum in vas transfundito, ac reponito. Vtile est iis, qui febrim non habent. & ad humiditas aluos, & ad tormina intestinorum facit.

Rosacei confectio.

Conficitur præterea ex rosarum succo, & melle commixtis quod rhodomel vocatur.

De vino ex myrti bacis.

Vinum myrtiten sic facito. myrti quam maturissimas baccas nigras sumito, & in sole siccatas tundito. earumque tufarum modio tres aquæ heminas, & vini austeri tantundem miscebis: sicque exprimes, & repones. hoc vehementer adstringit, & stomacho accommodatum est. fluxionibus ventris & stomachi prodest. & ad internas ulcerationes, & ad fluxum muliebrem valet. & capillos etiam denigrat.

Omphaciti confectio.

Omphaciten sic faciunt. Vva nondum penitus matura, sed adhuc acerba, in cratibus disposita, arescit ad solē diebus tribus aut quatuor, donec racemi rugas contrahant: tum vinum expressum cadis insolatur. idque adstringendi vim habet & stomacho idoneum est. Creditur quoque in pestilentibus constitutionibus vtiliter bibi. sed huiusmodi vinum non nisi post multos annos bibi potest.

Picatum vinum quomodo fiat.

Vinum picatum ex liquida pice, & musto conficitur. pix vero prius lauanda est marina, aut muria, vsquedum exalbescat, & marina aqua pura defluat. postea vero lauanda iterum est aqua dulci. & octo musti congiis vna picis uncia adiicitur. & ita permittitur. vbi deforbuerint, & constiterint, in vasa diffunduntur. Calefacit picatum vinum, concoctiones adiuuat, abstergit, repurgat, vtileque est pectoris, venteris, iecoris, lienis, & muliebrium locorum doloribus: itaque diutinis defluxionibus, & exulcerationibus, quæ in profundo sint, si febris ablit.

abfit. Iam vero ad tuffes, tardas concoctiones, inflationes, & fufpiria facit,

De abfinthite vino.

Vinum abfinthitem fic condire oportet. Pontici abfinthij pondo libram cum multo quadraginta octo Italicarum amphorarum sextarij decoque ufque ad tertias. tum fuperinfunde multo sextarios fex, abfinthiique pondo femiffem: omniaque diligenter mixta in vafa diffunde, & repone. Est autem ftomacho idoneum, vrinas ciēt, hepaticis, regio morbo, & renum vitiis auxiliatur. tarde concoquētibz vtile eft, itēque cibum auerfantibus, & iis, quibus iam longo tempore præcordia tenduntur. efficac etiam eft contra inflationes, rotundos alui lumbricos, & menftruas purgationes fuppreffas.

Elleboriten quomodo facias.

Facies autem elleboriten hoc modo. Ellebori nigri vncias duodecim, aphronitri vncias quatuor, multo heminas duodecim diebus quindecim macerato: & percolatis poft fex menfes vtitor, id etiam partum enecat, datur cyathus.

E scammonia vt fiat.

Scammoniten facies fic. Scammonie radicis per mēfem effoffe vncias quindecim in linteolo ligatas in multo congiū vnum conice: & diebus triginta finito. aluum purgat: bilem, ac pituitam trahit.

Ex thymo quomodo condiatur.

Thymi contufi & cribrati triobolos centum linteo colligatos in multo amphoram demittito. facit hoc ad ægras concoctiones, cibi faftidia, ructus difficultatem, neruorum, & hypochondriorum dolores, hybernos horrores, & denique ad venenata animalia, quorum iſtum frigus inſequitur, & locus computrefcit.

Dioclis vinum fanitatem conſeruans.

Cap. 26.

Cum in dolia coniectum muſtum fuerit, in metretas decē praſij minam indito.

In hoc capite plurima esse menda conspiciuntur.

Cum dandi vini duplex sit ratio, ususque postulet, ut vinum demus, vel ut febrim soluamus, vel ut concretionem fluentem sistamus, ideo in iis vini exhibitione omnino utendum est eò, ut vires confirmemus. at quibus, ut febris infirmetur, vinum damus, sit ut aliis dandum, aliis non dandum esse iudicemus: siquidem non vna est indicatio. atque ætas quidem est ad hoc idonea ea, quæ floret. vel quæ non multum absit. præterea viri aptiores ad hoc sunt, quam scemine: tempus verum, & æstivum: naturæ perhumidæ. itémque non multæ calidæ febres, breues, & quæ sine symptomatibus accedunt: & quæ in firma declinatione sunt, potius quam quæ declinare incipiunt. Omnino autem ad hoc inepti sunt, qui cum duritie, aut inflammatione partium ægrotant, sicci que sunt, & difficulter perspirantur: quique febres continuas habent: & quibus nervosa pars noxam contraxit. Vinum autem ieiunis dandum est, indita quinta aquæ calidissimæ parte: sique admodum potens sit, quarta. Sed si defecabitur, magis etiam eius vis infringetur. siquidem multum eius perspiratur. Primam vero eius exhibitionem remissam esse oportet, habita interim ratione consuetudinis: sique facile ferat, etiam secundo loco dandum erit: sique promptus capiat, etiam tertio. Ij vero qui præbibere consueverunt, bibacésque alioqui sunt, hortandi sunt, ut ad sex vsque heminas bibât. Qui vero athletarum vitam degunt, quique consuevi sunt ad ludos, quos apocottabismos vocant, cum videlicet poculis plenis alter alteri propinat, duplum, si velint præbibât, & euomant, tunc enim ex consuetudine datus eis humor accer & pituitosus excernetur. Adhortandi quoque sunt, ut qui velint, in medio cibo bibant, & etiam post sumptum cibum definitam mensuram assument. Sed potus omnibus ne serius duarum horarum spatio à cibo sumpto detur. si postea siti vrgebuntur, aquam bibât. Qui vero frigidum aliquid sumpserant, iis in medio cibo, aut post cibum potus exhibeatur. Qui vero ieiuni bibere non consueverunt, nec possunt absque cibo potum sumere, si voluerimus nuda corpora à vino contingi, frustula panis in vinum temperatum calidum confracta iniiciemus, sorbendum dabimus, atque ut

ita

ita temperatum sumant, iubebimus. ita enim pro portione respondebit potationi quæ ieiuno stomacho fit. Eadē quoque & in senibus, & in pueris, & in plerisque mulieribus facienda sunt. itēque in iis, qui parum bibunt, vel suapte natura læduntur. qui vero à paucis initium sumunt, & in medio cibo vini indigent, iis ante, & post etiam, consuetam aquam dabimus. omnes vero, quibus febris infirmandæ causa vinum damus, si res ex sententia succedunt, cogere oportet, ut dilutius quam eis conveniat, ebibant. mensuram vero in omnibus communem definire, cum magna & prope infinita sit in iis, qui sumpturi sunt, differentia, non possumus: & tamen danda opera est, ut medium terminum inter plurimum & minimū determinemus. ne plus igitur quam tres heminas, nec minus quam unam bibant. iis vero qui ieiuni bibunt, dum apocottabismum exercēt, tertia præterea epoti pars adiungatur. qui vero post longum tempus loti sunt, portio consueta dari eis debent: itēque iis, quibus à balneo vinum damus. Omnibus enim, qui datum vinum biberint, sequenti die si bibant, aquæ potionem commendamus. quam nisi eis persuaserimus, admonendi erunt, ut paucis vino utantur. & copia etiam alimenti minuēda erit, qui vero febris infirmandæ causa secundum balneum ingrediuntur, in eisdem vinis perseverare oportet. qui vero causa resolutionis, hi debent ad robustiora transire. Sed transitus ne fiat confestim & repente, sed pedetentim. Nunc vero signa, quæ sequi eos debent, quibus recte vinum sit datum, exponenda sunt nobis. nam his cognitis mala quoque simul intelliguntur. ergo faciei rubor cum naturali coloris elegantia coniunctus, commoda spiratio, sudores calidi per totum corpus, capitis leuitas, partium corporis agilitas, animi hilaritas, oculus humidus consequentur. tum vero sentiet se recte lotum, & ad vinum recte erit affectus: & postquam biberit, cibos magnopere appetet, & eorum usum commode feret. itēque ructus, à quibus leuabitur, excitabuntur, & à cibo potius quæret. moderati sudores prodibunt, qui paulo post cessabunt: vrina excernetur. corpus denique reddetur molle, & probe coloratum. qui vero incommode vinum sumpserūt, eos sequetur faciei pallor, & siccitas per omnia, vel certe plurima corporis membra: ac, sicubi significat, sudor frigidus apparebit, una cum capitis gravitate, in quo æger omnium

artuum motus conspicietur: itémque animi demissio, & stomachus ad cibum supinus, & sitis quæ sedari potando non poterit, & æstus in hypochondrio, & voluntas eructandi, nec ulliustus fient: si quæ fiant, nihil leuabunt. vesica sæpe urinam retinens, atque etiam paulatim eam reddens, eorum quoque pulsus densus erit necessario. Cum hæc tum omnia, tum plurima appareant, si nausea eos tentabit, vomitus statim imperabitur. Si nausea non adsit, ipsi tamen aliqui facile vomant, tunc etiam, ut vomant, iniungemus: si difficulter vomant, aquam calidam potui dantes laborem sedabimus. Qui vero febrim habent, si euomant, & longa fuerit accessio, post vomitum exiguo cibo sunt alendi: si brevis, post sequentis diei somnum. Si non euomuerint, in iis cauere oportet diatriton, & mediis diebus assiduus potus temporibus à nobis definitis dandus erit. noxium enim est, cum febres post vini potionem accidunt, siccitate in ægro regendo uti. quam ob rem par est, ut cõtinuis potionibus humectantes particulas corporis exsiccatas, vini potione expediamus & liberemus.

Antylli, de collutione, ex tertio de auxiliis, quæ extrinsecus adhibentur. Cap. 28.

Collutio sitim lenit, oris siccitatē humectat, linguæ asperitatem leuigat, dissolutionem mitigat, ac quod in dentibus viscidum est, expurgat. ac collutio quidem non solum in remissione dàda est, sed etiam moderate in omni tēpore, præter quā in principio, ea uti possumus. gargarizatio vero iuuat ipsa quidem parum, extremas stomachi partes humectās, sed tamen magis etiam lædit, cum materiam sursum petentem efficiens, caput obstruat.

De potu, ex libro eodem Antylli. Cap. 29.

Aqua calida quoquo modo omnibus ægrotantibus in tēporibus opportunis danda est: frigida vero, præcipue ut calorem, qui non ex alia affectione, puta ab inflammatione sit exortus, sed ipse per se vexet, ut in ardentibus febribus flammis, exhibetur. Per obfistentiam vero frigidam damus iis, qui frigide potioni sunt assueti, & qui alieni sunt ab usu calidæ, aut quibus stomachus in morbo propter calidæ potionem subuertitur. Si vero ob febris æstum frigidam quis bibat,

bibat, is voraciter, & largius bibat: si ob aliā quampiam causam, parum, & quasi sorbeat. Cauendū autem est, ne statim à cibo bibatur, nisi vinum, & frigida. acetum nanque per se non damus, sicut ne vinū quidem, nisi quandoque paululū, & medicamenti vice. posca vero datur iis, qui sanguinem reieciunt: præsertim vero si à stomacho, aut ventre fiat reiectio. atque etiam iis, quos nausea vehementer exercet. & qui in navigationibus nimium expurgantur. quandoque etiam pituitosis poscam damus, vt pituitā euomant. & oxymeli sumimus, vt affectionibus thoracē infestatis succurramus, & cum quispiam fungos comedit, atque etiā vbi quis gypsum potauit, & magis quoque, vbi taurinum sanguinem bibit. mulsum vero vinum vtrum alicui ægrotanti accommodatum sit, ego certe nō noui. at melicratū & iis prodest, qui febrem habent, & iis qui sine febre neruorum affectionibus correpti sunt. hydromeli vero, & apomeli, & melimalū ipsa per se non sunt idonei potus: quādoquidem facile corrumpuntur, & aescunt. ori vero satis accommodata sunt iis, qui non appetunt in febribus non prauis, & morbis qui iam inueterarint, & à quibus febris absit: si minus apte datū alimentum est, nobisque placet statim à cibo & frigidam, & vinum dare, horum aliquid sumemus. tum enim corpus, & præsertim ventriculus, & stomachus iam expleta nihil mali neque à morsu frigida, neque à vini facultate, atque vino patietur. ex quo fit, vt neque ieiunis, neque multo post cibum, demus: cum simile sit si longo post cibum assumptū tempore, ac si ieiunis propinemus. post potionem vero cibos statim offerre, ne accommodatum quidem est iis, qui ieiuni præbunt. vinum enim & frigida prius corpus lædunt, quam cibi ingrediantur. Sed neque conuenit dare iis, qui multo ante comederunt, & postea superbibunt. nam quomodo hæc frigida morsum possint retundere, aut vini potentiam hebetare, cum iam confecta sint, nihil est quod afferri posse videatur.

Herodoti de potu: & quonam accessionis tempore potu sit vtendum.

Cap. 30.

Cum tota annotatio integra sectione in principium, statum, & declinationem diuidatur, omnem partem ad potum præbendum necessariam inueniemus. Qui igitur sumpto cibo febricitarint, aut facta conuenienti ciborum corruptio-

ne, si in principiis quoque annotationū nutriti fuerint, vel suspicio est, ne quid vitiosi alimenti sumpserint, si eis vomendum esse iudicauerimus, his vomitum post assumptum potū imperabimus, quibus quidem, ut reliquæ diligenter expurgentur, etiam secundo loco dabimus: & sæpe etiam, ut res subiectæ temperentur, & per inferiora secedāt. sed alæ quoque circumstantiæ inueniri possunt, quæ potum in principio annotationum postulent: qualis est infantium ætas. sed id demum tempus opportunū existimamus, cum nec serius, nec citius datur. qui vero potum auersantur, & ob eam causam in periculo versantur, id quod in difficilibus instantiis fieri solet, si in principio accessionis potum expetant, non erit eis negandus. In tēporibus vero incrementi plures causæ dandi potus sunt. ergo si vehemens sitis in accessionibus quosdam inuadat, ferrique ea egre possit, non ex malitia, & incremento morborum, sed ex quadam propria mali qualitate, omnino necesse est symptoma mitigare: quod nisi fiat, febris magnitudinē multo magis sitis augebit. qua in re spectanda est etiam ægrotantis natura. nam si in ceteris tolerans patiensque sit, & sitim non ferat, profecto aptus erit, ut in accessionis incremento bibat: & item qui multum biliosi humoris in stomacho acervant, & magno cum labore id reiciunt, & quodammodo leuantur, sed extrema frigent, pallidique ipsi sunt, & prope deficiunt, neque decubitum ferunt, exusti atque enecti siti, quamuis ab excretionē leuari debuissent, cum ex quibusdam numeris constitutis hæc vicissitudine quadā patiantur, neque quiescunt, neque ad extremas usque partes febris peruenit, si multum humoris eis præbuerimus, eos quodammodo ablucemus. iis cum euomuerint, accidit ut statim post assumptionem, & vomitū, calor confertim per corpus euehatur: & ad status proprietates proxime accedat. Si que partitio annotationis in imparia distribuatur: ut maior pars incrementi, minor vero status sit: tempus portionis dandæ erit in accretione. siquidem illud proportionē respondet tempori status: quoniam in iis temporibus causa dominatur, & homo ipse vexatur. Citius quoque alendi sunt, qui facultates habent, quæ facile opprimuntur: quos multo ante non solum potu dando communire oportet, sed cibis etiam præbendis. Qui vero in febribus difficulter bibunt, quia stomachus ex peculiari calore exaruerit, si magnitudo

fe-

febris sit, hi nisi continenter bibendo humectentur, cum magno suo damno in tempore alimenti reparantur. Nonnulli sunt qui ex suffocatione talia patiuntur: à quibus periculum suffocationis imminens auercentes, ante statum potionē dābimus. In iis autē, qui suapte natura non appetunt, & cum labore sumunt ea quę offeruntur, & præcipue si siccitas os occupet, continuo potu utēdum est: cum maior inde propter res futuras euasura sit utilitas. Citius quoque potū dāmus iis, quibus attractiones ingentis famis accidunt, ut symptoma mitigemus. Atque calidi quidem potus dandi tempus exposuimus. siquid omissum à nobis sit, facile erit ex iis quę dicta sunt, inuenire. frigidi vero potus, cum incipit annotatio, vsus est in iis, qui sanguinem fundunt: in accretione vero dandus est iis, qui propter aliquem casum, sumere calidum non possunt. Frigida vero potio, quę ardentibus infirmandi causa datur, ante remissionem in ipsius status tempore præbetur. eadē exhibendi tempora sunt tepidę, lactę, & gelidę potionis. Calidę autem exhibitionis diuersa sunt tempora. nam si detur in principio annotationis, ut vomitus cieatur, & copiosa & tepida detur. Simili quoque modo si propinetur, ut vehementem, & ardentem sitim extinguere velimus: siquę una cum defluxionibus multi acres, biliosi quę humores in stomachum confluant. siquidem eo tempore quod sumptum est, non superatur, sed excernitur. In frigida vero potione ad sitim tollendam, facere debemus, ut paulatim eam sumant, & parce bibendo diutius in potione immorentur. at cū mouendi vomitus causa bibitur, ut conferatim, ac quantum vno haustu possint, ea utantur. si vero propter annotationis longitudinem, aut virium vexationē, aut propter iam memoratas circumstantias demus, cū in accretione aut statu sint constituti, moderata potio danda erit, ut neque solum gustent, neque etiā se expleant, commodum nanque in febris est, ventrem vacuum, & non tensum seruare. Qui vero propter siccitatem, & propter suffocationem ex ipsa ortam siccitate potum sumunt, in quibus etiam seruari volumus, quę ad potionē pertinent, eis paulatim & cōtinenter offeremus. Si vero etiam febricitantes aut stomachi, aut alui fluoribus vexentur, tunc etiam cauendum est, ne potio conferatim sumatur, quādoquidem symptomata excitat, atque irritat: optimūque est, ut ex vasculis, quos

rum perangusta sint ora, paulatim bibant. quod si in remissionibus potū præbeamus, iis qui defluxionibus tenentur, nunquam nec multum, nec assatim & confertim dabimus: sed eo modo, quem diximus. cæteri ad expletionem vsque bibant. siccis vero, & quorum caro oclusa est, & ex omni parte constricta, plus dandum est, quam ut sitis postulet ratio. si quæ opus sit, iterum dandum, eadem enim & vnius, & plurium potionum est occasio. facienda tamen coniectura est, an primus humor concoctus sit: & corporum natura est indaganda, non autē desiderij ægrotantis habenda ratio. nam si sudores, qui post datam potionem apparent, viles sint, ac bene cedant, perseverandum est in secunda portione propināda: si vero copiosis, largioribusque sudoribus opus sit, ipsi vero cessent, excitandi erūt. cum vero singultus infestet, aut sicca tussis intendatur, pauca calida absorbenda est: gelida vero aut frigida si pro calida detur, iisdem modis, iisdemque temporibus danda est: si vero ut sudores, aut alia symptomata cohibeantur, quæ supra numeravimus, paulatim, & ex maioribus interuallis exhibenda. Itēque frigida, quæ à cibo datur, pauca esto. frigida vero, quæ in febribus ardētibus certatim datur, aut lactea, aut gelida quomodo danda sit, in libris ad curationem pertinentibus, explicabimus. Aqua vero quæ potatur, sit optima, & decocta ad carbones in vase fictili. sed nos aquam in vitream phyalam immittimus, & in aquam feruentem indimus: quæ sic parata, omni reprehensione caret. si praua sit aqua, vbi decocta fuerit, sub dio teneatur. frigida vero pura esto frigida & mollis. Si vero accommodata atque apte tepesciat, lacteaque, aut egelida reddatur, diuersis rationibus ea erit vtendum, facta comparatione cum calida. Ceterum tepida ita temperetur, calidæ aquæ potui accommodatæ cyathis quinque vnus frigidæ addatur. egelida vero sic mutetur, ut calidæ cyathū vnū, & frigidæ quinque habeat. lactea vero ex pari vtriusque mensura temperatur. sit autem intenta, quæ frigida est. si vero remissa sit, plus frigidæ erit adiungendum,

De potionibus, quæ ægrotis conueniunt.

Cap. 31.

Febricitantibus optima potio est melicratum, aut oxymeli: quibus cordi est accommodatum. aqua vero in febricitante omni morsu vacat: excretionibus vero non admodum facit. aquæ vero, in quibus aliquid maduerit, in quibus

quibus vis adstringendi inest, non sunt incommodæ ventris perturbationibus, & valent etiam ad vomitus cohibendos: quibus mellis, & oxymelitis potio est aduersa. Mala vero dulcia, æstiuo tempore in tenues partes dissecta, in aqua macerentur vsque dum aqua colorem inde contrahat. Vel cydonia mala matura secantur in partes, & similiter macerantur. quod vero ex malis fit, dandum præcipuæ est iis, qui bilem vomunt: & quibus fluit aluus. sed ne mala aciditatem vllam habeant, diligenter considerandum est. Simili quoque modo pira sunt maceranda, quæ acerba, dulciæque sunt. omne autem dilutum, quod ex piris conficitur, maiorem vini facultatem refert. secundas in hac re fert id, quod ex malis fit cydoniis. minime vero quod ex crudis palmulis paratur: estque præstantius id, quod ex semimaturis conficitur. Myrta vero tenera macerata passò, vinosam quidem potionem, sed tamen morsus expertem, & lenem faciunt. Succus vero qui ex punicis extat, non minus, quam quæ dicta sunt, vinosissimus est. estque hic quoque succus lenis: & nihil habet caloris, atque hisce dilutis, quæ acerba sunt, vti poterit quispiam in iis febribus, quæ & turbationis expertes, & tutæ sunt: & omnino in iis, quos citata aluus exercet. Dilutæ vero quæ à sorbis, pirisque siccis, & myrtis, itémque palmulis fiunt, minus strigmenti modo crassæ sunt. vti his poterimus in iis, quibus vinum non est dandum, acini quoque vuarum confissi macerantur: sed eorum decoctum est utilius: quod astringendo est efficacissimum: nec vllam aliam acrimoniam, neque aciditatē habet. Vina vero quæ ex myrtis, fauis, tritico, & hordeo fiunt, nihilo imbecilliora sunt, quam quæ ex vua cōficiuntur: sed multo tardiora, peioræque sunt. at quæ ex palmulis & ficubus fiunt, cum in principio bibuntur, similia dulci vino gustantibus videntur: at facultate multo deteriora, & grauiora, & ad conficiendum difficiliora. cum vero inueterascunt, similia vino aultero, & calore, & facultate redduntur.

Philotimi, de potione, quæ ante, & quæ post cibum datur.

Cap. 32.

Cum post cibum potus cōfertim sumitur, vsu venit, vti stomachus, & præsertim superior, fiat latior: venter extendatur, cibi madescant, & parentur vt diffundi queant, os;

lz ij

L I B E R

partes capitis, guttur, & ventriculus calefiant. Qui vero nocte frigidam bibunt, iis omnia prædicta loca refrigerantur, & alimentum, quod non longe aberat, ut calefieret, perfrigerat, & coctionem impedit: alimentumque feruens, & bullas in eo iam excitatas deprimat, atque deponit: facitque ut quiescat: partemque alimenti iam dissolutam & eliquatam, reddit crassiores. Si quis vero frigidam ieiunus bibat, in eo quoque eadem loca perfrigerari, & cito, & plurimum humorem, & calefactum minus ex ventre in corpus distribui: & pituitam, que ventriculo continetur, fieri crassiorem contingit. iis vero qui ex laboribus, balneis, & febribus bibunt, cum distributio humoris celerrime fit, tum mixtionem minus sustinet: alimentumque quod in venis est, & os, & vultum, & stomachum, & ventrem maxime perfrigerat: & succos, qui venis continentur, paruo tempore refrigerat, ac crassiores facit.

Rosacei confectio.

Cap. 33.

Rosas purgatis sordibus, & excisis vnguibus, in peruetustum vinum quot velis conice. non tamen acervatim, sed paulatim: singulisque diebus calamo, quod ad fundum vasis pertineat, commoueto, ita tamen, ut ipsum diligenter obtures, ne fiat perspiratio: & finito triginta dies, quibus lapsis vinum defecabis, & in quinque eius sextarios vinum mellis sextarium conicies. itemque operculo probe concludes, & cum triginta dies sic permiseris, ut consiltat, utitor.

Eiusdem alia composita confectio.

Rosis, excisis vnguibus, iniice mellis sextarios senos: & per annum ita finito. tum huius compositi cape lib. vnam. mellis puri lib. quinque. eisque omnibus leuigatis vini optimi sextarios decem affunde,

Hydrorofatum.

Mellis optimi lib. 30. foliorum rosarum lib. 10. aquæ fontanæ lib. 60. coque aquam donec ferueat, & ablato ab igni vase, rosas iniice. tum vas obturabis, donec perfecta sit facta concoctio. ubi coxeris, mel separatim coquendo spuma expurgabis, & defecatis rosis, mel decocto rosarum infunde.

Aliud

Aliud rosaceum.

Vini, quod primum exprimitur, pondo 21. mellis pondo 8. foliorum rosarum pondo 3. rosæ vino immadescant dies quindecim. tum è vino per colū traicies, melque excoques, & spumam abiicies: & vino, in quo rosæ maduerint, addes: & probe obturata sic permittes.

Aliud rosaceum recens.

Mellis pondo 7. vini pondo 21. foliorum rosarum pondo 2. tritas, vt par est, rosas vino biduum adinisceto. tum rosas excolatis, & melle cocto, vtrunque commiscebis, & probe obturata dimittes.

Violaceum.

Mellis pondo 7. vini pondo 21. violarum manipuli 240. has in folia redacta in vino triginta dies macerabis. tū violis colo traiectis, mel coques. tum vtrunque in vnum compones, & obturata ita fines.

Chamamelatum.

Vini ascalonitæ pondo 21. mellis pondo 7. granorum chamemeli vnc. 6. grana vino diebus quinque macerato. iisq; excolatis, mel coquino. & abiecta spuma in vnum omnia rediges, & obturata permittes.

Conditum ad lapidem in vesica frangendum.

Mellis sextarius, vini sextarij quinque, piperis vncia, saxifragi drach. quatuor, spicæ nardi tantundem, carpesij, zinziberis, mei, assari, cassiæ, sinonis, petroselini, acori, gentianæ, dauci ana drach. 4. sicca melle despumato & vino componentur: & vas, in quo posita fuerint, dies 210. ita finito, vt fiat concoctio.

Conditum.

Mellis lib. 10. vini prioris lib. 30. piperis vnc. 1. piper contundendum est, vinoque admiscendum. tum mel despumatum cum vino compones, & obturata fines.

Anisatum.

Mellis lib. 10. vini prioris albi lib. 30. anisi vnc. 5.
lz iij

L I B E R

Ex iunco odorato.

Ad drach. 16. iunci odorati adde croci pondera 12. massi-
ches drach. 16. hæc omnia contrita vino compones: melque
despumabis, & omnia simul miscebis, obturabisque, & ita
permittes.

Styracatum.

Mellis lib. 30. styracis lib. 1. vini lib. 6. mel despumato,
styracem terito, commisceto. & cum melle despumato vinū
in mortario misceto, & manu tua excipiens vitior.

Absinthite.

Ad vini sextarios quinquaginta iniice costi, folij, amomi,
cassie singulorum semissem, mellis sextarios decem: & ab-
sinthium herbam paucō vino macerabis, & prædictis rebus
tantum eius diluti affunde, quantum tibi gustanti rite con-
fectum esse videatur.

FINIS QVINTI LIBRI.

ORIBASII MEDICI-

NALIVM COLLE-
CTORVM,

LIBER SEXTVS.

*De decubitu, ex Antylli quarto libro, de auxiliis,
quæ sunt. Cap. 1.*



Ecūbere autem confert iis, qui acuto morbo
detinentur: quoniam qui ita laborant, lassari
non debent. qui vero diuturnis morbis sunt
correpti, solum cōfert decumbere, cum vrget
accessio. at in interuallis, etiam moveri nihil
prohibet: cum motione, & variis quoque excitationibus in-
digeant. Figura autem decubitus eorum, quibus caput labo-
rat, in subline vergat, præter quam in phreneticis, quoniam
in

in eis humilem atque inclinatum decubitum volumus: quia decubitus in sublime elatus, quodammodo eos perturbat. Præterea iis, quæ in thorace accidunt, sublimis decubitus est accommodatus. In dysentericis vero & celiacis decubitus conuenit ad illa inclinatio. in gonorrhæa, satyriasi, & renū dolore, in vtriusvis latus decumbere potest. nā gonorrhæa, & satyriasis ex acui, exacerbarique solent locis ex calfactis: cū in reclinato decubitu manent. renū dolor tum exacerbatur, cum lumbus ea figura comprimitur. iis autem, qui non nutriuntur, quique tarde cōcoquunt, in sinistrum latus vtile est decumbere, vt iecur ventriculo circumfusus eundē calefaciat. in scirrhis vero iecoris affectionibus, & tumoribus & inflammationibus contumacibus, in dextrū latus decūbere est melius: quemadmodum si lien eisdem malis correptus sit, in eum decumbere satius est. sed in torminibus intestinorū, & in ilei, atque coli affectionibus, medius inter supinum & sinistrum conuenit. Cauendum autē est in colicis, ne illorum dolorem mitigemus, à pedibus decubitum altiore faciētes: cum hic decubitus & caput, & instrumenta sensuum repleat. præterea quos ventris dolor, aut eiusdem frigus vexat, eis quoque talis figura decūbendi non est accommodata.

De quiete, ex eodem libro. Cap. 2.

Quibus decubitus, iis etiam quies & tranquillitas conuenit: ac præcipue quidem in principiis accessionum, itēque incrementis, & post cibum nuper sumptū, & cum quis dormire cogitat, apta est quies, atque tranquillitas.

De aegroto abstinendo, ex eodem libro. Cap. 3.

Abstinendus æger est, cum carnis & sanguinis copiā contrahere volumus, itēque cibos incoctos coquere, plenitudinem euacuare, defluxiones siccare, easque præcipue, quæ ex plenitudine oriuntur: quæ res maiores quoque mitigat. sed & dolores ipsos lenit, quos acrimonia excitauit: qui vero ex plenitudine oriuntur, eos irritat.

De somno & vigilia, Galeni. Cap. 4.

Somnus semper humectat, non secus quam vigilia semper exsiccant: non tamen aptus est, vt calefaciat semper, aut refrigeret: verum cum in iis, qui febrē non habent, pituitosos

lz iiij

L I B E R

aut crudos, aut quouis modo frigidos succos in corpore in-
 uentos confecerit, atque concoxerit, ex eisque probum san-
 guinem procrearit, tunc hominem inliti caloris incremento
 calefacit. at cum ex huiusmodi humorum putredine iam fe-
 bricitantes occuparit, tum febris calorem extinguens, pro-
 prium vero augens, eos refrigerat. Cum igitur somnus pro-
 prium calorem augeat, & roboret, eum vero qui præter na-
 turam est, cõminuat, & extinguat, merito etiam quis vno &
 eodem tempore corpus frigidius simul, & calidius se ipso à
 somno reddi censebit. Cũ vero duplex læsio existat ex som-
 no, altera communis, quando ægroti in principiis accessio-
 num dormierint, altera propria in quibusdam morbis, quan-
 do in aliquo alio tempore dormierint: hæc periculosam esse
 existimare debemus, illa enim neque mortẽ, neque aliquod
 aliud graue significat, cum naturam temporis consequatur.
 In principiis enim accessionum, calor, & humores in pro-
 fundum corporis vergunt: ac, si qua inflammatio in visceri-
 bus sit, merito augetur: si quę humores aliqui ad ventrẽ con-
 fluant, non concoquuntur illi quidem, vt in aliis somnis, sed
 multo plures sunt, quam ob rem eo tempore vigilias ægro-
 tis imperamus, spiritus, sanguinis, & caloris qui in eis est, la-
 tionẽ ad exteriora, quę à vigiliis sit, opposites, tanquam
 maximũ auxiliũ, lationi eorundem ad interiora, quę in prin-
 cipiis accessionũ efficitur. Ex somnis vero, qui aliis tempori-
 bus capiuntur, maxima ex parte vtilitas manifesta consequi-
 tur, præsertim vero, vbi morbo declinante adhibeatur. nam
 & in statu etiã aliquãdo manifestã vtilitatem somnus affert:
 quandoque etiã in extremis incrementi partibus, quę statũ
 contingunt, euidentissima tamen omniũ vtilitas est ea, quę
 affertur in declinationibus. Veruntamen cũ somni nocent,
 minus exitiales sunt iam cõsistente, atque in crescente accef-
 sione, præcipue autẽ perniciosi sunt in declinationibus. quo
 enim tempore aliquid est vtilissimũ, si præterquam quod ni-
 hil prodest, etiã nocet, mortem iure significat. Iam ex som-
 no læsiones sunt, quę sunt vtilitatibus contrarię: tum quod
 febres ab eo non dissoluantur, vel etiã augeantur, tum quod
 dolores intendantur, & fluxiones multiplicentur, & inflam-
 mationes crescant. Ex succis vero, quibus concoctione opus
 est, eis somnus prodest: quibus vero digestionem per halitum,
 vigilia. præterea, succos qui in ventriculum, intestina, & iecur
 ver-

vergunt, somnus intendit: vigiliæ reuellunt. itémque in humoribus, quorum crassitudinem, aut lentorem attenuare oportet, vigilia utilis est, sed nō immoderata. sunt enim etiam in parte concoquendi, id quod somnus efficit. maxima vero lesio frigidis humoribus accedit, cum quispiam permittit, ut quantū illi postulent, dormiatur. eo enim propter frigiditatem inclinant. veruntamen eis non prodest, sed tantum in eiusmodi humoribus dormiendum est, quantū satis sit ad vires, quæ in vigilia laborarunt, reficiendas, & ad quandā concoctionem obeundam. Somnus namque fit, vel cum naturalis calor propter aliquem laborem, aut nimiam siccitatem ad alimentum conuertitur: vel propter nimiam humiditatem, quæ foras extendi non possit, ac prior quidem, & salubris & naturalis est: alter vero est, qualis in comate, & lethargis euenire consuevit.

*Antylli, de utilitate, quam somnus affert, ex quarto libro
auxiliorum, quæ fiunt. Cap. 5.*

Somnus remittit, quæ tensa sunt, emollit indurata, fundit coherentia, inæqualia ad æqualitatē perducit. itémque quasi-fationes, & animi turbationes sedat: spiritū lenit: defluxiones sistit, humores qui sunt in corpore, crassos faciēs. Somni vero tempus in morbis intermittentibus est, cū sit remissio. quod si longior sit accessio, tunc & status, & declinationis tempus accommodatum est. at tempus principij est inutilius. atque etiam minime aptum est id, quod accessiones antecedit. In incremento vero, si breue sit, non est in eo refugiendus somnus: at si longius, atque post medium diei fiat, tunc est prohibendus. suapte enim natura omnis vespertinus somnus est malus. verum si post mediam noctem, & præsertim circa diluculum, medium quodammodo incrementi contingat, permittendum est ut continuo dormiatur. nox autem est die aptior. in ipsaque nocte, accommodatiora sunt ea, quæ post horam tertiā sunt, & præsertim vltima. in die vero, diluculum, & pars vsque ad meridiem, cæteris præstant.

Eiusdem, & ex eodem libro, de vigilia. Cap. 6.

Vigilia plenitudinem per halitum digerit: quæ in ventre sunt, minuit, & ut per partes infernas exeant, præparat: languorem dissolvit, grauitatem dispensat, resoluta corrigit: &

robur naturæ atque animo adiungit: sudores cohibet. iis vero qui ex medicamento purgantur, ut usque ad perfectam purgationem vigilant, imperandum est. post etiam sumptum tunc cibum & potum, itemque in accessione, & ante accessione, ut cum de somno loqueremur, memorauimus, vigilare homines debent. Vigiliæ inducunt frictiones duriores sine pinguedine, & magis etiam, si ex lincis pannis crudis obeantur. præcipue autem crura fricentur: Vnguinæque conueniunt, quæ acriora sunt, quæ nitrum, aut euphorbium, aut limnesten, aut cachry, aut cardamomum, aut pyrethum, aut vuam taminiam, aut granum gnidiū, aut sinapi capiunt. Cataplasmata quoque cruribus ex sinapi superduntur. Vigiliæ etiam faciunt hæc, pruritus violentus, pilorum euulsio, digitorum tractio, stomachi vellicatio digitis iniectis facta: quæ ano admoventur, atque induntur, quorum est iam descripta materia: ex iis quæ odorari solemus, quæ foedi sunt odoris: quæ sternutamenta cient: acria medicamenta oculis adnota: aut oleum ipsum infusum: cucurbitulæ inguinibus affixæ: clamores continui: nuncij turbulenti: sermones qui affligunt, & cruciant. Spectacula vero non solum vigiliarum sunt efficientia, sed etiam propensionem in somnum nimiam dissoluunt. ergo quid fiet incommodi, si adhibeantur?

Eiusdem, de sermone, ex eodem libro. Cap. 7.

Sermo vim quandam habet, ut caput impleat, & gravitatem afferat. quin etiam vires dissolvit, idque præcipue in febribus, & magis quoque in accessionibus. sitim etiam inducit: ac linguam siccatur, est item lippientibus, & quibus sanguis ex naribus funditur, & maxime iis, qui sanguinem reieciunt, incommodus, est autem aptus iis, qui præter modum ad somnum sunt propensi.

Eiusdem, de vociferatione, ex eodem libro. Cap. 8.

Vociferatio est thoracis, & vocalium instrumentorum: & prius etiam, quam horum, naturalis caloris exercitatio, calorem namque auget, purgat, firmat, & attenuat. solidas vero corporis partes, robustas, puras, & offensus minime obnoxias reddit. Vociferatione autem utimur quandoque ad morbi medelam, vel vocis desesset, vel totius etiam corporis: quandoque vero, ut vocem vel ex morbo, vel suapte natura male

le affectam emendamus. Conuenit autem hæc stomachicis, vomentibus, acidum ruſtantibus, ægre concoquentibus, atque etiam accommoda eſt iis, quibus pituita redundat in corpore, & mulieribus prægnantibus, ſaſtidio, cui picæ nomen eſt, obſeſſis. Capitis vero affectionibus nõ eſt idonea: cum neſcio quid facultatis ad replendum caput, & inſtrumenta ſenſuum capite contentorũ, habeat. Iam vero iis qui cibi ſaſtidio tenentur, quique non aluntur, conuenit: præcipue vero languidis, hydropicis, & aſthmaticis, itẽmque reſectionibus ex morbo, accommodatiſſima eſt. Nunc vero quoniam vox laborat, partim propter longam & nimiam loquelam, partim propter clamoris magnitudinem, partim propter acumen, & contentionem, partim vero propter ſilentium, quaſi ſuarum actionum oblita, ideo fit, vt in hiſce omnibus, quæ dicta ſunt, vociferationis uſus ſit utilis: cum longam loquelam diſſoluat, & noxæ, quæ ex clamoris magnitudine contracta eſt, placida & quieta imminutione medeatur: acumini vero occurrat, grauioreſ ſonos inſpergendo. Qui vero ex ſilẽtio oritur, quãuis non proprie vocis ſit labor, tamen cũ vocis labore proportionem quandam habet: quod circa ad eum quoque vociferatio eſt utilis, quæ vocem exerceat. ſi denique vocalia inſtrumenta deſeſſa ſint, totũque corpus ſuum tenorem non ſeruet, aut laſſitudine obſideatur, tunc ad eorum reſtitutionem, & curationem, utilis eſt vociferatio.

*Qui ſit vociferationis modus, eiufdem, & eodem
ex libro. Cap. 9.*

Qui vociferaturus eſt, debet, cum alius deiecit, fricari leniter: ac præcipue partes inferiores: faciẽmque ſpongia mædificare, aut abluere: & prius ſenſim loqui, ac per interualla mediocria, ſed melius eſt, vt prius deãbularit: poſt vero, ad vociferationem accedat. Is vero qui doctrinæ expers eſt, vociferando dicat, quorum meminẽrit, quæque clara, & multas habere lenitatis, & aſperitatis mutationes videantur. ſin autem verſus ſciat, iãbicos dicat: & tertius locus elegiæ detur: quartus modulis numerisque, qua in re præſtat etiã, memoria rẽcitare, quã legere. In primis autẽ vociferandum eſt, vocẽ, quã grauiſſimis fieri ſonis poteſt, producẽdo, tũ ad acutiſſimos eandem redigendo. deinde cum non multum in acuto ſono permanſum ſit, retro viciffim paulatim reſectendum,

vocem diminuendo, donec ad grauissimam, à qua ductum initium est, reuertatur. Modus vero à viribus, animi alacritate, & consuetudine sumendus est.

Antylli, de salubri vociferatione.

Cap. 10.

Cum vocis exercitationem rite initam, omnium præceptorum ad sapientis tutelam & conseruationem efficacissimam esse vsu atque experientia didicim, dedi operam, vt & auxiliij naturam, & qua via & ratione adhibeatur, quoad eius fieri à me potest, describerem. nunc igitur, quisnam modus veræ exercitationis vocis, ad firmam & diuturnam corporis valetudinem sit, dicendum est nobis. Vox omnis fit à spiritu per respirationem atque inspirationem deprompto, & formato ab his instrumentis, quæ natura ad hunc vsu est fabricata: vt eius materia sit respiratus aer, ars vero, si ita dicendum est, partes corporis, quæ aerem extendunt, atque dilatant. ergo necesse est, eius præstantiam, & vitium, aut in spiritu, aut in spiritum formantibus instrumentis versari. Instrumenta autem sunt, extremorum asperæ arteriæ locorum, eius quæ epiglottis dicitur, oris partium, linguæ, palati, dentiû, & labiorum harmonia commoderata, atque ad actionem rite disposita. Considerandum igitur est, qualis aer, & quomodo dispositus, optimam vocem efficiat. ac in acutissimis quidem sonis vsu venit, vt comprimatur, & angustetur collum, & mentum compressum vehementer supra à locis quæ ad gurgulionem sunt, ad extremas linguæ partes comprimatur, & angustetur: atque etiam vt ad prædictarum partium proportionem, totum corpus simul attenuetur: & aer ad mensuram distantie locorum pertranseat: & in pronunciationibus, & melodiis, quæ ex ipsis sunt, & collum, quam maxime fieri potest, dilatetur, atque amplificetur, & os ad extremas linguæ radices, à locis quæ ad gurgulionem sunt, maximopere abscedat, & deducatur: & in pronüciando multus spiritus exsuffletur: totumque reliquum corpus remittatur, & propter raritatem relaxetur, ergo acutiorum sonorum exercitationem, inutilemque intentionem, quam hypate paulatim efficit, aut artificiosam accrescendi indutriam, vt multum valeat, sinere deberet. quod si ad corporis tutelam suauitas cantus, & vocis præstantia conducatur, grauiorum sonorum vocem exerceamus. etenim aer quâplurimus respiratione in corpus per arteriam, & per
ceteros

exteros apertos cutis meatus occultos attract⁹, maximū mo-
mentū afferre, & præcipua præstantiæ vocis esse videtur por-
tio, id vero fit vel maxime à multa vasorum aërem attrahen-
tium latitudine. latitudo vero à concinna exercitatione con-
ficitur, cum nos meatus accommodate diducimus, & dilata-
mus: & paulatim quamplurimum excipere aërem, & rursus e-
undem exsufflare conamur, parum enim deest, quin omnes
virtutes, quas pronūciatio affert, à spiritus multitudine & co-
pia præstari comperiamus. nam neque quispiam vehementē
sonum vnquam ederet, nisi vehementi, propter copiam, spiri-
tu vteretur: neque magnum quippiam, nisi ei magna spiritus
copia abundaret. Sed nec etiam longum tempus duraret, si
non vocis productioni spiritus multitudo suppeditaretur: si-
cut etiam nec dēsum, aut clarum, aut plenum quid emitteret:
aut propter paruitatem, & imbecillitatem inspirationis, ina-
nem, raucum, solumque sonum ederet, cum perfectas, per-
spicuasque dictiones reddat: aut cum propter spiritus exilita-
tem, quasi cēler, quæ dicuntur, atque impediat: nec ad pro-
nunciandum sit satis. quo tempore, nulla re alia vocem cor-
riget, nisi multo spiritu vtatur. Cum igitur copia aëris per spi-
rationem attracti, maximum pondus afferre ad vocis præstā-
tiam videatur, in primis eius habenda est ratio ei, qui vocem
exerceat. quis autem sit modus huius curæ, & diligentiae ex-
ponendū est. ergo cum spiritus in nos attractio fiat diducto
pulmone, & ventre, & meatibus qui in tota sunt carne (aër
enim intro vi pellitur ad eam capacitatem à diductione factā
naturali quadam necessitate, vt quod vacuatū est, impleatur)
nos cum per nares, atque os ingredientem videamus, ac mul-
tū etiā eius per totius cutis meatus ingreditur. eo plus autem
externi aëris intra nos recipiemus, quo maiorem fecerimus
capacitatem eorum locorum, quæ sunt eundem attractura.
quam ob rem quorum densa cutis est, & meatus angustos ha-
bent, exiguæ vocis sunt, & ad sonos edendos imbecilli. rari
vero, & quibus vasa aperta sunt, vehementem vocem edunt.
ac pueri quidem & mulieres, & eunuchi vocem imbecillius,
quam viri emittunt. id quod eis propter meatuū angustiam
contingit. atque egrotantes, ob eandem causam, minorem
vocem quam bene valentes habent. Cum ergo ostenderimus
causam vocis corrigendæ esse aërem spirando attractum, aë-
risque causam esse meatuū dilatationem & diductionem, cō-

L I B E R

sequens est, vt quo modo hæc ipsa fiat, considerandum esse videatur. quoniam igitur omnis corporis capacitas, & cavitates duobus modis augetur, & paulatim diducitur, vel cum tunica, quæ cavitates amplectuntur, ex omni parte in orbem concluduntur: vel cum corpora ad id accommodata, ex additione augentur: vtriusque ratio nobis habenda est, & meatus dilatandi. in qua re densationem omnem, & eam quoque inducentes causas fugere debemus: vt maxime remittatur, quod non tensum est, in longitudinem, quod vero fufum est, in latitudinem: & moles corporis conseruetur. præter ea vero aërem augere oportet, tum per inspirationes paulatim adductum respirando, & amplius vasa ad ipsum excipientia accommodata diducendo: tum etiam conando ex additione quamplurimum foras excernere, & spiritum prius ingressum exprimere & vacuare violentius. nam & carnis remissio atque fusio latitudinem meatibus præstabit, cum copiosioris aëris per respirationem adductio eos ad maiorem semper latitudinem diducat: & expirationis assiduitas, quo plurimus spiritus reddatur, magnopere meatus diducit. quo enim quispiam maiorem diligentiam adhibuerit, vt thoracem spiritu per expirationem vacuet, eo copiosiore aëre, vt in illius consumpti locum sufficiat, indigebit. ex quo conficitur, vt vocis exercitatio corpus meatuum diductione rarefaciat: cæteræ vero exercitationes omnes carnem stipant, densant, & constringunt: illa vero leuem molem corporis, meatus dilatando, cæteræ vero solidam, duram, & grauem efficiunt. atque ex ipsa vocis exercitatio, & raritate, quam ipsa inducit, videre est carnem obsequentem, & ad omnem actionem maxime tractabilem reddi: ex aliis vero exercitationibus, resistentem, duram, egre sentientem. ideo fit, vt idiotæ, & plerique athletæ ingenio sint stupido, tardoque. ergo vocis exercitatio est cæteris anteponenda. In primis enim, in ipsis lectionibus accommodatis perspicuas humorum redundantium exercitationes facit: qui vero maiore vi legunt, maiores, atque adeo etiam per sudores: qui vero lenius legunt, per occultam exhalationem, quæ in tota mole corporis efficitur: atque in omnibus simili modo per effusionem, cum expirando multi humores extra effertur: & ex irritatione facta à vociferatione, & attenuatione vt multa excrementa, & sputa, & muci, & pituitæ prouentus excreantur. Iam vero ex robusta respiratione, quam vociferatio

feratio præparauit, præterquã quod vasa absterguntur, multi etiam humores consumuntur, qui & clam per corporis extremitatem, & per nares, & per os efflantur. Iis vero qui recalcendi ex frigiditate sunt, ecquod maius auxilium afferri potest, quam actio respirationis exercitatæ? Spiritus enim calorem nostrum assiduo motu ex collisione attrituque excitat, & suscitât: talemque reddit per incessantem actionis in corpore nostro feruorem. quocirca si non singulas in nobis partes, respirationis refrigeratione refrigeramus, lateat nos similia pati, qualia patiuntur ij, qui in maiorem humiditatem cadunt, * quam sit in nobis, atque etiam vehementissimæ refrigerationis correctionem eos recte consequi, qui rite vociferatione vsi fuerint, dictum est. Quinetiam si in nostris corporibus siccitas, & calor præter modum redundare videantur, multus aër per meatuum latitudinem respirando ingrediens, quæ exsiccata sint, maxime humectabit, & cum sit tenuiorum partium, & liquidior quam omnis aqua, duritiem à siccitate inductam emolliet. porro autem calorem, qui in corporibus præter modum sit, quid attinet dicere quã à nullo alio magis, quam ab aëre continenter per respirationem attracto refrigeretur, atque extinguatur? Oportet ergo sæpe legere, corpusque totum laxare & remittere, carnemque raritate perfundere, arteriam, cæterosque transitus spiritus studiose diducere, & per grauissimas vocis terminationes modulari. Vt autem procul à nobis valeant soni, qui ex additione ad notas studiose conscendant, faciendum est. Scimus enim, & viribus, & intentioni meatuum alienissimum esse vocis acumen. Sonorum vero concinnitates, varietates mutationibus cantus temperatis conueniunt: sed nihil est quod ad salubrem corporis tutelam conducant. vociferationibus vero quæ per hypatas fiunt, quam maxime fieri potest, sonum dilatare coguntur. at in ijs, qui legunt ita, vt audiantur, aut differunt, internam humiditatem euidentissime consumi, declarat densus vapor ex ore legentium prodiens. & superfluitates vetustiorum humorum, qui vnicuique meatui adhærebant, quæ excernuntur non solum in prædictis expirationibus, sed per alias, quæ extemplo appareât, vt per sputa, mucos, pituitâ, quæ expelluntur. quibus omnibus corpus ipsam causas morborum effectrices extrudit & reiicit. prædictis autem vocis actionibus neque temere, neque inconsulto vtendum est, ac

L I B E R

præsertim iis, qui huic exercitationi non assueti, incipiunt, neque etiam cum prauorum, corruptorumque humorum adsit copia, quin etiam vox non est exercenda tum, cum magnis & euidētibus cruditatibus stomachus obsidetur: ne ex actione inspirationis & expirationis, quæ firmior, & citatior facta sit, dum vox in magnitudinem, & multitudinem accreuit, vapores corrupti largius per corpus distribuantur.

Galenī, de exercitationibus

Cap. 11.

Non omnis motus exercitatio est, sed solum vehementior, quoniā autē id quod vehemētius est, in his est, quæ cū aliquo conferuntur, sit, vt idem motus alteri sit exercitatio, alteri nō sit. terminus autem vehementiæ est anhelitus alteratio: vt motus qui anhelitum non mutant, nondum exercitationes vocemus. Cum igitur vehemens motus exercitatio sit, necesse quidem est, hæc tria ab ea perfici in corpore, quod exerceatur, duritiem membrorum ex mutuo attritu, innati caloris incrementum, & spiritus citatiorem motum: sequi vero hæc reliqua omnia priuatim commoda, quæ corpus ab exercitatione consequitur: vt ex mēbrorum duritiā, tum vt minus ex labore patiātur, tum ad actiones robur: ex calore, tum deducendorum in corpus validiorem attractum, tum alterationem magis expeditam, tum nutritionem præstantiorem, tum singularum corporis partium fusionem. cuius fusionis beneficio, & solida fieri molliora, & humida tenuari, & meatus dilatari cōtingit. ex vehemētiori vero spiritus impetu, & meat⁹ purgari & excremēta expelli necesse est. Calefaciūt igitur, ac refrigerant exercitationes, superuacaneas humiditates per halitum digerēdo. ac morbos etiam frigidos & humidos ex accidenti faciunt. ergo in iis, qui pituitam acervant, humorem continuo diffundit, & ad aliquem principem partē fluere cogit, atque ita principe parte humectata, aut refrigerata, totū corpus frigida, au thumida affectione corripitur. Ocīa vero vt plurimum frigidi humoris copiam congregant: & raro etiam calefaciūt, cum scilicet natura corporis intemperata sit, vt acres defluxus habeat, qui in omnimodo ocio cohibiti, febris calorem afferunt. sed exsiccat quoque ocium ex accidenti, cū vires imbecillas facit, per quas alimenti distributio solidas partes siccāt. Corporis autē exercitationes non sunt contemnendæ, quemadmodū contemnere eas solent ii, qui
in disci-

in disciplinis studiose versantur: sed & totum ipsum corpus, quoad eius fieri potest, mouendum, & particulæ motibus qui viribus æquales sint, tractandæ, & dimouendæ in omni genere exercitationum, in quibus singulæ suo munere fungantur, motus autem vtiliores sunt, qui e nobis eduntur, cū ab interioribus partibus feruntur, & nostræ actiones sunt.

Quodnam tempus exercitationum esse debeat.

Cap. 12.

Si ergo exercitatio hæc efficit, non difficile erit tempus eius vsus statuere, nam quoniam digestionem in corpus adiuuat, non debet, cum administratur, crudi, incoctique cibi, aut succi multitudo aut ventriculo, aut vasis contineri: vnde periculum sit, ne prius, quam per maturam concoctionem vtilis fiat, in omnes animantis partes rapiatur, & quoniam meatus expurgat, & excrementa expellit, præstat eam ante cibos adhiberi: quandoquidem impura corpora quo magis nutries, eo magis lædes, ex quibus perspicuum est, tempus ad exercitationem commodissimum esse, cum hesternus cibus duplici cōcoctione, & ea quæ in vetriculo, & ea quæ in vasis sit, prorsus sit confectus, atque concoctus: & alterius cibi sumendi tempus iam instet. quod si aut prius, aut posterius exercitatio ne vteris, aut crudis humoribus hominem implebis, aut pallidæ bilis prouentum augebis. huiusce autem temporis notæ est, vrinæ color, quæ enim aquæ speciem præfert, crudum adhuc esse in venis indicat eum succum, qui à ventriculo submittitur: quæ vero rufa biliosaquæ est, iandudum huiusmodi succum concoctum esse: quæ modice pallat, peractæ modò secundæ concoctionis est signum. eo igitur tempore adeunda exercitatio est, sed expulsis prius excrementis, quæ vel in vesica, vel inferioribus intestinis continentur, periculum enim est, ne quid ex his in habitum corporis rapiatur, correptum videlicet vi caloris, quem accendit exercitatio.

De frictione preparante.

Cap. 13.

Ergo si quis posita iam veste, protinus ad valentiores motus prius accedat, quam totum corpus molliatur, & excrementa extenuentur, & meatus laxentur, periculum est ne aliqua solidarum partium rumpatur, aut conuellatur. pericu-

lum præterea est, ne excrementa impetu spiritus impulsâ, meatibus obstruant. Vt igitur hæc non fiant, oportet linteo corpus mediocriter fricando prius calefacere, mox oleo fricare. neque enim protinus accedendum ad pingue censeo, antequâ cutis incaluerit, & meatus laxentur, &, vt vno verbo dicam, quam præparatum corpus sit ad oleum suscipiendum. huic rei satis omnino sunt pauci manuum circumactus. qui nullo compressu sint graues, & modice celeres: vt corpus citra compressum calefaciant. siquidẽ his peractis, cernere licebit floridum ruborem per totam cutim diffundi, ac tum quidem pingue inducendum, & nudum manibus fricandum, quæ mediũ inter molle, durumque, modum seruent: ne corpus coactum, constrictumque, neque vltra, quam par est, laxum, resolutumque reddatur: sed in sua natura conseruetur. Fricandum vero primo contrectatu blandius, inde sensim augendum: eatenus aucta semper ad valentius frictione, quoad iam carnem manifeste premat, ne tamen contundatur. non tamen tam validâ frictione diu vtendum est, sed semel aut bis in quaque parte: quandoquidem nõ eo fricatur ad hunc modum pueri corpus, vt duretur, cum id iam ad labores producimus: sed quoad actiones excitetur, & robur colligatur, & raritas, quæ mollem frictione consequuta est, constringatur. siquidem in medio temperamento seruari huius corpus oportet: nec vsquâ durum, siccumque reddi, ne aliqua ratione naturale eius incrementum inhibeatur. & progressu temporis, quando iam nobis sit factus adolescens, tunc & durior frictione vtetur & præterea frigida post exercitationes luatione. Variæ autem ex manuum iniectione, circumactumque frictiones esse debent: nec superne modo deorsum, aut inferne sursum adhibite, sed etiam tum in subiectum, tum in obliquũ, tum in transversum, tum in subtransuersum. quo vniuersæ, quoad fieri potest, musculorum fibræ ex omni parte fricentur. Domus autem in qua obeũda exercitatio est, nec calidior, nec frigidior esse debet: vt corpus absoluta temperie tempore frictionis perfruatur, nam si calidior, aut frigidior sit, quam oporteat, fiet vt in calidior corpore sudet priusquam satis fuerit emollitum: in frigidior vero, neque prorsus calefiat, neque vnquâ probe mollescat: neque ruborem floridum ostendat, neque in tumorem extollatur. hæc enim sunt in aëris temperie, & statu corporis temperato moderatæ frictionis signa.

Dege

De generibus exercitationum, deque earum facultate.

Cap. 14.

Commune omnium exercitationum illud est, ut animanti caloris incrementum ex ipsis excitetur. singularum vero exercitationum hæc sunt propria. valens, hoc est, quæ violenter sine velocitate exercetur, musculis & nervis robur parat: cuius modi sunt, fodere, & quatuor simul equos habentis coercere, aut onere maximo sublato, aut manere eodē in loco, aut paululum procedere, acclives quoque inambulationes huius generis sunt: & si quis per funem manibus apprehensum scadat, atque etiam si quis comprimat digitos, pugnumque faciat, aut diducat, & manum dilatat, vel in sublime attollat, & ita diutius permaneat: & adhibitum quempiam deducere sibi manus iubeat, nec tamen ipse remittat. id quoque magis fiet, si quis summis manibus apprehenso pondere (cuiusmodi sunt, qui in palæstra alteres nominantur) manus porrigat, aut in sublime erigat, sed in palæstra sexcentæ aliæ sunt huius generis valentes exercitationes: quarum omnium peritiam simul, atque usum exercitor callet, qui sic est diversus à gymnaste, sicut à medico coquus. quæ ergo valentes exercitationes sint iam dictum est: nunc vero ad eas perueniendum est, quæ celeritate, citra robur ac violentiam, peraguntur. eiusmodi sunt cursus, & umbratilis armorum exercitatio: & cum duo summis manibus inter se concertant. atque etiam quæ per follē, & parvam pilam fit exercitatio, est talis. eius quoque generis est quod *ἑκπλερίων*, & *πενταρίων* dicunt. est autē *ἑκπλερίων*, cū in plethro, hoc est, sexta parte stadij quis prorsum, retrorsumque vicissim, idque sæpe, in vtranque partem sine flexu cursitat: vno quoque cursu breue quiddam de spatio demit, quoad denique in vnico gressu consistat. *πενταρίων* vero si quis summis pedibus ingrediens, tensas in sublime manus, hanc antrorsum, illam retrorsum celerrime moueat. Celeres motus, sed non violenti sunt, qui in palæstra eduntur, nobis, vel solis, vel cum aliis humi celeriter circumuolutis, licet autem & erectis, tum circumactis, ac velociter prope adstantē mutatis celerē peragere exercitationē: sæpe etiā cruribus retro tantū resiliēdo, interim vero in ateriora vtrūque erus singulatim referēdo, quin & per magnā exercitatione celeri tantūde valēte vti quispiam etiā citra alteres potest, si vtrique frequen-

L I B E R

tiæ, celeritatique motus earum impêse incumbat, siue has in pugnum ductas, siue explicatas mauis. ac eiusmodi quidem celeris exercitatio est in quibus dixi, speciebus comprehensa. Ad vehementem autem veniendum est. ea enim ex valenti & celeri composita est: quando quas valentes diximus, iis omnibus vt vehementibus vti possumus, motus celeritate adiecta. non in postremis autem vehementes hæ sunt, fodere, discum mittere, saltare, idque continuato opere sine intermissione. similiter quoque graue aliquod telum iaculari, ictus maxime continuado: aut graui armatura testû celeriter agitare. hæc igitur omnia exercitationum sunt genera: & præterea ex eis aliæ magis lûbos, quam brachia vel crura exercent: aliæ spinam, aut thoracem solum, aut pulmonê. quippe incessus, cursusque, propriæ crurum exercitationes sunt: extremarum manuum concertatio, & vmbra armorum pugna, brachiorum. lumborum vero, assidue se inclinare, ac rursus reuocare. thoracis vero & pulmonis, maxime respirationes, propriæ exercitationes sunt: quemadmodum præter iam dicta, maxima vox omnium vocis instrumentorum. ex motibus igitur alij animantibus ex se ipsis insunt, de quibus ante diximus, alij extrinsecus adueniunt, qui nauigando, equitando, aut gestando siue vehiculo, siue lectulo pendente, siue cunis agitatatis præstantur, siue per vlnas nutricum in infantibus. extrinsecus etiam aduenientium frictio sit. nonnulli tamen motus plane mixti sunt, qualis est equitatio. non enim vt in vehiculis, ita etiam, cum equo insideas, accidit, vt à gestate tantû agiteris, ipse nihil facias, sed & spinam erectam sustinere, & vtrisque feminibus equi costis firmiter inhaerere, & crura extendere, & etiam ante prospicere oportet, quo in genere & aspectus exercetur, & collum laborat, & viscera agitantur. sed æque etiam dimouentur viscera iis qui saliant: verum iis qui vehiculo gestantur, non æque, quare si quis viscera, quæ sub septo transuerso sunt, mouere violentius velit, & prædictos labores adeat, & præterea ad frictionem, quæ per circumiectam fasciam administratur, accedat. Sane concutiunt etiam nonnihil viscera, quæ sub septo sunt, maximæ respirationes & voces: sicut etiam efflatus. tam vero ipsa spiritus retentio, exercitatio quedam musculorum est, non minus eorum qui in abdomine, quam eorum qui in thorace insunt. atque hi quidem sunt motus, qui nobis extrinsecus adueniunt.

Quomodo

Quomodo aduenda sit exercitatio. Cap. 15.

Eruat se adolescens, vbi in lotio, vti diximus, perfecta con-
coctio videatur: mox fricetur mediocriter. docebit id color
floridus in summa cute residens, & artuum flexibilitas, atque
ad omnem motum habilitas. postea vero exerceatur, dum &
corpus intumescit, & color illi floridus apparet, & motus a-
lacriter, æquabiliter, & concinne edit. inter hæc vero sudorẽ
cum calido vapore commissum cernes. inhibenda vero tum
primũ exercitatio est, cum aliquod horum fuerit immutatũ.
quippe si paulo contractior corporis moles videbitur, ilico
cessandum est, nam si ultra quid progrediatur, etiam boni
quippiam educetur: atque ita tum gracilius corpus fiet, tum
aridius, atque ad incrementum minus habile. Simili quoque
modo, si coloris gratia euanescat, cessandum est: quoniam si
adhuc exerceas, frigidum corpus efficies, & nimirum exhau-
ries. Iam vero si motuum alacritas, æquabilitas, vel concinni-
tas remitti quippiam, collabi quẽ cernitur, utique statim desi-
nere oportet: itidem, si in sudore accidat vlla qualitatis eius,
quantitatĩve mutatio, quippe quem & magis copiosum sem-
per, & magis incalentem edi par est, prout motus vehemen-
tiores fiant. cum igitur is aut minor, aut frigidior redditur,
tũ scito corpus exhauriri, refrigerari quẽ, & sicari plus iusto.
quam ob rem animum diligenter attendere exercitando cor-
pori debemus, vt cum dictarum iam notarum quælibet appa-
reat, protinus cesset, nec tamen protinus mittendum est ad la-
uandum: sed summam intentionem exercitationis remittere,
sistere quẽ iubebitur, si quẽ velit spiritus cohibitione implere
ilia, perfundi oleo, atque apothera pia deinceps vti debet:
quæ genere duplex est, altera ceu pars exercitationis, altera
eius species. ac de ea quidem, quæ ceu species est, postea di-
cemus.

De apothera pia frictione. Cap. 16.

Nunc autẽ de ea, quæ vt pars exercitationis habetur, dicẽ-
dũ est. Omnis exercitationis probe peractę postrema pars a-
pothera pia dicitur, duplex eius est scopus, vt excrementa pur-
get, & corpus a lassitudine tutũ cõseruet. prior vero, est etiam
tori exercitationi communis: quando ei quoque duo omni-
no esse proposita diximus, vt solidas animalis partes firmet,

L I B E R

& excrementa expurget. proprius autem apothera-
piæ si-
pus est, ut lassitudinē, quæ succedere immodicæ exercitati-
ni solet, submoueat, atque prohibeat, qualis autem adhiben-
da sit, ipsa finium, ad quos tendimus, natura demonstrabit.
nam quoniam propositum est, ut solidarum animalis partiū
excrementa, quæcunque exalta, attenuataque per exerci-
tationem, in corpore adhuc manent, prorsus eiciantur, & fri-
ctiones quæ per alios cum celeritate administrantur, addideri
oportebit. & plurium manibus fricandum, quo nulla cor-
poris pars nuda relinquatur, & cum his una tum ipsarū, quæ
fricantur, partium tensionem, tum etiam spiritus cohibiti-
onem, oleum quoque fricando corpori largiter erit circunfun-
dendum. id enim ad velocitatem simul & molliē cum fri-
ctione conducit. & alioqui aliud non mediocriter commodum
secum affert: quando & quæ tensa sunt, remittit, & quæ ex ve-
hementiore actione fatigata sunt, emollit. media igitur esto
mollis duræque, quæ eadem mediocris est. perficietur autem
fricantis manibus valenter iniectis ita, ut earum compressio
proxime ad duram frictionem accedat: cæterum pinguedinis
copia, & velocitate mouendi eatenus remissis, ut plane me-
diocris euadat. porro tendendas, dum fricantur, partes cense-
mus, ut quicquid inter cutem & subiectam carnem excremen-
torum residet, id per cutim expellatur. & ob hanc etiam cau-
sam non exigua portio apothera-
piæ est, spiritus detentio &
cohibitio: quæ quidem efficitur tensis omnibus thoracis mus-
culis, iis vero, qui sub septo & abdomine sunt, remissis, qua
sane ratione excrementa deorsum ferentur. secundo autem
loco censenda est ea, quæ mediocriter eos musculos, qui in
abdomine sunt, tendit: quo videlicet ea quæ sub septo sunt,
viscera apothera-
piæ fructum sentiant. His ipsis de causis eti-
am fasciarum circumactis fiant, tendente se ad singulas
eo qui fricatur, non tamen cum omnibus pariter se verten-
te: cum neque continuos motus, nec vehementes ei con-
tingere ex apothera-
pia conueniat: sed certe aliquot, & qui-
bus per intervalla frictiones sint interpositæ. itaque tum se-
pe reuoluatur, tum sæpe hoc ipso tempore progymnastem
mutet. sæpe ipse à tergo gymnastæ incumbens, atque vtrun-
que crus per vices ei circumplectens, idque cum tensione ali-
qua non vigente, ab aliis qui cōmode cōtrectēt, fricetur, hac
enim vel præcipue ratione & calorē, qui exercēdo adauctus
est,

est, seruauerit, & excrementa propriis ipsius tum tensionibus, tum motibus eiecerit, ad quam rem conficiendam, spiritus quoque cohibitio non parū videtur conducere. quin etiam inter ipsas exercitationes, spiritus cohibitionem interponunt optimi gymnastę: sicut etiam, quam supra diximus, apotheraپی debitam frictionem: simul etiam cessando, cum homo lassari incipit: simul cutis meatus paulatim expurgando: quo scilicet perspirabile purumque corpus ad subsequentes labores sit: cum alioqui verēdum sit, ne siquid tale gymnasta prouiderit, obstruat potius meatus, quam expurget. nam vehementiores materierum motus diuersis temporibus & rationibus cōtrarias edere actiones possunt. obstruere autem, cum crassum simul ac multum fuerit, quod cōfertim ac p̄ceptis agitur: purgare vero, cum exiguum, tenuēque est, nec p̄p̄propere, nec violenter cogitur simul omne expelli. ob has igitur causas, qui etiam in medijs laboribus apotheraپی vtuntur, potissimumque in iis, qui grauia, quę vocant, certamina exercent, laudo, atque commendo.

De propria frictione.

Cap. 17.

Frictio quandoque per se ipsa commodum aliquod corporibus nostris affert: quandoque vero iis, quę commodum afferunt, ministrare potest. ministrat autem in exercitationibus, preparans ad eas corpora: & item cum post eas adhibetur, ac prior quidem frictio p̄parās, posterior vero apotheraپی nominatur, de quibus supra verba fecimus. quę vero per se ipsa boni quid facit, ea soluendi, ligandi, carnem augendi, & minuēdi vim habet, vt dura corpus ligetur, molli soluatur, multa extenuetur, mediocri denique crassescat. quatuor enim hę genere differentię in quadruplici frictionum omnium facultate, atque vsu insunt. si quę medias harum, quę vna cum his intelligantur, annumeres, sex differentię omnes fient. Nā si dura ligādi, mollis soluēdi vim habet, corpora quę supra modum soluta sunt, ea duriter fricare oportet: quę cōstricta sunt, molliter, si modice se habeant, ea nec molliter, nec duriter, sed quatenus fieri potest, vtroq; extremo declinato, fricāda esse, perspicuū est. Quęadmodū vero in iis differentijs, quę in qualitate sunt, nō solū dura, mollisq; consistūt, sed etiā media: ita in iis quę in quātitate ver-

L I B E R

fantur, non solum multa & pauca. sed etiam media est. cum igitur duæ res sint toto genere disiunctæ, si modo id quod facit ab eo quod fit, genere distinguitur, frictiones ex eorum numero sunt, quæ faciunt: affectus vero, qui ab eis in corpore relinquuntur, ex iis quæ sunt. quare contrarietates quæque alias in genere frictionum, vt tum mollem & duram, tum multam & paucam: alias in affectibus, vt tum colligationem & solutionem corporum, tum gracilitatem & crassitudinem, necesse est constituamus, ac prior quidē affectuū contrarietas, ex priorē frictionū contrarietate nascitur: secunda non item. euenit enim in hac, vt gracilitas proueniat ex multa frictione: carnis incrementum ex mediocri: quippe cum pauca augendæ carni non sufficiat: propterea quod id quod carnis incrementum accepturum est, & sanguinis moderato accessu, & valida virtute indigeat: quorum vtrunque mediocris commode præstat frictio: pauca neutrum, nec abunde, nec satis. Hippocrates igitur reductis veluti in elementa simplicibus differentiis, vniuersam frictionum rationem absoluit: quemadmodum carnem satis adicias, quemadmodum detrahas, quemadmodum corpus mollias, & quemadmodum constringas. cum his vna protinus se promunt, tum mediæ earum opera, tum quæ per coniugationē faciunt. mediæ, cum neque ligare corpus, neque soluere, neque carnem augere, neque minuere studemus: per coniugationem vero fiunt, vt cum, verbi gratia, pariter colligare & carnem duram adicere volumus, frictionem duram vna cum mediocri quantitate adhibeamus: cum vero mollem, frictionem quoque mollem, & quantitate mediocrem administremus: & in aliis etiam coniugationibus ad proportionem. etenim tres differentiæ frictionum à qualitate sumptæ, tribus, quæ sumuntur à quantitate, coniunctæ, nouem coniugationes efficiunt. eas nos formula quadam describemus: in qua duorum versuum, qui superne pinguntur, priorē, qualitatum, secundum, esse quantitatum volo.

Qualitates. Quantitates.

	{	Pauca.
Dura.		Multa.
		Mediocris.

Mollis.	{	Pauca,
		Multa.
		Mediocris,
Mediocris.	{	Pauca.
		Multa.
		Mediocris.

De matutina fr̄ctione.

Cap. 18.

De matutina fr̄ctione in corpore tēperato ad hunc modum differendum est. si nihil sit, de quo queratur, certe superuacaneum erit, eum fricare: nisi si quando ingenti frigori occurrendum videtur. tum nāque veluti qui frigida sunt vsuri, sic fr̄ctione quoque hoc preparabimus. si vero lassitudinis sensus vllus appareat, tum vngēdus homo est, & molliter fricandus. simili quoque modo, si siccior iusto sit, oleo dulci vngendus est. (id enim sicca corpora humectat) fricandusque est, vt omnino parcissime, ita nec duriter, nec molliter: quippe cum succurrere digestionī in corpus, non cutis, carnisque habitum mutare, neque etiam quod in his continetur, quicquam per halitum digerere oporteat: quorum mollis vtrunque, dura alterum facit: siquidem hęc cutim densat, duratque: mollis vero per halitū digerit, ac corpus laxum, mollēque facit. Verum si cutis densitatem corrigere velis, ei quæ ex duris tum fr̄ctionibus tum pertractionibus, atque ex vehementi exercitatione, & multo puluere orta est, mollis fr̄ctio cum copioso & dulci oleo medetur: quæ vero ex frigore contracta est, eam primū fr̄ctione sicca & celeri, deinde cum oleo adhibito calfacientes, ad naturam suam redigemus. Laxitatem vero, quæ frequens balneum, mollēmque fr̄ctionem, & veneris vsum consecuta est, paucula fr̄ctione, primum quidem sicca, deinde cū oleo aliquo eorum quæ adstringunt, sanaueris. humiditatem vero, quæ nimix potioni successit, sicca fr̄ctio, & cum lintheo administrata, & cum manica, interdū etiam solis manibus, idque vel citra vllū pingue, vel cum eo plane exiguo corrigat. esto autem oleum hoc, quod per halitum euocet, & omni facultate adstringente vacans.

De vespertina fr̄ctione.

Cap. 19.

Atque ita quidem de matutina fr̄ctione. vespertina vero

L I B E R

iis utilis est, quos vel valida lassitudo premit, vel immodica siccitas male habet, vel quorum corpus ex alimento non nutritur. verū symptoma, cum corpus non nutritur, nūc seponatur vna cum aliis omnibus symptomatis, quæ post trahantur. in temperata vero natura, cum aut valida lassitudo, aut immodica siccitas corpus afficit, prandium minus esto: tum ab eo ad cenam longius tempus interponatur: plurimum quiescat: exiguum tamen quippiam inambulet, ut cibus recto motu cōcussus subsidat, melius etiam sit, si exonerare alium possit. His omnibus rite peractis, securus oleo duci fricabis: non multum tamen ventrem continges si secus facias, periculum est, ne & cibum deterius concoquat, & succus aliquis ex eo semicrudus in corpus digeratur, caputque turbetur, & stomachus subuertatur, optimum ergo fuerit, omnino ventrem non attingere. si vero in musculis ei vicinis, vel sensus aliquis lassitudinis, vel siccitas maior appareat, blande, & mediocriter vngi debebunt.

*De frictione, quæ ad febrim tollendam adhibetur,
ex libro Herodoti de auxiliis quæ fiunt.*

Cap. 20.

Frictiones quæ causa soluendæ febris adhibentur, hisce temporibus sunt administrandæ. conueniūt enim circa morbi statum, non omni quidem in parte, sed extrema, ut non longe à declinatione absit. in temporibus vero accessionū, primum in declinatione fieri debent. obseruandi tamen sunt, qui partes aliquas inflammationibus obsessas habent. nam si eę sint, dissolui febris nullo pacto poterit. quin obseruare etiā oportet spirandi difficultates, itēque sudores, qui sine ordine in toto corpore, aut vultu, & collo sese ostendunt. ergo quibus facta crisis est, in principio declinationis, estate, atque autumnō accommodate in loco temperato reclinabis, atque inibi paratum hydrelcū calidum, in quo aphronitru tōstū iniectū sit, habebis. frictio autem in iunioribus, & minoribus, à quatuor fiat: in iis vero, quorum ætas floret, quique maiores sunt, à sex administretur: ut alij brachia ad manus digitos vsque fricent, alij thoracem vsque ad inguina: alij deniq; crura vsq; ad pedes. effuso vero pingui aliquo, manus superne deorsum deducant ita, ut pars

omnis

omnis infricetur. deinde hominem prouum statuunt, ipsumque ad eandem proportionem fricent. ac principio quidem leui manu iniectione, lentaque utantur: deinde vero, celeri & comprimente: postremo vero, remissa, & que in omnibus primæ sit par atque similis. Iam vero etiam partes capitis, & ceruix adiuncto pingui contrectentur. Partes autem singule, in iunioribus centies, in florenti ætate ducenties fricentur: in iis, qui athletarum more vitam degunt, duplicandus est numerus.

Interim vero dum frictio administratur, si multa hilaritas addit, simulque febris sedetur, facilisque respiratio, & bonus color appareat, & pulsus magnitudo non ita multum sit imminuta, neque densus pulsus sit, & caro in tumore adiuncto rubore sit elata, tum numero frictionum aliquid debet accedere. at si iis qui fricantur, sudor prodeat, qui prius non apparebat, tum scire conuenit, recte progressam esse frictionem, & inde utilitatem ægrotanti fuisse allatam: & tamen eum secunda quoque experientia indigere, neque etiam, cum pares accessiones sunt, nihilque occurrit, quod sensus iudicio utile, aut noxiū sit, sed per se ipsæ impulsus capiunt, expectanda crisis est: nam ex secunda administratione perspicua utilitas apparebit. omnibus porro post frictionem, aquæ calidæ quod satis sit, dandum est, sique tempora remissionis adsint, posturbationem, quâ auxiliū hoc attulit, & post sedationem concussione alendus æger est, at in quibus nihil quicquam remittitur, eos perfectas remissiones expectando nutrimus, in mediis temporibus largū potum dantes, & præsertim iis, quos siccitas male habet. alimēta vero liquida & calida dāda sunt. Si hyems sit, ea quæ ad curationem pertinent, in loco calidiore fiant: oleoque aphronitrum misceatur, & vini decima pars indatur. In secundis vero frictionibus, si non laxentur, virēsque corporis validæ sint, & pulsus in propria magnitudine permaneāt, nec ulla turbatae respirationis nota videatur, à frictione resectos insidere oportet, atque perfundi: ut inde laxatis corporibus, simile quippiā iis quæ per sudores sunt, * post crisis perficiatur: atque utilitates magis variæ extent, nā vel manent in eodē statu, ut ante dixi, adiuti ad morbum discutiendū: vel typi in alterius generis formas trāseunt: vel intermissiones capiunt, vel sunt vehementiores, & eodē die cessant. sepe etiam tutas perseverantias inferunt, post quas la-

boriosus frictionum modus cauendus est : sed in primis frictionibus manendum, cum non procul finis conspiciatur. si vero intendas manuum iniectionem, neque ferant, vlcerisq; sensum tactus inuehat, à frictione desistendum. si vero fricando multum circa se calorem sentiant, idque semper, & maiore itidem malo afficiantur, adsit vero etiam aliquod symptoma implacidum: tunc à tali quoque auxilio abstinendū est, cum eis immensum calorem afferamus : & vt cætera adhiberi queant, tēpora remissionis expectabimus. si vero adhibita frictione in diuturnis & intermittētibus febribus accidat, vt continua & vehemens febris subsequatur, moueri & turbari non debemus, quasi res male cedat : quandoquidem inde statim æger recreabitur.

Iam vero frictionem quoque tollendæ febris causa adhibere debemus in iis, qui febres molles, & tepidas habēt, quę vel ab initio tales in eadem forma perstiterunt, vel ex vehementibus & difficilibus febribus declinantes, ad hæc magnitudines peruenerunt. quibus vero frictiones adhibendæ non sunt, discerni debent ex temporibus morbi, ne aliquid incommodi palam afferamus. quinetiam facta ægrotantis secum cōparatione, id discernetur. quam ob rem noxę, quę inuehuntur, spectandæ sunt. nām cum febres quę à frictionibus excitantur, vehementes sint, nec declinent, sciendum est, hoc auxilium non proficere. simili quoque modo, si segnes, & somnolentę per totum caloris tempus sint, lassumque corpus, respirationem densiorem, & pulsus exiguos, & obscuros, atque etiam frequentes reddant, tum frictionem male cedere iudicamus. sed & tremor, & conuulsio ex frictione intempestiua, & multa fiet : pariter etiam ex dolore inflammatio exorietur, carne in tota corporis mole intumescēte. His symptomatis animum diligenter attendere, & copiam remediorum paratam habere oportet.

*De inambulatione, ex 30. libro Antylli, de auxiliis
quæ fiunt.*

Cap. 21.

Deambulationis duo statuenda sunt genera, quorum alterum vt auxilium, alterum ad corporis recurationem adhibetur. deambulare igitur auxilij gratia cēsemus in affectionibus, quę capiti, itēque oculis, gurgulioni. & thoraci, præterquam in sputo sanguinis, contingunt. est vero etiam ma-

xime

xime utilis deambulatio stomacho humefcenti, dolenti, & in
 quo alimenta coalescunt, & corrumpuntur. efficax est etiam
 ad mulieres, quibus suppressæ sunt purgationes: & cum alius
 sistitur, & cibi supernatant, & vrina retinetur. nō mediocri-
 ter quoque coxendicis morbis prodest: & ad summam, om-
 nibus iis, in quibus necesse est, aut à superioribus partibus ad
 inferiores aliquid defluere, aut quæ ad inferiores partes pro-
 pensæ feruntur, excernenda sunt. Deambulatione vero apo-
 therapeuticæ utimur, cōfectis grauioribus exercitationibus,
 & post purgationes, quas medicamenta fecerint, & post su-
 blitionem oculorum, & post copiosum vomitum: & absolute,
 atque vno verbo, deambulatio apotherapeuticæ potest a-
 nimum remittere, spiritum commutare, & in ordinem addu-
 cere: & quæ distenta sunt, soluere, itémque thoracem purga-
 re, & vt facile respirationem edat, efficere: instrumenta que
 sensus roborare, & ventriculum firmare: & quod maximi re-
 fert, omnem affectionē quæ lassitudinis sensum affert, quæ-
 que perturbat, explicare, atque dissoluere. Ac deambulatio
 quidem quæ auxiliij causa suscipitur, & multa, & contenta es-
 se debet: tum, crura impariter mouenda, calcibúsque inceden-
 dum: tum pectoribus pedū cum poplitem contentione am-
 bulandum. ac initio quidem quiete, deinceps vero vehemen-
 tius: & rursus vicissim remittendum. quantitas autem ex vi-
 ribus iudicetur. Verum quæ recurandi causa initur, pauca, &
 placide administrata, & quieta, animi corporisque effusione
 coniuncta esse debet. ex quo fit, vt quietæ deambulationes
 imbecillioribus accommodatæ sint. eadem quoque conue-
 niunt iis, qui à cibo deambulationibus vtuntur, itémque iis,
 qui nuper è somno sunt experrecti, & qui ante maiores ex-
 citationes, ad eas incundas se deambulando præparant: &
 qui parte quauis dolent. robustæ vero deambulationes con-
 ueniunt valentioribus, perfrigeratis, quique spiritum ægre
 trahunt, languidumque vna etiam cum viribus habent. quí-
 que signiore sunt mole corporis, & qui carnem reficiunt, &
 conualescentibus. Quæ vero cum intentione crurum, aut
 calcibus incumbendo fiunt, capiti male affecto sunt accom-
 modatissimæ, itémque thoraci humidiori, & vtero cōuulso,
 & purgationi suppressæ, & cum partes infernæ ex alimento
 fructum non capiunt: & omnino, quibus materia sursum re-
 pit, & fertur. Non intentæ vero deambulationes placidis si-

L I B E R

similes sunt. atque ad eadem valent. quæ vero extremis digitis
pbeuntur, eas obseruatum est proprie lippientibus, & aluo
suppressæ vtiles esse: accliuës autem thoraci, qui spiritû exi-
guum ducat: idque ante cibum, & cum loco aliquarum ma-
iorum exercitationum iniungitur deambulatio. decliuës ve-
ro, cruribus laborem afferunt illæ quidem, sed tamen magis,
quam alię, materiam infra trahunt, cum eam à capite ad in-
feriores partes deducant. Inæquales vero vtiles sunt iis, qui
cito deambulando fatigantur. quæ in campo sũt, magis la-
boriosæ, quam hæ sunt: & magis etiam sunt accommodatę
ad spiritum, & ad corpus constituendum. quæ loco aspero
sunt, caput replent, quę in arena, & præsertim profunda, (est
enim hoc vnum genus exercitationis vehementissimæ) effi-
cacissimæ sunt ad omnes partes corporis firmandas, & po-
tentissimæ ad materiam è supernis ad infernas partes dedu-
cendam, quæ vero in terra molli sunt, proxime accedunt ad
eas, quę in arena sunt, quæ in pratis exercentur, blandissime
sunt, nihil omnino sensus tentant, nihil commouent, sed ta-
men caput implent, cum propter odoris suauitatem, tũ pro-
pter humiditatem, quę in eis inest. quæ vero in viis sũt, mi-
nore cum labore sunt, quam ex, quas in locis deambulatio-
nibus dicatis obimus. quæ vero habent inuolutiones, sunt
capiti noxiæ. Oblongæ vero, similes sunt iis, quæ in viis fi-
unt, quę vero in locis superioribus domus sunt, ceteris om-
nibus sunt anteponendæ. nam & vaporum, qui è terra effe-
runtur, sunt expertes, & aërem habent puriorem. atque ex eis
accommodatiores etiam sunt, quæ sunt in locis, quæ tabu-
lis sint strata. siquidem obsecundant, & caput leuant, & ma-
teriam deorsum trahunt. exigua deambulatio prodest iis, qui
fatigati sunt, quique post exercitationes loti non sunt: & iis,
quibus à cibo deambulationibus opus est: quibus grauitas est
in corpore. multa vero deambulatio iuuat eos, qui caput, aut
thoracem male affectum habent, & quibus infernæ corpo-
ris partes non nutriuntur: & qui in exercitationibus vehe-
mentiore motu egent. iam vero, quę prope mare sunt, sic-
candi & materiam attenuandi vim habent. at quæ circum
flumina, & stagna sunt, humectandi vim habent. verunta-
men quæ prope stagna sunt, deteriores censentur. quę vero
in mediterraneis sunt partibus, ex sunt aliis, quæ dictę sunt,
præstantiores: verum superantur ab iis, quæ prope mare o-
beunt.

beuntur. quę in rore fiunt, similes sunt iis, quę ad stagna fiunt. quę in locis auium volatu frequentatis fiunt, efficacissimę sunt ad euocandum per halitū, & ad leuandū: simili quoque modo eę, quę in sublimibus fiunt locis, at quę eavis locis, & speluncis (aër enim ibi intēperatus, & vitiosus inest) itēmque quę sub tecto fiunt, deteriores sunt iis, quę sub dio. valent enim ad replēdū vel maxime, si humili tecto casa sit munita. Quę loco ventis non perflato fiunt, valent ad euocandum per halitum, & ad excrementa dispergenda, itēmque remittunt, non feriunt, at ex iis, quę vento perflāte fiunt, quę sub Borea, tusses excitant, thoracem ledunt, stomachū dissolutum roborant, vires collabentes firmant, & sensuum integritatem afferunt: quę sub austro, caput replent, sensuum instrumenta hebetant, aluum molliunt, atque ad dissoluēdum valent, at quę Zephyris spirantibus fiunt, eę præstant ceteris omnibus, quę in vento fiunt, non habent enim Boreę insuauitates, cū eis mansuetudo simul atque iucunditas sit coniuncta, quę in apeliote fiunt, malę sunt: & feriūt. quę in Sole, effundunt, & caput implent, & inæqualitates gignūt. quę sub arboribus fiūt, meliores sunt iis, quę sub tecto, aër enim ventilatur, & redditur salubrior. eęque conuenientes arborū qualitibus, aut nocent corporibus, aut prosunt. quę vero cœlo sereno, leuant, per halitum euocant, attenuant, bonam respirationem, & mouendi facilitatem parant: quę nubilo, caput implent, grauitatem important, minúsque per halitum euocant, ac maturinę aluū molliunt: & segnitiam ē somno contractā dissolunt, spiritūsque attenuant. vespertinę vero ad somnum hominem præparant, & inflationes dispergunt.

De cursu, ex eodem Antylli libro. Cap. 22.

Quoniam cursus est deambulatio vehemens & concitata, ideo inter vehemētes exercitationes numeratur, est vero accommodatus hyberno tempore: itēmque æstate media. Vallet autem ad corpora calfacienda, appetitum reuocandum, & ad naturales actiones corroborandas, & stomachum firmandū, & defluxiones euocandas. etsi enim primū defluxiones videtur excitare, eas tamen postea cohibet & cōprimit. verum caput implet. In renū autem morbis, & seminis profluio, vt asseruatum quoddam auxilium, nos cursum adhibuimus, prodest ischiadicis: in quibus in cursus initio viz

moueri possunt, sed ubi in cursu sunt, ita properant, ut morbi propemodum obliti videantur. In iis vero, quorum viscera torquentur, & qui fungos esitarunt, & qui à scorpionibus icti sunt, nos cursum profuisse obseruauimus. ergo differentias, quæ ex qualitate, & quantitate sumuntur, & cæteras etiam generis eiusdem, ex iis intelligemus, quæ supra de ipsis deambulationibus dicta sunt nobis. at quæ non dixerimus, quæ quidem sunt perpauca, ea nunc persequemur. est ergo cursus quidam, qui recta ad anteriora fit, qui inde etiam nomen duxit: alius in posteriora, quem recursus vocant: alius in orbem, quem circuncisum nominant. ex quibus is, qui ad anteriora fit, ea præstat, quæ iâ diximus. at recursus in posteriora, is non celeriter initus, & capiti, & oculis, & tendinibus, & stomacho, & lumbis accommodatus est, atque utilis, idcirco non replet caput. porro incessus, qui pedibus in altum sublati fit, qui cogit, ut firmitus summis pedibus incumbendo homines vadant, ne concidant, materiam infra trahit. Cursus vero in orbem, thoraci, & cruribus accommodatus est: at capiti est alienus. Ergo cursus qui tecto corpore incuntur, ij carnem calfaciunt, & sudores mouent: qui non tecto corpore, non magnam illi quidem sudorum copiam eliciunt, veruntamen clam vehementer per halitum euocant: atque etiam corpora durant, & exsiccant.

De gestatione, eiusdem, ex eodem libro.

Cap. 23.

Aliæ exercitationes in motu corporis consistunt: gestatio vero media est inter motum, & situm partium corporis quiescentium. Cumque totum corpus ferendo moueatur, inde existit utilissima, & placidissima exercitatio, quæ ipsas itidem partes non minus, quam magnæ exercitationes, moueat. Omnis autem gestatio potest naturalem calorem augere, & materiæ multitudinem discutere, & habitum corporis firmare, & actiones stupidas excitare, & segnitiam præterea dissoluere: & corporis turbationem sedare, & iis, quos vigilie exercent, somnum conciliare: & contra etiam veteranosis & dissolutis reditum ad se, & vigilias parare. ac somnum quidem conciliat, excrementa, quæ à capite & stomacho delabuntur, per halitum digerendo: cum hæ partes sint vigiliarum causæ præcipuæ. at vigilias postea inducit, cor-
po-

poris tenorem ad se reuocando, & corroborando. Gestatio-
 nis autem differentias communes, in oratione, quæ de am-
 bulationibus habita est, exposuimus. propriæ vero sunt hæc.
 vna in lectica sit, quæ fulcra habeat lineis ab angulo ad an-
 gulum per pedes distincta, vel sit in sella: hæcque duplex est,
 vel sedentibus iis, qui gestantur, vel iacentibus, vel in vehicu-
 lo: vel in naui, ac in naui quidem, quæ aut ventis, aut remi-
 gibus impellatur. Gestationi quoque subiiciatur equitatio:
 quamuis nonnulli de ea priuatim loquantur. Ergo gestatio-
 ne, quæ in lectica sit, vtitur in febricitantibus, aut qui diu-
 turna imbecillitate laborant, quique elleborum sumpserunt.
 atque etiam dū vires reficiuntur, cum imbecilli adhuc homi-
 nes sunt, prodest: itémque vigilantibus, quique segnitie & pi-
 gritia quadā sunt oppressi, & iis, quibus caninum in modum
 appetitus est intentus, quippe quæ intentionem illā sedet. &
 iis, qui tarde alimentum conficiunt: & iis, qui alias obire ex-
 ercitationes nō possunt, eadem quoque proportionē, iis qui
 diuturno morbo impliciti sunt, utilis est. sed aliud genus,
 quod lectulo pensili sit, & ante, & post cibū prodest: alterum
 vero, post cibum est inutile. quo modo autem vti hac gesta-
 tione debeamus, explicatur à nobis, vbi de elleboro propi-
 nādo loquimur. In sella autem stratos gestamus eos, qui fe-
 brim habent, atque ex iis, lethargicos potius, & quos cata-
 phora virget, qui vero simplici, & permanenti, & diuturnā
 febris iactantur, si vires ferant, debet gestari quamplurimum:
 quandoquidem gestatio minus mouens corpora, quādoque
 febrim excitat. ergo in febricitantibus, qui ad integritatem
 perueniunt, vel quorum longa admodum remissio est, vel
 qui febribus tenentur longis, etiam si nō magna intervalla
 habeant, conuenit hæc gestatio. Qui febrim nō habet, in ca-
 thedra non lecta potius, quam lecta, gestandi sunt. temporā
 autem, & loca in quibus gestatione vtendum sit, & quibus
 modis fieri debeat, deambulationis tractatio nobis expo-
 suit. quæ autem in vehiculo sit, habet vim quādam amolien-
 di, commouendique morbos stables, & permanentes. quæ
 vero in nauibus sit, parū plerūque distinguitur ab ea, quæ in
 terra administratur: ac quæ trāquillo mari obitur, nō admo-
 dum magnam turbationem, neque concussionem afferit. ex
 quo fit, vt ferme accōmodata sit iis, quibus etiā gestatio per-
 currū conuenit: nisi quod hoc magis habet, quod in purgā-

to aëre, & in quo nō humidi vapores, sed sicci, & acres sint, efficitur: & ob eam ipsam causam est præstantior. Quæ vero per pontum fit, ventis nauim ferētibus, ea maxime varia est, & ex maxime contrariis constat. habet enim motum acutissimū, vehementissimum, & nequiquam cessantem, dum nauis à vento impellitur: estque mixtus ex securitate & timore: habetque facillimas, & celerrimas mutationes. ac tales quidem mutationes, omnem diuturnam morborum affectionem remouent. Commotio denique, quæ in nauigatione excitatur, vim habet elleboro leui, & albo persimilem.

De equitatione, ex eodem. Cap. 24.

Equitationis exiguus in ægrotantibus est vsus. nam si placide equus gradiatur, nihil magis quam lassitudinem, & præsertim inguinibus afferet: si vehementer impellatur, quamuis totum corpus laboriose concutiat, tamen aliquid utilitatis affert: siquidem magis, quam omnes aliæ exercitationes, corpus, & præsertim stomachum firmat: & sensuum instrumenta purgat, eaque reddit acutiora. sed thoraci exercitatio hæc est intensissima.

De gestatione, quæ in febribus conuenit, ex Herodoti libro de auxiliis quæ sunt. Cap. 25.

Gestationis, quæ in sella, aut cathedra fit, primus modus est, vt neque minus quinque stadiis, neque plus, quàm huius duplum, producat. qui modus sequenti etiā die erit obseruandus. à tertio vero die quinque stadia singulis diebus accedant vsque ad triginta stadia. qui vero longiore gestatione indigent, ij curru, qui manu ducatur, vtuntur: quos per triginta stadia mouere incipimus, deinde ea conduplicamus. qui in febribus vigilia premuntur, eos vsque dum somnum capiant, gestare oportet. quos vero dolor vexat, aut aliud tale symptoma exercet, gestandi sunt, donec id quod eos infestat, amoueatur. gestatio vero, quæ lecto pensili fit, numero quidem non facile definiri potest, quanta esse debeat: verū consequi ratione debemus, tanto tempore vtendū ea esse, quanto quispiam in sella perlatus quadraginta stadiorū iter conficeret. qui vero in bigis gestantur, à stadiis triginta aut quadraginta ducentes initiū, vsque ad spatium altero tanto maius progredi debent. quibus maiore mensura opus est, sunt qui

qui equitare consueverunt. in quibus equitatio quoque anteponenda est, utpote eorum naturæ accommodatior, & habita etiam consuetudinis ratione. Qui denique nauibus gestantur, à sexaginta stadiis incipiant, & in duplum horum definant.

De cricilasia, ex quarto libro Antilli, de auxiliis quæ fiunt.
Cap. 26.

Hæc exercitatio intenta corpora mollire potest, & quæ loco stabiliri non possunt, tum reuolutionibus, tum vero etiam figurarum corporis varietate sic parare, ut facile flectantur, & stabiliantur, neruósque imbecillos firmare, & laxare, & calorem excitare, & intelligentiam, quæ deflexit de via, & atrabili agitur, ad statum suum reuocare. sit autem crici diameter minor, quam sit hominis longitudo, ut eius altitudo ad mammas usque perueniat. neque impellatur per longitudinem, sed etiam errando. esto autem ferreus auriga, qui ansam ligneam habeat. nonnulli tamen tenues cricos rotæ adiectos superuacaneos esse putauerunt. veruntamen non ita se res habet: sed stridor ex eis ortus hilaritatem, & voluptatem animæ parit. In initio autem rectos impellere cricos oportet. ubi autem corpus incaluerit, atque inane sit factum, tunc exiliendum, & discurrendum. sub fine vero, iterum recti impellendi sunt, ut statum, quem exercitatio parauit, tueamur. tempus autem accommodatum est ante cibum, aut balneum, ut etiam in aliis magnis exercitationibus obseruatur.

De natatione, eiusdem, ex eodem libro.
Cap. 27.

Pauci diuturni morbi sunt, in quibus apta sit natatio. & perraro etiam adhibetur. ac æstate solū ea utimur. potestque gracilem reddere, per halitum euocare, firmare, calefacere, attenuare, hominem iniuriæ minus obnoxium facere. quæ ergo in mari fit, ea hydropibus, scabiosis, & quos exanthemata infestos habent, itemque elephantia sin patientibus, & quorum crura, aut aliquæ aliæ corporis partes defluxione tentantur, accommodata est. facit quoque ad eos, qui ex alimento fructum non sentiunt, hisque qui in morbo exagitantur. Capiti vero nocet non solum quæ in mari, sed etiam quæ ybique fit. quæ vero in dulcibus aquis, egre & imbecilliter

in ij

L I B E R

prædictas res potest. quâ ob rem vitanda plerunque est. nam si quis in ea diutius immoretur, ei nervi cum propter frigus, tum propter humiditatem lædentur, at quæ fit in calidis spon- te nascentibus, incômoda est, quippe quæ impleat. Sed multa magis fugienda natatio est, quæ ex calefacta aqua constat. Quin etiam siue in marina, siue in alia aqua natare quis vo- luerit, debet is prius moderate vixisse, & frictione præ- calsecisse corpus, & è vestigio in aquam se proiicere.

De palæstra. Cap. 18.

Palæstra vehemens firmum & validum spiritum efficit, item- que corpus solidum, & musculosum. nervos etiam confirmat, & sensus exacuit, & naturales actiones corroborat. Carnem densam illam quidem & excitatam, sed tamen ex omni par- te paucam adiecit. pinguedinem, omnia œdemata, tumores, aquam intercutem dissolvit. thoraci aliena est. at placida pa- læstra, vice versa carnem multam comparat, ex quo fit, ut iis qui reficere se incipiunt, sit superiore accommodatior. Præ- terea erecta palæstra capiti prodest, & thoraci, & nervos cor- roborat: quæ vero super pavimento fit, lumbos, genua, præ- cordia, & intestina vitata adiuuat: sed capiti est ineptior.

De vmbatili certamine, ex eodem libro eiusdem.

Cap. 29.

Vmbatilis pugna valet ad sedandam affectionem lassitu- dinis sensum referentem, & ad humeros firmâdos, & ad ner- uorum imbecillitatem, & ad tremorem corrigendum. quin- etiam materiam infra deducit, & præsertim in iis, qui sum- mis pedibus pugiles imitantur. Est etiam utilis renibus, colo- intestino, atque vitiis quæ thoraci solent accidere. oportet autem non solum manibus cum vmbra depugnare, sed etiam cruribus: ac interdum tanquam salientes, interdum vero tan- quam calcibus cædentes.

De gesticulatione, ex eodem libro. Cap. 30.

Inter choream, & vmbatilem pugnam media interiecta est gesticulatio, sed ad vmbatilem pugnam propius accedit: estque ad eadem utilis, ad quæ pugna vmbatilis est: sed hæc pueris, mulieribus, senibus, & quorum corpus mirum in mo- dum gracile atque imbecillum est, magis conuenit: siquidem
utilis

utilis, & accommodata eis est exercitatio.

De exiliendo, & saltando, ex eodem libro.

Cap. 31.

Differt exilire à saltando. nā exilire est cursui simile, cum eodem in loco corpus manet, poplites inflectendo, & circumuehendo: saltus vero est ferme crurum continuus. his similis est saltus, quo Lacœnæ mulieres ad nates saltando prisci temporibus utebantur. saltabant enim circumflexis cruribus ita, vt calcibus nates attingerent: quandoque cruribus alternatim inflexis, vt calcibus nates peterent: quandoque vero vtrisque, vno & eodem tempore. Exilire vero accommodatum est diuturnis morbis capitis, thoraci, materiæ, quæ ad partes superiores propensa fertur, cruribus imbecillis, sese non alentibus, excarnibus, stupidis, & tremulis. Saltus vero magis, quam si quis exiliat, materiâ infra ducit: sed quia thoracem concurrit, ideo eius affectionibus nō conuenit, veruntamen & ad motum, & ad actiones promptum corpus valde reddit. saltatio vero ad nates caput purgat, & siccatur: euocat etiam menstruas mulierū purgationes: & fœtus nimium adherentes expellit, quemadmodum Hippocrates in libro de natura pueruli scriptum reliquit. secundas quoque retentas deicit: & vterum qui supra se contraxit, in suum locum trahit: & hæmorrhoidas itidem prouocat.

De pila, ex eodem libro.

Cap. 32.

Exercitatio, quæ ex pila existit, promptiores ad motum reddit eos, qui in ea se exercent: & vitales actiones roborat. Est autem in ea differentia, quæ ex pilæ differentia oritur. nā alia parua est, magna alia, & media alia: atque alia iuste magnitudinis, alia denique inanis & vacua. paruæ pilæ magnitudinis sunt tria genera: & ex vnoquoque genere vna existit exercitatio. quædam enim valde parua est: qui in ea exercentur, corpore maxime elato ludunt, & colludentes manus manibus proxime admovent. hæcque exercitatio cruribus aptissima est, siquidem vna cum intentione crurum administratur. utilis est etiā dorso, & costis pullulantibus: itēque brachiis. carnem quoque solidā reddit. Alia pila est paulo maior, qua etiam homines vtuntur: & cubitos cubitis ludendo immiscunt: nec corporibus mutuo herent, nec annuunt: sed

m. iij

L I B E R

variis modis mouetur, & propter varios pilæ ictus atque motus huc, atque illuc digrediuntur. atque hæc pilæ exercitatio præstantissima est: & quod corpus sanum, & præoptum ad motus cum robore cōiuncto præstat, & quod aspectum firmat, nec caput replet. Tertia vero pila, quæ his maior est, distans inter se homines ludunt, sed in ea stataria pars est, & motoria, qui manent, pilam emittunt cum vehementia, & continuitate: brachiaque, & oculi iuuantur. in motoria vero & brachia, & oculi pariter iuuantur: sed cruribus etiam propter cursum, & spinæ propter inflexiones, quæ currendo fiunt, commodum accedit. atque hæc quidem de parua pila sufficiant. Exercitatio autem, quæ à magna pila oritur non modo à superioribus differt ex pilæ magnitudine, sed etiam ex manuum figura. nam in superioribus omnibus summæ manus super humiliores humeris tenentur, in hac vero, capite altiores. & idcirco ille quoque excitatur in hac exercitatione, atque discutitur. quandoque etiam summis pedibus vadunt, ut manus altius extollant, quandoque etiam saltant, cum pila supra eos fertur. ita firmat totum corpus huiusmodi exercitatio, & capiti prodest, materiâ infra deducens. Quæ vero plus iusto magna pila est, brachia quidem in ea procienda firmat, & utraque etiam manu propter magnitudinem emittitur, sed plagas duras affert: eaque non modo egrotis, aut conualescentibus inutilis est, sed etiam bene valentibus. Inanis vero pila, cui etiam folliculo nomen est, æque exercet, ac motoria, in qua curritur: sed tamen non admodum facilis est neque apta, atque ideo omittenda est.

De pugillatorio felle, ex eodem libro.

Cap. 33.

Follis pugillatorius in corporibus imbecillioribus grano sicculno aut farina, in robustioribus, arena impletur. eius vero magnitudo ad vires corporis, & ad ætatem accommodetur. suspenditur autem in gymnasiis superne è culmine, tantumque à terra distat, ut fundum ad eius, qui exercetur, umbilicū pertineat. hunc utrisque manibus tenentes qui exercentur, primum quidem quiete, postea vero vehementius, gestant ita, ut ipsum recedentem consequantur, & iterum redeunti cedant violentia compulsi: postremo vero eum è manibus reiicientes emittunt: ut cum reuertitur, vehementius corpori aduentu suo occurrat. ad extremum vero in sedem suam sæpissime restituen-

restituendo dimittunt: vt ex congressu, si non valde aduertāt retrocedat. ex quo fit, vt quandoque manibus occurrant, dū propinquat, quandoque vero pectore, manibus passis, quandoque vero iis ad terga reuolutis. Potest igitur hoc exercitationis genus musculosum corpus reddere, & robur afferre. est quæ humeris, & toti corpori aptū: & propter plagas, quas infligit, omnibus visceribus idoneum.

De exercitatione, quæ halteribus contorquendis fit, ex eodem.
Cap. 34.

Halterum iaculatio, dura exercitatio est. Stomacho autem quem defluxio infestat, quique imbecillus est, & in quo cibus acefcit, & qui cum labore concoquit, est accommodata, & probe etiam humeros exercet. carnem creat: sed nec capiti, nec thoraci conuenit. differunt autem halteres inter se. nam vel separatim, mittuntur manibus extensis, & circumactis: vel tenentur solum in protensione manuum plerunque quiescentiū, & breui motu agitatariū: & iis ipsis, qui exercentur, introeuntibus, & eque ac pugiles, concutientibus: vel cum ij qui exercentur, manus ad spinam iaculando inflectunt. primum genus ea præstat, quæ diximus secundum vero, crura nervosque confirmat, & materiam deducit: tertium vero spinam. illaque iuuat, & mollit: sed caput pessime afficit.

De ingressu per loca sima, ex eodem libro.
Cap. 35.

Hoc exercitationis genus spiritum roborat: & corpori faciles flexiones parat: ac præsertim eam vim cruribus indit, ac simul etiam robur iis partibus, quæ mouentur, comparat. longum vero tenorem præparat, nervos conseruat, materiam deducit, & superiora excrementa ad suos meatus pellit. si vero etiam cum arteriarum firmitate adhibeatur, fiet vna è validissimis exercitationibus quæ inferiores, & superiores partes corporis æque fatigabit.

De armorum pugna, ex eodem libro.
Cap. 36.

Hæc exercitatio apud veteres non erat: non erat inquam inter eas, quæ ægrotatibus profunt: cum aliter se in armis veteres exercerēt. Romani vero hæc postea exercitationē inue-

m iij

nerunt: quæ primum quidem conducebat, vt ad bellum p̄a-
tiores essent. sed quam nunc instituimus, ad corpora fatigan-
da pertinet. ergo milites (hæc enim ad singulare certamē per-
tinet) armis indutis, vel contra aduersarios, vel contra colu-
mnā, tanquam contra aduersarium pugnant. hæc autem ex-
ercitatio potest corpus aptius ad motum, & ad carnem susci-
piendam reddere: veruntamen carnem mollem, laxamque fa-
cit. estque capiti noxia, tum quia mirum in modum à pileo
contegatur, & galea, tum quia pondere pressum labore. ma-
xima autem huius exercitationis professio, est & pollicitatio,
vt longam respirationem, & corporis firmitatem gignat, cum
ij, qui huic se dedunt, omnem aliam spiritus expulsionem fer-
re possint.

De rebus Venereis, Galeni.

Cap. 37.

Rerum Venerearū ex Epicuri sententia nullus est vsus sa-
lubris. re vera autem salubris est vsus, si tantum interualli in-
terponatur, vt neque resolutio vlla sentiat, & ipse homo se
ipso leuior factus, & melius etiā spirare videatur. tempus au-
tem ad vtendum oportunū est, cum corpus in exquisita om-
nium externarum circumstantiarum mediocritate sit consti-
tutum: vt neque nimis plenum sit, neque vacuum, neque ni-
mis perfrigeratum, neque supercalefactum, neque exsiccatum,
neque humectatum. si vero errare cōtingat, paruus sit error.
sed melius est, vt potius calefactum, quam perfrigeratum, &
plenum, quam vacuum, & humectatum, quam exsiccatum, ve-
neris rebus vtatur. Qui ergo imbecillas vires habent, ij à Ve-
neris vsu ad summam infirmitatem deueniunt. qui vero ro-
bustas, sed propter magnam pituitæ copiam morbo detinē-
tur: ideo patiuntur, quod humores plus iusto per halitū dige-
rātur. Innoxia enim Venus iis est, qui calidi, humidi que sunt,
qui que semine naturaliter abundant. Quinetiam corpus eo-
rum, qui firmas vires habent, Venus calefacit. at eorum, qui-
bus eadem imbecillæ sunt, protinus quidē calefacit, sed post
ea vehementer refrigerat. nonnulli enim sunt, quos protinus
à iuuentute cōcubitus imbecilliores efficit: nonnulli vero, nisi
coquant assidue capitis grauitate infestantur, cibos fastidiunt,
ac febribus obnoxij fiunt. atque vt deterius appetunt, ita e-
tiam minus concoquunt. Quosdam noui, qui cum huiusmo-
di natura essent, vt à coitu abstinere, torpidi, pigri que, ac
segnes

seignes facti sint: quosdam vero, qui melancholicorum more, præter modum mœsti, ac spei expertes euaserint: hæcque omnia statim Veneris usu sedata fuisse. Hæc igitur consideranti mihi, seminis retentio lædere magnopere videtur: & præsertim in iis, in quibus semen suapte natura deterioris succi est, & copiosius: & ipsi ociosam vitam degunt. quiq̃ue antea rebus Veneris frequentissime utebantur, postea vero affatim abstinuerunt. Qui vero firmiores, & iuuenes sunt, horum habitus corporis in raritatem potius, quam vires in imbecillitatem, mutatur, itaque corriguntur per ea, quæ cogunt, & contrahunt, qualis est præparans exercitatio. si vero etiam aliqua refrigeratio post Venerem corporibus adueniat, erit etiam exercitatione præparante ob eam causam utendum. quâdmodum ea calorem excitat. si vero anni tempus non dissuadeat, nec à frigido balneo abstinendum erit. Cibi copia quidem sint minores, qualitate vero humidiores, tum ut probe concoquantur, tum vero etiam, ut siccitas, quæ ex Venere contrahitur, corrigatur. debet vero nec frigidior temperata esse, sed vel media, vel calidior. nam quoniam corpus à Venere & laxius, & frigidius, & imbecillius, & siccius est affectum, debent plane quæ densent, & calfaciant, & vires reparent, adhiberi: atque ad hæc studium omne impendi.

De rebus Veneris, ex Rufo. in quo est etiam victus ratio. Cap. 38.

Omnino autem concubitus frigidius corpus efficiunt: at tamen minus laboris à muliere impenditur, quam à viro: atque ita etiam minus molestiæ mulieri accedit, nam vehementes sunt virorum concubitus, & ideo maior itidem labor in concumbendo ab eis adhibetur. qui etiam erectis hominibus fiunt, maiorem lassitudinem afferunt: atque illi etiâ sunt huiusmodi, qui post satietatem ineuntur, itémque post ebrietatem. qui ante cibum fiunt, faciles quidem ac celerrimi sunt, sed nescio quid imbecillitatis inuehant. seminis vero interceptiones, quæ in medio concubitu fiunt, renibus, & vesicæ sunt pessimæ. Verum non omnino pessimæ sunt res Veneræ, si & tempus opportunum, & modum velis animaduvertere. Ex eis ergo hæc extant commoda: plenitudinem euacuant, corpus agile reddunt, ad incrementum promouent, & magis virile efficiunt, animo vero id præstant, ut impeditam vim ratio-

L I B E R

nis explicent: iramque nimiam cohibeant. ideo fit, vt melancholicis, si quid aliud, accommodatissimo sint remedio, quicūque etiam alio insanix genere laborant, & nonnullos etiam comitiales sanauerunt, facta in pubertatis tempore mutatione: itēque nonnullos, qui capitis grauitatem, aut dolorem patiebātur, sanitati restituerunt. Hippocrates autem vno verbo res Venereas morbis, quos pituita gignit, accommodatissimas esse pronunciauit. multi enim, qui ex morbo non alebantur, ad cibum facile sumendum redierant. alij, cum prius ægre spiritum ducerent, facile spirantes euaserunt. quidam, cum cibos fastidirent, ad eos capiendos promptiores sunt facti. alij à continuis pollutionibus, quæ in somnis fiebant, sunt liberati, quæ res minus afferre noxæ existimatur: sed mihi quidem non videtur: quippe quæ dissolutum corpus in somnis, adhuc magis dissoluunt. Atque hæc quidē sunt primæ huiusce orationis partes à nobis expositæ. Naturæ autem Veneri idoneæ sunt calidæ atque humidæ: victus vero ratio calidior & humidior: ac tale etiā anni tempus: atque ætas. ac tempus quidē, ver: ætas vero, iuuetus. victus vero multo quā alij ad res venereas accommodatiores est, qui sit calidior, atq; humidior. minime autē ad eas facit victus siccās & refrigerās, atq; ætas senilis, & autumnus: & natura, quæ his sit maxime similis. atq; ita oratio mea finē eū est cōsequuta, quæ initio proposuerā. Nunc vero rationes victus ad cōcubitum accommodatæ, & curationes adhibendæ iis quivireb⁹ Venereis nō possunt, sese offerūt. diætā ergo calida & humida instituēda est: labores quoq; moderati esse debēt: & cibi facile deduci: quod est totius diætæ caput. Singuli autē labores sint cōtētaxe deambulationes, curs⁹ tardi, & quieti: equitationes neq; ad modū cōcitatae, neq; admodū multæ. nā in eis & lūbos, & testes fatigari vehemēt⁹ necesse est. ei vero, qui sit frigidior, itē quæ ei qui humidior, hæc & magis, & acrius faciēda sunt omnia. cum vero, qui siccior sit, in quiete continens, in statu opportuno constitues: quemadmodum autem prædicti labores moderati iuuant, ita etiam moderati concubitus conueniūt. nam & ad rem ipsa incitat, & consuetudine facilitatem afferunt: vt multi qui omiſsa consuetudine concubendi, non potuerint concumbere. alij vero ægre & magno labore * post ea concubuerint. adeo non solum oportet consequenti institutione corpus in suum statum redigere. labores autem his minus

minus cōueniunt, at palæstræ, & multæ frictiones, & gesti-
 culationes, & missilium iactus, valent quidē ad robur com-
 parandum, sed in alias partes potius alimentum perducunt.
 Venus, siquid aliud, alimēti exuberantiā exigit. ergo miseria
 & abstinentia nemo cōuenienter vtetur, at potu atque pascu
 vtetur. potui autē cōueniunt vina fulua, quippe quæ omniū
 sunt moderatissima: neque per vesicam adeo permeant, sicut
 alba: neque sicca & crassa sunt, veluti nigra. eadem sunt ca-
 piti maxime idonea, & facillime concoquuntur: quibus om-
 nibus est opus. panes apti sunt, puri, furno decocti: siquidem
 humidiores sunt cæteris. obsonia sunt carnes hœdorum,
 agnorum, suū, gallinarum, gallorum gallinaceorum, attagenū,
 perdiciū, anserū, anatumque. nā hę omnes alunt maxime. ex
 piscibus idonei sunt polypodes. excitare enim Venerem hi
 mirū in modū existimatur. quicūque etiā mollē carnē habēt,
 sunt accommodati, inter olera, orminū, erysimū, eruca, & rapa
 ad hoc faciunt: quę etiam medicamenti vicē gerunt. ē legu-
 minibus faba, cicer, eruilia, phaseli, & pisi, quod flatu cor-
 pus impleāt, & quod copiose alant, conueniūt: veluti ruta,
 quia flatu discutit, ac propellit, ita cōmiscendi corporis li-
 bidinē obtundit, ac discutit. Vuas ego in hac diætā magno-
 pere cōmendo. nam & humiditate præstant, & breui tēpo-
 re probe subducuntur, & probe etiā nutriūt: & humanū san-
 guinē replent flatu, qui maximo impetu ad Venerē impel-
 lit. Iam vero accommodatum etiam huic loco est, vt quæ tē-
 pora sint rebus Venereis idonea, perscrutemur. ne quid in
 hac tractatione desiderari possē videatur. Ergo tempora in
 omnibus multa sunt, prout quisque est paratus: sed summa
 est, vt recētes satietates & ebrietates vitentur: quia post has
 nullus alius cōuenit labor, fames quoque cauēda est. verun-
 tamē magis salutariter eo tēpore concūbitur, quā cū quis se
 expleuerit, sed imbecillius corpus redditur, fugiendæ quoque
 cruditates sunt. idcirco concubitus qui media nocte sunt,
 periculosi sunt, si cibo nondum confecto exerceantur. eius-
 modi sunt ij, qui sub aurora sunt, cum fortasse cruda adhuc
 sint ea, quę ventriculo continentur: & quia neque excre-
 menta, neque vrinas homines emisierint, neque aluus de-
 iecerit: ac concumbere cum excrementis, est malum. ante
 vero exercitationes, & balnea, minus periculosum est. ei ve-
 ro qui cōsueua munia obiturus sit, imbecillitatē parit. opti-
 me ergo concūbet à cibo, qui ad satietatē non sit ingestus.

L I B E R

nam hoc & ad vires confert: & ita refrigerationes, quæ sub-
sequi solent, minus contingunt. Inde vero, si cui post pran-
dium rerum venerearum pruritus excitetur, cessandum est
donec alimentum ex multo somno constiterit. si post cenā,
ante dormire oportet: siquidem hæc maxima cessatio est. Ac
natura quoque videtur ratione quadam id efficere, vt pri-
mum eo tempore maxime ad venerem impellat, postea vero
id quod superfluit, quam quod ei aptum & æquale est, ac-
commodatius excernat. quod cum medici animaduertent,
in filiorum procreatione admonent, virum qui comederit,
& epulis & conuiuio exceptus fuerit: mulierem vero, quæ
parcius sit educata, debere commisceri. causa est, quoniā vir
dare, accipere vero mulier debet. Sed ad hæc quæ diximus,
aliæ quoque affectiones corporis sunt examinandæ. etenim
post labores, prauum est concumbere. & tamen existimant
nonnulli solui concubitu labores, sed non recte sentiunt:
cum imbecillitas non sit laborum remediū, & tamen calo-
re neruorum, qui in lumbis sunt, vim quādam afferunt. ergo
vitandæ sunt lassitudines, itēque vomitus, qui paulo post
sint erupturi, quique paulo ante præcesserint: itēque pur-
gationes, & alui fluxus recentes. nam inueteratos quando-
que Venus exsiccat, habenda quoque ratio est omnium mor-
borum thoracem obsidentiū, aut quos obsessuros esse suspi-
camur: & vitiorum, quibus nerui affliguntur. quā ob rem
vehementes cupiditates ego nequiquam laudo: sed censeo,
tunc magis esse à concubitu abstinendum, idque tum in a-
liis, tum vel maxime in iis, quorum vesica & renes aliquo
morbo vexantur: & quos morbus comitialis, aut infania in-
festos habet: nam vbi morbi accessuri sunt, tum vehementes
impetus excitantur. Optimum autem est, vt tum quisque
rebus venereis vtatur, vt cum prompto animo atque expe-
dito concubitum expetat, tunc etiam corpus eò feratur. de-
cet enim animum dominari, corpus vero obedire. non sunt
hæ opiniones, sed prouidentię naturę, quę euacuationis in-
diger: vt etiam cæteras animantes facere decet. diætæ igitur,
quibus assuescere debemus, sunt huiusmodi. quibus cogni-
tis, poterit quispiam remedia facile inuenire, quæ iis, qui cō-
cumbere non possunt, adhibeantur. nam Corinthius qui ad
nos venit, se quidem magna corporis commiscendi libidi-
ne teneri dixit, sed in concubitu semen non emitte, statū
vero

verò multū efflare. in hoc cōiectura cōsequutus sum, ex sic-
citate malum existere: id quod indicauit curatio. nam cum
primum victu humido ali cœpit, statim semen emisit. Iuue-
nis vero Milesius, qui annum forte natus erat secundum &
vigesimalum, aiebat se in concubitu emittere genituram non
posse, at in somno magnam eius copiam excerni. is mihi
visus est ob multam humidam perfrictionem non posse cō-
cumbendo foueri, & cal fieri, in somno vero nimium cale-
fieri, quatenus somni id præstant, vt interiora calefiant, &
exteriora perfrigerentur: ideo labores ei satis fuerunt ad cu-
rationem, equitatio scilicet: medicamentum vero, testiculus
Castoris epotus: reliqua denique victus ratio omnis, sicca
& calida.

FINIS SEXTI LIBRI.

ORIBASII MEDICI-
NALIVM COLLE-
CTORVM,
LIBER SEPTIMVS.

*Quæ corporum affectiones euacuationis indigeant,
ex Galeno. Cap. 1.*



Um plenitudo duobus modis fiat, atque di-
catur, vno cum ad vires, altero cum ad ca-
pacitatem vasorum humores continentiu
refertur, vtrique opus est euacuatione, siue
in ægrotante homine, siue sano fiat. quē-
admodum enim qui onus gestat, non pro-
tinus simulatque grauatur, & fatigatur, iam cecidit, & ab eo
est victus: ita etiam, vbi vires à plenitudine grauantur, fieri
potest, vt homo nondum ægrotet. siquidem nonnulli, qui
consueta adhuc munera obeunt, sentire se aiunt graues, pi-
gros, segnes, atque ita, vt egre moueantur, eaque plenitudo
est, quæ ad vires pertinet: veluti cum post exercitationes tē-
di videantur, non parua nota est alterius plenitudinis, quam

nōnulli κατὰ τὸ ἵγχυμα vocant, quia in humoribus per vasa infusis consistit, atque intelligitur. sensus autem vlceris speciem referens, in toto corpore proueniens, ac præcipue in motionibus, mali succi est soboles, atq; progenies: qui quidem plerisque consuetas etiamnum actiones obeuntibus aduenire conspicitur, quandoque autem in quibusdam corporis partibus, non in tota mole, apparēt indicia affectionum, quæ in illis partibus sunt, similium iis, quas in toto corpore consistere dictū sit. ac quandoque solum caput grauari sentiunt, aut quendam vlceris sensum habere, aut musculos temporum intendi, idque aut simpliciter, aut cum maiore calore coniuncto. sic quoque in iecore, liene, ventre, costis, & septo transuerso grauitatē sæpe sentimus. Simili quoque modo in ore ventriculi, aut grauitatem, aut absurdum aliquem sensum percipimus. ad hæc, dolores in parte quadam infixi, vel ob humorum copiam, quæ confertim ingruit, vel ob spiritum flatuosum, euacuationem indicant: quemadmodum etiā faciunt, qui ab acri humore partem exedente, atque erodente excitantur. Sunt etiam qui ab intemperie nascantur: & ex iis quidam ab ea sola citra humores, alij vero cum humoribus. ergo in his omnibus, quæ dicta sunt, infestantium humorum, aut vaporū euacuationes ab his affectionibus hominem liberant. non prorsus tamen venam secare opus est: sed satis est tum purgare, tum fricare, tum lauare, tum aliquo medicamēto vti, quod per halitum euocet. Deinceps igitur quænam affectiones venæ sectione iuuentur, exponamus.

Quæ affectiones venæ sectione indigeant. Cap. 2.

Qui consueta munia adhuc obeunt, sed princeps aliqua pars, aut totū corpus in eis grauatur, aut tenditur, iis necessaria est euacuatio. Si vero per ætatē neque pueri adhuc sint, nec iā senes, consiliū de secāda vena inibis: habita tamē præcipue ratione primarū intētionū, hoc est, quātitatis, qualitatisque plenitudinis, & roboris aut imbecillitatis viriū: deinceps vero naturalis totius corporis habitus, itēque anni temporis, regionis, & vitæ ante actę: tum vtrum copia esculentorū, poculentorūque, & præsertim valentis materię, qui ita affectus est, se expleuerit. & quibus motibus vel cōsuetis, vel nō cōsuetis, se mouerit: quāsq; excretionibus habuerit, aut præter consuetudinem compescuerit: ad hæc autem omnia.

omnia, nō gracilior, aut crassior sit effectus. Sane vtriusque plenitudinis quantitas ex propriorum signorum magnitudine dignoscetur. quanto enim grauior sibi homo videtur, perspicuū est, plenitudinē quoad vires tantū auctam esse. eodemque modo, quantū tensionis sensus auctus fuerit, tantū quoque auctā esse alteram plenitudinem, quam à quibusdā κατὰ τὸ ἔχχυμα vocari diximus. Vtriusque vero plenitudinis qualitatem partim ex colore cognosces, memor colorē humorum esse, siquidē modice totum corpus à calore, frigoreque externo affectum fuerit: partim vero ex iis, quæ naturæ humorū sunt coniuncta. frigidiores enim, frigidior totius corporis sensus sequitur: calidiores, calidior: humores vero, qui in venis aceruantur, tumor & vasorum distētio: eos qui in carne, sensus in ea aut grauitatis aut tensionis, sicut etiam caliditatis, aut frigiditatis consequitur. porro facultatū nos dispensantium infirmitates ac robur propriis actionibus iudicantur. ac voluntariæ quidem in neruis, & horum principio cerebro. pulsantes vero in arteriis & corde. ex facultate vero, qua bona nutritio fit, aut color bonus, aut malus, tertia facultas, quæ nutritrix est, quam à iecore proficisci ostēdimus, cognitionem sortitur. vbi ergo adsint plenitudinis signa, & facultates valentes fuerint, tum si videlicet affectio tensionis sensum referat, nihil præterea attendens, venā incidēs: ac multo etiam magis, si sensum referat inflammationis. Si vero infesta plenitudo grauans sit, non semper sanguinis est facienda detractio. contingit enim, vt crudus humor in corpore sit collectus, in quo diligenter est aduertendum, quantum vires robustæ sint, & quantū humor ipse sit refrigeratus. etenim exolutæ ab huiusmodi affectionibus vires, adhibita sanguinis missione in extremū recidere malum solent: vt restitui postea nullo modo possint. quod vbi factū est, periculū nō mediocre consequitur. ac præsertim si febris accedat statu æstiuo, stomacho male affecto, & toto corpore molli suapte natura, & tēperie humido, huiusmodi enim homines per halitū digerūtur, & celerrime animo languuntur, etiā si nō magna febris inuadat. Si vero nihil horum sit, ceterū hyems sit, regione natura frigida, atq; hominis natura frigidior, iis & totū corpus venę sectione grauiter refrigeratur, & nōnulla etiam symptomata accidunt, quæ ex graui refrigeratione cōsequuntur. quā ob rem qui ita affecti sunt,

L I B E R

hos venę sectione vacuare non conuenit : sed frictionibus,
& vnctionibus mediocriter calfacientibus, & potionibus
humorum crassitudinem incidentibus, & modice calefaciē-
tibus. nā quę vehementer calfaciunt, ea tum vires dissoluūt,
tum etiam febres adaugent. Quicunque autem sanguine per
sputum reiecto, nunc quidem curati sunt illi quidem, sed eā
habent structuram in partibus thoracis, atque pulmonis, vt
si vel paulo plusculum sanguinis colligatur, protinus aut
vasis alicuius osculum referetur. aut vas ipsum rumpatur, iis
etiam si nondum vllum in corpore syniptoma extet, tamen
ineunte vere sanguis mittendus est: simili quoque modo iis,
qui facile in comitiale morbum, vel apoplexiam cadunt,
eodēque modo si alicui alij morbo obnoxium hominem
cognouerimus, vt peripneumonix, pleuritidis, aut anginę,
melius est prius venam secare, quam expectare, vt aliquod
euidens symptoma plenitudinis appareat. Ad eundem mo-
dum, si hæmorrhoides retentę sint, & præsertim illi magis
melancholici videantur. omnibus etiam, quos singulis an-
nis morbi, qui ex plenitudine oriuntur, in æstate solent ex-
ercere, inæunte vere mittendus sanguis est: id quod etiam fa-
ciendum est in iis, qui eiusmodi morbis verno tēpore cor-
ripiuntur. Homines enim experientia edocti sunt non à se
ipsi solum, sed à iumentis, vtile esse, vt priusquam æstas in-
cipiat, sub finem veris sanguinem mittāt, memores à quibus
morbis capi soleant, cum repente calida æstas adueniat. ea
enim & sanguinem plus protendit, & fundit, & tanquā e-
bullitionem quandam eius parat ita, vt tunc non amplius
in venis tanquam moderatus contineatur, sed vel eas rum-
pat, vel erodat. si quę immoderatio in partem quampiam
irrumpat, aut inflammationem, aut erysipelas, aut talē quē-
piam morbum gignat. etenim cum multo plures, tum vero
etiam maiores, quam sint morbi plethorici, ex humorum fu-
sione progignuntur. Quidam autem sunt oculis imbecillio-
ribus, qui affectionibus, quę scotomaticę nominantur, fa-
cile corripiuntur, quos etiam initio veris euacuare oportet.
prius tamen considerandum est nobis, quid in eis acerve-
tur: si quidem nonnulli amarę bilis succum copiosius, quam
reliquos, colligunt: nonnulli melancholicū, aut pituitosum:
nonnulli vero ex æquo omnes coaceruant: in quibus abun-
dare sanguis dicitur. hos ergo omnes vacuabis, sicut etiam
poda-

podagricos, & arthricos initio veris. idque aut medicamē-
to purgante, aut venæ sectione. Porro venæ sectio nō solū
cum plenitudo est, eaque siue ad vires, siue ad vasorum, qui-
bus succi continentur, amplitudinem pertineat, sed etiam si
plenitudo nulla sit, magnopere prodest initio inflāmati-
onis, quæ vel ex plaga, vel ex dolore, vel ex partium infirmitate
oriatur. Si quoque magnus morbus expectetur, sanguis om-
nino mittendus est: etiā si plenitudinis signa nulla adsint, ha-
bita tamen ratione ætatis, anni temporis, & virium. Itaque
tria sunt, quæ agnitionem continent, morbi magnitudo aut
præsens, aut imminēs: robur viriū: ætas omnis præter pueri-
lem atque senilem. qui scopi satis sunt ad venæ sectionem
indicandā. neque enim vbi tanta crudorum humorū copia
accumulata est, vt secandam venā prohibeat, ratio reprehē-
ditur: quia iis viriū robur non adest: hocque indicio est, nō
posse eos sanguinis ferre missionem, cum vna cum totius
corporis colore, qui ita sit redactus, vt non indicet abundan-
re sanguinem, pulsus quoque in vehementia & magnitudi-
ne inæqualis est, imbecilibus & paruis in ipsa inæqualitate
exuperantibus. Nunc vero de vtriusque plenitudinis notis
consideremus: an vbi ex in homine solita munia obeunte
apparuerint, mittendus illi omnino sit sanguis, an id neces-
sarium non sit, vbi nulla magni morbi fuerit expectatio.
Quid vero ego in hac re sentiam, nostis: cum sæpe adfueris-
tis, cum sanguinis missionem suaderē vel podagricis, vel ar-
ticulorū dolore laborantibus, vel morbo comitiali vexatis,
vel melancholicis, vel iis, qui sanguinem prius expuissent, aut
thoracis structurā sortiti essent ad aliquod tale nialum con-
trahendū idoneam: aut scotomaticis, aut qui angina conti-
nuo corripentur, aut pulmonis, & iecoris vitiis essent ob-
noxij: aut vehementes lippitudines paterentur: aut, vt vno
verbo dicam, aliquo magno morbo præmerentur. nam in
his omnibus censeo missionem sanguinis necessarium esse
remedium: quæ statim post viriū atque ætatis habitā ratio-
nem adhibeatur. quæ si quandoque non memorentur, sub-
audiendę tamen sunt. at qui nihil huiusmodi ante sunt pas-
si, omniumque corporis partium inculpatam structurā nacti
sunt, in eis duplicem me vacuationis rationem subiecisse
cognouistis: venę quidem sectione si in victu sint intempe-
rantes, sine venæ sectione autem, si temperato vivant. nam

& multa frictione, & balneis, & deambulationibus, atque aliis motionibus, & item vnctionibus in quibus digerendi vis inest, statim exhaurire plenitudinem licet: nisi forte crassus sanguinis redundantia tibi adesse videatur: talis enim maxime est melancholicus plerunque: raro vero crudorū, quos vocant, humorum. Cæterum in redundantia melancholici humoris, præstat venam incidere: aut certe vti medicamento atram bilem expurgante. at vbi crudi succi exuperant, antequam morbus incipiat, caute euacuabis: vbi vero febris iam accedit, vt ante dixi, nequaquam. erit vero indicio color eorum plumbeus, aut ex pallido albus: omniāque potius, quam ruber: itemque pulsū inæqualitas. Si vero etiam talis plenitudo multum excreuerit, tum & corporis quoque grauitas adest, & pigritia ad motus, & mentis tarditas, & sensus hebetudo. Contra vero, quibus cumulatus in corpore sanguis ex compressis hæmorrhoidibus sit, iis venam audacter incides, etiam si grauem antea morbum experti non fuerint. fieri enim potest, vt apti quidem ad aliquē huiusmodi morbum fuerint, verum ob hæmorrhoidum inanitionem nondum passi: si vero etiam aliquē in eis particulę vitiosam habere constructionem, & præsertim in thorace videantur, eis omnino venam celerrime secabis. Idem me sentire de mulieribus, quibus menstrua purgatio suppressa est, intellexisti. enimvero in eis non proroganda euacuatio: veruntamen venam scindere non est necesse, cum malleolorum scarificationes ei, quod superuacaneum est, euacuando satis esse possint: cum alioqui vim etiam quandam habeant mensum ciendorum, nõ secus quam veng in malleolis ac talis incisę plenitudines enim, quæ ex mensū retentione sunt ortæ, per crura vacuabis, siue secare venam, siue scarificare oporteat. Reuellere autem mulierum purgationes secta in cubito vena solet. nam quę candidiores sunt, tenuiorem acruare sanguinem consueverunt: iccirco à malleolorū scarificationibus maxime iuuantur. nigriores vero venam secando curato. si quidem eæ crassiores, ac magis melancholicum sanguinē coaceruant. quod magis etiam facies, si magnas habere venas videatur: id quod gracilioribus ac nigrioribus solet plerunque contingere, veluti carnosæ & candidis venæ insunt exiguæ: in quibus præstat malleolos scarificare, quam venā incidere: quippe cum hæ paruas in cruribus venas habeant:

vt

ut licet etiā rite secētur, quod iustū tamen sit, nō fluat. multē
 vero sanguinis copiam non parū habent, sed extreme sunt
 enues: alię contra, crassę, sed parum habent sanguinis. Ac
 mulierem quidem tenuissimam, cui iam octo mensibus sup-
 pressa menstrua purgatio fuerat, non modico sanguine de-
 trasto ad pristinum statum breuissimo tempore perduxī. pri-
 mo enim die sesquilibram, secundo libram, tertio non mul-
 to plus quam selibram detraxi. in hanc vero sententiam ad-
 ductus sum, cum eius venas eminentes conspicerem, quę san-
 guinis liuidi plenę videbantur. Ceterum, non contemnen-
 da est venę sectio, tanquam auxilium reuellens non sit, cum
 me persepe videritis in sanguinis ē naribus eruptione, cum
 ea vehemens sit, ea vsum protinus effluxionem sedauisse. Cō-
 uenit autem non vsque eo sanguinem educere, vt ad ex-
 tremum casum virium perueniatur, sed quoad iusta mensu-
 ra videatureducta, & prorumpentis sanguinis impetus vali-
 dus perseveret: venā in cubito secanda est.

De partita sanguinis missione.

Cap. 3.

Quibus multa euacuatione opus est, vires autem infirmę
 sunt, in iis partiri euacuationem prestat, vt cum parum san-
 guinis detraxerimus, iterum, ac, si lubet, tertio eūdem mitta-
 mus, quemadmodum me quoque fecisse in iis, in quibus cru-
 diorum humorum inerat copia, conspexiſtis. nam vbi parū
 sanguinis detraxi, protinus melicratum exhibeo probe co-
 ctum cum aliquo attenuanti medicamento, vtputa hyſſo-
 po, aut origano, & interdum etiam nepita, aut pulegio:
 aut certe cum melicrato oxymeli, aut oxyglycy: atque ita
 sanguinem iterum minuo, quandoque autem eodem die,
 quandoque verō postero, in quo rursus dato aliquo ex pre-
 dictis medicamentis, iterum aliquid sanguinis detraho: ac
 tertio die quoque idem facio, vbi aliquid similiter dederō.
 Verum vbi feruescentis sanguinis copia redundat, acutis-
 simam febrem accendens, euacuatio confertim facienda est,
 conādūmque est inanire, vsque ad animi defectionem, vi-
 rium robore diligenter inspecto: quemadmodum scio qui-
 busdā sex subinde heminas, aut postero, aut tertio, aut quar-
 to die fuisse detractas: quandoque etiam primo die, cum fe-
 bris in principio noctis, aut medio incepisset: probe autē cō-
 cocta fuissent, quę pridie comedissent. nonnullis vero, pri-

n ij

LIBER

die inæqualitatē, aut grauitatem, aut capitis, aut alterius cuiusdam partis dolorem sentire se querentibus, ac proinde parce comedentibus, vbi febris præcedente nocte inuasisset, memini me primo etiam die sanguinem detraxisse. nam in quibus copia feruentis sanguinis apparet, dato operam, vt cum quā celerrime vacues, prius quam in principem aliquā partem irruat. quam ob rem etiam de nocte venam incidere ne verearis. nam ita affectis ægrotis expedit, vsque ad animi defectionem, vt diximus, sanguinē mitti. Noui enim ex eis quosdam ex animi defectione necessario refrigeratos, & maioribus toto corpore affluentibus, & aluo citata, celeriter morbo liberatos. Præterea in maximis inflammationibus, & vehementissimis doloribus nullum maius remediū noui, quam vsque ad animi defectionem euacuare, adhibita distinctione, an sanguinem mittere, an purgare oporteat. Euacuandum autem est vsque ad animi defectionem, sed non omnem. neque enim intelligendum est de ea, quæ ægrotis ex timore contingit: neque de ea, quæ ex mordacibus succis os ventriculi obsidentibus oritur: cum tunc quoque animi defectionem ægroti pati soleant. verū talis animi defectio non est sufficiens mensura euacuationis: quæ contingit quandoque ante, quam conueniat: quemadmodum febricitantibus quoque sæpe vsu venit, vt inter surgendum, vel residendum animo linquantur. animi igitur defectio, quæ ratione euacuationis fit, sit mensura euacuationis in affectionibus antedictis. Mentem vero adhibere oportet, vtrum purgationem ferant, pulsus eorum contingendo, dū sanguis adhuc fluit: sicut in aliis omnibus, quibus sanguis mittitur, facere consueui: ne forte ignarus pro animi defectione mortem afferas.

De mensura euacuationis sanguinis. Cap. 4.

Sciendū est, dum propositi scopi huius præsidij augentur, maiorem euacuationē indicari: dum vero nō augentur, tantum detrahendū de sanguinis missione, quantum illi fuerint imminuti. Morbi autem magnitudo, & robur virium primi scopi erāt sanguinis detrahendi. quibus vtrisque scopis presentibus, perspicuum est, vt ante diximus, nullam esse crudorum humorum tantam, talēque plenitudinē, quæ inhibere hoc auxilium queat. deinde vero spectandum est, quæ
sit

fit naturalis hominis temperatura, nam quibus amplē venæ sunt, quique modice graciles sunt, nec albi, neque tenera carne, copiosius euacuabis: contrarios vero, parcius: quippe qui exiguum habeant sanguinem, & eorum caro facile per halitum digeratur. qua etiam ratione pueris non est secanda vena vsque ad quartumdecimum ætatis annum: post quem, si magna copia sanguinis congesta esse videatur, tempusque anni verum sit, regioque natura temperata, & puer sit natura bene sanguinea, sanguinem minues: id quod inulto etiam magis facies, si peripneumonix, aut anginx, aut pleuritidis, aut omnino alterius cuiusdam acuti, & vehementis morbi periculum imminet. primum autem detrahes vsque ad heminam, ad summum. Si vero tibi inspiciēti vires firmę permanere videbuntur, dimidium heminæ adicies, iterata missione: nosti enim vehementi pulsui cum æqualitate, tanquam minime fallaci virium robustarum signo semper adhibendam fidem, ex abundanti autē, & magno. itaque & septuagenariis, si dicti pulsus adsint, & affectio iubeat, venam secabis. quidā enim eius ætatis multū sanguinis habent, & vires itidem robustas: sicut alij sicci sunt, & pauci sanguinis, & facile nigrescentes quauis parte percussa. itaque non solū numero annorum animū adhibebis, sed etiam habitui corporis, nam sunt qui sexaginta annos solū nati, sanguinis missione non ferant. veruntamen minus his utique detrahes: quamuis eandem habere affectionem, quam florens corpus, videātur. Sed optimum fuerit, antequā vena secetur, hæc omnia considerare, & præsertim cum suppressę hemorrhoides sint, & muliebris retēta purgatio. etenim vbi incisa vena sanguis fluit, tum eius mutationi, & præsertim cum iam adest inflammatio, & tenori fluxionis non labascenti, potissimum autem pulsuum mutationi, tanquam indicio non mendaci, animū diligenter attendas oportet: & continuo cessandū est, cum pulsus immutatur, aut in magnitudine, aut quauis inequalitate. nam de mutatione in imbecillitatē quid attinet dicere? scis enim in hac qualitate certum fieri iudicium firmarum, & infirmarum viriū. In quibus autem prope sectam venam magna aliqua inflammatio est, in iis sanguinis & in colore, & in consistentia mutationem expectare est optimum, diuersus enim est sanguis, qui inest inflammationi, à naturali: quia nimis exalfectus est. nam si crudior erat prius, modo ru-

L I B E R

brior, & flauior efficitur. sin eiusmodi prius fuerat, ad nigrum adustione conuertitur. nam sanguinis mutatio signa est. aliquid ex inflammatione in venam secundam transsumptum fuisse: non tamen omni ex parte expectanda est mutatio: sed est quandoque, ut antequam mutatio appareat, cessandum sit. idque vel propter virium imbecillitatem, vel propter malignitatem inflammationis. interdum enim nihil ab ea emittitur. sed inibi vehementer est constrictus. Si tamen vires nondum exolui euacuatione videatur, id quod scies pulsus tangendo, & si is, cui sanguis mittitur, ætate florenti sit, expectanda mutatio est. potissimum vero, si aer ambiens sit temperatus. Duo enim hæc sunt, quibus præcipue dignoscitur, quantum hoc præsidio sit euacuandum: ægotatis inquam natura qualis sit, quam exquisitè cognoscere non possumus: & ambientis temperies qualis futura sit misso sanguine. nam cum is calor, quem febris affert, multum sanguinis digerit, & ægotus abstiniens viuit, alimentum ex sanguine cum breui tempore necessario destituit, atque interim vires exoluantur. Consumitur enim ob temperiæ ægotantis, si humida & calida sit, qualis est puerorum: ob aerem vero ambientem, si regio calida sit, & æstiuum tempus. proinde minus detrahimus, quâ affectio comonetur: habita ætatis ratione, in pueris: habitus corporis in cædidis, & quibus tenera caro est: temporis vero, sub cane, eadem quoque regionum & constitutionum est ratio. alio vero modo, ut etiam ante diximus, in contrariis, hoc est, frigidis temporibus, & regionibus largam euacuationem vitamus, propter refrigerationem consequentem. quapropter vnum in his singulis euacuationis modum scripto definire non possumus. noui enim quibus sex libræ sanguinis fuerint detractæ, & febrim protinus fuisse extinctam, nec vllum virium detrimentum esse consecutum. nonnullis vero sesquilibra non sine leui quadam virium noxa detrahi potuit: quibus si duas libras quis euacuasset, extreme læsisset. quamobrem scio me quandoque vnâ quoque librâ, & quandoque etiam minus, vtiliter detraxisse.

Quæ vena secunda sit.

Cap. 5.

Si venâ causâ reuulsionis feces è directo partium, ad quas sanguis fluit, perspicuam inde vtilitatem celeriter videbis: at si contra feces, nihil proderit. Ita affectio liene vena quæ est

est prope annularem sinistrae manus digitum incisa iuuat. nonnulli vero eam venam incidunt, quæ inter medium & annularem interiacet: & sanguinem fluere sinunt, donec ipse per se sistatur: lienemque iuuari aiunt: atque si venam internam cubiti secueris: sanguis enim è sinistra manu detractus lienem male affectum mirum in modum iuuat. præstat autem non semel extrahere quantum conueniat, sed in duos dies est facienda partitio. Quinetiam pleuriticis sanguinis missio è directo laborantis lateris adhibita, euidentissimam sæpe utilitatem attulit: quæ vero ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis spatium, ac sæpe etiam oculorum dolores grauissimos venæ sectio è directo facta intra horæ spatium sedauit. ergo in oculis laborantibus vena, quæ humeralis vocatur, quæque ex ea deriuata est, in cubito incisæ, perspicuam utilitatem celeriter afferunt: at dolente latere, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iccore, aut vetriculo, ea quæ per alas in cubiti iuncturam pertinet, maxime autem hæc ipsa interior secanda est. si secus, ea quæ ab ipsa diducta in flexu iuncturæ apparet: quam iandiu nostis ab humerali vena diductam esse, ipsamque contingere. Sunt enim hi tres modi sanguinis in cubito mittendi, interior, exterior, & medius. interior utilis est iis, quibus inferiores collo partes patiuntur: exterior iis, quibus affectæ sunt quæ illis sunt superiores, vt facies, & caput: medius vero locus interdum vtriusque venas diductas habet in vltiores partes brachij pertinentes: interdum vero celeriter in vnum inter se coeunt in flexu iuncturæ: ac nonnunquam earum alteram obscuram, claram alteram. Vbi ergo vena, quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad aliquam ex mediis accedas, da operâ, vt eam potius incidas, quæ à propria diducitur. quandoque etiam vsu venit, vt quæ inferiores sunt cubiti iunctura, quæ in vna sunt, eas nihil prohibeat incidere: vbi quæ in cubito sunt, non vtiq; appareant. & ex iis ipsis incidendæ sunt, quæ è directo partium affectarum sitæ sint. sanguinis ergo missio, quæ in brachio fit, recte quidem administrata nihil magni habet in se: at si in ea peccatum sit, triplex error cõsequitur, vt in media, neruus exiguus, in humerali neruus capitis musculus: in interiore vero, arteria venæ subiecta, simul etiam incidatur.

n. iij.

Cauendum esse, ne axillarem venam incidamus, si necessitas non urgeat, idque propter arteriam ei subiectam. Cap. 6.

Si quis autem alibi vnquam in vena secanda arteriā quoque secuit, hoc loco id contigit, ergo maxime cauendum est, ne eam incidamus: si vero necessitas id cogat efficere, duo hæc consideranda erunt, vt eam ligemus qua maxime parte pulsus arteriæ nobis indicat, quod vbi fecerimus, videamus, an locus vlla ex parte inflatur, si que inflatur, vinculum statim soluendum, & quod inflatum est, ad equalitatem redigendum, & iterum ligandum initio deligationis in primo loco, vbi arteria sub interius brachij caput est sita. conandumque est, vt venam inferius incidamus: quia eo in loco disiecta ab arteria est per venam mediam: cui nullum vas subicitur: sed neruus est, vt ante dixi, notabilis in medio flexu: quē ne tangamus, diligenter est animaduertendum.

Situs, & sectionem humeralis venæ omni ratione vacare periculo.

Venam autem humeralem secare omnibus modis sine periculo licet. & tamen quibusdam etiam ex huius sectione musculus sub radio constitutus indoluit: alios inflammatio subsequuta vexauit, & dolor diu perdurauit, veruntamen iis, qui sic affecti fuerint, vena nō vnico ictu fuit diuisa, sed cum primum fuisset aberratum, secundo, & tertio, & quandoque etiam quarto fuit percussa, quam ob rem cum musculi caput sæpe punctum fuisset, eiusmodi affectiones excitatæ sunt, at vnico ictu magna facta diuisione nec quisquam inflammatione correptus est, nec dolorem contraxit. quocirca hec est intrepide secanda: sed interior, caute admodum, & considerare. Conandum autem est in media incidenda, ne vbi neruus est situs, fiat sectio. Nunc vero quemadmodum prædictæ omnes partes secta cubiti vena, vt dictum est, iuuantur: ita etiam quæ inferiores sunt, iuuantur incisis iis, quæ in malleolis, & poplitibus insunt. prædictis autem inferiores sunt coxendix, vesica, atque vterus, renes ad vtrāque partem pertinent: siquidem inferiores sunt iis, quas prius diximus, superiores vero, quam eæ, quas secundo loco recensuimus, itaque missus ex cubito sanguis interdum eis prodest, vbi recens

inflam-

inflammatio sit, & sanguis redundet: quibus vero affectio inest, quam proprie nephritin vocant, venas poplitis, aut certe malleolorum secare conuenit. Vteri vero inflammationibus magis etiam quam renum, venis in crure sectis succurritur. nam euacuationes, quæ ex cubito fiunt, aliud etiam malum habent adiunctum: vt menstruas purgationes, sanguinem ad partes superiores corporis retrahendo, comprimant. at iis, quæ ex cruribus fiunt, hoc etiam inest, vt menses cieant. Memini vero me ischiadas, quæ non ex frigore, sed impletis sanguine, quæ in coxa sunt, venis exortæ essent, vno die facta ex cruribus euacuatione, curauisse. idcirco vena poplitis utilius ita affectis, quam malleolorum secatur: at scarificatio nihil eis perspicuo prodest. Vt autem summatim dicam, incipientes inflammationes reuellendo euacuandæ sunt: inueteratæ ex iis, si fieri potest, affectis partibus: si non queat, ex vicinis. in iis quæ incipiunt, auertendum est, quod influit: in inueteratis, id tantum quod affectæ parti infixum est, euacuandum. Id autem optime euacuabitur per venas cum iis coniunctas, quæ sunt in ipsis partibus. cui rationi subscribit etiam experientia. quocirca quæ in gutture, & arteria graui inflammatione affliguntur, in principio vena secta in cubito, post ipsum vero, in lingua egregie prodest, incisis videlicet ambabus venis, quæ in ea sunt. Sic quoque induratas inflammationum in oculis reliquias iuuat incisa vena, quæ ad magnum oculi angulum decurrit: vt etiâ capitis grauitates, & inueteratos eius ex plenitudine dolores leuare manifeste solet in fronte secta vena: at incipientes, aut vigentes iuuat per cucurbitulâ in ceruice facta reuulsio: eaque interdum per se, interdum cum scarificatione adhibita. ceterum prius euacuare totum corpus oportet. eadê quoque ratione incipientes in occipitio dolores, atque vigentes, vena frontis incisa iuuat. In quibus vero corporibus nulla adhuc particula affecta est, sed ineunte vere vacuationem anticipamus, in iis si quidem talis sit homo, qui quotannis æstiuo tempore morbis febrilibus obnoxius esse solitus sit, & euacuare studeamus id, quod materiam morbis suppeditat, omnis pars est ad detrahendum sanguinem accommodata: sicut etiam si arthriticus sit, qui omnibus articulis laboret. quibus vero pars aliqua præcipue infestetur, vbi prius euacuati non fuerint, non est ex quauis parte molienda vacuatio, sed sicut in

iis, qui pati iam incipiunt. quam ob rem podagricos ex cubito vacuabis, quos vero comitialis morbus, aut vertigo affligat, potius ex cruribus. si vero ad venæ sectiones propter suppressas hæmorrhoides peruenias, si cohibere eas velis, quæ in brachio sunt: si prouocare, quæ in cruribus sunt, venas secare oportet, at in quibus menses retinentur, semper in cruribus: siquidem ciere eos oporteat, accidit tamen aliquando, ut ex utero per erosionem sanguis erumpat: in quo non est idem curationis consilium: siquidem non effluere sanguinem volumus, ut in menstrua purgatione, sed plane sistere consilium est. Ego vero quandoque in aliqua simia dissecanda, neruum venæ mediæ in cubito subiectum, & rursus in alia, eundem prope venam ei parem similiter conspexi, quorum conspectus ut rarus est, ita utilis fuit ad tollendam calumniam medicorum, utpote neruum incidentium: quandoquidem post sectionem, statim illi quibus esset adhibita sectio, affectionē stupidā in brachij longitudine sentirent, quæ postea toto vitæ tēpore eos occuparet. ego vero iis, qui medicis id vitio verterēt, indicaui, propriā corporis fabricationē ita quandoque fieri. & hac ratione medicos dedecore liberaui.

Quod tempus sit vene secanda, & iteranda euacuationis.

Quibus euacuatione opus est, in iis est maturanda euacuatō: nisi quædam corruptio cibi in ventre concoquendi facta sit, aut tarda concoctio, aut etiam cibi in eo contineantur. verum quoniam sæpe quintus, aut sextus est ab initio dies, antequam nos ad curandum accersant, expediet tunc quoque sanguinem mittere, etiam si primum huius auxilij tempus sit omissum, quocunque enim die mittendi sanguinis scopos in ægrotante compereris, in eo auxilium hoc adhibeto, etiam si vigesimus à principio dies agatur. at quinnā scopi erant? morbus magnus, & viriū robur, puerili ætate excepta, & aëre nos ambiente valde calido. quoniam vero progressu temporis virtus in plerisque morbis exoluitur, ideo mittendi sanguinis occasio multitudine dierum aufertur: non quo primario dies hoc efficiant, sed per medium virium dissolutionis. itaque si quando vel secundo à principio die vires exolui videantur, à vena secanda utique abstinemus, in quacunque autem diei noctisque hora sanguinē mittes, si in febricitantibus scopū habeas, declinationem singularum

larum accessionū. quibus autem aut propter lippitudinē, aut aliud tale quippiam citra febrim hoc auxilio est opus, in iis magnitudinem doloris, aut inflammationis, aut totius affectionis, cui secta vena opus est, respicias, cūque nihil tale aut urgeat, aut prohibeat, præstat mane venam incidere: non statim è somno experrectis, sed circiter horæ spatium ante vigilantibus. quosdam lauare prius est melius: quosdā etiam prius deābulare. Cæterum in quibus vere ineunte venam incidere aggredimur, aut propter metum febris, aut alterius cuiuspiam affectionis, scio me sanguinem etiam quibusdam detraxisse, posteaquam rerum consuetarum aliquid cōsecissent. iteratæ autem detractionis tempus, in quibus simpliciter euacuare nobis propositum est, eodem die esto: in quibus autem reuellere, si duobus deinceps diebus fiat reuulsio, melius succedet.

Ex Amylli secundo libro de presidio euacuante, quenam vasa in corporū partibus sint secanda. Cap. 7.

Si à fronte sanguis auferendus sit, rectam in fronte venam secamus. in plurimis vero, in superioribus frontis partibus, & caluaria, vbi vena ad Y literæ similitudinem scinditur, sectio autem in parte inferiore ad ipsam venę scissionem est facienda. quæ vero in angulis oculorū sunt, prope supercilia, multo supra angulos incidimus. post aurem vero secanda est ea, quæ duræ parti auris est opposita. quæ sub lingua sunt, si non vtranque, at certe eam, quæ magnitudine excedit, dexterā vtique secamus. in brachio vero, eam quæ ex humero descendit: in manu, eā quæ inter mediū & annularem interiacet: in poplite, quæ maxime media est: in malleolis, interiorem: si quæ ante & post malleolos sint, eas quæ ante. sed propter vasorum exiguitatem non est sepe in nostra potestate, vt quod velimus, incidamus. porro in secandis cubiti venis, & quæ circa cubitum sunt, varia animaduersione est opus. hic etiā si minus in nobis sit, vt eligamus quā velimus, aut vna solum appareat, vel etiam si aliæ appareāt, sed accommodatius ex vna fiat euacuatio, dare operā debemus, vt ex ea sanguinem detrahāmus. si vero, vt natura fert, & in plerisque accommodatæ sunt tres, eæque sint perspicuæ, ea nimirum quæ supra est ad musculum, & media, & quæ ad brachij exortum est, cui etiam substrata est arteria, tūc quenam in aliquibus secāda sit, discernendū erit. nam in iis, qui

animo linquuntur, aut stomachus aliquo vitio affectus est, aut virium robur suspectum est, vena superior incidenda est. quibus confertim facta detractio, & cōcitata euacuatione est opus, media: at quibus mutatione in melius & diuersitate, inferior, ac superior quidem cauenda est in iis, qui musculos cōuersos & circumscriptos habent, & in quibus musculorū curuitas vasis incumbit, paulo supra flexum vena est incidenda. in gracilibus vitanda est inferioris incisio. & in quibus vena ipsa firma & valde magna est, metus enim est ne vires exoluatur, magna sectione adhibita. si vero fugientes, exiguam sectionē fecerimus, sanguis in grumos cōcrescet, & fient aneurismata, quæ satis longo tempore perdurant, sed postea sedantur, in valde pinguibus, si venter aliquis sectione venæ diutatur, vena superior incidenda est. nam & musculus humectus, qui supra est, plurimum à vase abductus est, & nervi plurimum ab hac parte sunt disuncti. quā ob rem etiam si quispiam profundissimam sectionem fecerit de industria, ad eos nō sit peruerturus. vena vero in omnibus semel absolute pinguedinis est expers, & detecta, & facile scinditur, & facile fluit. iam vero media quoque multum abest à nervis, qui sub ea sunt siti. sed ea in plerisque antequam ad flexum perueniat, in multas partes, aut saltem in duas scinditur: quarum altera supra, altera vero infra vergit. quocirca in venæ sectionibus, quæ tactu fieri dicuntur, sed coniectura fiunt, quibus venæ inciduntur, ij pati solent, quoniam enim in venarum scissione venæ ipsæ scissæ tenuissimæ sunt, & non apparent, ideo errores committuntur. ergo hæc vena non tundenda est, quin etiam alius quidam error in deligando brachio ad venam secandam committitur: vt cutis vehementer tensa in medio flexu, quia ad brachij musculum extenditur, opinionem sæpe vasis facit. quare hoc cauendum nobis est.

Quod tempus opportunum sit vena secande in singulis temporibus, ex Herodoti libro de præsidiis euacuantibus.

Cap. 8.

In singulis temporibus morborum, in principiis accessio-
num incommoda est venæ sectio: nisi magnum aliquod malū febricitates inuadat, vt suffocatio, aut conuulsio, aut exercians dolor. si vero nihil extrinsecus vrgeat, remissionis tempora sunt expectanda. si quæ longa interualla sint, in perfecta remissione

remissione venam secare conueniet. Vires enim robuste facilius euacuantia præsidia ferunt: & constant pro earum robore: & tantum non auxiliis manus præbent. quæ omnia in longa mutatione fiunt, at cum in accessionibus conciderint, auxiliis tantum indigent, quibus recreentur. si vero breue sit remissionis tempus, præueniendum erit, vt ne eam perfectâ expectemus: sed cum incipit remissio, secunda vena est: licebit enim nobis paulo interiecto tempore post detractionem, in remissione alere. & in febribus quandoque auferentia remedia adhibemus, addentia vero non item. sed absurdum est, vt alibi tempus in venæ secandæ tempore consumamus. Cumque inuasionis tempora elapsa statum faciant, ignota vero sint tempora statum suscipientia, propter inuasionem, eo tempore est facienda sectio. nam quod reliquum est sedabitur, cum vero ad remissionem currit inuasio, tunc inspiciendum est: cū vero eo peruenit, mouendū est, & præsertim hoc præsidio, at quorum continuus morbus est, nec discerni tempora possunt, idē est venæ secandæ, & cibi dandi tempus: vt paulo ante corporis recurationem sanguis detrahatur. si vero continentes febres sint, & aliquam accessionē perspicuam afferant, in qua accedentes in eadem magnitudine mancant, & ordinatas, aut inordinatas inuasiones faciant, diligentissime animaduertendum erit ne incrementibus inuasionibus detractiones moliamur: sed in temporibus inæquabilibus, quod etiam tempus ad cibum dandum erit accommodatum.

Antylli, quid ante venæ sectionem faciendum: ex secundo de vacuantibus præsiis libro.. Cap. 9.

Ante venæ sectionem ligandum est brachium robusto vinculo, quod habeat duorum digitorum latitudinem, aut paulo plus eo. in iis vero qui masculos brachiorum elatos, & circūscriptos habent, vinculū est inferius iniiciendū: ac præsertim si quibus venæ sectio adhibetur, sint oblongi: siquidē in eis interuallum longitudinis à musculo ad cubiti flexum satis magnum intercedit: in paruis autem, non multum. simili quoque modo iis, qui musculos contortos habent, superior constructio est inutilis. est enim paulo inferius medietate musculi facienda ligatio: ad finē musculi vinculo constituto. at in mulieribus, & qui musculos flaccidos habent, nihil prohibet medio musculo vinculum adhibere. sed si inferius, quā totus mu-

sculus sit, aut si in inferioribus eius partibus deligauerimus, licebit nobis valida admodum constrictione uti: quod tamen partibus, quæ constringuntur, non est utile: quandoquidem in constrictione & vasa occultiora fiunt, & obstupefcit manus, ac dolore conficitur. verum si in musculi medietate fiat constrictio, neutiquam premendum est: ac præsertim in mulieribus, & delicatis. compresso enim musculi ventre, persæpe in brachio hyposphagma oritur. nonnullis vero & erysipelas & abscessus consequuntur: in quo etiam videndum est, ne vinculum cutim inuertat cubiti: sed naturalem eius situm conferuet: ut cum ablatum fuerit, cutis in proprium locum secedens in causa sit, ne sanguis effluat: cum dissecta cutis in locum venę sectionis abeat, atque ita eam claudat. qui vero in vasorum non apparentium sectione infra cubitum constringunt, non recte faciunt. nunquam enim in villo mēbro vasa eleuata sunt ab inferiore cōstrictione. quin ne illi quidē, qui prius spōgiis vasa quæ in cubito sunt, fouent, quicquā profunt: quia non eleuantur, nisi adhibita cōstrictione. vbi vero sit facta deligatio, manus inter se fricandæ sunt: & aliquid manu tenendum. Quibus vero in fronte, aut angulis oculorum, aut sub lingua, aut secundum aures venæ secantur, vinculum est collo iniiciendum: & ægrotanti imperandū, ut dextram, aut sinistrā manum sub mento teneat: aut solum pollicem totum. atque ita laqueus digitis alligandus, & adstringendus. ita enim guttur non deficiet, & vtriusque partis vasa ad caput tensa eo compressu in superioribus partibus intumescent. in absurdis vero, aut languidis hominibus, minister adstans manum mento subiiciet, si à manu detrahare sanguinē velis, prius perfundenda est aqua calida, atque ita cum cōstrictione relaxanda. in malleolis vero constrictio supra genu in femore fiat: sanguisq̃ue, si fieri potest, in balneo detrahatur. vel ante fomenta adhibeantur. cūque fuerit aduota cōstri-ctio, laborans inambulet, cūque sit faciēda sectio, rectus super vnico crure consistat. idē fiat in venarum poplitis sectio- ne: & constrictio paulo supra poplitem adhibeatur.

Quomodo vena secanda sit, ex eodem

Cap. 10.

Venas incidimus quandoque pūctim quandoque cæsim. ac punctim quidem eas, quæ non apparent: cæsim vero eas, quæ valde in superficie cutis sunt fixæ. non totum au-tem

tem vas secandum est, nam auersis eius labiis fluxio non fit cum eiaculatione. sed neque etiam inferior vasis pars secanda est, verum superior. dico autem inferiorem, quæ ad brachij exortum infra vergit: superiorem verò, quæ ad radium. nam superiore parte incisa, decetior fit sanguinis iaculatio: at partibus inferioribus incisis, nihil iaculabitur.

Quando, qua magnitudine, quaque forma secanda vena sit, ex eodem libro. Cap. 11.

In iis, qui euacuatione confertim facta indigent, ampla incisio facienda est, at vbi sanguinis latione reuellere, atque auertere oporteat, quemadmodum vsu venit in iis qui sanguinem reieciunt, aut ora venarum aperta sunt, aut sanguis è naribus, aut alia parte quadam fluit, perexigua est facienda, eiusmodi enim cum ab ipsa affectione vacuantur, non iam euacuatione, sed retractione atque auersione indigēt. ex quo fit, vt sanguis multo tempore fluere ex vena debeat. præterea angusta sectio in paruis vasis est: itidem facienda: ampla in magnis. nam si quis in magno vase sectionem paruam faciat, sanguis necessario collectus concreset. Sunt autem tres incidendarum venarum figuræ. transuersa: recta, quæ non pungit venam, sed scindit: & harum media obliqua, ac transuersa quidem vtendum est, vbi iterationem nullo modo faciendam esse existimamus: curuato enim cubito statim conglutinetur. obliqua iterandæ sanguinis missioni apta est: quoniã in flexu cubiti non ita exquisitè labia sectionis componuntur. forma vero oblonga conuenit iis, in quibus non solum eodem die iteranda est sanguinis detractio, sed tertio etiã die, & quarto. siquidem cubito curuato labia sectionis à sese plurimum diducuntur.

Quid faciendum sit, vt sanguis facile fluat, ex eodem libro. Cap. 12.

Si fluxio sanguinis non procedat, quod violentior sit adhibita constrictio, remittenda ea est: si vero cute recurrente, vasis incisio sit abscondita ex contractu cutis supergressa, cubitus in omnes figuras erit constituendus ac voluendus, vt supinus, vt sublimis, vt extensus, vt denique contractus teneatur, donec in ea eadē figura consistat, vt vasis sectione contractus diuisione recte constituta, sanguis facile fluat. siq; parua

fit facta diuifio, iterum erit diuidenda. cum vero præ timore sanguis nõ fluit, accommodatius erit vt line ftrepitu effluat. ea enim turbatio fedatur fi non exiftiment, vlcera pafcentia non effe confeutura. Si animi defectio perturbet, ftatis & reclinatis sanguis mittetur: & ftomachus tum vomitibus, & digitorũ in os immiſſionibus vellicandus, tum odoramentis recreandus: fed & partes extremæ vinciendæ erunt fic, vt magna moleſtia afficiatur. fi vero cõcretio ſanguinis in grumos interturbet, impediaturque effluſionem, concretionem diſſoluere ambobus vtriuſque manus indicibus digitis oportebit: & comprimendo elidere atque exprimere: oleumque erit inſundendum, & multo etiam magis acetum: quod ſane habet grumos diſſoluendi poteſtatem. ſi perfrictio vetet, ne ſanguis exeat, eaque ſit vel propter aërem frigidum, vel quia morbus frigidus ſit, vt eſt comitialis, atque attonitus, & qui ſunt generis eiſdem, ſouendus erit locus perfundendo, fricâdo, vngendo, & omnino ad contrarium ſtatum erit redigendus. Iam vero pinguedo & caro in pinguibus & carnoſis proſilit, dum ſanguis auferitur, eumque cohibet: in quibus hæc vnica eſt ratio: nam vel auferre eum qui recurrit, vel retinere oportet.

De arteriarum ſeſſione. Galeni.

Cap. 13.

Arterias quoque ſecare medici conſueuerunt: alias quidem in temporibus, ob humores calidos & ſtatuofos ad oculos cõfluentes: alias verò ſecundum aures, ac præſertim in vertiginofis, & quicunque diuturnis capitis doloribus calidis & ſtatuofis afficiuntur. Iam vero & ob alias quasdam capitis affectiones diuturnas, arteriarum quæ poſt aures ſunt, ſeſſione vtuntur. non tamen eas ſecant, cum vlla alia pars affecta eſt: cum tamen multe ſint, quæ hoc auxilio potius quam venæ ſeſſione indigeant. vbi enim calidus, ſtatuofusque ſanguis in arteriis collectus infeſtat, illic communibus affectæ partis ſeſſatis arteriis eſt opus: verum quia ſanguinis fluxus difficulter comprimitur, arterias ſecare medici non audent. atque etiã cum vulnus ad cicatricem perducitur, aneurifma efficitur. idcirco maiuſculas arterias medici ob hanc cauſam refugiunt: paruas autẽ tanquã nõ ita multũ profuturas, nõ incidũt, quãquã & ipſæ quoque nõnunquã nõ mediocre cõmodũ attuliſſe viſæ ſunt: & cicatrix etiam eis abſque aneurifmate fuit obducta. quinetiã ſi maior arteria ſit, cicatrix ei inducitur ſine aneurif-

àneurismate utique secta. quæ res sepe imminēs ex profluio sanguinis periculū sustulit. apparet enim perspicue, cū trāsuerſa sectione tota per se totam discinditur, reuulsis vtrinque ambabus partibus, vnā sursum, alterā deorsum concedere. Equidem admonitus quibusdam insomniis mihi perspicuis, arteriam secui, quæ inter pollicem, atque indicē dextræ manus sita est, sanguinem quæ effluere permisi, donec ipse per se cessaret: cum ita somnium mandauisset. effluxit autem non tota libra, atque ita subito diurnus dolor in ea præcipue parte infixus, quæ iecur septo trāsuerſo committitur, sedatus est. Alteri vero, cui ex vulnere in malleolis accepto, secta fuerat arteria, sanguinis cursus non cessauit, donec ego vocatus totā arteriam secui: deinde medicamento ex aloë, thure, & albis ouorum, pilis leporū molliusculis excepto vsus sum. & vulnus citra aneurisma curatum est, carne videlicet osculo arteriæ obducta. homo vero ille quadriennio per exigua temporum interualla coræ dolorē sentiens, exinde perfecte conualuit. hæc itaque mihi sepe numero persuaferunt. vt in summis artubus, imo vero & in capite arterias secarem in omnibus doloribus, qui à calida, flatuosa quæ substantia nasci viderentur, ac præsertim in membranis, quarum dolor pungentis speciē refert, & sensim expanditur. pungente quidem in vna parte sensu, tanquam in affecti loci centro infixio: tensionis vero sensum percipiente omni particula, quæ circa centrum sit cōstituta.

De arteriarum sectione, ex Antyllo,

Cap. 14.

Arteriam secamus, si fieri possit, quæ sub vertice ad occiput, & media inter tendines: si secus, eam quæ secundum aures est: vel eas, quæ in vtroque verticis latere ad sinciput sunt: pertinent enim ad coronalem, & mediam futuram. quæ vero à temporibus ad frontem pertinent, ideo non secantur, quia sitæ contra muscolum sunt. eas. n. facile sine periculo incidemus, si iusserimus ei, cui arteriæ secantur, vt genas moueat, inheret, quæ, ac innitatur. ita enim muscoli omnes temporum toti per se totos perspicue mouentur. poterimus ergo omiſsa parte quæ mouetur. in ea parte, quæ in fronte quiescit, facere sectionem. verum tamen neque multum, neque cōfertim sanguis ex arteriis propter earum exiguitatem fluit. Sed nec

L I B E R

etiam cum multo spiritu exit: venosæ enim sunt. non igitur multa sectio faciēda est. hinc magis varia fit detractio. Quæ vero ante aures sunt, quæ masculi mādibularū exurgūt, firmę admodum sunt, ac robustæ: sed raro citra periculum secātur propter musculorum propinquitatem, & propter implicatio- nem eius loci membranarum. In secandis vero arteriis occi- pitis, vsque ad os secanda arteria est: osque ipsum abraden- dum, vt caro ex ipso osse suppullulet, & per eius mediū oscu- la arteriæ excipiātur: & præcidatur. melius enim est, vt ipsam tanquam varicem excipiamus, & subiecta volscella, aut alio quodam instrumento simili, incidamus non multum, sed par- ticularim. vbi satis sanguinis effluerit, supposita volscella vas extrahendum est, & medium præcidendum. ita, enim ne- que committetur, neque ex fluxu sanguinis periculum vllum consequetur, cum oscula arteriæ in carnem recurrant.

De cucurbitula, ex Galeno

Cap. 15.

Cucurbitulæ corporibus prius euacuatis vtilēs sunt: cū enī plethorica sunt corpora, cucurbitulas non adhibemus. eadem quoque ratione in cerebri, membranarūque inflammatio- nibus non vtimur cucurbitulis in principio affectionum, quæ admodum ne in vlla quidem alia parte, quam obfideat inflā- matio: sed tum cum nihil præterea inluat, totūque corpus ante sit euacuatum, atque vsus postulet, vt aliquid corū quæ in parte inflāmata sunt, moueamus, & amoliamur, vel ad ex- teriora attrahamus. Cum vero affectiones adhuc sunt, tum non iis membris, quæ laborare incipiunt, sed eis quæ his con- tinuata sunt, reuellendi causa cucurbitula admouetur. in prin- cipio vero vtendum est repellentibus.

*Antylli, de cucurbitula, ex secundo libro de præidiis
euacuantibus.*

Cap. 16.

In mediocri dolore, & similibus, leuibus cucurbitulis, quæ sine scarificatione admouentur, vtimur: vbi autem volumus roborare, vehementibus. in oppletis vero particulis, vt in iis quæ à corrupta materia vexantur, præcisæ cute affiguntur. an- tequam vero applicentur, ventrem iam emollitum esse opor- tet, aut omnino nullam infestantium excrementorum suspi- cionem subesse: & prius omnino comedisse, aut post leuem cibum

cibum, eumque iam subductum aquam præbuisse. maxime autem si sanguinem detracturi simus, primum locus est parumper illinendus: sique postea satis ruber, & tumidus à cucurbitula sit factus, scarificandus erit: si non, tertio loco erit admouenda, donec pars in tumorem extollatur, atque rubescat. si vero nec tumor, nec rubor exciteretur, partes usque dum puniceæ fiant, spongiis fouendæ sunt. & ita postea scarificandæ. at si norit quispiam, corpora non rubefactum iri, veluti in iis, quorum pingue abdomen est, aut in refrigeratis, & mulieribus quæ pepererunt, usu venit, tum antequam cucurbitula affigatur, cataplasma partibus superdabitur. sed sit interdum, ut à leuibus cucurbitulis tumor validus, & colore luidiore excitetur: ubi vero sacrificatio sit facta, aut parum quidpiam, aut certe nihil sanguinis effluat, cum & crassius sit, quod ante stat, atque carnosius. in eiusmodi ergo spongiis maxime fouere locum, tenuemque, & facile fluentem reddere sanguinem conuenit. Ne vero prope mammas cucurbitulæ affigantur, cauendum est. illapscæ enim cucurbitulis nonnunquam mamme, & inturgescerent, magna admodum difficultate auelluntur. ubi autem eas auulseris, oleum erit perfundendum. applicandæ autem cucurbitulæ sunt ex modico igni. nam si vehementes adhibeantur, vapore inflammantes, contententesque corpora, nihil notabile attrahunt. eo vero situ collocandas esse partes, ut ne sanguis in eis cõtineatur, crassescensque excretioni impedimento sit, sed ut pronus ad inferiora effluat, inter omnes constat. ablatis cucurbitulis, si quod eductum est, satis sit, partes curabimus: sin secus, iterum eas affigemus. In capite vero non cum multo igni affigendæ sunt: siquidem vehementer attrahent, & euelli difficulter poterunt. quæ ex modico igne admoventur, id quod opus est, facient. Cum vero ad auellendum difficiles sunt, spongiis calida & frigida aqua imbutis circumdare eas oportet: siquidem ita remittentur: sin minus, eas perforare consilium est.

De cucurbitularum differentia, ex materia, & figura sumpta.

Differentiæ cucurbitularum, quæ sumuntur à materia, tres sunt, vitreæ, corneæ, æneæ. argenteas, quia vehementer igniuntur, reieciimus. ænearum est usus frequentior.

L I B E R

vitreis quoque vti possumus, in quibus sanguinis est consideranda euacuatio: & corneis item in capite, vbi aeneas auulsi difficiles fore cognosceremus: itemque in timidis, qui à flamma deterrentur. in figura autem præcipue differunt aeneæ, aliores enim magis, quam humiliores trahunt. quæque humiliores sunt, quia non vehementer attrahunt, capiti sunt accommodatiores, quæ habent plana labia, corporibus latis, quarum labra resima sunt, curuis & gracilibus aptius admoventur. quæ acutum os habent, his cōueniunt, in quibus non scarificamus, sed vehementi impositione cucurbitularum, quas leues affigimus, atrahere volumus: cum acumen labrorum ad violētum attractum faciat. quæ labra habent obtusa, cum in aliis, tum vel maxime in capite vtimur. attractio vero ænearum, itemque vitrearum cucurbitularum ex igne fit: cornearum, citra ignem. siquidem in extremo perforatæ sunt: cumque adhibentur abstersæ vehementer per foramen trahunt. statim vero foramen digito, aut cera clauditur.

Herodoti, de cucurbitulis, ex libris de præsidiis euacuantibus. Cap. 17.

Cucurbitula materiam, quæ in capite est, euacuare potest, itemque dolorem soluere, inflammationē minuere, inflationes discutere, appetitum reuocare: imbecillum, exolutumque stomachū roborare: animi defectiones amouere: quæ in profundo sunt, ad superficiē traducere: fluxiones siccare, sanguinis eruptiones cohibere, menstruas purgationes prouocare, facultates corruptionis effectrices attrahere, rigores sedare, circuitus soluere, à propensione in somnum excitare, somnū conciliare, grauitates leuare. atque hæc quidē, quæque his similia sunt, præstare cucurbitularum vsus potest.

De scarificatione, ex libris Antylli, de præsidiis vacuantibus Cap. 18.

Scarificamus partes corporis, quæ aut inflammatione, aut duro tumore laborant. eæque siue distentæ sint, ac dolore vexentur, siue fluxionibus infestentur: cum scilicet ad statum venit fluxio, aut iam eundem sit consecuta: aut acris adsit materia. Pars autem, quæ scarificanda est, prius, si fieri potest, lauari debet: sin minus, aqua tepida perfundi, vsque dum rubeat: aut
spongiis

Spongiis foueri, aut soli, ignive exponi : & postea sacrificari. adhibendæ autem sunt incisiones cruribus, & abdomini per rectitudinem, eodémque modo in thorace, dorso, & ceruice. at in capite, pro situ capillorū in fronte, oblique, porro incisiones sint æquali inter se magnitudine, sintque æqualia quæ inter eas sunt interualla, initiumque scarificationis ab inferioribus partibus sumatur, ita enim sanguis ad extimas partes influens non obscurabit eas, quæ deinceps scarificandæ erūt. situs vero scarificationum per æquales inter se ordines fiat. non fiat autem scarificatio plagam infligendo, sed per tractum. hoc enim pacto dolore vacabit.

Apollonij, de scarificatione.

Cap. 19.

Cum ad corroborationem, & quamlibet corporis tutelā, sanguinem conferre plurimum didicerim: qui quidem plerūque redundat, & interdum qualitate in peius vertitur, existimaui, ubi redūdat, imminutionē: ubi corruptus est immutationē cōuenire. Venas igitur eodē anno sæpe incidere nō esse accommodatū cēsui: quoniā vna cū multo sanguine spiritū quoque vitalem effundi intelligebam: quo crebrius exhausto, tota corporis compages refrigeratur, & omnes naturales actiones peius obeūt. quocirca iudicaui à particulis ignobilissimis, utpote à cruribus, sanguinis detractionem scarificando fieri debere, quantitatem metiendo ex hominis habitu, atque usu, qui expostulet. præstantissimum autem hoc auxilium est, tum ad tuendam sanitatem, tum ad recuperandam cum auersa fuerit, * * vel ab aliquibus huiusmodi causis, sed nemo tamen putet, me venæ sectionem reicere. eam enim ego in maximis, periculosissimisque affectionibus non omitto: in quibus abunde, affatimque sanguinem effundere oportet, nā in vehemētibus affectionibus euacuationes affatim faciendæ sunt. Plethorem vero mediocrem, quæ aliquid mali sit factura, & iam conuersionem in morbosum statum attingat, tibia scarificationibus vexata, quæque sine molestia, & quantam voluerimus sanguinis extrusionem reddiderit, citra validam totius corporeæ molis commotionem, soluit. sæpe autem plus, quam satis sit, congregatur, quare non est cunctandū, quin quoties signa plenitudinis inciderint, eam tollamus eo modo, quem nunc præscripsi. præstat autem

o iij

viscera, quæque in toto corpore insunt vasa, non repleri immoderate, neque distendi: sed potius in quadam relaxatione terminata contineri, ut expedite permeare spiritus naturalis queat.

Scarificationem mulieribus quæ non probe purgantur, itémque aliis plerisque affectionibus prodesse.

Cap. 20.

Mulieribus, quibus non prospere succedit purgatio, scarificatio mirabiliter auxiliatur. nam quod illic minus est factum, hac ratione euacuatur. statutum autem purgationis tempus expectandum est: tuncque si nihil aut parum sponte sua effluerit, hoc auxilio tantum detrahemus, quantum usus postularit. quinetiam hoc auxilium quibusdam mulieribus maxime profuit, ut menstruæ purgationes de more iterum redirent. continua enim ad partes inferiores sanguinis deductio, ei quoque viam ac propensionem parat. Equidem mulieres, quæ multum ætate procefferunt, quibus iam pridem menstruæ purgationis nihil apparuerat, ubi aliqua molestia corporea vexaretur, hac curatione subleuare consueui. est enim hæc mulierum propria, multumque efficax est: quippe quæ naturalis excretionis modum imitetur. Euacuare autem interdum scalpello soleo, interdum hircines admouendo. iam vero cum oculos quidam ex longo tempore ab incessabili fluxione infectos haberet, hoc presidio sanatus est: cum nos aliis quoque localibus auxiliis ad oculos vteremur, & totius corporis curam gessimus. Senex etiam quidam, cum prius per longa intervalla, deinde breuia, strangulante circa pulmonem angustia vexaretur, simili modo est curatus. vacuandum autem tantum est, quantum conuenire videatur, estque cauenda refrigeratio: alimentumque moderatum tribus, aut quatuor diebus dandum. Cumque pestilentia vehemens per Asiam vagaretur, multique ob eam causam obirent, egoque in morbum itidem incidissem, secundo die cum remissio fieret, crus scarificaui, & ad duas libras sanguinis detraxi, atque hac ratione vitæ periculum. quo sane auxilio, cum multi quoque usi essent, sunt seruati. erant enim signa plenitudinis. atque illi precipue euaserunt, qui sanguinem copiose euacuauissent. Quinetiam capitis dolores moderatos, tonsillarum inflammationes, ac dolores laterum recentes tollit. nam diuturniora huiusmodi sympto-

sympromata localibus scarificationibus dissoluimus. eos denique qui vires reficiunt, & ad statum naturalem difficulter redeunt, nihil sane est, quod eque ad eis accommodatā, & idoneam, bonāque nutritionem ducat, ac sanguinis per scarificationem euacuatio.

Antylli, de hirudinibus, ex libris de praesidiis euacuantibus. Cap. 21.

Nonnulli captas hirudines includunt, eisque ad multa vtuntur. vbi enim mitescunt, carni facile admoventur: cum alię quandoque peregrine se gerant. eas vero experientia docti protinus admouemus: quę vero nuper sunt captę, vnū diē seruare, & parū sanguinis alēdi gratia iniicere cōuenit. ita enim virus earū exprimetur. Vbi vti volumus, locus, cui applicandę hirudines sunt, nitro prius fricandus est, ac sanguine alicuius animalis, aut argilla liquida illinendus, aut fouendus, aut vnguibus scalpendus. siquidem ita promptius carnem apprehendent. hirudinēsq; in aquam purā, & tepidam in vase lato, atque magno iniiciendę sunt, vt cōmotę virus abiiciant: deinde spongia sunt excipiendę, & strigimentis purgandę, ac denique manibus admouendę. vbi omnes inheferint, oleum tepidum particulę, ne refrigeretur, infundemus. si vero manibus, aut pedibus affigendę sint, partem in aquam, in qua hirudines sunt, iniiciemus. si vero cum cruore plenę sint, vti etiam eis oporteat, vel quia pauca nobis hirudines suppetāt, vel quia paucę carni inhęferint, earū caudas vbi expletę sanguine fuerint, forcipe excidemus. nam sanguine fluente nunquam trahere cessant, donec nos sale, aut nitro aut cinere earum ora perspergamus. cū exciderint, si locus est cucurbitulę capax, eius applicatione virus extrahēdū est: eaq; erit valide agglutināda, celeritęque auellēda: si vero capere cucurbitulā non queat, spōgiis fouēdus est. si vero ex corporibus, aut osculis cruētę lachrymulę adhuc effluerint, mannā, vel cuminū, vel farinā insperges: deinde lana pauco oleo madente conuolues. Si sanguis etiam erumpat, linteola, vel telas aranearum ex aceto iniicies, vel gallam, vel spongiā nouam pice liquida illitam, & combustam: deinde chartulam aceto madefactā applicabis, atq; alligabis. hęc in mediis corporis partibus agenda sunt. nā in artubus, hoc est brachiis & cruribus, sola deligatio ad

o iii j

cohibendum sanguinem est satis : quæ postero die soluenda est. si quæ sanguis constiterit, abiicienda, si non, iisdem vtendum. Scire autem conuenit, hirudines non ex intimis partibus sanguinem attrahere, sed eum, qui carni adiacet, exsugere. porro vtimur hirudinibus in iis, qui incisiones pertimescunt, vel in iis particulis, quibus propter exiguitatē, aut gibbositatem, aut inæqualitatem affigere cucurbitulas non possumus. hirudines autem auellimus, quando eius sanguinis, quem detrahi oportere existimamus, dimidium extractum fuisse coniicimus : deinde tandiu sinimus effluere, quandiu fuerit excretus is, qui satis sit. cūque particula tum ab hirudinibus, quæ suapte natura sunt frigida, tum ab aëre ambiente refrigeretur, ideo fouenda est, ac recalfacienda: sanguinisque effluxio non refrigerantibus, sed adstringētibus, & emplasticeis, vt diximus, cohibenda est.

Menemachi, de hirudinibus.

Cap. 21.

Hirudines locis affectis, aut iis, quæ nō pinguibus proxima sunt, applicātur. nam oleū earum appetentiam subuertit. in angustia vero stricti calami, ab vtraque parte non perforati, aut in operculum paruæ harundinis, aut quippiam simile demitti debent, cum admouendæ sunt. earum numerus ex duabus magnitudinibus, loci videlicet, & affectionis est sumendus. * auferantur autem oleo calido earum labiis infuso. mordacitas vero aliarū in partibus vlceratis conueniet. quod vero post auulsas hirudines effluit, digitus impositus cohibet. quātitas autem excretionis ex hirudinum erectione apparet: sed euidentius quoque cernitur, si in vnum conducta fuerit, vbi hirudines à corporibus diuulsæ sanguinem euomuerint. hirudinibus vero adhærescentibus, loca, quibus affigendæ sunt, superficie tenus scarificanda sunt : nam vbi sanguinem gustauerint, eundem magis expetunt.

Galenī, quos purgare conueniat, quibus purgationibus, & quo tempore.

Cap. 22.

Sana corpora difficulter purgantur, nam & vertigine vexantur, & torquentur, & sit molesta purgatio : & celerius præterea exoluuntur. hæc autem omnia fiunt, quod purgās medicamentum proprium educere humorem cupiens, ipsūque non comperiens, sanguinem & carnes colligat,

vt

vt ex eis quod suū est, eliciat. at qui sani adhuc sunt, illi quidem, sed tamen nisi euacuentur, in morbos casuri sunt, praeueniendi sunt, & ineunte vere vacuandi, vel misso sanguine, si ex multitudine, vel purgatione, si ex humorum corruptela capi morbis soleant. Ac nos quidem & podagram, & articulorum dolores in principio, cum nondum circum articulos tophum excitassent, huiusmodi euacuatione complures annos inhibuimus: eodēque modo plerosque attonitos, comitiales, melancholicos, & aliis eiusmodi diuturnis affectionibus vexatos, praedicta euacuatione sanauimus. aliis itaque pituitam, aliis amaram bilem, aliis atram, aliis serosa excrementa, ad essentiam eorum morborum, quibus capi consueuerunt, euacuari conducit. ac protinus melancholia quispiam, nisi purgatus fuerit, singulis annis capietur. hunc ego non solum vere, sed autumno etiam purgo. itēque foeminam, quæ in mamma cancerum habuit, quotannis ineunte vere similiter purgandam curo: quam quidē ad sanitatem perduxī vehementer euacuando, vsus medicamento nigram bilem expurgante. si quæ assumpta purgatio non fuerit, sentit mammam altius dolore vexari. Quinetiam incipientem elephantiasin misso primum sanguine, & purgatione data, in alio curauī. deinde ei quoque vnica singulis annis purgatio sufficit: eaque intermissa, morbum statim reuocat, atque hæc quidē ægritudines nigros humores purgari postulant: comitiales autem, attoniti, & asthmatici, pituitosos: velut dolores articulorum, si cum multo calore infestent, amaram bilem: si cum tumoribus frigidis, pituitam euacuari postulant. Alius quidam æstiuo tempore tertiana semper corripiebatur: qui multos ab hinc annos in febrim non incidit, sub finem veris pallidam bilem nostro consilio ante purgando. hoc enim tempore eiusmodi homines euacuare est melius: quemadmodum comitiales, arthriticos, & melancholicos, & quicumque ex humorum crassitie in morbos cadunt, ineunte vere præstat euacuare. Antequam autē medicamentum purgans exhibeamus, crassos humores attenuare, tenacēsque dissicare, ac meatus, per quos traduci, trahi quæ debent, aperire oportet, si purgatio sit optime successura, idque cum in reliquis omnibus, tum vel maxime in his, qui elleborum sumunt. nam medicamenti vis, quæ diuellit, cum excutit humores, qui altius affectis partibus inhaerent,

L I B E R

& ob eam causam diuturnis morbis prodest, facilius id facit humoribus prius attenuatis. qui hoc negligunt, iis molestæ purgationes succedunt, & cum torminibus, & interdum cum vertigine quadam, multaque nausea, malo pulsu, exolutione, ac difficultate. eius autem, qui elleborum sumpturus est, prius experiri naturam debemus, quomodo ea ad supernas purgationes, hoc est, quæ vomitibus fiunt, affecta sit. experiemur autem dandis iis, quæ vomitum mediocriter prouocant. nam si ita non facile purgetur, non erit ad elleborum agendus, si non ante præparetur. præparatur autem vomitu ipso sæpius excito. cum ergo is, qui sumpturus elleborum sit, promptius vomere assueuerit, melius etiam fiet, si ante corpus humectabimus. humidum vero fit corpus, tum multo cibo, cum quiete. ac quietem quidem id facere, perspicuum est: quando, ut exercitatio membra exsiccare potest, ita quies, cum vacatio quædam, & exercitationis vacuitas sit, humiditates conseruet. at cibus copiosior non absolute humectare aptus est, sed is denique qui vehementis qualitatis expers sit, hoc est, qui neque acerbus, neque acer, neque salus, neque amarus sit. nos vero oxymeli quandoque potui dedimus, in quo ellebori albi ramusculos per diem ac noctem raphanis infixos demiscramus. essetque hæc ellebori imbecilla purgatio. Cæterum qui angustum thoracem, & iccirco pulmonem compressum habent, sunt ad vomendum ineptissimi, cum aliis, quæ vomitum cient, tum præcipue elleboro albo. vasculum enim aliquod ex iis, quæ in instrumentis respirationis sunt, disrumpent, Præterea amarum bilem per superiora, pituitam potius per inferiora purgare conuenit. quanquam interdum contra est faciendum, si pituita in ventriculo, amara vero bilis in intestinis acruata fuerit. at melancholicum succum per inferiora semper educimus. Ac de anni quidem temporibus scriptum in aphorismis reliquit Hippocrates, estate superiores, hyeme inferiores partes medicamento purgandas esse. atque ad temporum anni proportionem, regionum habenda est ratio: ut calore, frigoreque distinguatur. idemque de ætatibus est sentiendum, iam vero cõsuetudo quoque non parum facit ad indicandum euacuationem. nam qui vomere sunt assueti, purgationem per superiora minus moleste ferunt: qui assueti non sunt, non sine periculo, & præsertim elleboro, purgantur.

sed

sed par est etiam, vt genus morbi consideretur. nam cum corpus albidum, & pituitosum totum apparet, quā hydro-
pem leucophlegmatiam vocant, opus est medicamēto, quod
pituitam educat: ac primum quidem per inferiora, postea
per vomitus, postremo per ea, quę per nares & palatum pi-
tuitam trahunt. cum enim redundans humor in toto cor-
pore sit diffusus, omnes euacuationes admouebimus. si vero
ascites sit hydrops, medicamentum, quod aquę educendę
sit, dabimus: quemadmodum in arquatīs aliquid dādum est,
quod bilem educat. nam & his bilem multis modis euocare
oportet, sursum, deorsum, per vrinas, per palatum, per nares.
ita etiam si melancholicus succus redundarit, vt in melan-
cholia, cancro, & elephātiāsi, medicamentum, quo nigra bi-
lis educatur, exhibemus. nam in comitialibus vtimur medi-
camentis pituitam extrahentibus, ex quibus est perspicuum,
à morbi conditione nobis ostendi & humorem euacuan-
dum, & locum, per quem eundem educere debeamus. iis e-
nim, quorum iecur inflammatione vexatur, simulatque con-
cocta inflammatio sit, purgationem adhibemus: ac per infe-
riora quidem, cum ea in simis iecoris partibus sit: per vrinas
vero, cum in gibbis. ita quoque in reliquis spectabimus &
humorem exuberantem, & affectum locum, ex quo tan-
quam causa quadam, morbus confurgit. hæc enim, & quis
humor euacuandus sit, & quomodo, & qua parte sit educa-
ndus, indicabunt: & ad hæc omnia, tempus etiam accommo-
datum monstrabunt. nam inter initia, tenues & serosos
humores vacuabis: concoctionem vero expectabis, vbi cras-
si, & glutinosi fuerint, quales suapte natura sunt pituita, at-
que atra bilis. accessiones quoque tibi euacuationis modum
indicabunt: vt dum vrget accessio, à superioribus educas:
vbi cesset, quę remissio dicitur, ab inferioribus. nā sic etiam
iuvant quę per se in morbis eueniunt: cum in accessionibus
vomitus plerisque excitetur, & sanguis è naribus erumpat:
in remissionibus vero, lotium & aluus fluat.

Tempora autem accessionum, & criticorum dierum ma-
xime obseruanda sunt, si quando purgationem per inferio-
ra moliaris. nam si humores ad superiora propensi ferantur,
vis medicamenti per inferiora purgantis impeditur. In iis
autem, qui iā egrotant, si morbus diuturnus futurus est, expe-
ctanda semper erit concoctio: in acutis vero morbis, cum

L I B E R

turget materia, inter initia medicamento purgante vtili-
cet: atque id ipsum cum magna animaduersione, diligentiq;
consideratione faciendum est. nam in acutis periculum non
mediocre est, ne purgatio male succedat, eo quod omnia
medicamenta purgantia calidæ sint facultatis: & febris in
eo quod febris est, & sui ratione, non sicca, nec calida, sed
his maxime contraria, humida frigidâque exposulet. non
ergo febrilis caloris causa purgans medicamentum propi-
namus, quod nos quoque quantum in ipso est, nocere sci-
mus, verum, vt humores febrem concitantes educamus. de-
bet igitur maior utilitas prouenire infestis humoribus de-
tractis, quam sit noxa, quæ à medicamento expurgante cor-
pori infligitur, necessario. prouenit autem utilitas, si & sine
molestia, & omnis infestus humor euacuetur. quod vt fiat,
considerandum prius est, vtrum is, qui morbo laborat, ad eâ
purgationem sit idoneus. etenim qui plerisque cruditatibus
laborarint, crassisque ac tenacibus eduliis vesci consueue-
rint, itémque quibus tensa hypochondria, inflatâque sint, aut
satis, superque calida, atque feruentia, aut in eisdem locis in-
flammati quedam sit, ij omnes ad purgationes sunt inepti:
quamobrem dimittendi sunt. & egrotâtis humores, quoad
eius fieri maxime potest, ad fluendum paratos esse oportet:
hoc est tenues, & minime tenacitatis vllius participes: &
meatus, per quos est transitura purgatio, apertos esse. hæc
enim nos ante paramus, cum aliquem sumus purgaturi: at in
acutis morbis, si statim inter initia, vel primo die, vel non
vltius secundo, purgatione vsuri simus, turgente materia,
nihil huic præparationi relinquitur loci: nisi quis forte oc-
casionem nactus sit mulsam potui dandi, in qua parum hyss-
opi, aut origani, aut tragorigani, aut thymi, aut pulegij, aut
aliquid eiusmodi attenuans sit incoctum. quocirca consen-
taneum est, vt in acutis morbis raro purgante medicamêto
vtamur: quod in principio non sæpe turgeant humores af-
fligêtes, neque, si turgeant, egrotus sit ad purgatione aptus.
neque etiam nobis tempus sui parandi accommodatû præ-
stet. Turgere autem dicuntur humores, cum motu vehemê-
tiore agitantur, & ab vno loco in alium confluêtes, in prin-
cipio morbi, vexant hominê, dolorésque ac titillationes af-
ferendo, eû quiescere nō sinunt. hos ergo humores euacuare
conuenit, eos dico, qui in motu, latione, & fluxu sunt:
qui

qui vero in aliqua parte corporis iam confederunt, neque
 vlllo alio auxilio, neque medicamento purgante mouendi
 sunt prius, quam concocti fuerint. tunc enim naturam etiam
 euacuationi habebimus adiutricem. hæc enim simulâtque
 humores concocti sunt, eosdem dimouere, idque quod su-
 peruacaneum est expellere conspicitur: quo sane tempore
 crises etiam fiunt. Verum cum natura perfecte excernit, nul-
 lo præterea medicamêto opus est: cum vero ipsa mediocri-
 ter, atque imbecillius facit, quod deest supplere medici de-
 bent. Illud autem sciendum est, raro euenire, vt humores ab
 vno membro ad aliud confluât, ac sæpius in vno aliquo mē-
 bro quiescere, ibique manere, donec concoquâtur, toto mor-
 bi tempore, vsque ad solutionem. Cum igitur non solū mor-
 bus acutus fuerit, sed etiam cum vehementissima febris con-
 iunctus, cauendum est, ne purgationem offeramus, præcipue
 cum ægrotantis natura nobis sit ignota. nonnulli enim sua-
 pte natura difficulter purgantur, nonnulli vero modica po-
 tione medicamenti epota, copiose purgantur. Cum igitur fe-
 bris non sit vehemens, tūque ægroti naturam noscas, medi-
 camentum dabis, quam ad rem vti tor elleboro nigro, aut a-
 lio quopiam simili, è quorum numero etiam est, quod ex co-
 locynthide conficitur, quod vtitato nomine hieram vocant.
 hæc autem cum varie conficiatur, ea quæ elleborum assum-
 pfit, nec scamnoneam habet, præstantissimum medicamen-
 tum est in iis, qui medicamentum subducens sumere omni-
 no possunt. post assumptam vero purgationem, vtile est ptif-
 sanam sorbere, quemadmodū ait Hippocrates. ipsum enim
 purgans medicamentum, vt exiguum fuerit, in fundum ven-
 triculi descendit: in descēsu vero cum gula, tum pars omnis
 sublimis ventriculi, non solum medicamēti purgantis qua-
 litate, sed substantia quoque in descensu appulsa inficitur, &
 magnopere læditur. ex quo fit, vt ptissanæ succus vtiliter ab-
 sorbeatur, quippe qui abstergere, & inferius trahere possit id,
 quod transeundo meatibus se implicuit: & temperare, atque
 immutare medicamenti qualitatem, quæ membris insedit.
 quas ob res iubet Hippocrates, vt post purgationis potionē
 ægroti ptissanam absorbeant: cū vero purgatio incipit pro-
 cedere, ptissanam dari vetat, veritus ne purgantis medica-
 menti actio dissoluatur.

Quot modis aluus non excernat, cum datum purgans medicamentum fuerit. Cap. 24.

Non excernit autem quandoque aluus, medicamēto purgante exhibito, vel ob egrotantis hominis naturæ proprietatem, vel ob medicamenti dati exiguitatem. quandoque etiam stercus defæctum, atque in aliquo intestino exsiccatum, cum clysteri educendum esset, antequam medicamētum daretur, euacuationem impedit. potest quoque natura ad urinam vergente, purgans medicamentum nihil facere. interdum etiam, cum euacuatio frustratur, præterquam quod corpori nihil noxæ affert, in alimentum etiam transit. interdum vero in perniciem mutatur, atque venenum.

Quæ medicamentis purgantibus indantur. Cap. 25.

Cum omnia purgantia medicamenta vētriculum lædant, & eius os præcipue, quod ex nervis quamplurimis constat, & acerrimum sensum habet, excogitatum est, vt medicamentis bene olentia misceantur, ne sola, & sincera ipsorum vis ventriculi os attingat. talia autem esse debent semina, quæ indantur, quæ & medicamenti malitiam retundant, & eius actionem impedire non possint: quæque attenuandi, & incidendi vim habeant, vt & crassos humores secare, & vias, per quas educendi sunt, aperire, ac patefacere queant. oportet etiam, vt commista medicamenta sibi inuicem consentiant, & in nulla parte discrepent. dissentiunt autem non cū hoc bilem, illud pituitam forte euacuet, (vtraque enim pari modo euacuare possunt) sed cum hoc celeriter, illud tardius ab assumptione purgationem mouet. ita enim euacuatio inæqualiter fit, quamuis simul fuerint accepta. dico autem inæqualiter fieri purgationem, vt, cum ipsa desinere videatur, alterius euacuationis initium exoritur.

Rufi, de purgantibus medicamentis. Cap. 16.

Neque omnes, qui quoquo modo affecti sint, nec quocumque tempore, nec statim vbi contigerit, purgandi sunt. sanos vero, & in quibus excrementum nullum redundat, purgare non conuenit. nam quæ tandem afferri vtilitas potest, si id quod accommodatum naturæ est, detrahas, atque etiam nō
sine

sipe molestia id facias? omne enim, quod medicamento educitur necessario, bonum est. & ideo ex paruis excretionibus animi defectiones, exolutiones, atque alias difficultates, & * * * afferes atque inuehes, nam vtut vacuaris, bonum vtique educes. Verum si homo pituitę portione, aut bilis, aut alterius cuiuspiam humoris redundantia grauetur, tum est accommodata purgatio. vtrisque enim auxiliantibus, & natura, & medicamento, succedit purgatio: eaque facilius peragitur, & melior est, cum molestus humor subducitur. obseruare autem eos oportet, qui pingues sunt, & quorum habitus tabidus est: siquidem hi colliquantur: pingues vero ab attenuatione, & quauis euacuatione læduntur. Temporum quoque repentinas mutationes, & astrorum ortus aut occasus, tempora valde immutantes, Arcturum dico, pleiadas, solstitia, æquinoctia, canemque obseruare oportet. priusquam enim probe constiterint, mouere nihil conuenit. Præterea in purgationibus, quę per inferiora fiunt, obseruandę sunt hæmorrhoides, & fluxus muliebris sanguinolentus: itemque omnes, qui tinesmo, quique alui fluore tentantur, & quorum intestinum vlceratur: & quorum admodum sicca est aluus. hos siqua necessitas purgandi vrgeat, clysteri prius euacuatos purgato. Atque hæc quidem in purgationibus infernis vitanda sunt. In superioribus vero partibus, huiusmodi morbi, tussēs, asthmata, interiora vlcera, vt pulmonis, tabes, iecoris, colliquatio: & cum quispiam sanguinem expuit, sed nūc bene valere videatur, periculum vero est, ne vena rumpatur, & si quem in gurgulione, aut faucibus, aut ceruice morbus exercere consuevit, huiusmodi in quā morbi omnes prohibent, ne per superiora purgemus, ac præsertim elleboro. huc accedūt oris stomachi dolores, & cū cibis nō cōtinetur, nec tamē vomitu reiicitur. Forma quoque corporis attrita, & oblonga ceruice, sed tergo breui & exiguo, & cauo, non est euacuanda per superiores partes: siquidē eiusmodi naturæ plerūq; tubercula habēt in thorace, & difficulter spirant, & tussē vexantur: vt in validis vomitibus, & suffocationes, & sputa sanguinis excitentur. quin etiamne pinguiores quidem supernas purgationes facile ferunt: neque etiam qui facile exoluuntur: neque ij, qui omni ex parte sunt expleti: neque timidi, neque ij, qui pusillo sunt animo. nam si in vlla re alia, tum vel maxime in hac forti

animo est opus. quam ob rem neque mulieres, neque pueri, neque senes apti admodum sunt, ut per superiora purgētur: quippe cum hi timidi sint omnes. sed mulieri quoque periculum inest, ne uterus conuellatur: atque ita vocis & sensus expers fiat. purgandi autem pituitosi per supernas, biliosi per infernas partes sunt: ac præsertim quibus nigra euacuanda bilis est, & autumno, & vere, per quam partem videatur, educere conueniet. at hyeme, & æstate, si inanire cogaris, hyeme per inferiora, æstate per superiora, & cōtra etiam, quam materia vergat, id facies, nam reuellere in quibusdā est melius. alios vero qua materia vergit euacuabis præcipue, cum secedit, neque vtiliter, neque moderate vergit. in cæteris contra erit faciendum. Ex anni temporibus ver est ad purgationes accommodatissimum: secundas tenet autumnus: sæpenumero enim sub pleiadibus constitutionem veri parem sortitur: ut neque difficulter nonnulli purgētur, & æstatis superfluitates opportune eiiciant prius, quam hyems adueniēs eas condenset, & corporibus infigat. Ac vere quidem purgationes sunt præstantissimæ, quod excrementa quæ hyeme collecta fuerint, educunt prius, quam calor ea contingens, moueat, atque perturbet. signa autem, ex quibus purgatione opus esse cognoscas, erunt vertigines, capitis grauitates, & dolores repentini, aurium continentes soni, aspectus difficultates, obtusus auditus tardus sensus, sopor, nulla cibi sumptio. si quæ vinum bonum quis bibat, ei amarū, aut alio quouis modo insuaue videatur: mentis alienationes, & quorum quis ante meminerat, obliuisci: palpitationes variis modis per corpus exilientes, insomnia continua, & formidolosa, & perturbantia, & nescio quis horror sub cute, lumborum grauitas, ventris distortionem, cumque nec cibus expetitur, nec ubi expetitus sit, concoquitur: nec si coquatur, eo homo delectetur: itemque cum alius pro alimenti proportionem non deicit: urinæque exigua excernitur: nausæ, oris humiditates, & color in hoc biliosus, in illo pituitosus, in alio subniger, præter statum naturalem eius hominis, in quo inest, itemque trahi, ægre spirare, non facile moueri, & tamen corpore bene valere sibi videri, quæque in cute pullulant, aut ex pituitosis vlceribus, aut iis, quæ per se erumpunt, aut ab asperitatibus oriuntur, aut etiam ephelides. Hæc omnia, quæcunque inuenire alius potest, quæ nobis argumēto sunt, humo-

rum

rum repletionem, malitiámque subesse, ad purgationes ob-
 undas nos hortantur. si vero humor quispiam sic redundet
 in corpore, vt non modo futurus sit morbus, sed iam adsit,
 euacuandus est. sed multo melius est, vt noxios humores ex
 omni parte præueniendo auferas, si modo possis. quæ vero
 medicamenta vnicuique morbo conueniant, deinceps dice-
 mus. Vistus vero ratio eius, qui per infernas partes purgan-
 dus est, minor esse debet, sed non multo: verum vsque adeo,
 vt cibus qui datus fuerit, cito concoquatur: nec multum ster-
 coris in intestino conficiatur. siquidem hoc dolore conficit
 ventrem, & vomitum ciet, cum medicamentum ad se trahens
 subduci non potest. quocirca nõ est alienum, vt prius quam
 medicamentum purgans detur, aluus molliatur, & malua. &
 beta, & lapatho, & iure concularum, aut aliis rebus, quales
 alij aliis conuenientes, atque idoneas inuenerunt: sin secus,
 clysteri idem fiet molliore. nonnullis vero, vt pituitosis, ci-
 bum pridie non dedisse conuenit: quibus etiam non pessi-
 mum est, ante purgationem euomere. nam siquid aliud aluo
 impedimento est, ne facile subducatur, tum vel maxime est
 pituita copiosior, ex quo fit, vt in quibus pituita redundat,
 eos per inferiora purgari non valde probem. sed quando-
 que morbo non ita conuenit. nam & capitis grauitatem, &
 oculorum dolorem, & aliquos comitiales, aut vertigine la-
 borantes, & pleróque hydropas, & articulorum dolore ve-
 xatos, & alios præterea morbos per inferiora purgare oportet,
 qui etiam per superiora purgandus est, verum quæ dicta
 sunt impediunt, idque licet ille pituita sit refertus, eique ne-
 cessaria est inferna purgatio, solum vistus ratione erit recte
 instruendus. quin etiam medicamenta ego describam, qui-
 bus pituita refertus homo per inferiora, si opus sit, vtiliter
 purgabitur. & quoniam pro natura intestini aliis facile, a-
 liis difficulter aluus subducitur, consentaneum est, eum qui
 rite per superiora, & per inferiora purgaturus est, huius rei
 non esse ignarum oportere. Venter enim in homine suapte
 natura osculum habet aduersum: & in dextra parte ad spi-
 nam, latius quam in cæteris animantibus: inde vero fit an-
 gustius: deinde mesaræum subit: atque ita deinceps vsque ad
 coli principium. huiusmodi ergo cibus facile euacuatur, ac
 quibus osculum superius spectat, vel est angustius, quam par
 sit, vel quod ita ab ortu factum fuerit, vel quod aliqua in-

L I B E R

flammatio obsideat, aut durus tumor postea enatus cōprimat, aut aliæ quædam obstructions impedian, iis cibi difficulter descendunt: sed facile subducuntur. Signa sunt hæc, qui ab ortu tales sunt, hi ad quacunque ratione vomendum sunt parati: sed eis difficulter aluus subducitur: plurimûsque sensus in eis excitatur, cum cibus in ventriculo moratur: superiores partes flatu agitaras magis habent, & partes quæ supra vmbilicum sunt, magis tumentes. quos quidem omnes ne per inferiora purginus, cauendum est, at quibus ventriculi os propter morbos angustum est redditum, similia quidem eueniunt. veruntamen progressu temporis morbis solutis, symptomata quoque soluuntur. quam ob rem non semper ita affecti sunt tum ad concoctionem obeundam, tum ad ructus, tum ad alui deiectionem. ergo ne ita quoque ad infernas purgationes semper eodem modo sunt affecti, qualia nanque de superiore vêtre dicta sunt nobis, talia itidem de inferiore sunt censenda. etenim venter inferior, in principio secundum naturam latus est: ad finem vero fit angustior: ac præsertim in sinistra parte, qua lien occupat. inde enim ipse incipit, eique intestinum, quod cæcum nominant, adnascitur. porro in ilibus ad dextram partem, vnde intestinum initium ducit, melius inuenies: sed semper, magisquæ ad extremum angustatur. quod si hoc etiâ intestinum, tum natura, tum morbo aliquo non tantum, quantum opus est, diducatur, tum magna necessitas quædam cogit, vt cibi desuper celerius delabantur: quos ipsum retinens, & intestina torquet, & flatus, & tumultus, & grauitates affert. donec paulatim in colum intestinum incidât: ex quo iam ad subductionem sunt paratiores. ergo quæ natura facit, eodẽ modo semper fiunt: quæ vero à quibusdam ægritudinibus administrantur, quatenus ægritudines intenduntur, & soluuntur, ita etiam ipsa faciunt, & quæ natura sunt, obseruanda semper sunt, quæ vero vi morborum, quatenus morbi vetant. Cæterum in eiusmodi purgationibus maius periculum impendet iis, quorum os ventriculi non probe transmittit excrementum, quod & à liene, & à cæteris locis ad insuetum vomitum impellitur: quod quidem retro cedēs labores parit. qui vero ad coli intestini principium ad dextrum ile cibos nō traiciunt, atque diducunt, ij vehementius conflctantur. cum enim colum inde exoriens ad sinistrā partem supra vmbilicum procedat,

cedat, & in sinistra reflexum tenuia intestina subeat, merito
 fit, vt labores eo in loco vehementiores excitentur. De pur-
 gationibus vero, quæ per superiores partes fiunt, & præfer-
 tim de ea, quæ ex elleboro conficitur, singillatim postea lo-
 quemur: & victus etiam rationem, & cætera omnia explica-
 bimus. medico enim nihilo minus quam res aliæ, hæc quo-
 que nota esse debet: vt vbinam laudatissima medicamenta
 habeantur, plane sciat. neque enim omnia vbique præstan-
 tissima nascuntur: sed scammonia Colophone, in Ionia, &
 sub Mysio Olympo: thapsia in Sicilia, & Libya: elaterium,
 quod est cucumeris agrestis liquor, Cyrenis: epithymum, A-
 thenis, & ad Isthmum: granum Gnidium, in Caria: vnde no-
 men etiam traxerunt Asclepiadæ Gnidij, quod hoc grano
 plurimum vterentur: at elleborus in Oeta monte, & Anti-
 cyris: ex quo niger non est etiam prauus is, qui Lycestide,
 quique supra Ascaniam paludem & in Parnasso, quique in
 Aetolia nascitur: quemadmodum albus, vbiçunque alibi na-
 scatur, est pessimus. is autem apud Armenos nascitur, & trans
 flumen Sagarium, qua nunc Galatæ colunt omnia. quibus
 quidem sit rebus, vt vbi probatissima medicamenta nascan-
 tur, & quando incidantur, sit considerandum. magni enim
 etiam refert, vt in tempore incidantur, & parentur: vt, cum
 de eis verba fient, exponetur, hæc autem satis sint, ad medi-
 cum cohortandum, ne vlla in re, quæ ad medicinam perti-
 neat, socors sit. Mensura vero purgantium medicamento-
 rum, quæ mihi, & tibi, & illi sit accommodata, definiri à me
 non potest: quia non eadem est omnibus hominibus offeren-
 da: sed debes tu eam mensuram, quæ cuique conueniat, co-
 gnoscere. hæc enim omnia, corpus, diæta, tempus anni, ven-
 tris natura, vis medicamenti, succorum facultates, maxime fa-
 ciunt, vt quis facile, & difficulter purgetur, & vt ne magis à
 maiore copia medicamenti, quam ab æquali euacuetur: imo
 vero alicui minor copia ad purgationem sufficit. Igitur, vt
 ita dicam, mensura multis apta exponetur: quatenus exultimaro
 nec minorem esse, quam satis sit, nec maiorem, quam oport-
 eat. verum si magna quandoque differentia inuenietur, non
 iam mihi, sed naturæ, quæ medicamento obuiam non pro-
 cessit, vitio vertendum est. Quæ igitur præfari oportere cen-
 suimus ad omnem purgantium medicamentorum artem,
 & rationem pertinentia, hæc sunt, quæ diximus. qua v9-

L I B E R

ro ex parte, & quænam sint quæ purgēt, deinceps exponam: qua in re satis fore arbitror, si quod in omnibus plerunque fit, proposuero. In eiusmodi enim nihil est vel minimum, sicut elleborus: quem perspicue credunt & per superiores purgare, & per inferiora euacuare. nam quæ aluum cient, multis admodum vomitus mouent: & præsertim quibus ianitor ventris non facile fluens est. ac copiosum quoque & exiguum medicamentum ad vomitum impellit. nā illud multa, eaque confertim ad partem trahit, quæ supra effluunt: hoc vero, quia præ exiguitate propellere infra non potest. stomachi quoque imbecillitas, & consuetudo euomendi, & magna pituitosi succi copia, qui etiam à bile secretus ad ventriculum peruenit, hæc inquam omnia in purgationibus vomitus mouent, idcirco satis est de eis dicere, quod in plerisque solet contingere. Ergo niger elleborus per infernas partes purgat, itémque eius radices & semen, purgat quoque granum gni-
dium, pityusa, sambucus, mercurialis, polypodium, iris, colocynthis, phacoides, quod alij empetron vocant, pepliū, quod etiam portulacam nominant: & peplos, quem alij ficum, alij papauer spumeum appellant: & aloë, & hippophaës, & hippophaëstum, & clematis, pycnocomum, & vitis agrestis, & vitis chironia, quam etiam bryoniam vocant. itémque thymum, epithymum, amaracus, origanum, conile, papauer littorale, quod cornutum est, & papauer quod rhoras dicitur, & cucumeris siluestris radix, & scorpiurum, & sisamoides album: & tithymalus helioscopius, & tithymalus cyparissias, & tithymalis fœmina, quæ tithymali quoque marini nomen habet: & chamælea, & brassica marina, & lathyris, & agaricum, & euphorbium, & lychnis agrestis, & enicis, & scammonia: & præter hæc etiam, squamma æris, & flos æris. Per superiores vero partes purgat elleborus albus, sisamoides magnum, quod etiam Anticiræi veratrum Anticyræum nominant, proxime autem ad senecionis herbæ formam accedit. Iam per superiora quoque purgat vua taminia, & narcissus, & spartus, & bulbus, & silybum, & cucumeris satiuæ radix, ac semen, & caules agrestis: & radiculæ semē, & lauri folia, & præter hæc erugo, atramentum furorium. quæ ambigua sunt, daphnoides, quod eupetalon quidam vocant, thapsia, elaterium, ricinū, quod aliqui cyprium seseli, Aegyptij vero Cici vocant, tithymali maiores. ex iis sunt etiam qui

qui characiæ dicuntur, qui in herbis mares dicuntur, & alij sunt myrsinitæ, quæ feminæ vocantur. ferunt vero fructum nuci maxime similem. estque alius qui lata habet folia. atque hi tithymali, & per supernas, & per infernas partes purgant. itémque apios: cuius forma talis est, qualis helioscopius tithymalus est: nisi quod partes radicis fructui piri sunt similes. De his vero omnibus nunc dicemus, ut quid singula educant, & quibus morbis conueniant, & quam mēsuram quāsciam satis esse cōficiat, intelligatur.

Caput

27.

Elleborus niger bilim, & pituitam per aluum purgat. datur hemicranico dolore capitis laborantibus, & furentibus. Melampus quoque Amithæonis filius furentes Præti filius hoc purgauisse fertur. ex quo elleborus melampodij cognomen inuenit. Hippocrates vero pleuriticos, cum infernas partes dolor infestat, elleboro purgat, ac quandoque elleborum per se, quādoque vero peplio admistum præbens: cūque magnopere laudauit, licet etiam liquore scammonæ eundem admiscere: & egregie purgabit. cū vero mitius purgare velis, solum elleborum dabis. non enim tātam vim habet, quātam eius nomen indicat. satis ergo erit, radices eius siccās incidere, vinōque dulci & oxymelite ad drachmas binas perspergere, & in lentibus, aut ptissana, aut iure gallinæ decoctas sorbere. scāmoneæ vero oboli tres vni drachmæ ellebori miscebūtur. Eius autem semen est cnico simile, quod etiā sesamoides nominatur, educit eadem, quæ radix, sed vehementius. eius feminis nō paulo minus quam drachmæ duæ in melicrato dandæ sunt. præstat autem iucunditatis gratia tam semini, quam radicibus anisum, & petroselinum, & daucum, & aliquid huius generis admiscere.

Granum Cnidium pituitam, bilem, & aquosā multa expurgat. est enim feruens, & acerrimum ad purgandum, si triginta grana dederis, sin agere mitius velis, viginti dabis. cortex auferendus est, internāque pars cum melle & polenta trita præbetur, aut in melicrato potui datur, sed cum vino melius bibitur. à potu vero parum olei absorbendum, ne guttur exurat. sumitur etiam ex melle cocto, grana cōiuncta melle illinendo. Videtur autem magis cōferre feminis, quam viris. alicui enim absque vlla alia purgatione ad vterum pur-

p. iij.

L I B E R

gationes adduxit. & alioqui etiam naturæ conuenit. quā ob rem non incommode datur hydropibus, & quorum venter est frigidior: item quæ comitialibus, attonitis, articulorum doloribus vexatis: & denique capitis defluxiones exsiccat. Est autem semen Cneori, quem fruticem Cnestrum, & linū, & thymelæam vocant. sed & foliis eadem facultas inest, verum imbecillior. ea siccata danda sunt cum melle ad acetabuli pondus. & aquosiora educit. Aliud vero Cneoron, quo Athenienses quoque in myleriis vtuntur, nihil huic habet simile: ac ne fructum quidem. potest tamen paululum mollire.

Pityusæ vero semen pituitam & bilem purgat: & quandoque etiam aquea. confert iisdem, quibus granū cnidium: atque etiam si plenitudinem per inferna euacuare aliter volueris. succus vero eius vehementior est, secundæ semini, tertiæ vero dantur radicibus. succi vero satis erunt tres oboli melicrato dissoluti, potui dati. seminis drachma, radice duplum, quam seminis, datur.

Acta duplex est, altera arborea, quam sambucum vocant: altera humilis, quā ebulum nominant. vtræque pituitosos humores, & hydropicos per inferiores partes expurgat. earum facultates non sunt calidæ, quales plerisque aliis purgantibus insunt, sed etiam frigidiores. Radix autem in vino coquenda est, & hydropicis sæpe danda: siquidem ea ad ventrē deducit. caulem quoque tenerum si quis olerum more elixatū mandat, mediocriter purgabitur. omnino vero non sæpius, quam bis comedendus est.

Mercurialis & mascula & fœmina æque, ac sambucus, sed magis biliosa expurgat. ergo si tenera folia decocta comederis, stercus abunde expellent. & parū etiā à propinquis partibus trahent. si vero decoctum vino admixtum bibas, valentius aluus deiiciet. conuenit autē ei, qui quotidie euacuari debet: itemque febricitati, cui aluus non deiiciat, & seni, & puero, & fœminæ: ac fœminæ quidem magis: nam valet ad aluū subducendam.

Polypodium pituitam, bilem, & aquosa educit. eius radices dantur drachmæ duæ derasæ in melicrato, aut aqua. non pessime quoque super balsamento deraditur, & ante prandium comeditur. radix etiam in ptissana, aut gallinaceo iure incocta citra molestiam purgat. erit autem satis hæc purgatio pro anni temporibus, & præcipue adolescentibus, nam in morbis
nihil

nihil ita magnopere purgandum est.

Iris educit pituitosa, submucosa, & biliosa. si plus iusto dederis, etiam sanguinea, & nigra euacuabit. ergo ut moderate purges, cyathus sufficit. est stomacho admodum aliena, radices dantur ex melicrato drachmæ tres spleneticis, quotidianam, quartanamque febrem habentibus, spiritus angustia laborantibus, & quos tusses, & colicus dolor infestat.

Colocynthis pituitam, & bilem puram educit. datur medullæ interioris drachma una ex melicrato. si mitior purgatio queratur, colocynthidos semen eiicito, in corticem vinum dulce fundito: sub molli cinere coquito, usque dum probe coctum caluerit: idque potandum dato iis, quibus non vehemēti purgatione opus est. & quibus luida exanthemata per cutem efflorescunt. totum autem colocynthidis corpus conuenit asthmaticis, laterum doloribus, diuturnis doloribus capitis, vertiginibus, visus hebetudini: estque ea amarissima, verum homines ad cibos promptiores parat.

Phacoides educit quidem aquea, pituitosa, & biliosa: sed drachmarum duarum pondus melicrato admixtarum satis est, quod potetur.

Peplus, & peplium eandem in purgando vim habent. seminis vero pondus acetabuli pituitosa, & biliosa cum flatibus per infernas partes expurgat. folia quoque siccata leniter purgant.

Aloë non est acris in purgando, stomacho placidissima est non secus, quam absinthium. satis erit, si duas drachmas ex melicrato potui dederis. pituitam autem, & bilem euacuat. sumi etiam quotidie potest à cœna. subducitur enim, & ciborum vim non hebetat. præterea sitim non inducit, & hominem ad cibos sumendos facit promptiorem. tritam aloë succo brassicæ excipe, & catapotia ad ciceris, aut fabæ magnitudinem confice: ex iis duo, aut tria sumito, ut euacuandi necessitas postulat, potes etiam cum resina catapotia conficere: itemque cum melle cocto, & præsertim in iis, qui amaritiam difficulter ferunt. recte quoque scammonem, & alij cuiuspiam admiscetur eorum, quæ tristitiam afferre solent. morbis autem confert, febribus quotidianis, morbo regio, iecoris dolori, & cum quispiam cibum respuit, & cruditatibus: nec minus foeminis, quam viris. siquid amaritudo nimia non esset, pueris quoque esset accommodatissima: sed rem adeo amarā gustare puer non vult.

p iiij

Hippophaës autem, & Hippophæstum pituitam, bilem & aquam educit. atque hippophæstum in aqueis educendis est efficacius. conuenit in morbo comitiali, morbo attonito, manuum, crurūque resolutione: prodest obliuiosis, ægre spiritum ducentibus, restis ceruicis spirantibus, & omnibus palpitationibus, quæ alioqui continētes sunt in corpore. si purgationem augere velis, succum dato: si per se, obolos tres: si cum cruo cōficias, drachmam vnam ex melicrato afferes. Coma, & radix sicca, & contusa minus purgant. sed euacuant hæ quoque ad pondus drachmarum duarū ex melicrato datæ: præstat tamen in omnibus peragēdis hippophæstum, & ideo minus ex eo dandum est.

Clematis pituitam & bilē vacuat. eius fructus ad drachmæ pondus ex melicrato exhibetur.

Pycnocomum biliosa exinanit. dato radicē comedendam: siquidem ea sola purgat, est quæ rotunda, exiguo pomo maxime similis.

Vites per infernas partes biliosa & aquosa purgāt, duæ autem drachmæ satis sunt. optime autem vteris, si Chironiam comitialibus, & infantiētibus, agrestem vero hydropibus adhibeas.

Thymum, epithymum, amaracum, origanum, & conilem ad nigros, & pituitosos humores purgandos adhibebis. sed epithymum in rebus omnibus præstat aliis. dato eius triti, & cribrati senas drachmas cū vino dulci, aut plus eo. potes idem à cœna commodè dare, si velis. nihil enim prohibet, quin moderate euacuet. in matutinis vero purgationibus cum oxymelite cæteris etiam admixtis vitor. confert epithymum flatuosis, hypochondriacis quæ affectionibus, & cruditatibus, & quibus iecur grauatur, quique difficulter spirant.

Thymus vero educit quidem nigra: sed pituitosa copiosius. eius comæ datur acetabulum ex melle asthmaticis, tussi diutina vexatis, & quibus crassities in ventre inest.

Amaracus siccus oxymelite inspersus datur ad drachmas quatuor cum aliis: & similibus prodest.

Organū quoque siccum ad acetabuli pondus ex melicrato propinabis.

Papauera leuiter subducunt. eorum seminis acetabulum ex melicrato satis est.

Cucumeris syluestris radix in potu sumpta conuenit hydropibus.

dropibus. purgat vero pituitam & bilem. sed succi radicis satis est tres obolos dare: caulis vero etiam triplum. elaterij vero quantum paulo post dicitur.

Scorpiurum pituitam educit & bilim. satis est drachmā aqua moderate incoctam, & vino mixtam bibere.

Sesamoides album purgat ipsum quoque pituitam & bilē. mensura eius seminis est, ut dimidium acetabuli detur.

Tithymalus helioscopius est omnium aliorum tithymalorum infirmissimus. sed & ipse infra biliosa, pituitosaque deducit, siue liquorem eius & semen, siue etiam folia dederis. sed ad omnia liquor est efficacior: secundas sibi vendicat semen, tertias folium. liquoris ergo satis est drachmam dare: cæterorum vero pro ratione virium. Cyparissias quoque similia, sed valentius expurgat. idcirco sufficit, etiam si minus dederis. at Tithymalis laudatissima inter tithymalos est. quocirca si instillatū caricis liquorem dederis, probe purgabit. idem faciet folia ad medij acetabuli pondus melicrato valde perspersa.

Chamælea pituitam, bilēque purgat. folia capienda sunt, conterendaque, & melle cocto inuolata exhibenda. erodit enim hoc vehementer. aliqui absinthio addito catapotia conficiunt. satis est drachmas binas dare.

Brassica marina datur cocta, & ut aliud quidpiam olus, appropinquata: est quæ stomacho pessima, & statim perturbat.

Lathyridos satis est grana decem comedere: eruntque gustanti dulcia, biliosaque, & aquosa copiose educunt. sufficit quoque eius herbarum liquorem multa resolutū ad obolos tres dare. folia etiam cum gallinaceo iure incoquantur. eadem namque ab eis, sed minus a foliis, euacuabuntur.

Agaricum pituitam & bilem purgat, sed non acute. est autem accommodatissimū iecori, lieni, pulmōni, iis qui ægre spirant, quos acidi ructus exercent, & articulorum dolores vexant, quique capitis grauitate tentantur, ac vertiginibus, morbisque comitialibus corripuntur. mulieribus etiam hysterice prodest, cum igitur sit his omnibus utilissimum, dantur ex melicrato, aut oxymelite drachmę duæ.

Euphorbium aquosa & biliosa copiose educit: est quæ eorum, quæ norim, acutissimum, atque ardentissimum: quam ob rem hydropicis, colicisque, & iis qui ventres frigidiores habent conuenit: cæteros vero vehementer perturbat: sitimque affert. ei vero miscendum est peroselini, aut dauci semē,

aut anisi, aut apij, aut tordili: siquidem hæc insuauitatem euphorbij quasi condiunt: & partē quandam magni illius impetus cohibent: & ad vesicam deducunt. iis præterea qui recta ceruice spirant, & qui ægre spiritū trahunt, fructum etiam ex euphorbij portione ferent. est autem bibendum ad trium obolorum pondus, indito pari pondere alicuius eorum seminum, quæ diximus.

Lychnis syluestris bilem & pituitam purgat. seminis datur drachmæ duæ: alij succum foliorum in melicrato præbent.

Cnicus pituitam & bilem, sed non vehementer, euacuat. ex trito semine succus exprimendus est, & iure gallinaceo admixto sorbendus. quidam aniso, melli, amygdalisque cōmiscant. & catapotia ad arquatos conficiunt. huius drachmæ quatuor sufficiunt. Vidi etiam in Caria medicos, qui ex Cnico, & fero lactis purgationes conficerent. sed quæ ad lac pertinent, omnia nobis separatim exponentur.

Scammonea nulla parte superatur ab iis, quæ agitat, & cōmouent, neque in acrimonia, neque in viribus, stomachi dolorem affert. graue olens, insuauis, & valde siticulosa est. ex quo fit, ut aliqui non incommode aloem ei misceant, & ita præbeant: alij vero addant thymi comam & salem: alij semina odorata. ergo nec ei, qui ventrem ardentem habeat, nec ei qui stomacho imbecillo sit. & cui periculum immineat, ne habitus corporis colliquetur: nec etiam hydropi: siquidem ei id est tāquā colliquatio, dāda est: sed potius ei qui arquato morbo, capitis dolore, lethargo, febre quartana, & quotidiana teñeatur: & quibus sub cute efflorescant furunculi incocti: quique doloribus oculorum, & laterum diuturnis laboribus conficiantur. pituitā autem & bilem impermixtam vehementer euacuat drachma eius ad summum. si mitius vacuandum sit, quo minus purgare velis, eo minus dandum eius erit: sed radicis plus dabis: siquidē ea multum à liquore superatur. quocirca dari eius drachmæ duæ possunt.

Squama æris educit aquosa: videtur quæ hydropibus cōuenire. satis est drachmas duas ex cocto melle in catapotia reductas sumere: aut ex aqua mulsā bibere.

Flos grisei crassa & pituitosa educit. huius oboli tres ex melicrato sufficiunt. Ea igitur, quæ per infernas partes purgant, quæ quidem ego nouerim, hæc sunt: nec tamen alia quāplura esse

esse despero.

Quæ igitur dicta sunt, plerisq; tum morbis, tū naturis cōueniunt: prout cuique suppetant, & in tēpore vigēt. & quāquam eorū vires augentur, si quis cōmiscere eadem velit, tamen non semper cōmode id fiet. nam quæ acutissima, ardētissimaque sunt, multo magis talia euadent, si cōmisceantur. quemadmodum si granum Gnidiū, tithymalos, colocynthida, & euphorbiū admisceas, eorū vis augebitur. ergo nemo est, qui hæc inter se mixta, aut alia eiusdem generis recte adhibeat: qui non facturus sit purgationes insuauiores: & vomitus, dolorē ventriculi, sitim quæ sedari non possit, & colliquationes, & excitaturus, & denique toti corpori noxam allaturus. In quibus vero augenda vis est, bene habet, vt misceas: at qui infirmissima miscet infirmissimis, ecquam is utilitatem feret? quānam vis ex altero accedit alteri, cum vtrunque sit infirmissimum? ergo ne hæc quidem permixtio probatur, verum ne ea quidem, qua miscentur ea, quæ per superiora purgant, iis, quæ per inferiores partes euacuāt, nisi quispiā ambigua medicamenta velit cōponere. neque etiam recte miscētur, quæ ori stomachi tristitiā afferunt, vt scāmonea, acta, & marina brassica: quoniā ad eas aliis cōdimentis opus est. Quoniā vero ex medicamentis alia decocta damus comedenda, alia sicca in puluerē redacta, aut confusa, aliorum vero liquores, aliorū denique radices exhibemus, non sunt cocta crudis cōmiscenda: nec radices succo admodum tēperandæ. Ac quispiā melius morbis accōmodata medicamenta distribuit, si, qualis quisque morbus sit, intelligat: isq; solida ab iis, quæ alterius generis sint, distinguet: quod qui nouerit, is etiā, cui morbo vnūquodq; medicamentū cōueniat, simul nouerit. nam quæ maxime cōtrariis morbis conueniūt, simul miscēda nō sunt. restat igitur, vt feruida refrigeratibus, fortia debilioribus tēperantes offeramus: itēque insuauia iucūdis, vt pulegij coma, nepitæ, thymi, petroselini semine, dauciq;, & anisi, & cæteris, atq; etiā pipere, & si quid aliud aptū est, cōdiendo. ex iis alia purgationē adiuuāt, quale est piper, & sales: alia prohibēt, ne quid plus, quam opus est, euacuetur: vt faciunt prædicta semina: alia medicamentum perducunt ad eas partes, quæ purgationis indigent: exēpli causa, si in regio morbo ea, quæ vrinæ ciendę sint: ac magis etiā nepitam, aut absinthiū, recur promptius expurgabitur.

ita quoque si ei, cui dolet caput, aut aspectum habet hebetem, sagapenum, aut panacis liquorem purgationi indideris, id quoque medicamentum ita confectum expeditius à capite deducet: quanquam hæc valde molesta sunt. & tamen sine his non possumus à supernis partibus commodè purgare. Iam qui castorium scammonia mistū lethargicis dant, id quod opus est, euacuant, & medicamenti morbo alioqui accommodatissimi compositionem inuenerunt, ita quoque mulieribus in suppressa mēstrua purgatione datur ex decocto artemisię, aut cuiuspiā eorum, quæ menses cient. nam præterquam quam quod in multis per ventrem purgare cōspicitur, etiā per vterum educere plane apparet. eadem est in pleuriticis habenda ratio, itémque pulmonis affectionibus, quibus si purgatione opus est, idem fieri conuenit. multo enim melius colocynthis, & scammonia, & elleborus cū agarico educunt ex thorace, quam si illorum vnum solum dederis. sed deducunt etiam cū ammoniaco: siquidē hoc quoque est pectori & pulmoni amicissimum, & aptissimum. Ad lumbricos vero, si lati sint, pulegium, aut minus heliotropium, aut hyssopum, aut origanum, aut bitumen recte purganti medicamento inditur. nam hæc breuissimo tempore lumbricos interimunt, quos postea medicamentum educit. si vero rotundi sint, decoctum ononidis, aut absinthium, aut vrticę semen, aut cuminum Aethiopicum, aut brassicę radix, aut eiusdem caules induntur. hæc enim lumbricos occidunt: & eosdem educit purgatio. Atque ita quidem in medicamentorum mixtione euerfari medicus debet, qui ad artem, quæ commoueat, quæque perturbant, velit redigere. quamuis enim multa experiendo, atque audiendo didicerit, hæc tamen, quæ nunc dicta sunt, nisi consideret, atque animo diligenter perpendat, is profecto eiusmodi est, vt mihi nihil ab ignaro homine in cognoscendis turbantibus, & valde agitantibus differre videatur. Sciat quoque hæc: nonnullos sumpsisse medicamentum vt purgaretur, aliosque nihil quicquam fuisse purgatos, alios vero plus, quam par esset, & non sine magna molestia: ad quæ auxilio aliquo est opus. Vñtus ergo ratio, quæ ante medicamentum purgans seruanda est, exposita est à nobis: quique eam ita diu tenuerunt. Vbi vero epotum medicamentum sit, si vomitus excitentur, vt plerisque contingit, vel propter insuauitatem, vel pro-

propter metū, & suspicionem de medicamēto cōceptam, vel propter nouitatem, vel propter stomachi mollitiem: huic apium aceto intinctum, illi oliuam albam sale conditam, mādendam dabis, alij vero salis grumum ori impones. & ita maxime medicamentum confirmabitur: siquidem hęc vomitum prohibent, quam ad rem valet etiam coriandrū odoratum & pulegium, & nepita. sed præstat in lecto paululum quiescere, vētrem & pedes calfaciendo: quemadmodum qui statim deambulauissent, copiosi vomitus, stomachi erosiones, & vertigines sunt excitatæ. Cum vero ad pristinum statum redierint, tum deambulatio imperanda est, vt subinde sensim se submoueāt: id quod etiam magis, quam celer gressus irritat, nam præterquam quod lassitudinem attulit, sæpe etiam multa, celerisque deambulatio, ne perfecta fieret purgatio, prohibuit. purgatione procedente vtilius erit in lecto recumbere, & ita vigilare quiescere. magis enim confluēt. tūc vero erit interim absorbenda paulatim aqua calida. nam & morsus sedat, & excretionē proritat. quibus purgatio nō it, quā mulsam forbeāt, aut nitrū aqua liquefactū. sed melius etiam erit glandem confectam ex sale, aut nitro, aut alumine magnesio, aut ciclamine, aut grano Gnidio, aut felle bubulo, aut radice bryonię, quā alij psilothrū vocāt, ano indere. hęc glās pituitosioribus magis apta est: absinthiū vero biliosioribus. si vero status multi suborti sic distendant intestinū, vt nihil extra emittatur, ruta melli cocto, itēque cuminū, & mentha, & resina adisceantur. vbi status eruperint, statim alia purgatio consequitur. Quicumque autem conantur clysteribus irritare purgationes, ad suffocationes quidē, quæ ex elleboro existunt, recte vsum clysteris inuenerunt: sed ad purgationes, quę per infernas partes agere debent, & non procedunt, tantum abest, vt clyster magnopere iuuēt, vt etiā noceat. periculum enim est, ne cum intestinum plenum sit, clyster infusus supra redundet, & dolores inuehat: quemadmodum vsu venit, vt cum quis clysterem iniecit, isque non subducatur, protinus alterum imponit. atque in acutis quidem medicamentis maxime cauendę retentiones, & cohibitiones sunt: nam si non subducantur, statim hydropas homines reddunt: & fortasse etiam alias noxas stomacho, vētri, iecori, & lieni afferunt. ac nonnulli tota corporis moles decoloratior est facta, at medicamenta molliora, etiā si nō

LIBER

purgent, nullum tamen ex eis periculum imminet : & magis etiam , quæ decocta damus : qualis est mercurialis, actæ folia , nec aloë quicquam grauius facit , si non purget . neque etiam epithymum , neque agaricum , neque etiam surculi bryoniæ. atque hi quidem, quia non valde aluum deiciunt, periculo vacant : at radix vim habet maximam. Ergo cum purgans medicamentum des, ad cætera omnia animaduerte, vtrum mali aliquid succedat . vt re atque vsu doctus confidas in singulis, & timeas. In quo spectandum etiam est, vtrum alia excretio purgationem impediatur : vt plerique sudoribus, & vrina excretis , aut vomitibus citatis nihil infra deiecerunt, quibus minus noxæ affertur, quam qui alio modo fuerint purgati. Videndum est qualia, quantaque sint ea, quæ purgantur: sed magis etiã qualia: hoc enim magis proprium est , quam maiorem mensuram spectare. multi namque cum satis vacuati viderentur, facile ferebant. ex quo fit, vt melius sit statuere signum eius purgationis, quæ satis sit, cum quispiam facile ferat . Cum vero homines exoluuntur, & decolores fiunt , & extrema refrigerantur, & conuelluntur, continenda est purgatio : si quæ medicamentum infestet , aqua calida bibenda erit, & vomendum, si aquam nō bibat, euomat tamen, nisi ei alioqui fuerit grata . nam multis potus assatim & confertim sumptus satis fuit, ad cohibendam alui subductionem. sed si paulatim sumatur , magis excretionem excitat. quin melius quoque est, manus & pedes oleo calido inungere. si vero vehementius inaniantur, tum extrema liganda erunt , & omnia deinceps facienda , quæ in choleris facere consueuimus. nam & eo casu periculum est, ne effectus quispiam, quemadmodum etiam fieri potest is qui purgatur, ex nimia euacuatione euadat. sed nihilo etiam minus sistit somnus, & balneum calidius. ac multis quidē post purgationes balnea contulerunt : ei vero, qui non satis fuerit purgatus, non lauari magis profuit, noctu autem absterguntur , & tamen victus ratio deinceps parciore esse debet, vt à cibis, & à condimentis aliquid detrahamus, & vinum acerbius demus, & postea ptissanæ cremorem, aut aliam quampiam sorbitionem è cerealibus offeramus. sed ei qui bene alatur, oua , alicam, sorbitionem , & dulce vinum dabimus, vt intestinum purgatione dera sum mitige-

re. Conu-
 lobere: ita
 rationem pe-
 ne paulatim
 mens, cibis, &
 ment: donec
 quod est sano
 quare de his, q
 in oratione, q
 ut, quæ per fi-
 mus est, ut mi-
 perire, afferan-
 dissecandi
 ingere tribum
 que in medio
 ante, quod ta-
 me & redire
 item commo-
 ditate obtine-
 re coniungere.
 libendum, q
 ueniamem r
 maxime eius q
 subleboro, &
 mi perire ma-
 in hunc morbo-
 rum indicium
 morbo
 morbum dolor
 ape: & siq
 um verbe, &
 quæ ab Ep
 nam pertime-
 mus, efficit. Id
 uanes mor-
 bus post rep
 torum dare in
 quidem, qui a
 gni ariculu
 cument, pub

tur. Conueniet etiam postridie lac cum melle, aut passo bibere: ita enim confluentes colliquationes ablucens, purgationem perfeceris, deinde vires erunt reficiendæ accessione paulatim crescente, deambulationibus, frictionibus, balneis, cibis, & cæteris rebus, quæ ad victus rationem pertinent: donec ad pristinum statum corpus redigatur. id quod est sano, & bene valenti maxime proprium. hæcenus igitur de iis, quæ per infernas partes purgant, sed cum prima oratione, quæ de purgationibus instituta est, de iis quoque, quæ per superiora euacuant, mentio sit facta, consequens est, vt nunc etiam de eis, quæ decent, quæque oportent, afferamus. ergo elleborus albus est omnium validissimus: secundæ sesamoidi, tertię vux, quartæ flori & fructui sparti tribuuntur. cætera minus faciunt. incidet tamen aliquis in medicamentum, quod non ita validum esse videbitur, quod tamen immodice purgabit, vbi & cibus, & potus, & auditus, aut aliud quippiam vomitum & subductionem commouerit, sed hoc in purgationibus, quæ per superiora obeuntur: in aliis quoque, quæ diximus, vsu potest contingere. Elleborus vero grauissimus videtur esse ad bibendum, quocirca plerique medici & ægrotantes hoc medicamentum refugiunt: verum si quis totam artem, atque apparatus eius cognoscens det, is neque quicquam facilius esse elleboro, & ipsum perspicue euacuationem moliri, & nihil penitus mali committere plane intelliget. cõuenit autem hisce morbis, insanix, melancholiæ, pedum & inueteratis coxendicum doloribus, itémque doloribus articulorũ, comitali morbo, & attonito, vertiginibus fanaticis, diutino capitis dolori, mentis segnitiei, & veterno, vitiligini, & lapræ: & siquid aliud in cuti excitetur. facit etiam ad pilorum barbæ, & capitis denudationem. confert itidem iis, qui nocte ab Ephialte suffocantur: & aquã reformidatibus, vbi iam pertimuerint: & interim dũ bibunt, ne amplius metuunt, efficit. Id autẽ olim agricolæ quoq; cognouerunt, qui vbi canes morbo caperentur, elleboro purgabant. ac medici multo post tẽpore homini, qui simili morbo laborabat, elleborum dare in animum induxerunt. Atque Hippocrates quidem, qui artem nobis instituit, & tradidit, iis, quibus magnus articulus cum vulnere luxatus est, & quibus ossa rupta cminent, iubet eodẽ die, aut postero elleborũ dare: qui licet

in cæteris rebus sint male affecti, fortasse tamē hoc medicamentum prohibiturum sit, ne gangrenis, & conuulsionibus corripiantur. quibus verbis nō facile est fidem non adhibere. Eius vero difficilis vsus est, cum videatur defectus * præprandio. quo tempore molestiam affert. ac si quis putat nigrum elleborum intelligi hoc loco, in primis huic quoque actionis difficultas inest ad excernendum, etiā si quid operosum post medicamentum sumatur, deinde vero ad opera conficienda, quibus opus est, ei par vis & facultas non inest: siquidem multo imbecillius hic tracturus est. Ergo propter hanc ambiguitatem præstabit fortasse hominibus ita affectis elleborum non dare, ac febricitantium nemini elleborus conuenit. quartanis vero quandoque conducit. est quoque accommodatus iis, qui renes habent lapillo vexatos: itēque diuturnis cruditatibus: valet etiam ad albam pituitam, ad lienem, & ad vlcera carcinode occulta: quamuis minime cōuenire vlceribus videatur. Veruntamen ego mulierē quādam vidi ab eiusmodi vlcere liberatam, cum medicus quidam in Co insula hoc ei remedium adhibuisset: cum tamen alioqui non esset clarus & probatus: sed in ellebori potione diligenter esset exercitatus. Hi morbi sunt, quibus elleborus conuenit. Verum non satis est, vt morbus medicamentum admittat, nisi alia quoque opportune deinceps adsint. supra enim diximus, quibus purgationes per superiores partes cōueniant, & quo anni tempore medicamentum purgans dādum sit, nunc vero tempora morbi explicabuntur. ea autem duo sunt: alterum ad totum morbum, alterum ad accessiones & intermissiones pertinet. de eo, quod ad totum morbum refertur, sic statuendum est, si morbus quispiam sit, qui suapte natura diuturnus esse soleat, multo melius est, vt in principio medicamentum purgans detur: cum præsertim maximam vtilitatem ei qui morbo detineatur, sit allaturum. ergo insanienti, arthritico, scabioso, & cui nerui stupore laborent, statim medicamentum dandum, prius quam morbus maiores vires acquirat, quā hoc medicamentum habeat: quemadmodum pleræque similes affectiones consuetudine, & tempore inuictæ atque insuperabiles euaserunt: quæ tamen admodum facile sublata sunt, si egrotantes in officio permaneant: & medicus excellens, & peritus sit. si vero morbus de numero eorum sit, qui incerti sunt, qui & cito, & se-

rius

rius iudicantur: ei, qui statim, non dandum medicamentum est: illi vero, qui serius, exhibendū. atque ita de toto morbo censendum est. In accessionibus vero morbi qui magnas, & ordinatas intermissiones habeat, & multas, ante medicari oportet. Cum vero paruas, & inordinatas, purgatio adhibenda est, cum primum accessio cessat: & præcipue in morbo comitiali. verendum enim est, ne morbus vocis, & sensus expertem hominem reddens, & omnium immoderatissima occupet, & graue, ac terribile aliquid faciat. In continuis vero morbis ratio temporis tum ab hora sumitur: tum cū agrotans promptus est, & mente constat, & robur corporis ad est, & cætera, quæ pertinent ad apparatus, suppetunt. De iis autem quæ purgationem antecedunt, sic statuendum est. Cum tibi veratrum dādum esse videatur, visus ratio est instituenda. ea vero est, vt qui difficulter vomunt, ad vomitū assuefiant, tum spectandum est totius habitus robur: quia si qua re alia, robore præsertim ad hoc medicamentum opus est: at vomere & à cœna, & ieiuni, & ex origano, & ex hyssopo, & ex raphano, & ex eruca, poterunt: nec debebunt diutius vomitibus extenuari. satis enim erit, vt qui facilius vomit, ter euomat: primum à cœna, post ieiunus, postremum ex raphano, aut aliquo ex iis, quæ nunc memorauimus. ac magis etiam pituitoso, quam bilioso, vomitus à cœna conuenit: tum biduum, aut triduum à vomitu intermittere. at qui difficulter vomit, longiore temporis spatio, & pluribus diebus assuefaciendus est. cum vero proxime ad sumendū medicamentum accesserit, frequentius vomere debet: post vltimum vomitum vnum diem intermittere, antequam veratrumumat: quo die clysteri vacuetur, tum lauetur, tum exiguo cibo nutriatur: sequenti die veratrum dandum, vbi placida frictione ex oleo vsi fuerimus. Multis autem modis conficitur, vt dari queat. alij enim diem & noctem in aqua macerant: tum ei diluto origanum, aut absinthium, aut nitrum indentes, præbent: alij dilutum cum melle decoquunt. porro maceratur tum in aqua, tum in vino, tum in passo. at veratrum cum vino videtur nigros humores magis educere. alij thapsiam addunt, alij sesamoides, alij taminiam vuam, vtpote quæ vomitus magis cieat: liceatque his, qui elleborum dat, recte purgare. cui autem ocium est, atque in eo studio tempus ponit, multa de apparando veratro comperiet.

L I B R U M

nam præterquam quod omnibus modis misceri & temperari queat, veteres etiam ipsius admotu, atque odoratu purgare sunt conati. è quorum numero est Plistonius. hic enim glandes aliter, atque aliter ex ellebore conficiens, an apposuit: & vomitus exciuit. ceterum elleborum passo componens, & diluens vna cum felle bubulo odorandum iis dedit, quibus neque mucus è naso, neque sputum posset procedere: ratus id quod erat, fore vt vomitus facilius prouocarentur: ac magis etiam si quis eo diutius vteretur. Diocles vero etiam vtero glandem ex ellebore imposuit, & vomitus prouocauit. Dieuches vero anum quoque ellebore instar emplastri circundedit. Ac nunc etiam pedes irrigat cocto in aqua marina ellebore, oleoque cyprio, & nitro infusis, ex qua perfusione pituitosi vomitus consequitur, qui pedum, articulorumque doloribus prodesse videatur. atque ita quidem ellebore in plerisque vsus est plurimus, cum etiã Philotimũ meminerim, vbi mitiore purgatione opus esset, post cœnam non dare, sed elleborum raphanis impingere solitum: & sequenti die raphanos præbuisse. ita enim concitatissime homo vomit: id quod minus ex ellebore faciet. vsus autem validissimus & optimus est, vt elleborum eque ac polentam contusam incidas. nec differt siue cum medulla seces, an secus: cum ea neque iuuat, neque quicquam noceat, tantum æque secare conuenit. si purgare mitius velis, paulo maiores particule faciendæ: si vehemētius, tenuiores, sed non multo. & melius etiam est, si ab vna radice sumas, quantum oporteat, si quæ ea æqualis sit, vt quæ incidis, sint equalia inter se: sin minus, curabis, vt quæ crassiora sunt, æqualis crassitudinis cum tenuioribus efficiantur. qui vero harum rerum nullam habendam esse rationem censet, multa is ignorat. si vero particule incisæ, admodum exiguæ fuerint, periculum est, ne longa alioqui, & suffocationes afferens, purgatio consequatur.

F I N I S S E P T I M I L I B R I .

ORIBASII MEDICI-

NALIVM COLLE-
CTORVM,

LIBER OCTAVVS.

*Archigenis, quomodo preparandus sit is, qui elleborum sum-
pturus est, ex primo de ratione morbos diuturnos
curandi. Cap. 1.*



Vi sumpturi elleborū sunt, preparari de-
bent, vt corpore robusto, & animo con-
stanti sint: vt eorum humores ad fluendū,
ipsique ad vomendū faciles reddantur.
ne igitur superiora loca vitentur, venter
est prius inaniendus. vt iam docui: post
vero quatuor, aut quinque dierum refectiōem, vomitus à
cœna Luna desinente ciatur: & transactis quinque diebus,
alius vomitus citetur: & in mensis incremento corpus iterū
erit reficiendum. tum aluo emollita, factaque excretionē, duo
aut tres vomitus à cœna ita prouocentur, vt tertio quoque
die singuli moueātur: atque id sub Lunā desinentē. vbi autē
ea inclinauerit, raphanis vomitus prouocabitur: vt post vi-
gesimum primum diem elleborus detur, qui vero mediocri-
ter sit affectus, ita est regendus, vt accommodatus fiat, vt ad
vomitum procliuis reddatur, vt humores eius non crassi ex
concretionē sint: vt ipse bono animo sit, vt elata mente vo-
mitui à cœna sufficiat, commoto paululum ventre: & post
triduum, aut quatrimum ex raphanis vomitum cieat: vno
vero aut duobus diebus post, elleborus detur. neque maxi-
mē contraria censenda erunt, vt multi vomitus à cœna pro-
uocentur, multęque attractiones ad infernas partes fiant:
multique ex raphanis vomitus cōcitentur, ac deinde ellebo-
rus detur.

Que danda sunt perpetuo vomituris.

Dicendum igitur est, quęnam cœnæ per vomitum sint
reiiciendę: & quomodo à raphanis eruātur. festos ergo dies
nōnulli esse existimāt eas cœnas, in quibus multa opipare,

q ij

L I B E R

variéque apparata ad ebrietatem & crapulam ingurgitantur: quæ quidem in ceteris rebus non prohibentur, si modo quid tale sit necessarium: at quos elleboro sumendo parare velis, ij paulo plura, quam consueverint, sumere debebunt: vt graua, aliena esse videantur. at stomachum supra, quam par est, extendere, alienum est, quoniam quamuis protinus sit leuandus, redditur tamen imbecillior. nam quid opus est cum morbo vacantem ad medicationem adigere? eadem ratio est eorum, quæ sumuntur. danda sunt enim quæ infra dilabi statim queant: adhibita diligentia, ne flatu impleant: ne venter inferior fluere possit: & minime nutriatur: & superior venter ea fluitantia, & non confecta, statim reiciat: quod à flatibus fieri consuevit. quocirca ea, quæ prius dantur, acria esse non debent, nec contra, dulcia, aut pinguia: sed huiusmodi ad finem seruanda sunt. quæ vero friabiliora sunt, prima ingerenda: vt panis, puls, arborum bacæ solidæ: tum carnes sumendæ sunt, non quæ grauis sint materiæ, sed pinguioris: eoque ex aliquo sapore offerendæ. ex leguminibus ea, quæ cibum simul raptant: in quibus sit aliquid acrius, vt cepa, radícula, aut porrum: tum pauca ex adstringentibus danda. ad hæc accedet aliquid nidorosum, & placenta mellita, & bellaria, ficus, vua passa, nux, & punicum * quoque ad vomitum valet. interim vero lene aliquod suauéque vinum frequentius inter bibendum est: quandoque etiam passum, & quandoque vinum mulsum copiosius capiatur. hæc nanque inflationes parant, eo quod omnia in sublime tollant. oliua autem, & præsertim sale condita, vitanda est. lentes verò, si quis eas posteaumat, acefcunt: & vomitus insuauiores faciunt. vua passa est iucundior: ficus secundo loco censetur, habet enim detergendi vim maiorem. si vero quispiam possit, ptissanam vino dulci, & melle temperatam in medio capiat. at iis, qui valde cibum cohibent, & continent, dandum est sesamum, itémque bulbi narcissi, qui cum alioqui dari queant, tum etiam ptissanæ, de qua nunc diximus, imponantur. nauseas enim pariunt. salsamentum quoque aliquod pingue ex iis, quæ sine aceto sumuntur, in primis ex aceto & plurimo oleo sumptum, vt cibus in sublime feratur, efficit. adduntur etiam aliqua olera, elixa, vt blitum, vt atriplex, & ex crudis, vt portulaca: & radícula media. vbi confertim

sumpra

sumpra se
horis, neque
ent. deinde
bi infra sit
ra. & de
bus qui sent
decant, dug
conficiatur,
contentum p
statum opus
conuenit. eo
es faciant, vt
randum est d
ferum extrah
sape autem ex
partem. si mo
mut inclinat
vomitum ex
tunc cum ven
bendum est
tionis excu
coniunctu
tiam blitio
vt gustui si
edocti non
neculum ad
que quocirca
vua accomm
medande sit
mationes si
valentia in
munt, qui a ce

Quæ res rap
leboro prius
citæ, & quæ
stiones inu
ri. debet ad
non maru

sumpta fuerit potio, post intervallum neque longius duabus horis, neque brevius vna postremū frumētaceū ingerendum erit: deinde vero ab inferiore ventre attrahitur quicquid cibi infra sit delapsū, qui valde admodum apprehensus fuerat. & deambulatio in loco aprico ineunda: cūque ructus qui sensu percipitur, ascendat, vt res ad actionem deducatur, digitus imponendus est, aut penna, vt res celerius conficiatur, epiglottide pingui oleo quodam inuncto. tum contentum premendum & vrgendum est, vt deglutiatur. ac statim opus aggredi immisso postea digito, aut alio corpore conuenit, eo nāque tempore stomachi os aperitur, & fauces faciunt, vt attrectetur, atque tangatur. qua in re perseuerandum est, donec cibus confertus educatur, sed non confertim attrahendi sunt digiti ad primā spiritus attractionem. sepe autem exinde venter compressus satis fuit ad maiorem partem, si non omnem, expellendam. debet autem is qui vomit inclinatus & pronus rem adiuuare, cum stratis segniores vomitus excitentur. qui ergo densum flatum spirat, inclinetur: cum vero flatus intus nullus adest, in ventrem procumbendum est. si vero pars eorum, aliqua ad membra respirationis excutitur, tunc cibus, qui insedit, cum multa pituita coniunctus consequitur. qui vero rite euomuerunt, in iis etiam biliosi quippiam sequitur: quod non ita conspiciatur, vt gustui sit perspicuum. Nonnulli cum vomendi rationem edocti non essent, in elleboro sumendo præ imperitia in periculum ad ducti sunt, cum ea res auxilio quandoque indigeat. quocirca diligenter est à nobis monstrandum, quibus accommodatum tempus euomendi sit: & quomodo attrectandæ sint partes, & quomodo abdomine infra deducto intentiones fiant: sed non ex locis, quæ circa collū sunt, nam violentia inde emanans potius cohiberet. talis igitur est vomitus, qui à cœna sit ciendus.

De vomitu ex raphanis excitato.

Qui ex raphanis excitus est vomitus, vtiatior est, & de elleboro prius, quid faciendum sit, edocet. nam & morsus excitat, & quandoque facit superfluitationes, quæ animi defectiones inuehant: quandoque etiam gutturis angustias parit. debet autem pondus eius, quod sumitur, maius esse libra, non maius tamen quam tres selibræ. acres autem raphanos,

q. iij

L I B E R

& teneros esse oportet: siquæ dulciores sint, caulem capere oportebit, & cum eo etiam pars foliorum, quæ tenerrima sint, & transuersa. sumitur post sumptum exiguum cibum, & aquæ potum. aliis longo tempore, omnibus vero pridie alio emollita, vel per se, vel si sponte sua non deiecisset, clysteri admotus nos eam exciuimus: cumque multa deambulatio præcessisset in loco aprico, & sub dio, aut qui probe perfletur ad meridiem: melque assumatur, ut saltim prima, quæ ingerantur, cõdiantur: tum albus sal & purus capiatur: tum in oxymelite inuoluatur: atque ipsum oxymeli interim absorbeatur non celeriter, sed parce, usque ad heminem dimidium. sit autem scilliticum acetum, si fieri potest, melque ex apibus thymo pastis. studiosus etiam ac diligens ad rem intendendam atque amplificandam, origanum ex sale non calculoso leuigatum assumere: & salem ipsum per se, & ut constanter negotium perficiat, parum oxymelitis ei forbendum erit, quantum satis sit, ut qualitates, quæ relictæ fuerint, eluantur. tum paululum decumbendum & pedes contrectandi. his confectis exsurgendum, & sese circumuertendo modicum inambulandum: & cum sedem reperierit, conabitur eructare, & rem ad horam usque producere, cum paulo maius temporis spatium intercesserit. excitata autem nausea tibi sit inditio, tum stomachum proritare & lacessere opus est, ut fiat perfecta purgatio. occurrit etiam satis magna tenuis humoris copia, plurimamque pituitosi: ac postremo nonnullis amarescens humor excernitur, quales quodammodo raphanos senserant: nisi segnior sit facta attractio. post hunc vomitum oris collutione statim opus est, item gargarismate ex hydromelite, tum ex aqua: & item exiguo decubitu, & satis copiosa pedum contrectatione: siquæ parumper dormiatur, tentandum est, ut aluus eiiciat flatu: inde deambulandum, tum in calidum balneum ingrediendum. tum cibus offerendus, qui incipiat ab aliqua re acri, aut à fassamento gracili, & ori grato: quod caro auis, aut alterius similis excipiat. at vomitum, qui à cœna fit, balneum præcedat, cum quis difficulter vomat, ita præparatus, ut post secundum vomitum à raphanis excitum, quiescat & cesset, exurgens potius, quam alimentis per dies corpus reficiens. atque ita denique ad elleborum, de quo dicetur, erit adigendus.

Eiusdem de elleboro eligendo, & dando. Cap. 2.

Antequam de elleboro præparatio loquor, dicam quodnam

nam sit antefendum, primum igitur eo qui in Oëta monte, deinde vero, qui in Galatia nascitur, utendum est. si huiusmodi non suppetat, Siculo. atque hic quidem virgas habet extentas, & rigidissimas, & ligni speciem referentes: crassitudine vero tenuiores: minusque raras cæteris. Qui vero in Galatia nascitur, is crassior est, & quodammodo rugosus, leuiter latus, candidior, apparétque ferulaceus. Oëteus vero minus candidus est, quam Galaticus, & ad nigriorem colorem magis vergit, quã ut terræ colorem referat, id quod Siculo usu venit: qui etiam minus rectis est ramis, minusque rigentibus, quique crassior euadit. sed is minime eligendus est, magis autem, quam par sit, rugosus est, cum non satis magna alimenti ei suppetit copia. is præterea fractus, valde albus intus est: gustanti vero linguam quadantenus mordet: & sensim intenditur, & saliuam ciet, & in hisce facultatibus diutius perdurat, elleborus omnis dulcescit, sed hic, magis quam alij, at Galaticus irruit celeriter suo morsu linguam statim exurens, & immoderatus saliuam educens: sed protinus extinguitur. Siculi denique humectati maior est mordicatio: est tamen inferior ea, quam Galaticus inuehit, permanétque talis, qualis incepit, diutius quam Galatici, saliuam vero, non admodum excitat, & obtundendo interimit. siccum præstat accipere, ita nanque confractus puluerem quandam asperginem non redolentem efflat. Qui vero in Oëta provenit, licet aridus sit, tamen confractus habet medullam interiorem, adhærentem, & prope conflam: verum si prius humectetur, eandem habebit circum solutam, & quæ auelli facile queat. ea quoque ad intensam purgationem opus est. Nonnulli eius partem, quæ suffocat, ademerunt, & tanquam castratum medicamentum vexationis cuiusdam ad nullam rem efficacis præbuerunt. Cæterum elleborus non esto liuidus, nec alia in eo macula conspicitor: sed extrinsecus purus sit, & fractus, intrinsecus mirum in modum candidus. qui talis sit, eligendus est. præterea potius incidendus est, quam in ramenta adigendus: siquidem ita difficile est æqualitatem coniectari, atque etiam dum in ramenta redigitur, pulvis qui in vibrationibus efficitur, ibidē insidet: qui etiam inæqualem, & suffocantem purgationem facit. crassa autē virga secetur, & per rectum, idque semel, aut bis, pro crassitudinis ratione: tum ad latera spectandum erit, ut partes æquales sint,

L I B E R

earumque tanta sit magnitudo, quanta est pultis non parue. sed huic maiorem, illi minorem portionem dare conueniet. qui incisus in tenuiores partes sit, intentius mouet. si vero tenues virgę fuerint, per longitudines diuidantur: vt virgę explanentur. Mensura est, vt cum copiosissime detur, duę drachmę sint: cum parcissime, oboli octo: cum mediocriter, decem oboli. ac minor quidem copia maiorę turbationem ciēt: maior vero copiosiore inanitionem, & minorem turbam inducit: media vero moderate agit. Hoc etiam in memoria habendum est, vt cum elleborum elegerimus, eundem refrigeremus, sed non statim post cōpositionem sectum demus: siquidem ita maiorem suffocandi vim habet. quem sane Agathinus in rebus omnibus diligentissimus cani dedit: cum non adhiberet electioni fidem: sed experientia, vt tutores transigatur, opus esse perspiceret: vt quonam pacto canis euomeret, eodem etiam homo, qui eundem sumpsisset, purgaretur. quam ob rem experientiam esse tutam statuit. porro cum aliis palam datur, quandoquidem nihil patiuntur: tum vero insanientes ab eo auertit delirium, partim quod dicto audientes non sint, partim quod ita spiritum ducunt, vt hoc eis auxilium non rite afferri posse videatur. Ad hoc accedit etiam, vt quidam medicamenta reformident, atque ita delirant. ergo his curandis insidię struendę sunt: & alia domus parata esse debet, in quam eos deducamus, vt elleborum sumant: in qua domo etiam gestationis alicuius insit occasio: & ceteri quoque apparatus, ad ea quę in purgationibus occurrunt, accommodati, atque ita cū ipsis versantes, tanquam ad eibum sumendum adducemus: & vt nobis in tempore obediant, assuefiant multo ante tempore aut pulti, aut alicę lotę, aut mellitę alicui placentę. In primis ergo afferendum est id, quod iam consuetum est: tū infuso medicamento globuli conformandi sunt, ac post pultem, & placentas, quas celixas fecimus, dandi vt deglutiantur. ergo ex quorundam optimorum hominū contentione, & emulatione eorundem, antequam quicquam preuideant, eos in insidias, cum vsus postulabit, adduces. commisceatur igitur elleborus pulti, triticeę nanque pitissanę non admodum affundendum est. nam in pulte, & placentis later. & si deprehenditur, negligentiam potius, quā insidias nostras subesse indicat. in multis enim frustulis eadem mensura debet occultari, vt si parum ex aliquo

quoque
cura op
mensura
etiam si
satis que
de per va
afferret. e
nino vis
clius ad
ter cetera
etiam vt
mie purg
cium, & a
tra dandi
ficus sit
que in pla
que antea
ti iouolu
pule, &
duarum
becilliu
runta
vsque
trior. In
in rami
cera d
tur: pol
tres de in
donec ac
vitro, au
bua cura
quantum
menter p
hoc quo
co mellit
successe
raporia
tempus
de iustis
rata vir

quo gustarint, ab alio sumant, quod satis sit, qua in re coniectura opus est, ut ex multis frustulis sumpta portio iustam mensuram compleat, nec tamen periculum vllum imminet, etiam si secundo loco sumatur, ut plerique metuunt: sed eos satis quoque purgatos vidimus. & lubricus lapsus proritat, & per vacuum fit, si quæ futura esset strangulatio, ei remediū afferret, ex quo fit, ut cum præter modum capiatur, non omnino vis auxilij dissoluatur, ut homines arbitrantur, sed facilius administretur, & ad id potius vergendum est, nam præter cætera, quæ huic medicamento insunt bona, hoc accedit etiam, ut quoquo modo primum educat, non gravis sit nimie purgationis timor, facile enim est & abstergere stomachum, & adstringere, ergo qui tractabiles sunt, ita erunt pertractandi, sed quidam ita dementes sunt, ut astutioribus insidiis sit opus: de quibus nunc itidem dicemus. Ergo si neque in placentis teneris occultare elleborum poterimus, neque antedictis ptisanis indere, bulbo utemur, ita quoque pulsi inuolutus calabitur, conteritur enim & in sorbitione, & pulte, & lente, & in omnibus iis, quæ deglutiri possunt, non duarum drachmarum pondere, sed quatuor etiam datur, imbecillius enim suas vires elleborus purgando exercet, veruntamen & multum, & tenuius, atque adeo atram bilem usquedum velis educit, si ita non possis, eo in eclegmate vititor, hocque modo paratur, Ellebori libra capienda est, quæ in ramenta redigenda est, & aquæ sextariis senis triduo maceranda: tum coquenda, usque dum sextarij tres relinquantur: postea diligenter expressas virgulas abiicere oportet, tres deinde libræ mellis reliquæ addendæ, & coquendum donec ad eclegmatis consistentiam redigatur, tum in vase vitreo, aut argenteo reponendum atque asservandum adhibita cura, ne perspiretur, dabis autem homini præparato, quantum mystri moderati magnitudinem impleat: & vehementer purgabit, neque hominem atronitum reddet, sed ad hoc quoque faciendum, insidiæ adhibendæ sunt, ergo modico mellis & aquæ addito dissolue, ac potui da. si hac non successerit, super calido cinere id ipsum coagmentato, ac catapotia conficito, ut deglutiantur, si vero tussis molesta sit, tempus accommodatum erit, ut catapotia tanquam sedandæ tussis gratia ægrotus deglutiat, quo casu in frusta moderata virgulas secabimus, & melle cocto inuolutas dabimus.

L I B E R

quosdam etiam vi purgauimus, vbi insidiis non fuisset locus. idque clysteri, in quo duplex eclegmatis mensura inesset, & modica aqua infusa. tum virgultorum particula ptissana cremore temperata & affusa, cum insaniunt.

Cætera ad finem capitis vsque non extant.

De elleboro propinando. Cap. 3.

ex Herodoti libro de praesidiis euacuantibus.

Elleborus decoctus dari apud nos minimo periculo solet. eius apparandi hæc est ratio. ellebori libram senis aque heminis triduo maceratam, lento igni decoquimus vsque dum tertia pars aquæ consumpta sit: deinde elleborum exprimimus: tū mellis heminas duas decocto addimus, itēque decoquimus, donec non inquinet. ex hoc damus iis, qui non admodum purgandi sunt, cochlearia duo: robustis vero mystri magnitudinem. purgatio, quæ per huiusmodi fiat, neque strangulationis, neque vllum alium metum, quem nimia purgatio solet incutere, vnquam nobis attulit: sed enim & violentæ, & vehementis actionis. & sine his, & per hæc, vt par est, minus prædest. Datur autem in morbis recte constitutis, vbi opus est breui & expedita curatione: & qui rite constitui à cæteris remediis nisi longiore temporis spatio non possunt. id enim ex elleboro lucri facimus, vt statim perficiat id, quod ars ipsa polliceatur. iis vero qui insaniunt, neque vlllo pacto eum sumpturi sunt, propterea quod omne alimentum suspectum habeant, ita paratum optime dabimus. nam licet perfecte morbum non expellat, minuit tamen adeo, vt sæpe etiam ipsis volentibus iterum propinemus. offeratur autem hydromelite dissolutus, vel ex pulte alicæ. potest etiamnum ex lentibus, aut libis, exhiberi. sed melius etiam sincerus datur: siquidem ita corpora magis contingit. Quinetiam in affectionibus iis, quæ difficulter curantur, elleborum damus. non omnibus tamen elleborus accommodate præbetur, vt ætati ambigæ, vt ei, cui adiuncta sit naturalis imbecillitas corporis, vt timidæ naturæ. nam in eiusmodi cum bis, tēve datus eis fuisset elleborus, maximi morbi sunt exorti. in quo vero medicamentum experti sine periculo fuimus, eūque timorem, qui circumstare solet, abieciimus, ei nos sincerum purumque

rūmque elleborum dedimus,

*Herodoti ex eodem libro, qualis sit elleborus præstantissi-
mus. Cap. 4.*

Elleborus præstantissimus est is, qui nascitur Anticyræ. reliquus autem cum cito excretionem proritet, intra tres, quatuorve horas à purgatione cessat. ceterum elleborus Anticyrinus in primis est lætior ceteris, deinde fungosus, & quodammodo multum inanis, colore vero ochræ resolutæ similis. præstantissimus tamen in hoc genere est rectus, & rugosus, & cuius plurima pars equali crassitudine constat: sub finem vero, in muris caudam definit, nihilo tamen minus sit lætus & vegetus, atque in hoc consistat, nā qui plurima eius parte in tennes pectinum modo lineas est resolutus, si natura non est lætus, is non fuit sectus in tempore opportuno, debet autem cum frangitur, intus albus videri, & tenuem habere medullam: idēque naribus admotus, non multo post sternutationes ciere: & commansus feruido gustu os implere, atque etiam dulcescere: ac magnam saluæ copiam attrahere. cum vero contractus puluerulentum quid ex se mittit, tum non est bonitatis indicium: sed aridum esse elleborum ostendit: qui quidem aridus etiam esse debet. si frutex sit, capiēda ea pars est, quæ læta sit: & præcipue ut inde quantum oporteat, sumas: si inde sumere totum non queas, dato operam ut ab alio, qui sit eiusdem generis, & in omnibus similis, quod deest, capias: ne purgatio temporibus inæqualibus succedat.

*Antylli de elleboro, ex libro de remediis euacuanti-
bus. Cap. 5.*

Hoc in primis scire conuenit, elleborum in ramenta de-
rasum celeriter purgationem ordiri, ac plerunque duas ho-
ras non excedere: bilimque ac pituitam sine multa turbatio-
ne educere: ipsumque vomitu simul reiectatū intra quatuor,
aut quinque horas terminari purgationē. qui vero parti fa-
rinæ crassioris est similis, & multo magis etiam qui in pul-
uerem redactus est, tardissime agunt, ut sæpe post quatuor,
aut quinque horas incipiant. cæterū omne & bilis & pituitæ
genus educunt. idque non sine conuulsionis, & nimis pur-
gationis periculo, ob nimiam purgandi prolixitatem, mul-

tiplicem tamen vtilitatem afferunt. Aqua vero, in qua veratrum maduerit, datur senibus, pueris, iis qui laxiorem habitum habent, quibus mens exolata est, qui que facile strangulantur, aut * eorum morbos habent: aut ut prius periculum faciamus vtrum elleborus postea dandus sit. oportet autem drachmas quinque ramentorum in aquæ pluuiæ heminæ atticæ semisse triduo madescere. tū colo traici, atque in vase duplici calefieri, atque ita decoctum propinari.

Quomodo occurrendum sit symptomatis ex elleboro consequentibus. Cap. 6.

Si facile purgantur ij, qui elleborum biberunt, hæc postea faciemus. vbi medicamentum biberint, aquam frigidam ori colluendo dabimus: tum aliquod odoramentum porrigemus. si que vires consent, eis persuadebimus, ut sedeant: si infirmæ sint, ut in strato aliquo humi depresso vsque ad duas, aut tres horas decumbat: & odoramenta quoque per intervalla offeremus. & aquam frigidam ad os colluendum exhibebimus: mentemque aliqua lepida fabella abducemus. extremas partes confricabimus, & vinciemus. Hæc omnia ideo facienda sunt, ne citius, quam par est, medicamentum euomatur. Post ea vero egrotos in lectulo pensili, aut aliquo alio sublimi loco collocatos vomere permittemus. primum nanque calor stomachum, & gulam inuadet: deinde salua & humor in os confluet, quibus sputo reiectis, iterum pituitam obuolutam reiiciunt. tum interiecto spatio, partem cibi, & medicamenti cum pituita euomunt: idemque interiecto spatio faciunt. cumque medicamentum atque cibum euomuerunt, pituitam cum exigua bilis portione reieciunt: tum cum multa bili pituitam & denique bilem puram vomunt. leniter etiam in tempore intermedio singultiunt: & habent alioqui faciem ferme facie succensam, & rubentem. tum venæ attollentur, pulsusque rarissimus fiet. Vbi vero purgatio processerit, probum colorem vultus acquireret, pulsus deus maiorque reddetur, ac singultus cessabit: & longiore spatio interiecto, & paulatim voment. His autem in media purgatione, cum singultu vexatur, melicratum, in quo ruta sit incocta, sorbendum damus. ad finem vero tepidam aquam dantes paululum intermittimus: tū ut aquam ipsam, & siquid eidem adiaceat, euomat, imperabimus. totum vero corpus aliquo pingui valde vngemus, & inter-

iecto da
macho
succedat
da et pet
fuerit. ita
nis capiat
trahonit
cis, & col
nas pericu
horum ma
teque ve

Prepara
strata habe
uerum qu
horatū e
incoctum
thymum
emplastre
digitali
lam. Si
ri velie
vllum a
ciemus.

Aquam
non sec
genus &
guadina
capitum
monuere
imperabi
to igni d
feruentur
stimulem
Nemo e
ita habe

iecto duarum horarum interuallo lauabimus, & cibum stomacho idoneū offeremus. si vero inordinatio, & irritatio succedat purgatio, aut alioqui incommodior, hæc incommoda expectabimus: vt simul atque sumptum medicamentum fuerit, statim euomant: nullamque utilitatem tardæ purgationis capiant. qua in re & strangulationis & singultus, & contractionis, & delirij, & animi defectionis, & nimix purgationis, & casus virium, & immoderatorum sudorū, & exolutionis periculum imminet. cūque minime planum sit, quodnā horum malorum sit futurum, ad omnia præparatos esse oportet. quæ vero paranda sunt, nunc persequar.

Quæ præparanda sint iis, qui elleboro purgandi sunt.

Præparare debemus lectulum sublimē, itēque alium, qui strata habeat, seu lineas, ab angulo ad angulum producta: & tertium quoque pensilem: spongas quoque, & poscam, & melicratum diuersis modis confecta: quorum vnum hyssopum incoctum habeat, aliud origanum, aliud rutam, aliud denique thymum: oleum cyprinum, melinum, irinum, rosaceumque: emplastra, ellebori dilutum, cucurbitulas, cuneolos, pennam, digitalia, clysteres, fomenta, absinthium, vinum, cibos, glandulam. Si igitur antequā tempus opportunū sit, vomitus irritari velit, metusque sit, ne medicamentum reiiciant prius, quam vllum ab eo fructum ferant: vt ipsum contineant, hæc faciemus.

Quæ facienda sint, vt qui medicamentum sumpserunt, vomitum cohibeant.

Aquam frigidam dabimus ad os perpetuo colluendum. si non sedetur turbatio, poscam: & extrema valde constringemus & fricabimus, & muriam, quantum parui mystri magnitudinem compleat, per interualla in os indemus: aut vt capparim ex muria in ore contineant, sileantque, nullōque, motu cieantur, vel vt sedentes valde sursum versi collocentur, imperabimus. si ne ita quidem leuentur, cucurbitulas ex multo igni dorso, & ori ventriculi applicabimus: & parum aque feruentis per interualla sorbendū offeremus. sique vehementer stimulentur, parum succi absinthij, aut eius decocti addemus. Nemo enim ita procliuis ad vomitum est, neque stomachū ita habet auersum, qui non à duobus aut tribus exhis reme-

L I B E R

diis leuetur. si vero contra, propter robur stomachi, aut a
liquam aliam causam, non debito tempore purgari incipiant,
in sublimi lectulo, qui deorsum vergat, collocabuntur, & vt
digitos in os coniciant, iniungemus: & vt gurgulionem
& tonsillas vnguium latitudine contingant. ita enim po-
tissimum vomitus irritabitur. præterea iubebimus, vt ti-
bias & poplites quamplurimum possint, extendant, & fle-
ctant, itémque spinam, & vt vtriusque manus pugnosc in ven-
trem impingant: aut nos impingemus, si ipsi per se non po-
terunt. si vero ne ita quidem euacuabuntur, eos in lectulo col-
locabimus, cuius strata angularia sint. & ipse sit pensilis: eos
que agitabimus & concutiemus, vt ibidem eos adhortantes
& iubentes vt vomere contendant, & in eam rem incubant:
eorumque digitos irino, aut cyprino inungemus. Noui etiá
qui scammonii liquore digitos vngerent, & ita purgationem
concitarent. Sed si ita non sequatur purgatio, pennas anse-
rinas ex cauda octo aut decem cyprino, aut irino intinctas
indemus: aut etiam digitalia. consuuntur enim digitalia ex
corio Carthaginensi, aut alio quouis molliissimo ad longi-
tudinem digitorum decem, aut duodecim instar digiti, ex his
spatium senum digitorum lana impletur: reliquū vero, quod
quaternum digitorum est, inane relinquitur: vt digitis apte-
tur. hæc igitur antedictis vnguētis intincta in stomachum
immittemus. Est auté adnotandū, in iis qui in lecto pensili
statuuntur, motum versus pedes, aut caput cieri, in iis vero
qui vomere non possunt, in latera. in quo casu pensilis quo-
que inæqualis esse debet, vt motus nauigationi similis ef-
ficiatur. Præterea melicratū, in quo hyssopum, aut origanū,
aut thymum incoquatur, sorbendum dabimus.

*Quid faciendum sit, cum strangulatio occupat eos, qui
elleborum sumpserunt.*

Quoniam nonnulli difficulter vomunt, & ideo suffocan-
tur, & sæpe etiam voce priuantur: idcirco strangulationem
sedabimus continua melicrati sorbitione, in quo ruta præci-
pue sit incocta: si minus, aliquid aliud eorum, quæ prædi-
cta sunt: idque paulatim & continenter propinabimus. itém-
que stomachum proritabimus in lectulo pennam vehemen-
tius immittendo. si vero valde admodum perturbentur, dilu-
ti ellebori cyathos tres, aut quatuor offeremus. quæ vero ad
vomitus

vomitum prouocandum adhiberi solent, reprobamus, vel ob hanc causam, quod ellebore dilutum eiusdem qualitatis cum ellebore est, & purgationem adiuuat. at quæ vomitum prouocantia dicuntur, cum diuersæ qualitatis sint, stomachum solum irritant, elleborum vero non commouent. si periculum quod ex suffocatione imminet, nullo ex his remediis subleuetur, accerrimo clysteri rem transigemus. intermissione enim periculi præbet. & tempus nobis suppeditat, ut aliis uti remediis possimus. dabimus quoque galbani tres obolos, quos deglutiant, sed si ne ita quidē sequatur leuatio, ut duos vetustissimæ urinæ cyathos sorbeant, cogemus. hæc enim abbo vomitum non cient, & suffocationem subleuant.

Quid agendum, cum in his & vox & sensus amittitur.

Si vocis, ac sensus expertes fiant, cuneolis eorum dentes diducemus in vtranque partem: & pennas immittemus, aut digitalia indemus: & quod sternutationem excitet, afferemus: ac præsertim ellebore ipso ad id utemur: sin secus, euphorbio. aut aliquo alio consimili. quandoque enim sternutantes, vorticem quandam pituitosum simul eiecerunt, qui cum stomacho inesset, & suffocationis, & amissæ vocis causam afferebat. si vero & vocis & sensus priuatio ita perseveret, vestimentum aliquod admodum firmum & robustum extendemus, & ex duabus partibus tenendum iuuenibus robustis, & aliis qui contra sese sint constituti, ac iubebimus, ut ipsum vestimentum sublime à terra extendant, tum in eo reclinabimus hominem, qui elleborum sumpsit: ac quandoque in sublime tollemus, eodem etiam vestimentum circumuertemus: quandoque vero in latus vtrunque deuoluemus, aliis id latus, quod prope eos sit, attollentibus, aliis vero deprimentibus. ac tunc quidē scire conuenit, nisi homo his quassationibus & commotionibus à sensus priuatione non subleuetur, eum non esse præter ea sensum recuperaturum.

*Quibus remediis utendum ad horum singulorum
& convulsiones*

Quoniam plerosque ac ferme omnes eos, quibus elleborus datus sit, singultus corripit, non omnibus tamen periculum

inuehit: ideo fit, vt qui leniter, & maiore spatio interposito intercurrit, cum ita sinamus: quandoquidem non sit futurus inutilis, cum stomachum proritet, & quasi recordationem excretionis ei suggerat. si vero fuerit contentus, & vehemens, & multis os vibret & quatiat, & conuulsiones inducat in primis melicratū dabimus, quod in singulis ictibus calidius absorbeatur: parum autē rutæ simul decoquatur: aut per se succus exprimatur, & singulatim aut ex melicrato, aut calida aqua sorbendum exhibebimus, si non subleuentur, remedio utemur, quod sternutamentum ciat, si vero ita quoque molestia perseveret, per totam spinę longitudinem cucurbitulas applicabimus. si vero admodū ossea spina fuerit, dorso prius peruncto vnam cucurbitulam sub magna colli vertebra affigemus: eamque deducere sensim, & deorsum in spinam trahere conabimur: cūque ad eum locum perducta fuerit, vbi vericulus adiunctus est, aliam quoque admouebimus prope vertebra, & ita eam etiā deducemus, atque ita primā ablatam iterum superius applicamus, nam sepe numero cucurbitule admotæ stomachū à singultu cōtractū, & veluti cōtortū dirigunt, & ad suum statum redigunt. Præterea vero partes extremas vinculis excipiemus, easque calfaciemus tum somētis, tum in aquam calidam infundendo. ad hæc etiam pauores quosdam machinamur, & contumeliis eos incessimus, & vt magnas inspirationes edant educimus: atque etiam vt longo tempore spiritum intro trahant: & vt longo tractu respirent.

Quid facto opus sit in contractionibus, quæ consequuntur.

Quemadmodū singultus omnes inuadere, ita contractiones quoque consueuerunt: quarum vehementes, quæ præsertim musculis accidunt, qui in cruris sura sunt, itēque in femoribus, & brachiis, & musculis masticatoribus, & in extremis pedibus, & potius etiam in manibus, quarum inquam vehementes sedabimus, copiose vngentes, comprimentes, calfacientes, fouentesque. quin huiusmodi contentiones cōpressio musculorum manibus facta summo opere adiuuat. nā qui in eorum ventribus collectus est spiritus, qui contractio nis est autor, manū compressū eliditur. Iam vero oleū sicyonium, & vetus, & ex acopis quæ calfaciunt, & molliunt, & ca-

storeū

florum
melicrat
ware cont
uat bal
plerique
* * *
etiam vna
deborum
lauerit co

Nimias p
ando & ca
cucurbitulas
netam au
in, sed si ve
mogenab
ficandi ha
nes si si si
habet.

Sudor
corpulq
fis, absterge
ficis, casu
Qui vero
tu nescire

Ex He

Qui per
ni modicu
di appetitu
cietur,
nem per
nulli vero
li dentes

storeum perfusum, & epotum, & per se, & cum melicato, & melicratum copiosum cum ruta absorptum obtundere, & leuare contractiones solent. sed maxime omnium contractos iuuat balneum. quapropter si purgatio abunde successit, ut in plerisque eorum qui vehementer contrahuntur, contingit,
 * * * eos lauabimus, & iterum, & tertio. ac quendam etiam vno die octies lotū vidimus non eo die quidem quo elleborum sumpserat, sed consequente. nam secundo die vehementi contractione correptus balnei auxilio fuit leuatus.

Quid faciendum in nimia purgatione, ut remittitur comprimatur.

Nimias purgationes sistemus calidissimum potum propinando, & extrema ligando, & vehementi frictione, & validis cucurbitulis tum hypochondrio, tum vero dorso admotis, & vi etiam auulsis. summe etiam vomitus cohibet absinthij potio, sed si vomitus perseverarint, etiam soporiferis dolorem mitigantibus utemur. hæc enim cum suapte natura vim exsiccandi habeant, & quia somnum inducunt ideo, excretiones sistunt: si quidem somnus quoque vim excretionis sistendæ habet.

Quid agendum, cum sudores consequuntur.

Sudores immoderatos sistemus ventulum commouendo, corpusq; spongiis aqua frigida, aut posca imbutis, & expressis, abstergendo: utemurque linimentis & stipatibus, & emplasticis, casum autem virium alimentis, & vino recuperabimus. Qui vero teporem, aut anxietatem sentiunt, ii mihi videntur nescire anxietatem à casu virium distinguere.

Ex Herodoto, de iis, quibus suffocationis periculum imminet: ex libro de remediis euacuantibus.

Cap. 7.

Qui periclitantur, ne suffocentur, ii in principio purgationis medicum saluæ expuunt: cum autem vehemens vomendi appetitus excitatur, nihil excernunt, facies intumescit, oculi exeruntur, colligantur & constipantur partes ad respirationem pertinentes, cum spirandi difficultate coniuncta. nonnulli vero linguam exerunt, & copioso sudore madescunt, alii dentes concutiunt, eisque mens tentatur. Cum igitur im-

1

L I B E R

minēs periculum cognoscamus, nulla interposita mora quā-
primum succurrere debemus. Vnguenta enim pennis obu-
luta indemus, & dabimus operam, vt pituitam, quæ locis de-
glutionis infideat, atque inhæreat, euellamus, atque ego qui-
dem, in quodam, qui suffocatione correptus inibi erat, vt mo-
reretur (nam dentibus contractis ita conciderat, vt faciunt iu-
gulatæ ostiæ) ore cuneolis aperto, & dentibus obfirmatis, ne
eos clauderet, manum inieci, & contractis in orbem neruis,
qui ad deglutionem sunt, manui adhærescentem pituitā ex-
traxi, quæ etiam absterfa, indiuidua permanfit.

Ctesij, de elleboro.

Cap. 8.

Patris, auique mei temporibus nullus medicus elleborum
dedit. nam neque eius temperiem, neque modum, neque
pondus quod dandum esset, illi cognouerant. si vero quispiā
elleborum potui daret, in primis hominem admonebat, fore
vt in magnum periculū casurus esset. cæterum ex iis, qui sump-
serunt, multi suffocati sunt, pauci seruati. at nunc tuto dari
videtur.

Mnesithei, de elleboro.

Cap. 9.

Ellebori potioni magnum periculum coniunctum est. nā
vel statim valentē hominem reddidit, vel multam, longā-
que molestiam in morbo concitauit. danda vero huiusmodi
remedia sunt iis, qui se tuta curatione præterea curatū iri nō
putant.

*Ex secundo libro Anthylli de remediis euacuantibus,
de apophlegmatismo.*

Cap. 10.

Apophlegmatismis vtendū est, vbi cætera remedia fuerint
adhibita, quæ deducere queant materiem stabilem, quæ iam
facta sit, & localibus remediis potius indigeat. etenim apo-
phlegmatismus potest simul calefacere, & materias infestas
abducere: corporaque corrigere & emendare, distributis su-
per eis medicamentis iis, quæ pituitam auocant, ad sinapismi
proportionem. his autem vtendum est, cum alius pridie deie-
cit aut clysteri, aut aliquo alio leuiter & pure subducēte irri-
tata. post apophlegmatismum, melicrato calido colluemus. si
vero vehemens morsus remaneat, lacte, aut rosaceo id ipsum
grit faciendum.

Galenus

Galenus, de iis quæ caput euacuant.

Cap. 11.

Succos, qui in capite sunt, sputis euacuamus. quod si leuiter facere voluerimus, piper & mastichen admiscebimus. si vberius euacuare propositum sit, vt pyrethrum & vuam taminiā mandant, imperabimus. anemonę quoque vtriusque radix commansa pituitam prouocat. itémque capparis radice cortex. serosum excrementum hæc remedia vacuant. crassam vero, lentamque pituitam, sinapi cum oxymelite, aut sapa, in qua origanum, aut hyssopum incoxeris. ego vero, vt tu nosti, eam sinapi cum oxymelite admisceo. si vero cerebrum mucro purgandum sit, acris eum remediis, quorum nonnulla sternutamenta itidem cient, euocabimus. itaque anemonę omnis, itémque cyclamini, & betę succus per nares purgat. Sternutamenta vero mouet ranunculi radix æque ac alia omnia, quæ vehementer siccāt, & sternutamenta prouocant: itémque flores & struthij radix, porro sternutamenta in succis crudis, qui thorace, pulmone, & capite continentur, non conueniunt. partes enim illas vehementer quatiunt, & perturbāt, quæ moderate calefieri: & quiescere, vt crudi succi concoquantur, desiderant. quibus agitatius contrarium euenit: siquidem ita magis implentur: & succos in eis contentos non concoquunt. Contra vero vbi iam concocti fuerint, ad excrementa euacuanda sternutamenta conducunt. Videmus enim in grauedinibus, destillationibusque in initio eas à sternutamentis acui, atque exacerbari morbos: in declinationibus vero dissolui.

Antylli, de suffumigatione, ex secundo de remediis euacuantibus.

Cap. 12

Suffumigatio non multis quidē, sed iis, quibus thorax morbo obsidetur, accommodata est: atque ne his quidem omnibus: neque enim sanguinem spuentibus adhibenda: neque etiam arido morbo laborantibus: sed iis solum conuenit, qui asthmatici sunt, & non nisi recta ceruice spirant: quatenus à multitudine pituitę, quæ difficulter educi queat, vexantur. Suffumigationibus autem vtendum est, cum ceteris quoque localibus remediis vtimur, prius tamē aluo emollita;

r ij

L I B E R

Homo vero vestibus totus tectus in sede locandus est ita, ut deuarcatus cruribus prona facie ad vtrunque genu decumbat: & os fatiscat. in spatio vero intermedio olla, aut lebes ignito: carbones habens statuatur: tum in ignem spargenda est aristolochia, ac præsertim, quæ clematidis dicitur: sin minus, quæ dactylitis nominatur: vel sulfur ignem non expertum, aut ladanum, aut tædam, aut ligna persicæ arboris, aut funiculum dera sum impones, in genere melior est nauticus, qui mari fuerit madefactus. homini postea imperandum est ut ore patulo fumum prompte attrahat, multi enim hoc confectio pituitam excreuerunt.

De iis, quæ per nares caput purgant, ex eodem libro Anthylli. Cap. 13.

Iis, quæ per nares caput euacuant, utimur ad hunc modum. calamus tenuis per rectum perforatus qui in nares indi possit, quique sit sex digitorum longitudinis, in nares imponitur: tum capacitas tota medicamento impletur. esto autem calamus aut naturalis, aut æneus, eo igitur naribus admoto, ex altera extremitate insufflando medicamentum in nares propel limus. quæ imponuntur sunt hæc, * apocelium, succus cyclamini, aut betæ, aut elaterium tritum, cedræa, & quæcunque huiusmodi sunt materiæ.

Ex eodem, de iis, quæ per lachrymas purgant. Cap. 14.

Eorum, quæ lachrymas cient, exiguus est usus, ad oculos enim diuturno morbo exsiccatos dūtaxat, item quæ palpebras scabie oppressas, & cum oculi non nutriuntur, utimur: ut oculos humore perfundamus aut materiam ad eos adducamus, quæ probe alantur. Lachrymas autem prouocant collyria quæ acria sunt. quæ vero odoratu lachrymas proritât, sunt veluti sinapi, cæpe, & silphij liquor. Fumus vero, quippe qui magis lædat, quam iuuat, euitandus est.

Ex eodem, de iis, quæ per vrinam inaniunt. Cap. 15.

Vrinam mouentium usus cauendus est in tabescentibus, aut macie confectis: quandoquidem eos valde perturbat. ex iis vero, quæ vrinam cient, alia sumuntur ore potui data: alia glandi

glandi colis imponuntur, his vero potissimum vtimur, cum vesicca explera est, & idcirco cōtrahi, & vacuare vrinam non potest. in glandem vero priapi nitrum aqua resolutum, itē que muriam, salis florem, fel, cyclaminum, & corem animal indimus.

De iis, quæ sanguinem educunt, ex eodem libro.

Cap.

16.

Vtimur iis, quæ sanguinem educunt, in mulieribus, quibus menstruæ purgationes suppressæ sunt. sanguinem vero educunt, ea quæ vrinam prouocant omnia, & quæcunque non cum siccitate, sed cum acrimonia calfaciunt. inter hæc numeratur brassicæ radix decocta, cuius decoctum potui detur, & præcipue agrestis brassicæ, & magis etiam eius quæ marina vocatur: persea radix, itē quæ saluia, ruta, amaranthum, chrysanthemum, dictamnium, crucæ semen. prouocant etiam quæ adhibentur extrinsecus, cum ori vuluæ admouentur, vt ruta trita, per se, vel cum sale, vel cum melle: vel cinis radicis anethi cum melle: porri succus, alliorum capita admota, myrrha trita ex vino, amomum, & denique leporis coagulum.

De iis, quæ sudorem prouocant, ex eodem libro.

Cap.

17.

Sudorem mouētibus vtimur, vel vt siccitatem minuamus, quæ in summa cute à febris, & præcipue tabidis inducitur fuerit: vel vt pruritus, & commotiones vehementer vexantes amoueamus: vel in reficiendo post longum morbum corpore, vbi summa cutis exaruit.

Vtimur pari modo eisdem vbi corpus ex alimento fructum nullum fert, & in corporis extenuatione, & in cruditate, & hydrope, qui *ἀνὰ σάπην* nominatur: & in quibus eruptio aliqua in summa cute excitatur, cum aut corruptio præcessisset, aut cibi acrimonia. Sudorem autem prouocant hæc: chamæmelum siccum tritum oleo inspersum, & summæ cuti valide confricatum: feseli Massiliense, pyrethrum, cachry, anisum similiter oleo inspersum. nitrum tollum non nimis tenuē, sed crassiusculum cum oleo: salis flos oleo temperatus: liquor cyrenaicus aqua dilutus, corpori infricatus, & ad ciccris magnitudinem epotus.

r iij

Deriuatio eiusdē generis est, cū euacuatione, quæ fit per eā partem, quæ fluxionem suscipit. ea fit per aliquam vicinam partē: vt cum per gurgulionē, aut palatum fit fluxio, ipsius deriuatio accommodata per nares fiet, nobis irritantibus, aut per acria medicamenta prouocantibus. Cum autem ad oculos aut aures, succi vergunt, tum eos non in nares tantum, sed in os etiam deriuare debemus, medicamento quod ex organo & sapa, & quod ex sinapi constat, dato ad os colluendū, & gargarizandum. Id etiam nobis est perspicuum, vnam taminiā commansam, pyrethrumque, & cetera huius generis acria, succorum copiā, quæ in oculos, aut aures ex capite fertur, ad os traducere. Fit etiam deriuatio, si id quod per asperam arteriam in pulmonem defluit, ad stomachū diuertamus, siquidem hoc est potius eligendum. atque etiam in muliere si per venas sedis sanguis erumpat, eumque ad vteri venas traducamus: fiet deriuatio. ex quo fit, vt riuare sit per riuos ducere, deriuare vero est è riuis ad latera diuertere.

Vehementissimos influxus succorū auxiliis reuellentibus cōfertim ingruere prohibemus. sunt autem reuellentia auxilia, vincula artuum, vbi succi in thoracem & ventrem vehementer inclinant: vomitus vero, vbi partes infernas petūt: quemadmodum etiam acres clysteres, vbi ad vomitum vergūt. Has ambas succorum inclinationes, cum eam inquam quæ per superiorem, & per inferiorem ventrem fit, ad vrinas, & sudores reuelles. vrinas quoque tum ad sudores, tum ad alui dejectiones trahes. reuellens etiam præsidium est cucurbitula prope mammas affixa. quæ vero hypochondriis adhibentur, sæpenumero sanguinis ad nares impetum valde reuulsisse conspexistis: quemadmodum etiam immodicas per vterum irruptiones, acria quoque medicamenta artubus imposita, succos ad caput, visceraque vergentes reuellunt. Omnino autem reuulsio facienda est, deorsum, vbi succi sursum vergūt: sursum vero, vbi ad inferiora feruntur: & vbi introrsum, ad exteriora: vbi extrorsum, ad interiora: sique dextrorsum inclinant, in sinistram: si sinistrorsum, ad dextram facienda reuulsio est. eo

dēique

dēmq̃ modo fluxiones, quæ retro inclinant, antrorsum: quæ vero in anteriora, retrorsum reuellendæ sunt. Timocrates igitur Heracleotes, cum iuuenis quidam ex agro non mediocri pondus in urbem dextra manu tulisset, ob eamque causam impleta manus fuisset, iussit, vt pari pondere sinistre imposito tantundem itineris conficeret: ita enim fore vt manus tumor euanesceret, qua re cōfecta, statim tumor cessauit, ac me quidem non solum in manibus, sed cruribus etiam tale aliquid facere conspexitis. cruri nanque, in quod humor confluit, aliquod repellens medicamentū adhibeo, idque apte ligo: eaque deligatio ab inferioribus partibus incipit, eaque semper vicinas partes continenter excipiens, & densans, vsque ad inguina progreditur: alteri vero cruri aliquod medicamentum calfaciens impono, atque ita fluxionem commuto, & ad alterum crus reuello.

Ex Galeno, de vomitu.

Cap. 20.

Qui vomere consueuerunt, iis quandoque consuetudinem seruare, quandoque vero intermittere cōducit. si ergo in ventrem flaua bilis cōfluat, homóque sit ea natura, vt amara bilis in eo redundet, regionemque calidam habiter, & vitam laboriosam, atque ærumnosam degat, is assuefaciendus est, vt bilim prius vomat, quam cibum capiat. si vero malum inde originem ducat, quod multum vini à balneo ante cibum velit bibere, tum & vomendi consuetudo est omittēda, & simul etiam potus, atque pastus multitudo auferenda. Ventriculus enim ab his factus imbecillus, totius corporis redundantiam, quæ in eum confluit, suscipere assuefcit. quibusdam tamē téporibus prodest euomere, vt succum glutinosum, & plurimū à ventre abstergamus: quo quidem tempore radículas ex oxymelle, & quæcunque sunt huius generis, offeremus, sique talem succū in ventriculo quis cōtinuo aceruarit, is cōtinuo quoq; ad vomitū impellendus erit. Contra vero, si ventriculus imbecillus ita sit, vt quæ sumpta fuerint, ferre non queat, vomitū prohibebimus: pauculosque cibos, & eos quidem stomacho idoneos dabimus: & medicamentis, quæ foris superdantur, eum roborabimus. Cui autem à cœna vomitum sine molestia cieri volumus, narcissi bulbos vna cū aliquo eorum, quibus ille vesca-

r iij

L I B E R

tur,propinantes,eum ita afficiemus , vt facile vomat . Narcissi enim bulbus,quem caput vocant , medicamētum est ad vomitum efficax . Valet etiam ad vomitum prouocandum semen anagyri , & glandis vnguentarię carnis drachma ex melicrato epota.hęc itidem per infernam aluū copiose subducit.itaque cū hoc medicamento vtimur ad alicuius visceris purgationem,& p̄sertim iecoris,& lienis , ex oxycrato dare ipsum consueuimus.

*Quomodo facile quis vomat,ex iis,quę ad Potamonianum,
de vomitibus scripta sunt. Cap. 21.*

Quoniam iis,qui violenter & difficulter vomunt,nō mediocriter periculum imminet,& venam aliquam rumpendi,& aspectum lædendi,& fauces,& columellam, & gulam dolore conficiendi,& aliquod aliud incommodum patiendi: idcirco medici rationes inuenerunt, quibus facile quispiā vomat,ne ceteris commodis,quę ex vomitu consequuntur,ob eā causam priuētur. Vomitum enim pituitā euacuat, caput leuat,& totum reliquum habitum corporis agiliorē reddit.& quandoque eum , qui cibum audius ingessit , cruditatibus vexari , & cum qui nimio vino se ingurgitarit , lædi non sinīt. Summa ergo, & totius rei caput est facilitas in mediocri repletionē vomendi. qui enim se nimis expleuerunt , ita ventrem quoque impleuerunt, vt eum cōtrahere nullo modo possint. Adhibenda quoque diligentia est, ne quę dentur,acerba , aridęque sint : sed partim dulciora & humidiora , partim vero acriora sint . Inter hęc probantur radiculara,eruca,verus salsamentum,origanum , & parum cępæ,atque porri . Valent ad hoc etiam ptissanę ex leguminibus, melle adiecto : itēque lomenta fabarum : & pingues carnes.nec tamen horum succi tantum sumendi sunt , sed tota etiam moles deglutienda: siquidem ita accommodatius euomentur . nam quę facile in succum vertuntur , ea & sua tenuitate,& quod parum abest,quin concocti sint,facilius distribuuntur.ergo qui vomiturus sit, non debet in mādendo morari diutius.sint autem omnia coquendo emollita, inter vina,dulciora anteferēda sunt : hęc enim magis fluitant : & multo etiā magis, si maiore aquę copia , quā consueuerint, diluantur. Debet autem is,qui vult euomere,& repidiorem, & largiorem potum sumere : amygdalāsque melle intinctas
cede.

edere: & eodem tempore placentas gustare, peponisque, ac cucumeris semen maceratum, & laeuigatum cum melle offerre. ita enim vomitum mirum in modum citat. idem facit etiam cucumeris radix trita ex melle. Qui volunt vehementius euomere, ij narcissi bulbum aqua decoquunt, eaque vinum temperant. ciet non secus vomitum irinum vnguentū, si quis illitis eo digitis irritet. Ad summam non multum spatij debet intercedere inter cœnam & vomitum, sed dum cibi adhuc sublimes sunt, vomitus incipiendus. si vero te impediât repletio, vt cogaris intermittere, tum primum somnū dormies. ita enim & venter aperitur, & cibi facile sursum redeunt. Qui vero in somnis vomunt, confert aquam frequentius absorbere: & vomitus neque acorem, neque morsum habentes soluet. Valet etiā ad vomitum, nec cessare, nec quicquam intermittere. sed vbi primum vomitus apparebit, etiā si perexiguus sit, irritandus erit, nec ab irritatione cessandū. interim vero tepidiorem aquam bibere: quādoquidem hoc pacto quispiam absque vlla molestia pulcherrime vomet. Post vomitus autem os colluendum est, & facies posca, aut aqua abstergēda. hoc enim & dentibus prodest, & caput al-leuat. sinciput vero præstat oleo rosaceo, aut crudo, quod omotribes vocant, vngere. cūque est quiescendum, iubere alicui debemus, vt pedes placide fricet: cū hoc etiam caput leuet.

Ex Diocle, de iis quæ ad vomitum valent.

Cap. 22.

Ex iis, quæ vomitum prouocant, quæ medicamenti vim habent, quæque efficacia sunt, non debent adhiberi: vtendū vero est familiaribus, & præsertim quæ consuetæ victus rationis sunt. huiusmodi erit dilutum cucumerum tenerorum & in frusta sectorum, & aqua maceratorum: qua deinde temperemus potum, quem à cœna tepidum sumamus. itēque aqua decocti * sphæni eodem modo pota: aut pura polenta non admodum cocta, cum melle in sorbitione sumpta & ante, & post cœnam. aut allia tosta ex melle sumpta. aut lissima fricta, tritaque, & tribus melicrati semiheminis perfusa. Hæc omnia & tepida, & acruatim sumenda sunt. ac facilius quoque sedens, quam stans quispiam euomet. nō debet autem ad vomitum incitatus cogi, vt omnia exqui-

sit euomat: sed ubi satis fuerit euacuatus, tum cessandum: nec interim quicquam, vel exiguum bibendum. Qui vero aridum vomit, is debet aquam tepidam superbibere. cumque tantum vomuerit, quantum esse consentaneum videatur, tum ventrem, tanquam vas quoddam lauet, potu melicrati, aut aquae permultae, & iterum vomat: si non, faciem aqua perspergat, & os vino mero & tepido colluat, & tribus cyathis eiusdem paulatim gargarizet.

Archigenis, de vomitibus à cibo excitatis.

Cap. 23.

In quo interpretando fuit propemodum diuinandum.

Vomitibus à cibo non consuetudine, sed necessitate commouetur. mirabilis autem utilitas inde consequetur, si bis, tervè in mense cieatur. nam & ex eo quod necessitate, ac propemodum vi prouocatur, facilitas quaedam consequitur, à qua nonnulli iam eam consuetudinem sibi acquisiuerunt, ut onus ciborum continuum alij exquisitè, alij vero plane deposuerint, suntque admodum negligentes ij, qui non dant operam, ut quae vehementer eis molesta sunt, & praesertim quae à colore procedunt, extinguant, & ad nihilum redigant. ego tamen ne in his quidem perspicuis praemiis quae proposita sunt, vllum tale medicamentum homini puro, & qui temperantiam seruari posse putet, suaderem, esset enim commutatio, ut alteri morbo locus daretur: & alicui quidem detestandus, alicui autem propterea cum ex alimento nullum fructum corpus fert: alij deformitas, aut grauis imbecillitas. amaræ bilis vitia, itemque atræ bilis, difficultas respirationis, vitiosa nutritio. defectio voluptatis, redundantia cupiditatis. Ac nonnulli ita stomachi assueti sunt, ut statim id quod ingestum sit reiciant prius, quam ex eo utilitatem ullam percipiant: vel propter malum quoddam, quod explicari non possit, ipsum vomant. idque non digitorum prouocatione, sed rudiculis quibusdam in ipsum ferme ventriculum iniectis. idque quod relictum est, aequè ac totum grauat, & facile, & absurde corrumpitur, neque unquam concoquitur. Praeterea alui secessiones immoderate mehercule perturbant. doloresque duri partim hinc, partim aliunde exoriuntur, corpus occupantes: cum praesto sit & paratum corpus, ut iniuria à quacunque causa afficiatur. & morbi etiam in quibusdam latet.

latitant accessionibus à ventre intercisis: contra vero sese effe-
ferunt, cum angusta est via, per quam auxiliū afferatur: cum
quispiam ita animum inducit, vt relicta & pro nihilo ducta
temperantia, in huiusmodi cumulum malorum cadat.

Rusi, de clysteribus. Cap. 24.

Ex clysteribus, qui iniiciuntur, alij molles, alij acres sunt.
molles constant ex aqua calida, & aqua & oleo commixtis,
ex lacte, ex scœnigræci, alicæ, tragi, lini seminis, & maluæ de-
cocto, ex cremore ptissanæ, aut tritici, ex portulaca, planta-
gine, beta, pane, vino & oleo mixtis: eruo, decocto lentium,
& rosæ, & rosaceo: nonnullis vero adhibetur adeps anseri-
mus, suillus, caprinus, hircinus, & gallinaceus, butyrum, resi-
na terebinthina, ruta, cuminum, lauri baccæ, anethum, & bi-
tumen. acres autem sunt, muria, aqua marina, garum, siluri,
decoctum iridis, thymi, satureiæ, aristolochiæ rotundæ, cu-
cumeris syluestris, absinthij, melicratum cum sale & nitro:
colocynthidos decoctum, centaurij succus, enici decoctum,
itêque ellebori nigri, mercurialis, polypodijque: acetum
cum nitro, rhus quo vtuntur coriarij. molles ergo clysteres
conueniunt iis, in quibus sterco durum insidet: & in qui-
bus maius aliquod remedium adhibere volumus, vt cucur-
bitulas, dropacem, venę sectionem: aut abraderè aliquid in-
stituimus, aut chirurgiam exercere. in gestatione, balneo: aut
vomitu, & præsertim purgante. Iam vero mollem clysterem
indimus etiâ iis, quos medicamêto aliquo per infernas par-
tes purgante sumus purgaturi, vt id facilius succedat, & mi-
nime consentaneū sit, vt * nudum medicamentū corpora
contingat. eodê quoque vtimur, quasi curationis causâ post
acrem clysterem iniectum, vt abstergamus, siquid insedit, ne
acres res, quæ inhæserint, nimis mordeant. Vtimur quoque
molli clysteri in iis, qui sanguinem spūnt: ne vasa nimia cu-
piditate, & voluntate exorta à vehementia disrumpantur.
Et in quibus partes adiacentes acres sunt, vt in exulceratio-
ne intestinorum, quæ defluxiones afferat: & in iis, quorum
intestina à medicamētis erosa fuerūt: & in torminibus, & fla-
tibus: & cum stomachus moribus vexatur: & in continuis
nimisq; desidendi cupiditatibus. & in quibus grauitas re-
ctum intestinū vrget: quam perfrictiones quædâ excitarint.

L I B E R

& in vrinę difficultatibus, & in suffocationibus, quę ex vtero sunt. & cum intestina inflammatione tentantur, & cum chirurgia in scroto administratur. Et omnino in capitis dolore in initio ante alia remedia, vt materiam alio traducamus. Non tamen eadem iniecta prosunt omnibus: sed aqua per se infusa facit, vt stercus excernatur in febribus continuis, & malignis: & in ætatibus, & naturis corporis delicatioribus: & in quibus non longo tempore stercus contentum exaruit. & in iis, qui ex longa imbecillitate corpus reficiunt, in quibus excrementa difficulter redduntur: & in chirurgiis prope anum administratis. Cæterum in iis, in quibus flatuum inuolutiones sunt, aqua vtemur calidior: quippe cum tepida flatum gignat: & vnica iniectione clysteris infundemus. nā quod interiecto spatio inditur, procreare flatus solet. Fœnigręci decoctum mulieribus potius conuenit: itēque mollioribus & delicatioribus, quorum stercus sit asperius. eodem quoque modo maluæ decocto vtemur: & præcipue in quibus locorum mitigare siccitatem oporteat: hni seminis autē, in quibus morsus sunt, partibus mediis inflammatione obsessis. si tamē acutę febres fuerint, caputque patiat, hæc iniectio, quia caput replet, fugiēda est. erit autem accōmodata locis muliebribus, vesicę, renibus, & intestinis inflammatione vexatis. Fursurum cremor, tragi, panis, & alicę vim etiam quandam alendi habent, & sæpe etiam vbi deiecta fuerint excrementa, vsus postulat, vt aliquid, quod alat, iniiciamus: vt in attonitis, & quibusdam cardiacis, qui cum sumere aliquid volunt, non possunt, neque etiā transmittunt, cum stercore sint repleti. Pręterea habent etiā vim dissoluendi, præsertim si triticei sint. quin hæc etiā iniectio intestinorū vlcerationibus, quę in summa cute sunt, prodest: quibus itidem ptissana cōuenit. magis enim abstergit, & statim stercus dissoluit: si quę suillū adipē adiunctū habeat, morsibus medebitur. efficacior est hircinus. Betę succus & decoctum intestinorum vertigines, & palpitationes dissoluunt: & stercus molliunt, & morsionibus occurrunt. Portulacę succus utilis est feruoribus cū alioqui exortis, tū vero ob læsionē aliquā consequentibus, & iis, in quibus obduri stercoreis excretionem, quę paulatim per ablationem facta fugit, male affectus constrictor, & rectum intestinum affe-

affectione
quo casu
inflammatione
loca imbecillitatis
codum malum
aut antea
modi decocto
clysteris infusione, & iniectione
purus, & in quibus robur
valens, & in diti admodum
conuenit
lunum, but
inflammatione
namque
ter conueni
olus, & qu
inflammatione
ita est, & m
citur. Meli
affectu, se
in quibus
dum sit. V
colluimus
subducatur
re occasio
ius gallinarum
cum m
us aptus est,
vocat, exere
codum leni
modo, aut
aliquid eorū
sit. Hic cum
biberunt, b
re ratione,
maxima sit
quoque est

affectionem erysipelatis naturam referentem contraxit. in quo casu eidem ouum & oleum admiscetur. in omni vero inflammatione per se iniectus conuenit. aptus est iis, quorum loca imbecillia sunt: & in quibus tormina fiunt. at rutæ decoctum magis valet ad flatus discutiendos: aut etiam cymini, aut anethi, aut lauri baccarum. quandoque etiam huiusmodi decoctum febricitatibus ob perfrictionē prodest. Lac clysteri iniicitur, vbi intestina, renes, vesica, & vterus vlceratione, & inflammatione obsidentur. Acres vero adhibentur, vt pruritus, extuberationes, & cutis vlcerationes excitentur. quibus roboris causa (nisi à noma sit origo) mel, aut adeps anserinus, aut suillus accedit. Resinam terebinthinam antedictis adiungimus. hydrelæo vero in morbis, in quibus stercus retinetur, & præsertim quos perfrictio inuexit: itémque bitumen. butyrum vero indimus, cum propter intestini recti inflammationem stercora continentur: & cōcreta excernuntur. cūque vlcera sordida intestinum obsideant, idem clyster conueniet. Maluæ decoctum & succus in longis torminibus, & quæ etiam diutius extendantur: atque etiam in inflammationibus intestinorum, cum sedes quoque simul affecta est, & muliebres læsiones adsunt, vtiliter admodum iniicitur. Melicratum vero inditur, cum nullo malo partes sunt affectæ, sed stercus contentum molliri difficulter potest. & in quibus notabili quadā chirurgica administratione vterendum sit. Vino autem, oleo, & cremore ptissianæ, aut maluæ colluemus eos, qui papaueris liquorē sumpserint. si quæ alius subducatur, frigidis clysteribus: si non, calidis vtemur. qua in re occasio est, vt festinemus. Lac bubulum, aut caprillū, aut ius gallinarum infundimus iis, qui altercum sumpserunt. Vinum cum rosaceo, vitello ouorū, aut dulci rosaceo incoctū, iis aptū est, quos crebra desidendi cupiditas, quā *τενισμός* vocāt, exerceat: idque in principio. hydromeli vero, aut decoctum lenticularum cum melle, aut erui decoctum eodem modo, aut ptissianæ cremorem cum rosaceo iniicimus, cum aliquid eorum, quæ ora obturant, in colo intestino fractum sit. Ficum decoctum accommodatum est iis, qui buprestim biberunt. Mensura eorum, quæ iniicienda sunt, habita naturæ ratione, in viris minor, in sceminis maior sit: ita tamen, vt maxima sit trium heminarum, minor vero vnus. habenda quoque est ætatis, & vitæ studiorum, & magnitudinis ven-

tris, & morborum, & symptomatum ratio. sæpe enim & bis,
& ter iniicimus, & præsertim in quibus vlceratio & inflam-
matio in recto intestino stercus, quod inibi est, continet, vin-
culi instar: idque quod iniectū est, superiores partes petere
non potest, & ita rursus excernitur, vt tantūmodo ad per-
fundendum & madefaciendū valuerit. Atque hæc quidē de
clysteribus, deque iniectionibus mollibus cōmemorata sunt
nobis. Acres autem clysteres in laterum doloribus conueni-
unt: itēque gingiuarū defluxionibus: capitis doloribus, fe-
bribus inordinatis, quæ non vehementes inuasionēs habent,
sed remissas, & inæquales: grauitasque in intestinis sit, & ven-
ter humidus, & molle hypochondriū. Valent etiā in quoti-
diana febre, cum & suffocationes sunt, & propensio in som-
num nimia, & etiā in magna difficultate respirandi, morbo
pulmonis, angina, tetano, morbo comitali, insania, coxedi-
cis doloribus, vertiginibus, nō nisi recta ceruice spirantibus,
lippitudine laborantibus, lumbricis teretibus & latis, qui in-
tus contineantur, iis qui letale aliquid sumpserint, aut me-
dicamentum: vlceribus, aut ebullitionibus & eruptionibus,
quæ in capite fiunt, callis & extuberationibus in summa cu-
te nascentibus, scabie, lepra: recti intestini vsque ad constri-
ctorē resolutione, lethargicis, & qui pituitam in ventriculo
adhærescentem habent, & ob eam causam non cōcoquunt,
nec fructum ex alimento sentiunt, & decolores sunt: in fluo-
re alui, cæliacis, hebetudine oculorū, & vlceratis intestinis.
In hoc genere non idem omnibus conuenit. nam acres cly-
steres in acutis & vehementibus febribus, & in quibus sto-
machus, aut intestina, aut alia imbecilla sint, vitare cōuenit.
quorum etiam vsus fugiendus est in iis, quorum vesica, aut
renes, aut vterus male affecti sunt: & quibus aluus per se hu-
meatur. itēque, in hyeme, aut æstate ardenti, & in corpo-
ribus imbecillis, quæ vel ob morbū ita sint affecta, aut quod
ita delicata sint nata. atque etiam in pueris, & mulieribus,
& eunuchis: & populis qui ad septentrionem sunt siti, & re-
gionem frigidam incolunt, vt Galli, vt Thraces, vt Itali: si-
quidem hi clysteres acres ferre non possunt: & item in iis, in
quibus ob quamcunque iniectionem, aut causam intestina
vlcerantur: & in vulneribus notabilibus, & quæ neruis insti-
cta sint. Audentius autem huiusmodi ablutionibus vtetur
in viris iuuenibus, quorū firma sit corporis constitutio, & a-
thle-

athletici
ei sunt be
cribus in
funt, &
turi adlin
& legatur
reducit au
dureat fit
funt acco
mura, & quæ
8 partes odi
vnt & magi
patetur para
aque maris
mura pars, q
Sunt eadem
ingitur. Ali
pe se decoq
doque admi
suerit, & d
quibus ven
punt, aut si
efficiant, &
sed præci
melle, aut
bi detrahe
bera, simili
habet. capi
iuentur. Si
ueniet quot
postea vel n
hypodij deo
per lentore
quo appa
nprocuron
tudine labe
nes sint. eun
guinem po
proprie ac
cum aceto

shletita: in locis vero, vt in Aegypto, vbi huic remedio affue-
 ti sunt homines: itémque in aliis téperatis. Iá vero valde a-
 cribus in iis, quorú firma est corporis affectio, ipsique fortis-
 simi sunt, & eis assueti, cum neque febres, neque morbi diu-
 turni adlint, crassitudo autem humorum sublit, aut torpor
 & segnities corporis consequatur, vti consueuimus. In co-
 xendicis autem doloribus, & ea spiratione quæ recta ceruice
 duntaxat fit, cum spiritus à stomacho non eliditur, clysteres
 ij sunt accommodati, qui sanguinem educunt: vt garum, siluri,
 muria, aqua maris. at in quibus ipsa tantúmodo affectio est,
 & partes adiacentes integræ sunt, ceteri clysteres conueni-
 unt: & magis cū adhibeantur, vt corpus ad alia auxilia præ-
 paratur. parantur autem hoc modo, mellis heminæ dimidiū,
 aquæ marinæ heminæ duæ, salis holcæ tres, olei quarta he-
 minæ pars, quidam vero duo oua adiungunt. Alius Clyster.
 Salis eadem mensura, nitri tantundem, cremor ptissanæ ad-
 iungitur. Alius. decoctū colocynthidis. eius enim tomentum
 per se decoquendū est: eique sal, aut nitrū à nonnullis quan-
 doque admiscetur. Simples fiunt ex decocto iridis, thymi,
 satureiæ, absinthij, cucumeris agrestis: quibus sal additur. In
 quibus vero sunt calli, aut tubercula in summa cute erum-
 punt, aut scabies, aut lepra, quæ grauitatem aut cruditatem
 efficiant, aliquis clyster conueniet ex iis, de quibus diximus:
 sed præcipue is, qui ex rotundæ aristolochiæ decocto cum
 melle, aut sale iniicitur. Qui vero lateris dolore vexantur, v-
 bi detractus sanguis fuerit, aliquo ex his clysteribus vti de-
 bent, simili quoque modo ij, quibus defluxio gingiuas male
 habet. capitis vero dolor, & morbus comitialis magnopere
 iuuantur, si initiū auxiliorum à clysteribus ducant: quibus cō-
 ueniet quoque veratri nigri decoctū, mercuriali adiecta: &
 postea vel rotundæ aristolochiæ, vel centaurij succus, vel po-
 lypodij decoctū: quibus non secus mel accedat. si vero pro-
 pter lentorum humorum copiam hebetes oculi sint facti, ali-
 quo apparato clysteri vtemur. in pleuriticis quoque & pe-
 ripneumonicis & vertiginosis, & tetano, & angina, & lippit-
 tudine laborantibus, post venæ sectionem, si capaces homi-
 nes sint, eundem clysterem iniiciemus, qui vero taurinū san-
 guinem potauerunt, iis clysteres memorati conueniunt: sed
 proprie acetū est nitro infusum: & brassicæ succus, aut semen
 cum aceto. iis, qui mortiferos fungos comederunt, nitrum,

L I B E R

absinthium, & raphani succus, & rutę decoctum iniicitur. iis vero, qui lac biberunt, acetum ex nitro, aut lac asininũ cum multo sale. in recti intestini resolutione, clyster ex muria imponendus est. Qui vero ascaridas lumbricos gignunt, iis muriam, aut centarij decoctum, aut etiã absinthij, aut lupinorũ: aut aloẽ, aut cedriam cũ aliquo ex prædictis decoctis iniicimus. quibus aluus diuturna fluxione vexatur, prodest muria, & absinthij decoctum: exterit cavitates, & renouat quod deest. quos helminthę lãbrici infestant, iis decoctũ lupinorum, aut eorum dilutum, aut rhun coriariorũ, aut decoctum abrotoni, vel absinthij, aut oleũ cicinũ, aut muriam imponimus. Lethargicis vero post ea remedia, quę eis in principio conueniũt, iniicimus melicratũ, quod nitrũ, salẽque, & absinthij succi portiunculã acceperit. iis, quos leuitas intestinorum exercet, qui ob intestini imbecillitatẽ, id quod ingestũ est, reddunt, absinthij decoctũ damus. Cupiditatibus nimis desidendi, quas tineamus excitat, parũ murię adhibendũ: cũ vires non laborent, nec affectio alte intra corpus delitescat. mel vero non admiscemus, quia permanentius humectat, & madoris efficiens est. si vero sanguis purus ob intestini exulcerationẽ fluat, herbę sanguinalis, aut plantaginis, aut myrti baccarũ nigrarũ vino decoctarũ succũ dabimus: quibus postea admiscēbimus thus, aut acaciã, aut hypocystida, aut balauistiũ, aut malicoriũ, aut rhois succũ, aut lanę, aut sępię cinerẽ, vel lintei multiplicis vna cum alumine scissili cõbusti: aut spongię sanguine taurino, & pice imbutę, aut fimi asinini per se: & præsertim si ab vlceribus depascentibus morbus oriatur. aut iniicienda sunt frigida, vt ne ictu suo pun-gant. Vlceribus autẽ intestini non fluentibus lac caprillum indimus, aut etiam bubulũ, aut lycij drachmas duas, terrę samię drachmas duas: aut amyli tantundẽ: aut triticeę ptil-lanę cũ bulbo cõbusto, aut absinthio. Fluẽtibus autẽ aut per-humidis vlceribus, chartę cõbustę, aut lentisci cinerẽ ini-ci-mus, aut medicamentũ ex charta constans cũ aqua, aut de-cocto alicuius adstringentiũ. In vsu clysterum, qui efficacio-res sunt, prius clyster mollis iniiciẽdus est, vt stercus insidens excernatur: & ne tã acer clyster corpora cõfertim attingat. sed in febribus morbus tẽpus non cõcedit vt sępe clysteres imponamus: in iis vero, qui febris sunt expertes, nobis per-missum est, vt in tẽpore opportuno clysteres adhibere pos-simus.

simus. De
vero, mino
aut eius par
rum partu
quod volum
coris retent
purgeuonem
perlepe & se
pue aut resin
ficta vero ex
funt. Tempus
elut in acutu
tur, quicquid
ret in diuturn
commodatũ
in pũtũ remu
dũ febribus in
sitionis ven
bus vt in qui
& plenitudo
superat, ibi
sertim in at
cum pũtũ
nas partes
quibus enit
nobis persp
tur, & contin
non opportu
lites, aut pur
que sique in
sorum corpora
cũ ventrẽ
rum excitent
facies decolo
uentur, & pe
nibus acres
rectum sunt
fentericis,
stimulus fi
mus, quæ

simus. Debet autem primus clyster, esse copiosior. secundum vero, minorem: & largiorē quoque in iis, in quibus capitis, aut eius partium causa indimus: minus largum vero, cum earum partium causa, quæ in pròptu sunt & paratæ, ut ab eis id, quod volumus, subducamus. In quibus tamen diuturna stercoreis retentio fuit, non debemus protinus (efficacem enim purgationem respuit affectio) acrem iniicere clysterem: sed persepe & secundum, & tertium clysterem mollem, qui accipiat aut resinam terebinthinam aut butyrum, imponimus. facta vero excretionē, tum utimur iis, qui acres & efficaces sunt. Tempus vero acrium clysterum in statu febre vacante est: ut in acutis, in principiis, & in statibus morbi adhibeantur. quinetiam in remissione accessionum eos iniicere oportet. in diuturnis vero, & declinantibus, omne tempus est accommodatū. cumque in febribus fiat intentio, atque remissio, initium remissionis magis probatur. sepe etiam in quibusdā febribus in principio utile est acri clysteri uti: qui vicem sectionis venæ ferat: idque in naturis tēperatis & calidioribus: ut in quibusdam, quorū firma est corporis constitutio, & plenitudo in carne est. ubi vero humores dominantur, & superant, ibi utilius est, materiā purgatione minuere, & præsertim in athletis propter usum, quem in clysteribus habent: cum pituitosa aluus eorū sit, & magna coaceruatio per infernas partes consequatur, cum vna etiam alia syndrome adsit. quibus enim in vêtre pituita est, iis clyster cōuenit. id quod nobis perspicuū ex eo fit, quod alimenta non concoquantur, & continui ructus, & acidi fiant, & cibi euomantur: & non opportune sudor in balneis cieatur: venter solitos clysteres, aut purgationes deferat, imbecillis reddatur, gracilisque: sique in febrem homo incidat, difficili rigore capiatur, totum corpus non æqualiter calefiat, maxime vero partes circa ventrē exurantur: appetitus vero absurdarū, & acriū rerum excitentur: appetitusque ad cibos sumendos deiiciatur: facies decolor, & plūbea euadat: pulsus lentus sit, ægre moueatur, & percussiones quasdā raras habeat. his statibus omnibus acres clysteres conueniunt. Cæterū fistulæ partim per rectum sunt perforatæ, partim nō item: quibus utimur in dysentericis, & in quibus partes corporis facile afficiuntur, ne stimulus fiat: & in quibus euacuationē facere pròptius volumus. quæ vero per rectū sunt perforata, adhibētur iis, in qui-

L I B E R

bus volumus clysterem plura expellere & à superioribus locis deducere:& in quibus crassiora sunt , quæ per clysterem iniicimus. quocirca erit huic rei accommodatum, vt loca affecta singillatim indicemus, vt, quantum differant, intelligatur: ex quo etiam planum fiet, ad quænam fistulis per rectum perforatis vti debeamus.

Signa quibus cognoscamus, quorum locorum affectione stercus retineatur.

Si igitur stercus propter affectionem , quæ in superioribus sit partibus, contineatur, stomachi distentio apparebit , dolores dorsi, & spiritus angustię consequentur. si vero à * ieiuno intestino cohibeatur, & gracilibus intestinis, nauseę, saluæ copia, & frequentes in vmbilico æstus erunt. colo vero intestino male affecto, flatus accidunt, retentionesque: & circa vmbilicū intestina violente torquebuntur, lumbis patientibus, grauitas sentitur, quæ lassitudinis sensū inuehit: quæque excernuntur, æque ac in defluxionibus, infracta, & sanie imbuta sunt. si venter laboret, stercus subalbicans, aut modica flaua bili coloratum, & laxum descendet: si ieiunum intestinum, concretum , strigmentosumque humorem, ac nigricantem, in quo sanguinolentæ interdum fibrę conspiciuntur, stercus habebit: interdum vero flaua admodū, copiosaque, & ex glande non ita multa lubricantur. A tenuibus vero intestinis excernuntur quæ porri colorem referant, variæque sint, ac continuo pauca, & quæ celeres mutationes sortiantur, ac magna cum molestia, & marcore descendant. At ab intestinis crassis , & fursuracea colore mucum quandam imitantia. ac cupiditate statim excitata, multa confertim , & sæpe subducuntur. à recto intestino mucus purus , qui crassitudinem habet, ac sanguis floridus cum magna, & frequentī cupiditate desidendi, quæ vix inhibetur, fluit . Cum igitur hæc signa sint, neminem iam latebit , quibus vtendum fistulis in egrotantibus esse videatur, ablutione autem per clysterem auricularem, cum in sinu magno, tum in abscessu in intercostali exorto , & in fistulis: vt primum humorem aqua calida abluamus, tum melicrato repurgemus: postremo vero medicamenta indamus, quæ pus creent. In colis quoque vlceribus infuso melicrato, fursurum decocto, & prillanę cremore, medicamenta iniicimus . In sinus vero muliebres inflam-

inflammatione
malæque,
nacco, vbi
rum, quod
lum, aut bury
nlenos vero
decocto cum
gula, aut may
rum & vine
fructos vero p
qua, intro ex a
se cum expell
non succum p
lum, aut rola

Ex Ly
teris

Dysenteria
huiusmodi, ve
quibuldam v
generis he sic
accidentes u
cant, omnes
flammarone
rit inflammari
perle, vel co
quatur: vel ip
non decoctum
cum quibus si
dum, aut sic
magna portio
partem firmam
constingunt
in aliquare
tem non qu
vlicera sint
erit accom
denda, non
his quoque
fert, & vic

inflammatione oppressos conticimus fœnigræci decoctum, maluæque, & prissanæ cum seuo porcino, anserino, & gallinacco. vbi vero vlcere tentantur, imponimus medicamentum, quod τετραφάρμακον nominatur, aut ceruinam medullam, aut butyrum, & deinde pessos ad id accommodatos. Puerulentos vero abluimus melicrato, alumine ex aqua, stœbes decocto cum vino, aut rosas, aut hedera: aut malicorio, aut galla, aut myrto, aut vino cum modico alumine, aut paribus vini & vrinæ portionibus: aut myrti decocto & vrina. obstructos vero propter alicuius rei adiectionem, abluimus aqua, nitro ex aqua, melicrato cum multo impetu, & stridore. sic enim expelletur id quod coiuerat. Pruriētibus vero betarum succum, porri. * chartam cum aceto, cepam, amygdalinum, aut rosaceum cum aceto iniicimus.

Ex Lyci commentariis, materia ad clysteres dysentericorum. Cap. 25.

Dysenterix, hoc est tormina intestinorum quedam sunt huiusmodi, vt nullam inflammationem adiunctam habeant, quibuldam vero etiam inflammatio sit coniuncta. vtriusque generis hæ sunt notæ. dolor ergo nimius, & febres quedam accedentes inflammationem cum vlceribus subesse significant, omnes vero febres, & dolor non vehemens absque inflammatione, vlcera esse declarat. Si ergo ad vlcera accesserit inflammatio, clysteres hi conuenient: succus lenticulæ, vel per se, vel cum lenticulis lentisci portio, aut myrti decoquatur: vel ipse solæ decoquantur. Facit ad idem cydoniorum decoctum. decoquantur etiam triticum, oryza, & alica: cum quibus singulis decoquimus aut mala, aut symphiti radicem, aut flores mali punici. quorum florum non debet magna portio simul decoqui. efficacissima hæc ablutio ad partem firmandam erit. His confectis, cætera omnia, quæ constringunt, si humida fuerint, conuenient: si vero arida, in aliqua re decoquentur, quæ illorum corrumpere facultatem non queat. suntque huiusmodi quamplurima. Si vero vlcera sint inflammationis expertia, idē genus abluitionum erit accommodatū: ceterum vis adstringendi erit parū intendenda. non tamen multo maior esse debet: quandoquidē in his quoque adstrictio modū excedens, & mordicationem affert, & vlcera proritat, & eo adigit, vt vel inflammentur, vel

f ij

L I B E R

humectentur ex quo fit, vt huiusmodi ablutiones hisce dysenterijs conueniant. Est porro alia dysenterijæ differentia, vt vlcera quandoque in ipsis intestinis computrescant partim magis, partim minus. putrescentiũ signa sunt hæc. odor eorũ, quæ exeunt, teter, color ad liuidũ & nigrũ vergit. ergo in hoc genere facultas adstringens augenda est. fiat igitur clyster ex vino, quodcunque maxime adstringens videatur. in eo rhus coriariorum decoquatur, itẽque rubi ramusculi, aut myrti, aut gallæ, aut punicę cortex, vel ipse rhois succus tantus vino dilutus, quantus satis sit, vt ablutio in intestinum per cornu importetur. succus etiam lenticularum satis erit ad hunc vsum præstandum, vt iis, quæ dicta sunt commisceatur. Gallæ vero aut cortices punicæ, si quis eas siccauerit, & cõruderit ita, vt in tenuissimũ pollinem redigantur, & cribro traiciat, & succo lentis admisceat, apte per clysterem iniiciantur. Hęc igitur conueniunt iis, quæ modice putrescunt. vbi vero malum procedit, maiórque putredo efficitur, atque adeo augetur, vt fibræ quædam, aut etiam tunicę intestinorum abscedant: tunc non iam solum adstringentibus opus est, sed medicamentis quoque crustas inducturis. in quibus caute admodum est progrediendum, plerunque enim cum vna cum putredine coniuncta sit inflammatio, à medicamentis nimium vehemētibus magnopere augeri consuevit. ergo non ita statim ad horum remediorum auxilium confugiendum est: sed tum denique, cum malum ita transgressum est, vt summa necessitas nos talibus vti cogat. Huius quoque generis ablutionum numerus est maximus. at ego non omnes adscribam, sed eas tantum, quæ vfu comprobatae, vt sunt etiam eæ, de quibus ante dixi, præstare ceteris existimantur. Vna igitur ad hunc modum ablutio per clysterem efficitur. Aluminis duri partes duæ, mali punici fructus, aut corticis pars vna: cortex aridus esto. his diligenter tritis lenticulę succum miscebis, & ablutionem admodum accommodatam iis, quibus iam vlcera computruerunt, iniicies. eaque nec vehementissima erit, sed inter adstringentes, & crustam inducentes quodammodo media. Alius clyster. Auripigmentum & alumen trita, alicui adstringenti humori commixta infunduntur. cui nonnulli chartæ cinerem præterea admiscunt, Alius admodũ validus. chartę cinis, auripigmentũ, calx vna paribus portionibus alicui ex prædictis

Etis huc
quoque
stolochm
lis, erugn
cadmiz
omnia ex
ad oculos
reſta in m
hæc, iteru
nor autem
gr. Almod.
bulla, chalc
de aceto ad
decocto dilu
tur. Aliud
Forum roſa
ſij, ſucci hy
raginis ſem
rolarum ſu
ſucco ſatis
ſucco exce
tur. In his
rentium,
ximam co
propter m
cunque ve
adacius,
rentiam ac
ſenteris v
que intra
interſino,
doque ſa
patris, hui
gunt. Ely
vehemen
ſint. hor
mor ſua
nia deſt
qui ac
cantur.

etis humoribus adstringentibus admiscetur. Alius, qui ipse quoque valde est efficax. Corticis punice, & gallarum, aristolochie, panacis, cadmiæ, aluminis scissilis, turis, salis fossilis, eruginis, aluminis rotundi, singulorum pares portiones: cadmiæ vero duplum. hæc omnia contunduntur, & simul omnia ex * aceto læuigantur, ut fiunt medicamenta, quæ ad oculos valent. tenuissime nanque læuigantur: tum coniecta in mortarium, in pastillos rediguntur. & cum vsus postulat, iterum læuigantur, & succo lentiũ commiscetur. maior autem minorve copia adhibenda est, ut rei necessitas exigat. Aliud. Calcis viuæ, auripigmenti, sandarachæ, chartæ cæbulæ, chalcitidis pares portiones, in pollinem redigantur: & aceto admixto pastillos confice. ubi vsus postulat, myrti decocto dissolue: & medicamentum huiusmodi est præstantius. Aliud admodum bonum, & cui coniuncta securitas est, Florum rosarum, liquoris papaueris, acaciæ, gummi, balau-stij, succi hypocyssidis, singulorum partes tres: gallarũ plantaginis seminis, cuiusque horum partes due. lycij Indici: si rosarum succus in promptu non sit, tres foliorum partes pro succo satis erunt: hæcque læuigentur omnia, & plantaginis succo excepta in pastillos ponderis drachmæ vnus redigantur. In his medicamentis hoc sciendum est, quæcunque adurentium, crustas inducentium, & vehementissimorum maximam copiam habent admixtam, eis cautius esse vtendum, propter metum eis adiunctum, ne error committatur: quæcunque vero maiorem partem habent adstringentium, eis audacius, & confidentius vtendum: quia siquid præter sententiam accidat, noxa grauis non sequitur. Hoc etiã in dysenteris visum fuit, ut cum vlus aliquod vasculum eorum, quæ intra intestinum sunt, contingeret, & magis oppresso intestino, in causa esset, ut sanguis ipse excerneretur: & quandoque sanguis concretus exiuit, quandoque vero non compactus, huic constitutioni conueniunt clysteres, qui adstringunt. Est etiã alia quædam in dysenteris differentia, ut quæ vehementer descendunt, in quibusdam acia excernendo sint. horum signum, est ipsius egrotantis anticipatio. nam morsiones molestissimæ sunt, & vlcera quoque ab acrimonia defluxionis excitantur. clysteres igitur tum conueniunt, qui acrimoniam obtundant: quales sunt qui ex tritico parantur, cū quibus decoquatur pinguedo capræ: sed satis erit

suis, & bouis. Sed caprilla magis apta esse existimatur. tritici cum decoctum succum crassum ex se mittit: qui vna cum pinguedine commixtus clysterē facit ad ea, quæ nunc dicta sunt accommodatum. Alij clysteres. Oryza decoquitur, aut alica, eodem modo: aut lenticula cum caprilla pinguedine: aut palmarum pingues: & ex eis clyster efficitur. Alij Gummi, aut tragacantha simul cum aliquo ex antedictis coquitur. si vero papauer etiam simul incoquatur, clyster is dolorem valde leuabit. Alius, qui paratur hoc modo. Lini semen cum papaueris vagina, & ipso etiamnum semine, & succus qui inde emanat, mordicationibus aptus clyster efficitur.

Alius, qui ad eadem valet. Ex prædictis succis quemuis cappe, & papaueris liquorē clysteri iniice. præstantissimus enim omnium ad has effectiones est. sed cautione opus est. nam si supra vires ægrotantis indatur, periculum affert. ergo cū imbecillum corpus est, hoc remedio non est vtendum: vel si vramur, perexiguum imponemus, habita virium eius, cui datur, ratione. si etiam gracilis egrotus sit, ne tunc quidem hunc liquorem infundemus: nisi admodum paucum. In his est etiam hoc intelligendum, quibusdam dysentericis purulenta excerni, quæ pura vlcera esse declarāt: in quibus vtendum hisce clysteribus est. Ceratum ex myrteo aut rosaceo fit, & admodum liquidum iniicitur: aut aliquid adstringentium, quæ ante memorauimus, sed adstringētis pauca esse debet copia. Hos clysteres intēdes, aut remittes, si addas, aut minuas, habita ratione affectionis, quæ proposita sit, simili quoque modo ex vno in alium transfundes, cum ita postulare tēpus videatur. Mēsurā autem clysterum pauca esto: ne sua illuue prægrauet, & ideo excernendi cupiditatem excitet. non tamen ita exigua sit, vt ob eam causam in ipsum intestinum longissime peruenire non queat. nec etiam semel duntaxat, sed sepe iniiciendi clysteres sunt, & hoc in omni alui secessione est optimum: nisi clyster ex liquore infundatur. quinetiam clysteres medicamenta crustas inducentia continentes, non sunt continenter ingerēdi, sed magnis spatiis interpositis. tam vero præstat etiā id indicare: clysterē nō omnino calidū esse debere, sed vsq; adeo, vt ne frigoris sensum inuehat. atq; hæc de clysteribus ad dysentericos accommodatis à me dicta sint. nam de iis, qui tinctimo conueniunt, nihil est, quod diuersum à superioribus dicendum putem. verum id solum commemorandum, clysteres

clyster
dysenter
te mor

Circa
rus per
lis est in
sanguin
sum exit
la reben
lis est, vt
est præcip
borum ver
bet per se
es admix
lore, nequ
runtamen
lametate,
notestunū
dem sent
tur, quoc
confuuar
gulis par
fecit. Et
deat. clyst
aqua myr
hæc mor
ficum de
clicante

Chole
nes vni
sed in
dolore
iniectione
rupti
clyster

clysteres in tinctmo maius emolumentum afferre, quam in dysenteriiis: quia in tinctmo longiore tempore in affecta parte morantur.

Aliud genus clysteris extremo intestino laboranti idoneum. Cap. 26.

Circa intestina morbus quidam huiusmodi oboritur. mucus permultus excernitur: estque mucus res quædam, qualis est intestinorum abrasio. neque est sanies quædam, neque sanguini simile vna effluit: & in excernendo cum hoc ipsum exit, nulla desidendi cupiditas vrgens excitatur, nec vlla vehemens necessitas vrget, vt citius excernatur: sed talis est, vt grauitatem extremo intestino afferat: quæ neque est præcipue vehemens, neque quicquam affert molestiæ. Ciborum vero excrementa, si nihil aliud incidat, quod ea perturbet, per se ipsa procedunt sanis similia: neque quicquam est eis admixtum: totumque corpus nihil insigniter neque in colore, neque in carnis copia, neque in viribus lædi videtur. Veruntamen qui in hoc statu morbi est, nõ omnino abest à calamitate. in quo quidem morbo male affectum esse extremum intestinum videtur: sed accidens vlcus non est: sed mea quidem sententia, quod efficitur, inde trahere originem videtur, quod excrementa singulis corporis partibus ingenita eo confluant: quæ non aliunde fiunt, quam cum alimentum singulis partibus distribuitur, & partes ipsæ minus recte sunt affectæ. Ergo cum hic morbus in extrema intestini parte insideat, clysteres apti fient ex sicubus siccis aqua decoctis: in qua aqua myrrha trita immergatur. atque hoc medicamentum erit huic morbo idoneum. Alius clyster fit etiam hoc modo. Aloë ficuum decocto admiscetur. hi clysteres intestinum humescens exsiccentes, expellere morbum possunt.

Clysteres in cholera sicca. Cap. 27.

Cholera sicca à vehementi quadam eorum, quibus homines vescuntur, corruptela exoritur, cum ea non excernuntur, sed in ventre atque intestinis continentur, repletionisque, & dolores vehementes creant. huius mali remedium est clyster iniectus, qui euacuandi vim habeat. Cū enim cibi nuper corrupti fuerint, atque in eas intestini partes amandati, profecto clyster eis admixtus potest ea quæ ibidem cohibentur, educere.

f. iiii

re. sed tamen omittendi huiusmodi clysteres sunt: vtendumque iis, qui flatus attenuant, & eorum, quæ continentur, concretionem diffundunt. sunt autem hi. Oleum ipsum calidum: aut ei incoquatur cuminum, aut fœniculum, aut rutæ semen: quæ optima erit, si montana fuerit. bonus etiam clyster ex ruta viridi fit. sed multi comam oleo decoquunt. verum decoctio rutæ vim perdit, ita igitur parabitur. Vbi oleū valde ferbuerit, ab igni amoueto, & quæ adhuc feruenti rutæ comam iniicito. conflagrescit enim in oleo, & in eo vires suas relinquit. atque ita hic clyster mirum in modum cholere siccæ cōducit.

*Ad ileon, hoc est terminus intestinum accommodati
clysteres* Cap. 28.

Voluulus post inflammationem aliquam fit, quæ suo tumore transitus, & meatus occupet. sique maior, & perfectus tumor sit, ne flatus quoque transeant, prohibebit, & ne cibi excrementa descendant: si minor, tantummodo difficilem exitum facit, sed non penitus stercus vetat excerni. cæterum inflammatio modo hæc, modo illam intestini partem obsidet: quæ res facit, vt tū bene, tum male hisce clysteribus utamur. Interdum enim superiores partes prope ventrem occupat: interdum vero & ianitoris partem aliquam apprehendit: interdum in gracilibus intestinis insidet: interdum colon obsidet. quæ omnia ex his signis dignoscuntur. si inflammatio fiat ab iis partibus quæ à ventriculo ad intestinum transitus patet, ventriculus statim impleri mirum in modum videtur, etiam si perexiguum quid biberint, aut comederint: multique vomitus ex quavis occasione contingunt: & totum etiam corpus perturbatione & molestia afficitur. si vero aliquod ex gracilibus intestinis inflammatio occuparit, in eo quoque casu vomitus fiunt, sed non tamē ita multi. Vbi autē sita hæc intestina sint, nobis prius dissectio monstrauit: & potius in his videtur dolor esse. verū neque in his, neque in superioribus omnino prohibetur excretio. Cum enim in sublimibus partibus sit inflammatio, omnia, vtut sors feret, inferius descendere properantia, exitu non priuabuntur, nisi aliquod aliud impedimentum, quale est, cui voluuli nomen est, contingat. & venter admodum fluit, cum inflammatio superiores partes exerceat: venæ quæ infra locum affectum quæ in menses

Sententia sunt
propellantur
vit. si vero in
tus multi fit
& dolore co
it: & transitu
tur, vel paru
matio suo tu
transcendi i
tinentur, nō
bus circa col
les ad hoc m
sedandas inf
calidum per
huic idoneus
buzum eliqu
dum etiam &
huiusmodi. H
terebint hinc
decoquitur
rum miscetu
quoniam in
duntur, atque

Colon à d
in quo iecur
præteruene
nem accessit
spiam infra
se colon non
hominibus it
lera sicca dicitur

Renes &
tuis morbit
tur, ex quo
ant, quoniam
qui ad ch

centerio sunt, semper ad inferiorem intestini partem aliquid propellant. idque est, quod Hippocrates ileon inanem vocauit. si vero inflammatio in colo sit, hæc consequentur: vomitus multi sunt, & perturbatio eo tempore modum excedit, & dolore conficit eam partem, vbi dissectio colon esse docuit: & transitus ciborum, & flatuum nunc penitus impediuntur, vel parum admodum dehiscunt: quatenus diminuta inflammatio suo tumore internam coli partem occupans, relinquit transeundi locum. sunt igitur hæc notæ, at qui hoc morbo detinentur, nō eis omnibus iniiciendi clysteres sunt: sed iis, quibus circa colon intestinum inflammatio est. Erunt autem vtilles ad hoc morbo laborantes, clysteres omnes, quicunque ad sedandas inflammationes valent: qui sunt huiusmodi. oleum calidum per se, vel cui melicratum sit incoctum. Est & alius huic idoneus, qui ad hunc modum componitur. Cum oleo butyrum eliquatur, & ita moderate calidum iniicitur. interdum etiam & butyro lini seminis succus commiscetur. Alius huiusmodi. Hyssopū cum oleo colliquamus, & parum resinæ terebintinæ admiscemus. Alius. Cum oleo caput papaueris decoquitur. caput postea papaueris abiicitur, tum oleo butyrum miscetur. sed hunc clysterem nō esse copiosum oportet: quoniam impleta in inflammationibus intestina contunduntur, atque affliguntur.

Ad colicos

Cap. 29.

Colon à dextro ili incipiens vsque ad eum locū pertingit, in quo iecur est, inde demissum, & dextrum hypochondrium præteruectum, ad sinistrū venit eodem: vbi proxime ad splenem accessit, ad sinistrum ile vicissim pergit: cæterum prope spinam infra descendit. in ea igitur parte, in qua locatum esse colon nouimus, dolores quidam, & inflationes oboriuntur. hominibus ita affectis cōueniūt clysteres tales, quales in cholera sicca diximus.

Ad renum vitia

Cap. 30.

Renes & colon mutuo afficiuntur. & quemadmodū mutuis morbis corripuntur, ita etiam remediis eisdem subleuantur. ex quo fit, vt nephritici plerique iis clysteribus vti debeant, quos colicis idoneos esse docuimus: qui quidem sunt ij, qui ad choleram siccam valere à nobis sunt dicti.

Commune quidpiam habent, & consensum morborum inter se colon & vterus ita, vt inflammationi vterum obsis- denti, merito conferant ea, quæ in colon iniiciuntur. ergo in- fundendum est calidum oleum, cui accedat anserina, aut gal- linacea pinguedo: aut butyrum cum oleo misceatur: aut hys- sopum, aut lini seminis decoctum, aut aliquid aliud eorum, quæ in ileo attulimus, adiungemus.

Quoniã autẽ vesica vicina est intestino, & simul etiã con- nata est, & in morbi consensum cum eo adducitur, quan- doque etiam aliquo ex iis clysteribus vti conuenit. Ergo vbi inflammatio vesicam vexet, vtiles erunt clysteres, quos ad ileum facere supra memorauimus. si vlcus in ea sit, ei- que adiuncta sit inflammatio, idem clyster erit idoneus: si inflammatio coniuncta non sit, clysteribus non est opus. Vesicæ quoq; talis quidã morbus accidit. vrinæ nõ pau- cæ à renibus in vesicam transmittuntur. qui sic affecti sunt, atque hac calamitate circũuenti, foras pellere vrinas præ imbecil- litate non possunt: sed ipsæ per sumen loco accommodato reperto exeunt. ad hos faciunt clysteres, qui constât ex oleo in quo cyminum sit decoctum: quod calidum iniiciatur. in eodem incoquitur non secus feniculum, & ruta. ad quod malum cetera quoque vrinam prouocantia faciunt. nam le- uigando remittunt vesicam, & leuant, & promptiorem ad excretionem reddunt. si vero propter nimiam vrinæ copiã supprimatur vrina, clyster morsum aliquem inuehens, & ex- pultricem potentiam excitans, vesicam ad excretionẽ præ- parabit. aloë pura hoc potest efficere: itẽmq; cyclamini suc- cus, omnino vero id quod iniicitur paucum esse debet: & cornu clysteris esse quam breuissimum: ne vlla clysteris por- tio debitas partes transgrediatur.

Helminthæ, qui superioribus intestinis continentur, ac- commodatis potionibus expellendi sunt: eos vero qui ad- colum sunt, per infernas partes educere possunt clysteres: qualis

qualis est.
num, aut
vbi satis d

Ad entre
tur animã
ascarides d
bus quida
persanat.
in latera, si
etiam quo
res debitas
re consue
clysterem

Quid d

Alia que
tollendat
alimentis
nie defec
alere cor
mor, aut
generis e
bitum ha
pellendat
partes que

Plerique
in colon
inciendu
nõ long
quam
ergo si
primu
ad qu
si, an

qualis est, qui oleum recipit, in quo absinthium, aut abrotonum, aut cuminum, aut menta, aut lupini decoquatur. atque ubi satis decocta hæc fuerint, oleum per clysterem iniicitur.

Ad Ascaridas.

Ad extremam intestini oram talis quidam morbus oritur. animalia quædam pusilla, quæ à materia * creantur, ascarides dicuntur. eis remedio sunt clysteres: tum ex acribus quidam: tum vnus etiam est, qui ex cedrix inunctione perfruat. porro clyster non debet esse recte perforatus: sed in latera, sic, vt multa exigua foramina in orbem habeat. id etiam quod infunditur, non debet multum esse. ita enim partes debitas non excedet. apta est huic morbo aqua ex cinere confecta, vtpote quæ præsentissimo sit remedio. eadē per clysterem iniicitur.

Qui clysteres vim habeant alendi eos, qui alioqui non nutriuntur.

Cap. 34.

Alia quoque calamitas quandoque contingit, ad quam tollendam clysteribus est opus. nonnulli tam vehemēter ab alimentis abhorrent, vt periculū consequatur, ne ob alimonie defectionē pereant. quibus clysteres ij sunt idonei, qui alere corpus possunt: quales sunt hiptissanæ, aut tritici cremor, aut farine ablutio, aut alicę cremor: aut res, quæ sunt generis eiusdem. debet autem cornu clysteris, si vsquam alibi, tum hoc loco esse quam longissimum: & manibus compellendus maxima vi clyster est, vt ad remotas, supernasque partes quam maxime conscendat.

Quibus clysteres iniiciantur, cum minime opus sit.

Cap. 35.

Plerique sunt, qui nihil excernunt, excrementaque eorum in colon non perueniunt, sed supra continentur. iis non iniiciendus clyster est: quandoquidē scire debemus, clysterem nō longius, quam ad colon ascendere: neque educere quicquam posse eorum, quæ superioribus intestinis continentur. ergo superuacaneum est eo tempore clysteribus vti. sed in primis danda opera est, vt excrementa in colon descendat. ad quam rem conficiendam, in primis vtrum tempus satis sit, an secus, spectandum est: & cum tempore etiam facilitas

L I B E R

transitus, aut difficultas ciborum, quibus homines vescuntur. nam alia citius, alia tardius deorsum descendunt. præterea habenda quoque ratio est naturæ eius, cum non egrotaret. si enim aluus suapte natura facile fluebat, citius excrementa subducentur: si vero difficulter, tardius. quin etiam si manum admouerimus, eius repletionem perspicuo inueniemus, si modo infra peruenerunt feces. si non infra pulsæ sunt, ea parte locus inanis apparebit. ad hæc in lumbis quoque grauitas est, si extremum intestinum sit repletum. sed & status eo tempore stercoreis fœtorem redolentes, excrementa infra peruenisse nobis declarabunt.

Quibus clysteres non iniiciuntur, cum tamen opus sit.

Cap. 36.

Secessum alui quendam περιποιῶν hoc est circumfluxum Hippocrates nominat. fluxus tenuis is est, & fecibus non commixtus: & partim per se prodit, partim cum duris cibi excrementis, quæ in egestionem delabuntur, quibus tamen admixtus non est. si igitur quæ à cibis intercidunt, foras egerantur, nihil opus est clysteri: si vero ea non excernantur, hicque circumfluxus solus exeat, tunc medici quamplures clysterem perhorrescunt: verum qui prudens est, & sapiens, eo vititur. hic enim tenuis fluxus aut nihil, aut certe parum, non mediocrem molestiam afferet. signum autem humiditatis alui hoc tenui fluxu, ut ciborum excrementa non secedant, primum est, ut cum prius secessio non esset cohibita, nunc nullo modo feces excernantur: deinde vero tangenti, colon impletum esse manus significabit.

De figura eius, cui clyster iniicitur.

Cap. 37.

Ægrotus resupinatus esse debet, tum contegendus: ac ne cavitates appareat, stragula admouenda sunt, ut corpus contingant: sint quæ aut vestes attritæ, aut linteorum partes, aut talia quædam, calida etiam sint, ne suo frigore homini horrorem incuterent. tum crura contrahuntur. qui situs mihi videtur conuenire. nam sublimem extra lumbum attollere, incommodum est. perinde enim est, ac si corpori inanimato clysterem indas. quandoque etiam in latus æger vertendus est. nam si vesica inflammata sit, in coxæ dice fit suppuratio, aut gibbus redditur: atque ita pōdus, aut tumor im-

pedit

pedit aut
oportet e
mor verg
mus. Inter
est, ut neq
sum imum
ri, ut simp
steris rep
buit, pler
uoluit eg

Quæ

Clyster
vel cum qu
tinet, vel cu
corporibus
tur, quod
causæ quæ
internas e
longius p
era ager
efficiet,
ingredie
suo temp
cidunt, n
impediti,
fit, ut eius
sit profu
fistula im
cutis for
plena lot
cæ graui
fistula de
fit, ut q
autem
irritati
pori a
faciunt
ferre

pedit aut clysteris ingressum, aut exitum excrementorum. oportet ergo facere, vt in alterutram partem deorsum tumor vergatur, si absque impedimento perficere cuncta velimus. Interim dum clyster imponitur, egroto imperandum est, vt neque clamet, neque respirationem contrahens sursum imum ventrem retrahat, sed simpliciter iacentem conari, vt simplicissime respiret. qua ratione nemo iniectioni clysteris repugnabit. vbi vero cessat is, qui medicinam adhibuit, plerique iubent, vt homo sese huc, atque illuc circumuoluat. ego vero id fieri prohibeo.

*Quot modis clysteres voto non respondent, ex Mnesitheo
commentariis.*

Cap. 38.

Clysterum frustrationes tribus fieri modis consueuerunt: vel cum quis clysterem non recipit, vel cum eum non continet, vel cum emittere non potest. hæ causæ sunt partim à corporibus & morbis, partim quod male clysteribus vtantur. quod ergo clyster non recipiatur, impediens morbo, causæ quædam huiusmodi. Vt cum inflammatio partes animas internas exerceat, & tumor excitatus sit, vt humor expressus longius progredi non queat, tumore impediens, & contra agente, itémque status eodem loco contentus id ipsum efficiet, cum scilicet neque secedit ipse, neque humoribus ingredientibus transitum concedit. Medicorum errores sub tempore constituuntur: vt cum in durum secessum incidunt, non obseruant clysteris fistulam, sed ab ipso secessu impediti, vi impellunt, & fistulâ in stercus coniiciunt. ex quo fit, vt eius foramen ab iis, quæ obsistunt, obturatum non possit prorsum clysterem emittere. Idem eueniet, si non recte fistulâ imposuerint: sed in aliquod latus inclinarint: siquidē cutis foramen obstruit. huic simile quippiam contingit, cum plena lotij vesica est, & resupinatis clysterem indentes vesicæ gravitatē & pondus ad intestinum retrahant. ita enim fistula occlusa vim clysteris ante progredi non sinit. ex quo fit, vt egroti clysteres his modis non recipiant. Continere autem eos non possunt, causa aliqua circa anum naturam irritante, propter vero medicorum errores, is etiā error, qui tēpori attribuitur, contingit, cum acrem admodum clysterem faciunt. ergo cur clysteres non contineantur, has causas asserre quispiam poterit. Quam ob rem autem is, qui clysterē

accepit, emittere non possit, causam aliquis, & præcipue in affectionibus tenuioris intestini, in morbum retulerit: cum plerunque in intestinis sit, plerunque vero in loco, qui inter ventrem interiectus est, & cutim, quæ totam naturam internorum articulorum in orbem complectitur. cum igitur compressis intestinis ab illo ambitu orbiculato spiritus supra firmetur, & incumbat, si conetur quispiam eo tempore clysterẽ eò vi adigere, flatus eum foras prodire amplius nõ sinit. comprimit enim extrinsecus intestinum constringens. medici vero vehementer errant, qui res acres iniiciunt. cum enim locus continens exacerbationem nullius cupiditatis desidendi habeat, continet. Præterea si quis clysterem vi comprimens, faciat ut supra magis conscendat, eum ad superiorem intestinorum inuolutionem propellet, & clysteri non parabit viam, ut retro possit cedere, atque exire. nam morsu excitato locus statim intumescit, & flatus conuoluit, qui ne exitus pateat, impedimento sunt. est autem hoc plurimum commune erratum: quia existimant, simulatque clyster iniici incipiat, si quamprimum eum intro expresserint, se hominem facillime liberaturos. sed minime verum hoc est. nã si cito introeat, citòque exeat clyster, secessus exustus non statim perspergitur, & humectatur. si quis enim molli- re secessum velit, totusque clyster iniectus diutius contineatur, venter à plenitudine distendetur, & dolebit. quam ob rem paulatim iniici clyster debet. etenim sensus nõ ita molestia afficietur, & ea pars clysteris, quæ primum ingressa fuerit, paulatim feces humectabit: si vero totus ingrediatur, non omne tempus à primo vsque ad extremum dabitur inspersioni eorum, quæ intus continentur. ex quo fit, ut nihil vetet, cum totus clyster fuerit expressus, quin statim excitationem ad sedem moliatur: nec multo tempore venter ob clysteris copiam intumescat, neque ad excretionẽ feces adhuc siccæ excitentur. Iam vero qui clysterem imponit, debet semper inanem clysteris partem conuolucere, est enim hoc valde accommodatum: quia sæpe nos præterit, clysterem ex ventre in ipsum vas clysteris recurrere, nisi continenter exprimatur.

Ex Rufo, de glandibus.

Cap. 39.

Consequens est, ut de glandibus dicamus. iis enim sæpe
vtis

vtitur, non ad- que etiam caput ob- ole irritat- rit, ut me- etiam pur- rivadi gra- in angina- capitis, lip- gunt, & re- liquias int- causa adhi- tiones incip- vero gestu- corruptum- prius indid- quibus itid- & conuen- ortis, & q- Ceterum- ex melle- mixtum- machi sub- hyloporu- admiscebu- Funt etia- que ex gra- mortus ex- quandoqu- pis refina- bus, quos- ci & cetera- resolution- lis modu- milis. Et- sunt, & vero & conuer- frigera

vitur, vt feces excernatur: & praesertim in iis, qui clysteres
 non admittunt, itemque in pueris, & mulieribus. quando-
 que etiam in iis, qui stomachum auersum habent, aut quibus
 caput obstructum est: aut in quibus partes à clysteribus fa-
 cile irritantur: aut in quibus detinetur id, quod injectum fue-
 rit, vt memoria atque irritatio excretionis suggeratur. saepe
 etiam purgandi causa glandes imponuntur: quandoque de-
 riuandi gratia, vt in febribus quibusdam acutis, & diuturnis,
 in angina, & cæteris suffocationibus: itemque in doloribus
 capitis, lippitudinibus, vertiginibus, quæ cōtinenter contin-
 gunt, & tenebrosos perturbationibus, eis vitur: & vt re-
 liquias inflationis & resolutionis excutiamus: & auxilij etiā
 causa adhibentur, vt mulieres faciunt, cum menstruae purga-
 tiones incipiunt apparere. & quæ iam trimestres fetus in
 utero gestat: quos glandibus mirū in modum mordentibus
 corrumpunt. vtuntur etiā ij, qui valde mordacem glandem
 prius indiderunt, & quos crebra desidēdi cupiditas exercet.
 quibus itidem hæmorrhoides prociunt, accommodatæ sunt:
 & conueniunt doloribus hypochondriorū in febribus ob-
 ortis. & quibus suspicio est, ne in somni propensione cadāt.
 Ceterum glandulæ conficiuntur ex sale tosto, & melle: &
 ex melle ipso per se cocto ad consistentiam: cui etiam ad-
 mixtum sit absinthium. huiusmodi autem cōmode ad sto-
 machi subversionem vtuntur: & ad helminthas, quam ad rem
 hyssopum quoque, & tragoriganum, & lupinos melli cocto
 admiscebimus. hæcque robustioribus vetriculis conueniūt.
 Fiunt etiamnum ex resina terebinthina, & nitro, & quādo-
 que ex grano Cnidio, cuius moderata sit portio. sed quia
 morsus excitantur, idcirco partes oleo moderato vnguntur,
 quandoque autem modicum pyrethri, aut piperis, aut sina-
 pis resinæ miscebimus: eaque glandula paralyticis, & flatu-
 bus, quos perfrictio exciuit, conueniet. Centaurium vero pi-
 ci & cerato additur: & inditum, & assumptum ad pudendi
 resolutionem vtiliter adhibetur. infantibus vero grumus sa-
 lis inditur per se oleo perfusus. mensura est, vt nucleo sit si-
 milis. Et * agetharium detracto cortice. quæ etiam teri pos-
 sunt, & excipi, vt pari modo quispiam eis vtatur. Bitumen
 vero & resina cum exiguo panace & hyssopo composita,
 conueniunt iis, qui crassos humores colligunt, & quorū re-
 frigeratæ sunt partes, & qui lumbricos ascaridas gignunt, &

colis resolutionibus, & mensruis purgationibus suppressis.
& item duritie, & diuturnis refrigerationibus. Ficus etiam
cum nitro miscentur: & vua passa, abiectis acinis: adiecto
nitro, & cymino. Ex his quædam nucleo, quædam collyriis
similia infunduntur. & quædam per se imponuntur, quædam
lana molli excepta induntur, lana prominente, vt facilius e-
uellantur, quod præcipue in iis, quæ acria sunt, & anum facie-
le commordent, obseruatur.

De inunctionibus.

Cap. 40.

Iis, quæ inunguntur, vtitur in corporibus, quæ nimis
adstricta sunt, quæque partes delicatiores & imbecilliores
habent: sed trahendū est vehementius. Vsu vero ad hoc pro-
bata sunt hæc, cyclamini succus aqua aut hydromelite re-
solutus, fel taurinum, elaterium, granum Cnidium, vua tami-
nia: hæcque terenda, & melle excipienda sunt. itémque colo-
cynthidos decoctum, quæ melicato incoquatur, cuique fel
taurinum accedat. Ceterū in omnibus acribus admouendis
prius fouenda partes sunt, & oleo prius inungenda. deinde
insidendum in fœnigræci & maluæ decocto sedem eo fer-
uore intendendo simul, & foras propellendo. quæ si plus ex-
cedat, portulacæ succo, & oui inunctione vtetur, & melilo-
tum melicato incoctū superdabimus. vitellos quoque ouo-
rum elixos, & cerata ex myrto facta imponemus. Ex omni-
bus autem glandulis ad morbos diuturnos efficacioribus v-
tendum est. & in quibusdam bonis corporis habitibus, cum
febris inordinatis non iactantur, idem obseruandum. sim-
plicioribus vero vtendum in delicatioribus, & febribus acu-
tis, vt feces deiiciantur. tempus vero horum administrando-
rum idē est, atque id, quod clysteribus est præscriptum. At-
que hæc quidem sunt, quæ de clysteribus, deque glandulis
tradenda esse existimaui.

Ex Diocle, quæ ventrem soluant.

Cap. 41.

Mercurialis & * vitis cum per se, tum cum betis & brasi-
lica incoctæ, & vna cum cibis assumptæ, aut cū pultē in sor-
bitione datæ, deiectionem abunde cient. Cnicus multis mo-
dis apparatus idem facit, nam vel succus ex eo exprimitur, &
potui datur, isque ante cibum melle, aut vino dulci tempe-
ratus aluum subducere consuevit, sit ex eodem sorbitio ad
can-

eandē r
& oblon
fricet, &
tundat cu
redigat, &
diocris m
nus, vt ei
tior, si eni
teratur qu
cum frigi
uit aluum
prius, itē
ro terebit
lo maiore
pienda est
mellis non
quædam di

Ex

Marin
mus qui
ducit, &
idque v
cere sol
confusi
nec crass
ius drach
ducit. Le
purgat. I
tentum
pari mel
tum, &
soluunt
ante co
catap
ea de
folia

Si

eandē rem valens. in maza quoque cōiectus idem præstat:
& obsonia in eo coquuntur. eodem vti poterit quispiam,
si siccet, & modice contūdat, & cribro traiciat: tum iterum
tundat cum melle, & ad ceræ formam, non admodum durā
redigat, & ex ea ante cœnam capiat quantum caricæ me-
diocris magnitudinem compleat, aut paulo magis, aut mi-
nus, vt ei qui vtitur, conferre videatur. Fiet autem vehemē-
tior, si cnicus crudus frangatur, & pars interna eximatur, cō-
teraturque, & melle excepta eodem modo, minus tamē quā
cum frigitur, sumatur. nihilo vero minus absq; molestia sol-
uit aluum fluor, qui ex sycaminis prodit, ex melicrato sum-
ptus, itēque cibis inspersus & commixtus. Ex cōsuetis ve-
ro terebinthina resina præstat omnibus. Ea vero, vt est, pau-
lo maiore mensura, quam sit faba Aegyptia, post cœnā ca-
pienda est: aut in poculum coniicienda, addendūque
mellis non minus quam triplum, & duobus aquæ calidæ
cyathis diffundenda, & ita bibenda.

Ex Dieuchthe, quæ leuiter per infernas partes purgent.

Cap. 42.

Marina aqua decocta, & sub dio detenta potatur, in pri-
mis quidem cum pari aquæ dulcis portione: tum vbi sub-
ducit, duæ aquæ dulcis partes vni parti marinæ adduntur,
idque vsquedum satis purgatum esse videatur. Hoc etiā fa-
cere solent, brassicam læuigant, exprimuntque, & cnicum
contusum inspergunt: & in vase fictili ad solem ponunt, do-
nec crassitudinem nanciscatur: tum remouent, dant vero hu-
ius drachmas duas ieiunis ex melicrato. & leuiter aluū sub-
ducit. Lenticularum quoque decoctum cum modico salis
purgat. Iam vero vuæ passæ satiuæ decoctum sub dio de-
tentum purgat. ac simile quippiam facit salis acetabulum cū
pari mellis portione, & aceti heminis duabus sub dio posi-
tum, & postea temperatum aqua datum. magis vero aluum
soluunt allia in melicrato elixa: & resina nitro excepta, &
ante cœnam data, & betæ, & cæpæ in melicrato decoctæ. &
catapotia ex nitro, pipere, resina confecta, & brassica, si quis
ea decocta cum nitro vescatur, & iusculum absorbeat. aut
folia actes cum beta decocta idem præstabunt.

Ex Lyco, aluum subducentia.

Cap. 43.

Styracis, scammonia, vtriusque pares portiones. cōiicitur

ad hunc modum. Syrax valde admodum in mortario teritur, vt moliri queat: eiſque ſcammonia adiicitur, & globuli ad fabæ magnitudinem conformantur. Aliud. Scammonia cum ſale candidiſſimo permultum læuigatur: tum in plumbea pyxide decoquitur. Ratio vero decoquēdi eſt huiusmodi. pyxis plumbea duplex eſt. eius operculum habere debet aut foramen, aut ſiſtulam. per eam viam ſcammonia cum ſale trita inditur: idque vas in olla, quæ lomento fabarum plena ſit, inſidet. coquitur autem lomentum fabarum, quod pyxida continet, poſca affuſa, non autem aqua. vbi lomentū coctum fuerit, etiam ſatis cocta erit ſcammonia. cum hoc factum fuerit, medicamentum ipſum ſinendum eſt, vt in pyxide refrigeretur. id poſtea iterum læuigabis vel per ſe, vel piperis albi tantum addens, quantum ſatis ſit ad medicamentum rite condiendum. atque ita parata ſcammonia neque ori, neque ſtomacho inſuauiſ erit, & nihilo ſecius purgabit.

Galenī Picra.

Cap. 44

Aloës drachmæ centum: ſpicæ nardi, xylobaſami, maſtiche, aſari, croci, cinnamomi ſingulorum drachmæ ſex. Ego vero aloës drachmis 90. croci drachmas quinque impoſito, atque ita vtor. Præterea ad aluum ſubducendam, aloën non lotam accommodatiorem eſſe ſcire debemus: eam lotā magnā medicamentoſæ facultatis vim amittere. quam etiam febricitantibus dare quiſpiam audeat, ſi non vehemens, ſed admodum debilis febris ſit. Multi vero etiam medicamentum ex aloë non lota febricitantibus dederunt: ac deinde cū nihil manifeſte leſiſſent, in aliis maximam noxam ſunt experti ex infeſtiſſima enim aloë, etiam lota, eſt iis, qui citra vitiatos humores calida & ſicca intemperie laborant. proxime ad hos accedunt, qui ſiccā intemperiem, etiam ſi cū frigore coniuncta ſit, contraxerunt. ad ſummam qui ex ſola qualitate particulam aliquam læſam habent, ab aloë offenduntur. intemperies enim, quæ in humoribus ſunt, medicamentis eos euacuantibus indigent: quæ vero abſque his conſiſtunt, in tabem penitus ex vſu huius medicamenti, quod ex aloë conſtat, deueniunt. Vbi ergo vitiatuſ humor ventriculi tunicas irrigat ita, vt nauſeæ ſymptomata magis, aut minus conſequantur, picra ex aloë vtilis eſt, eum humorem euacuans. in eſt enim aloë purgandi viſ, ſed non valida: ſed tanta,

tanta, vt
poſſit, ſi
ſecoris co
tum corpi
optimu
qui ſtoma
de conco
lum, quib
tenues illi
ſeret iis, q
partem al
gantes in
bus vero
continetur
poteris iis
ſolue omne
ea concoct
eſſe, præter
dicamentu
aut quibu
ſi aquæ c
machi ſi
elinatio
te propi
ciere vti
teat, ſæpe
ſuſuſoru
& iis qui
be, ſicut
bet, vbi al
pro aſare
adhibitu
mum hui
tribus.

Se
ſcam

tanta, vt quæ in ventre sunt, quæ etiam contingit, purgare possit. si vero aliquando copiosius exhibeatur, vsque ad loca iecoris conscendit. non est tamen medicamentum, quod totum corpus purget. verum biliosarum ventriculi affectionum optimum medicamentum est: adeo vt vno die sæpe multos, qui stomachici exstimentur, persanet. In iis autem, qui tarde concoquunt, non omnibus par est picram dare: sed iis solum, quibus id à succis vitiatum excitatur: & eo magis etiam, si tenues illi, biliosi que fuerint. quandam etiam facilitatem asferet iis, qui humida intemperie citra humores laborant, quæ partem affectam ita irriget, vt non secus quam nerui colligantes in articulis relaxatis, exsoluatur, atque luxetur. Quibus vero bilis in ventriculo, & præsertim imis eius tunicis continetur, accommodatius inuenire medicamentum nullum poteris. iis vero qui inflammatione aliqua vexantur, non absolute omnibus temporibus inflammationis datur: sed vbi ea concocta fuerit, & declinet, nam & concocta medicanda esse, præclare censuit Hippocrates. Recte autem quis hoc medicamentum tarde concoquentibus, bilimque vomentibus, aut quibus alia quadam fluxione stomachus teneatur, dabit, si aquæ cyathis quatuor mixtum dederit: veritus ne mel stomachi subuersionem, quæ fieri consuevit, excitet. sed in declinatione internarum inflammationum recte ex hydromelite propinabitur, quemadmodum etiam præbetur iis, quibus eiere urinam, aut purgationes menstruas prouocare oporteat. sæpe autem hoc medicamentum dare consueui iis, qui suffusorum symptomata ex stomachi affectione patiuntur, & iis qui aluo adstricta laborant, & mulieribus, quæ non probe, sicut dixi, purgantur: in quibus maiorem efficaciam habet, vbi aloës drachmæ 80. & croci sex fuerint. præstat etiam pro asaro carpesium conicere. quanquam etiam vtrisque adhibitis aliquando medicamentum confici. datur ad summum huius medicamenti drachma vna cum aquæ cyathis tribus.

Purgans medicamentum ex cydonio.

Scalpendum est cydonium circa semen: deinde euacuatum scammonia implendum, tum crusta circumplectendum, &

ij

L I B E R

affandum: postremo dandum vt comedatur. atque ita aluus subducitur, & stomachus minime subuertitur.

Catapotia ex aloe.

Colocynthydos pars vna, scammonex & aloës singulorū partes duę: succi absinthij pars vna.

Philumeni purgans medicamentum ad oculos diuturna fluxione oppressos. Cap. 45.

Marrubij, agarici, chamædryos, colocynthidos medullę, stæchadis, singulorum pondo decem: opopanacis, sagapeni, petroselinij, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum quinque: cinnamoni, spicæ nardi, myrrhę, polij, croci, singulorum quatuor. sicca terenda simul sunt omnia, & per cribrum traicienda: opopanacen vero, sagapenimque & myrrham confracta in pila macerare in melle oportet. his postea leuigatis sicca addenda, & ita conterenda: & sic confecta vitreo vase excipienda. si que mel desit, affundendum erit. Hoc medicamentum mirabile est proprie in morbis capitis diuturnis. quam ob rem oculorum quoque affectionibus accommodatissimum esse, vsu compertum est. vëtre enim mediocriter soluit. si vero sub vtendi tempus obolos quatuor, aut sex scammonex capiat, efficacius purgabit. reuellet nanque à capite omnia, & ferme etiam nimis. & quod à naturali corporis habitu alienum inuenit, secernit, & foras pellet: vt recentiora ab eo reddita corpora, & constitutiones & actiones suas non ita multo post purgationem acquirat. summa eius potio drachmas duas continet, cum melicrati cyathis quinque præter scammoneam, quæ adiungitur. ac quibusdam quidem medicamentum ipsum, idque vna eius portione, pristinam partium valetudinem potuit restituere, non tamen nuda puraque purgatione naturalem affectionē, & hilaritatem ratione distributionis gignere, atque restituere existimetur. quibusdam autem id effecit tum secunda, tum vero etiam tertia portione, in aliis vero ita præparat corpora, vt auxilium à metasyncriticis sint perceptura.

Archigenis purgantia medicamenta febricitantium.

Cap. 46.

In febribus bonorum morum, hoc est, in quibus vires cor-

corporis
facienda
peratis v
ribus, qu
abundant
si que pur
to medic
imponit
constit
gant, la
spatio v
latum, ve
tiam loli
melle de
mal lique
medio el
vna cum
lia, gland
que in m
ris eius
succus,
serum
est acc
singule
integrit
cente: a
se eodem
tis egre
tissimus
per vere
si modo
educere
febrile
purgat
et col
nuctu
le, qu
sorb
præ
tem

corporis subsunt, sed tempus breue est, detractio confertim
facienda est, vt morbi continuitas intercідatur. ergo in tem-
peratis vtendum est venæ sectione: idque potius in calidio-
ribus, quam humidioribus est faciendum. si vero humor sit
abundantior, tunc materia vtilius purgatione diminuitur.
siq̃ue purges, non statim scammonia, aut aliquo violento
medicamento, sed placido id facies. primum enim quæ
imponuntur, quæq̃ue illinuntur, si ex violenta materia
constent, cum per distributionem & transmissionem a-
gant, languida redduntur. Equidem cataplasmate in diei
spatio vti consueui, quod hypochondrio superdarem ita
latum, vt vsque * ad vmbilicum pertineret. Quandoque e-
tiam loliacæ farinæ partes tres vni parti Cneori admixtas
melle decoquens, totum ventrem comprehendo: aut tithy-
mali liquore obliuo: aut cyclamini succum pari pondere, di-
midio elaterij miscens & liquido cyclamini succo resoluens
vna cum modico mellis, ne nimis exsiccata reddantur friabi-
lia, glandulas cōficio. quæ vbi cyclamini succum accepit, at-
que in muria præmaduerit, impono, aut aliquid aliud generis
eiusdem. Tum ex iis quæ sumuntur, satis fuit mercurialis
succus, trium heminarum mensura, cui sal inditus fuisset, aut
serum lactis eodē modo. Sine molestia vero hoc omni ætati
est accommodatum. polypodij partes duæ, cneori, salis, nitri,
singulorum pars vna: cnici pars vna. dantur iis qui viribus
integris sunt, drachmæ tres. melle autem imbuitur instar pla-
centæ: aut in hydromelite inspergitur. Ipse quoq; cnicus per
se eodem pondere, aut ad summū holcarū quatuor, datus, sa-
tis egregie mouet: siquidem febribus ante dictis accommoda-
tissimus is quoque est, & placenta itidem, quā diximus. Cly-
ster vero ex mercurialis, & colocynthidis decocto est utilis:
si modo non solas feces, sed etiam aliud quippiam desuper
educere in animo habemus. Quemadmodum igitur in his
febribus hæc dantur non tanquam cibi, cum cibi perfectam
purgationem recipiant: ita ego alimentorum loco pul-
tem ex colocynthide dare consueui. 24. globulos, qui ponticæ
nucis magnitudinem compleant, deglutiat vna cum cibis il-
le, qui curatur: tū os colluat, & aquæ calidæ cyathos ternos
sorbeat, & quieti se tradat, purgationem expectans. est hæc
præstantissima purgatio, febri quoque non graui. educit au-
tem biles aqueas, & crassas. postea vero multos fuisse curas

L I B E R

tos vidimus, multos vero parum ab accessionibus vexatos, balnei vsu fuisse integræ valetudini restitutos. Quibusdam vero bis dari hoc medicamentum necesse fuit: quibus globuli ex eodem temperamento fuerunt dati. & tempus secundæ euacuationis est status februm, quæ bonorum morû dicuntur. cumque lassitudines, capitis, dolores, gravitates, imbecillitates, feruidæ in coxendice affectiones, & labor urgent, tunc præstantissimum medicamentum est: quod ad hunc paratur modum. Duæ colocynthides capiuntur, excauâtur, oleum eis infunditur: per noctem ibi moratur, in ollam novam reiicitur, aqua pari portione additur, confractæ colocynthides incoquuntur, expressæ abiiciuntur: succus in aliâ ollam transfunditur: fuligo abstergetur: puls decoquitur. ubi rite se habeat, nigri veratri & scammoniæ levis semiholca, si mite velis medicamentum, si intentum holca imponitur. his omnibus in ramenta diductis, orbes fiunt.

Hiera Rufi, quæ ex colocynthide conficitur. ex libro, qui est de morbis, qui articulis contingunt.

Cap. 47.

Hæc primum ad dolorem lateris inuenta, postea ad alia mala valde utilis visa est. labores enim non diutius producit: neque nimis acute purgat. datur ex melicrato, aut oxymelite. imponitur autem succo ptissanæ diluto, & melle condito, datur ad summum drachmæ tres: minimum vero, vna, in quibus pauca euacuatione opus esse videatur. Facit etiam ad dolores articulorum: eamque dare sæpe oportet, & in ea confidere: quippe quæ semper id, quod decet, efficiat. purgat enim neque acriter, neque confertim: neque aliunde magis, quam à morbo. Mensura in his satis est drach. 4. in melicrato aqua. sal vero admiscendus: quia facilius ita pertransit. eius talis est cōfectio. Colocynthidis iterioris drachmæ duæ: agarici, chamædryos, singulorum drachmæ decem: opopanax, sagapeni, singulorum drachmæ octo: petroselinii, aristolochiæ rotundæ, piperis albi: singulorum drachmæ quinque: cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, croci, polij, singulorum drachmæ quatuor: mellis quod satis sit ad hæc omnia assumenda.

Pars

*Purgans medicamentum, quod sordes ventris accommo-
date deducit, & simul thoracem, & caput suble-
uat. idque ad Iustum auctorem refertur.*

Habet hoc medicamentum interioris colocynthidis æ
gyptiæ denarios duos & triginta, marrubij, chamedryos, stœ-
chados, singulorum denarios 14. gentianæ, agarici, singulo-
rum 12. bdellij, spicæ nardi, croci, cinnamomi, singulorum 8.
casie, floris iunci odorati, piperis albi, longique, scille tostæ,
singulorum 6. radices centaurij, 4. omnia trita bdellio reso-
luto, panacis decocto, & melli cocto commiscentur, & ex ip-
so medicamento fabæ magnitudo ante cibos sumitur.

Aluum soluentia.

Liquaminis zinziberis denarios duos: piperis longi, scam-
monia, liquoris cyrenaici, singulorum denarium vnum: ace-
ti, gari, vtriusque cyathum: contere, in vnum redigito, dato
que cum lactucis vnum, si soluere aluum vis, duos, si purga-
re. Aliud. zinziberis, scammonij, singulorum vnc. 1. falis scrup.
4. acetis, gari, singulorum cyathus.

*Granula salubria, stomacho idonea, ventrem subdu-
centia, & presertim in typis.*

Aloës scrup. 2. succi absinthij scrup. 2. Scillam fermento
oblita torrebis ita, vt coquatur, inde educito, & villis ab-
iectis ponderato, & in mortarium coniectam valenter tun-
dito, absinthij succum affundendo, & aloëm tritam insper-
gendo: simulque omnia commisceto, atque excipito, & mol-
liendo in vnum corpus redigito. facto hoc fermento, extra-
he, & repone, factis tamē prius granulis ad ciceris magnitu-
dinem. dato iis, qui ex longo morbo difficulter vires resu-
munt, si per typos ægrotēt, grana 7. aut 11. aut 13. aut 15. dein-
ceps per dies 5. aut 7. aut 9. Si autem pituitam ab eis duci ve-
lis, aut efficaciora fieri, adde toti fermento euphorbij dena-
rium vnum.

Purgans quod placentula dicitur.

Simile drach. vnam, coni drach. 4. piperis drach. 2. Scam-
monie drach. 3. excipe melle attico. dantur summum drach-
mæ 2. Vtere etiam ad arquatos.

t iiij

L I B E R

Pastillus purgans.

Scammoneæ drach. 4. euphorbij, piperis, singulorum tantundem. pholij drach. 1. mellis lib. 1. vncia datur.

Oliuæ purgantes.

Gummi vnciâ 1. palmularum conculcatarum abiectis ofsibus lib. 1. mellis tantundem. piperis scrup. 4. amij tantundem, cymini denarij 4. anisi tantundem. aceti sextarium. oliuarum muria confectarum, sine ofsibus lib. 1. palmulas cum melle & gummi contere in pilata maricea: gûmi vero aceto prius macera. vbi probe fuit leuigatum, cætera omnia confusa indito, & simul læuigato: & aceto infuso in vnum omnia fermenti instar adigito. tum maceratas, & dulcedinem in aqua dulci nactas oliuas valde exprimito, & imposito. dato liquoris cochlearia quinque. oliuas tres, si is qui sumit, bene concoquat, & præcedenti die non multa sumpserit: ego vero scammonæ denarios quatuor addo.

Aluum subducens.

Piperis vnc. 1. cumini vnc. 1. zinziberis vnc. 1. foliorum rutæ scrup. 4. epithymi drac. 3. polypodij drac. 3. cnici vnc. 1. mellis quod satis est.

Alia placentula.

Cnici albi fricti, & desquamati libra vna, mellis cyathi tres, anisi drachma, carnis caricarum 30. datur ante cornâ, factis partibus ad regiæ nucis magnitudinē. danturque duæ, aut tres. Alia. Scammoneæ vnc. aloës drach. 4. euphorbij tantundem: aqua excipiuntur, granâque crui instar conformantur. ex his 7. aut 9. aut 11. aut 13. aut 15. aut 17. aut 19. aut 21. dato.

Medicamentum ad colicos, purgans.

Euphorbij aut iridis, petroselini, cyperi pares portiones.

Symbiotarium.

Scammoneæ vnc. 2. piperis, zinziberis, salis, petroselini, singulorum vnc. 4.

Puro

*Purgans medicamentum eos, qui elephan-
tiasi detinentur.*

Colocynthidem pulchram, bonâque cāpito, facitôque
vt diem & noctem in oleo madescat: deinde oleum effunde:
& in noua ollula colocynthida cum aqua decoque, vsque
dum flaccescens reddatur: tantū postea similæ adiice, quan-
tum excipere aqua possit. cūmq; fuerit facta decoctio, ad-
de ellebori nigri drachmam vnā, & mediam, scammonæ
drachmam vnā, & furculo anethino agita: & confice or-
bes instar lupinorum, aut auellanæ. datôque deglutiendos.

Hiera Iusti.

Colocynthidis interioris denarij 24. stæchados, chamæ-
dryos, piperis albi, piperis nigri, agarici, veratri nigri, scam-
monæ, singulorum denarij 13. ammoniaci, thymi, croci, eu-
phorbij, singulorum denarij 8: myrrhæ denarij 4: scillæ to-
stæ denarij 16. aliqui addunt casîæ denarios 4, & spicæ nar-
di denarios 8. mellis quod satis sit.

Epithema vomitum ciens.

Veratri albi denarij 8. piperis denarij 4. fellis taurini quan-
tum ad excipiendum satis sit. ad moueto.

*Medicamentum, quod odorati admotum per
aluum purgat.*

Fellis terrestris echini, melanthij, aut nitri vtriusque de-
narij 101. succi thapsiæ denarij 4. grani Gnidij denarij 3. ela-
terij denarius. læuigantur instar cerati oleo sicyonio, aut cy-
prino admisto: fiuntque orbes vnus denarij. horum vnum
odorabitur is, qd purgandus est, si bene concoxit. hoc au-
tem admodum debilitabit: sed aliquo vngueto odorato vi-
res postea recreabuntur.

FINIS OCTAVI LIBRI.

ORIBASII MEDICI
NALIVM COLLE-
CTORVM,
LIBER NONVS.

De aere, ex Galeno.

Cap. 1.



Primus aër est is, qui prorsus sit purus. talis est, qui neque stagnorum, neque paludum halitu sit perturbatus: neque ex profundo aliquo specu perniciosam aurâ exhalante sit infectus, qualis est Sardibus, & Hierapoli. Improbatur etiam, qui ex cloaca magnam aliquam urbem, aut numerosum exercitum expurgante vitium contraxit. Malus etiam est is, qui ex animalium, aut olerum putredine & fimo coinquinetur: quique ob stagnum, vel flumen vicinum nebulosus est: quemadmodum etiam celsis undique motibus cauo loco inclusus perflatum nullum recipit. Suffocans enim is est, & putris: similis nimium ei, qui in domibus quibusdam clausus est, in quibus ob putredinem, & quia non perflantur, plurimus situs acervatur. Huiusmodi autem aëres, omnibus ætatibus sunt noxii: velut qui prorsus est purus, omnibus ætatibus est utilis. differentia vero aëris, quæ ex calore, frigore, siccitate, atque humiditate existit, non eodem modo in omnibus hominibus affecta est: sed corporibus, quæ optimo temperamento sunt, etiam aër optime temperatus est saluberrimus: in quibus vero aliqua exoperans qualitas dominatur, iis utilissimus est aër, qui ei qualitati maxime contrarius est, frigidus calidæ, calidus frigidæ, humidiori siccus, sicciori vero, quam par est, tanto humidior, quanto siccitas modum excedit.

De anni temporibus.

Cap. 2.

Hyemem humidam esse & frigidam dicimus, non quod aliorum temporum humidissima, frigidissimaque sit, sed quia id ei aliter contingit. cum enim in ea humiditas siccitatem superet, frigiditasque caliditatem, ideo sit, ut humida, frigidaque dicatur. eodemque modo æstas, quia in ea minor est humiditas, quam siccitas, & minor frigiditas, quam caliditas, idcirco

idcirco
singula
calida, aut
quod in e
datur. nam
& in æsta
humiditas
que ut in
ratio: nihil
citas, veru
vtrisque
litas, quæ
multo cal
qui quaru
anni temp
veri male
tum sed et
tum abest
siquid te
dam ius
firmem
pessimi
dem in
boso, &
tu om
sibi ipsi
saluberr
anni res
tumus
est malu
calore
sati sum
sed non
mores
funde
hæc
min
acce
litis
suar

idcirco calida, & sicca esse dicitur. enimvero æquum est, ut singula tempora ex propria natura atque sua examinata, aut calida, aut frigida, aut humida, aut sicca nominentur. id vero quod in exquisito medio omnium excessum est, deprehenditur. nam quemadmodum in hyeme frigus superat calorem, & in æstate superatur: ita in eis quædam est siccitatis, atque humiditatis æqua portio: quæ neque ut in æstate siccitas, neque ut in hyeme humiditas dominetur. Autumnus est eadem ratio: nihilque in eo est extremum. excellit autem in eo siccitas, verum in caliditatis & frigiditatis differentia mixtus ex utrisque est, eique aliud accedit malum temperaturæ inæqualitas, quæ autumnum maxime morbosum facit. nam meridie multo calidius est, quam sit mane & vesperi. quam ob rem qui quatuor temperamentorum coniugationes in quatuor anni tempora distribuere studuerunt, sciant se non solum veri male attribuisse humidum, calidumque temperamentum, sed etiam autumnum frigidum, & siccum. ego vero tantum abest, ut aut ver calidum & humidum pronunciem, aut siquid temperatum sit, id calidum & humidum esse concedam iis, qui ita asserant, ut quod plane contrarium est, id affirmem, omnium aëris nos ambientis temperamentorum pessimum esse id, quod humidum & calidum est: quod quidem in anni temporibus neutiquam comperies: at in morbo, & pestilenti aëris statu quandoque incidit. in quo statu omnia apta sunt, ut computrescant. Cum vero tempora sibi ipsis conueniens temperamentum seruarint, ver inter ea saluberrimum erit: acutissimos vero morbos, & ad aliorum anni temporum comparisonem maxime mortiferos autumnus afferet. cumque ver sit temperatissimum, autumnus est malus: siquidem vno & eodem die modo frigore, modo calore nos afficit: ipseque æstatem excipit, in qua multis affati sunt humores, quibusdam etiam vires debilitate fuerunt. sed non solum hoc nomine malus est autumnus: sed quia humores primum ad cutim movebatur, autumnus vero in profundum ab aëris ambientis frigore compelluntur. atque hæc quidem sunt omnium hominum communia. qui vero minus rectam victus rationem sequuntur, iis id malum etiam accedit, ut qui se fructibus largiter impleuerint, succorum malitia impleantur: ex quo consequitur, ut morbi, qui æstati sunt proprii, periculum quoddam omnino moveant: quan-

L I B E R

doquidem eo tempore profunda corporis pars expurgatur, & à partibus principem locum tenentibus ad cutim succi vitiosi perueniunt. ergo lepræ, vitiligines, licenes, vlcerationes quædam, pustulæ multæ exoriuntur. alio vero modo profunda corporis pars per phymata, & dolores articulorum expurgatur, cum parui succi in principes partes commigrent. Fiūt etiam sanguinis fluxiones, quæ plenitudinem, & succorū malitiam euacuant, & morbos qui ab ea gignuntur, resoluunt. si vero tempus vernum corpus alicuius bonis succis refertum capiat, id saluberrimum cōseruat, nihil ex propria natura innouans, at æstas, aut autumnus, aut hyems, nō item. nam hæc si purum corpus & omni prorsus reprehensione vacans acceperint, illa pallidam bilim copiosiore, quam par sit, gignere consuevit, ille vero atram, hyems denique pituitam. æstate igitur frigide, atque humidæ naturæ optime afficiuntur, hyeme vero calidæ & sicce: quemadmodum calidæ & siccæ æstate, humidæ vero & frigidæ hyeme male afficiuntur.

Ex Antyllo, de aeris differentia, quæ in mense est, ex primo libro qui est de præsidiis extrinsecus incidentibus. Cap. 3.

Luna, quæ æque ac sol Zodiacum perlustrat orbem, differentiam in aëre creat. Facit enim quatuor tempora mensis, quæ anni partibus proportionem respondent, atque hebdomadibus distinguuntur. prima igitur mensis hebdomas à nouilunio ducit initium, & vsque dum Luna duas in partes equaliter diuisa apparet, progreditur: estque veri similis: cum luna humida, calidæque sit eo tempore: & aër nos ambiens eo tempore humidissimus, & calidissimus, ac tunc quidem humores plerunque ruunt, & fecundi sunt, non secus quam vere. secunda autem hebdomas tunc incipit, cum Luna in duas partes æqualiter secta est, & ad plenilunium vsque procedit: eaque ætati similis est, ob hanc vnā causam quod fructus concoquit vel maxime. Hebdomas vero quæ plenilunium sequitur, cum Luna vsque minuitur, donec duas in partes sit equaliter secta, sicca est, atque autumnus est similis. vltima vero hyemi comparatur. quot igitur anni tempora feruntur, tot etiam menstrua esse tempora existimandum est. Illud quoque est animaduertendum, Solem sua vi corpora calefacere, Lunam potius humectare, quod in causa est,

sa est, vt
putres fa
diora, &
tes, mor

Ex eo

Diē vn
mitem est
calidū
pora tam
vt febrici
nes mane
& ros cad
ad occasu
circa vesp
num ægr
lud eum
facimus
noctis t
rimū à
no tem
frigore
in corp
lippitue
exercem
quibus
i, qui de
confluen
terea qu
eo temp

Aër
broli
lustr
liqu
sus v
dior

sa est, vt Luna humidius semper cerebrum reddat, & carnes putres faciat: corporaque eorum, qui sub dio viuunt, humidiora, & obtusiora efficiat. eademque causa capitis grauitates, morbosque comitiales gignat.

Ex eodem libro eiusdem, de aeris differentia, qua in die partibus est. Cap. 4.

Die vna cum nocte modo intelligimus, eumque anno similem esse pronunciamus. matutinum enim tempus humidum, calidumque est, veri simile. quam ob rem somni puri & corpora tam sanorum, quam ægrotantium recreantur. ex quo fit vt febricitantes hac hora placidissime degant, nam exhalationes mane dissoluuntur, & humidæ fluminum aure respirant, & ros cadit. meridies autem æstati comparatur: pars vero quæ ad occasum pertinet, autumno. noctis vero pars prima, & quæ circa vesperam est, occasui similis est. eo tempore neque somnum ægrotis suademus, neque potum damus, neque vllud aliud auxilium adhibemus, nisi quid aliud admoneat: quod facimus veluti illud tempus æque ac tempus occasus. mediæ noctis tempus hyemi comparatum est: siquidem tum Sol plurimum à nobis, vt hybernis diebus, distat. ergo dolores nocturno tempore vehementiores sunt: idque merito, cum nox suo frigore extremam cutim denset, & perspirationem quæ clam in corporibus fit, intercipiat, & defluxiones tum eorum qui lippitudine laborant, tum eorum quos tormina intestinorum exercent, tum eorum, qui cæliaci nominantur, tum eorum, quibus sanguis fluit, ab hac eadem causa promouentur: cum ij, qui defluxionibus correpti sunt, id totum quod clam ferri consuevit, vnum in locum amadent. Vltima noctis pars propterea quod matutino tempori propinqua est, eiusdem cum eo temperamenti est particeps.

Athenai, de aere, ex libro 29.

Cap. 5.

Aër à sole illustratus ab eo differt, quem sol non vidit, & vmbrosus est: itemque diurnus à nocturno. nam quæ sol perlustrauit, calidior est, & tenuior: vmbrosus vero, crassior. similique modo lucidus, minus frigidus est, & tenuis: tenebricosus vero, & obscurus frigidior est, & crassior. ergo qui calidior, tenuiorque est, corpora facile perspirantia reddit: con-

tra facit qui frigidus, crassusq; est, ex quo fit, vt noctes sint iis qui ex defluxione laborant, & iis, qui inflammatione vexantur, & febricitantibus, molestissimæ. differt etiam aer qui vnius ciuitatis sit, ab aëre regionis. in primis enim aer ciuitatis à domibus coarctatur, quocirca non secus quàm in cauis locis, calidior est, & crassior. sol enim aërem, qui non perspiratur, continuo calefacit, & magis accedit: at motus vacuitas crassum reddit: cum motus aque, ac ii, qui foliis perflant, aërē attenuet, & siccet. Cæterum aer, qui ciuitate continetur, crassus sit non solum qui in sese cogatur ex eo, quod nullo motu creatur, sed eo etiā, quod multo tempore in vmbra sit: & multo magis quod plurimè, atq; omnis generis exhalationes ex vrbe in aërem ipsum prodeunt, & fluant: & id quoque multo magis in iis vrbibus, quæ perspirationibus omnino vacat. qui vero in regione est aer, cum tenuis purusque sit, facit vt cibi appetentiores simus, & melius etiam concoquamus, & melius alamur: & meatus magis fluxiles sint, & sensus nobis sint integriores. causa est, quia aer ciuitatis, cum vndique sit conclusus tum à multitudine domorum, tum à tectis superimpositis, corpora facit, quibus succi difficulter digerantur, eaque replet. at qui in regione est, cū late pateat, & sub dio sit, remisse & dissolute id, quod superfluit, excernens, & leue, & probe perspirans, & promptum ad sumendos cibos corpus reddit.

De regionibus, ex Galeni commentariis.
Cap. 6.

Regionibus quædam attributa sunt, vt ita dicam, ab orbis terre situ, quædam à proprietate sua, quædam vero à symptomatibus, ab orbis vero situ, eis inest, vt frigida sint, quæ ad Istrum, & Mæotida paludem sint sitæ: & vno verbo, omnes quæ ad septentrionem sunt, calida vero quæ in Aethiopia, atque India habentur, & vt summatim dicam, quæ ad meridiem pertinent. temperata vero sint, quæ in harū medio sint locata. In his omnibus fere orbis terre partibus propria quædam regionis est natura, atque sua: quatenus aliæ ad meridiem, aliæ ad occidentem, aut orientem solem propius accedunt: aliæ vero ad septentrionem magis vergunt. quæ vero à symptomatibus oriuntur sunt ea, quæ regionibus tribuunt

lutulenta

lutulenta
gignunt
nibus san
ex paludi
quæ ex te
praua fun
specu, que
ro quibus
ca mari a
sunt temp
& Libya
rantur, id
cesserunt
rari, est qu
tum ab his

Eurus a
te, Boreas
nomine
accedunt
orbis sit
tem quæ
guit, aff
proxime
cedit, du
pentrior
rum vera
tudine m
polo sp
ronotus
calum est
atque in
semper
que v
ment
alius
tias: e
frigida

lutulēta stagna, & aquæ palustres: quæ vel lapides in renibus gignunt, vel lienem amplificant. itēq; venti, qui habitacionibus familiares sint, qui vel ex stagnis, vel ex fluminibus, vel ex paludibus, vel ex sinu, vel ex pelago exoriantur. Iam vero quæ ex terræ exhalationibus excitantur, partim bona, partim praua sunt: qualia sunt, quæ ex metallis afferuntur: & quæ à specu, quod Charonium vocant, exhalantur: In frigidis vero quibusdā regionibus vt in Thracia & Ponto, quoniā loca mari adiacentia, humilia sunt, ob eam causam calidiore sunt temperatura: in calidioribus vero, quales sunt Aegyptus & Libya, quoniam estate à ventis ab Arcto flantibus refrigerantur, idcirco minus calida sunt iis, quæ ad mediterranea recesserunt. Zona vero exquisite temperata, ac media orbis terrarū, est quæ ad Cnidū est & Co: & quæcūque loca nō multum ab his vel ad Aquilonem, vel ad Austrum recesserunt.

De ventis.

Cap. 7.

Eurus ab ortu solis, Notus à meridie, zephyrus ab occidente, Boreas ab vrsa spirat. hæc quatuor loca contrario inter se nomine opponuntur: singulæque magnā latitudinem habent. accedunt etiam aliæ ventorum octo differentię. cum enim orbis finiens, cui hoc nomē impositum fuit, quia mundi partem quæ sub aspectum cadit, ab ea quæ non videtur, distinguit, aspectūque nostrum definit, in sex partes diuidatur, proxime ad has sectiones latitudo Solis ortus & occasus accedit. duæ postea & viginti sunt aliarum duarum partium septentrionis, & meridiei: quæ in duas partes diuiduntur: quarum vtræque ex vndecim constat: vt etiam totus orbis à latitudine meridiei in sex distribuitur. Notus igitur ab humili polo spirat. inter hunc & ortum solis hybernū est is, qui Eurionotus appellatur: vt inter hunc & polum, & hybernū occasum est Libonotus, hi que omnes humidi, calidique sunt, atque ita ob eam causam caput aggrauant. Notus tamen nō semper humidus est: videtur enim quādoque siccus esse: eumque vulgus Caurum vocat. atque is Notus subinde vehemens est. semper ergo motum perspicuum habet: lenis vero alius est Notus, vt eius motum in aëre, & nubibus non sentias: estque is semper calidus: at Caurus quādoque perspicue frigidus apparet.

In ea regione, in qua medicaturi sumus, singulorū siderū ortum, & occasum nosse debemus: quoniam ex iis anni tēpora veteres definiunt. In Helleponti autem parallelō veris principium est æquinoctium, quod eo tempore contingit: finis vero ortus vergiliarum. idem finis est æstatis principium, vt etiam finis æstatis & principium autumnī, est Arcturi exortus: qui æquinoctium autumnale diebus fere duodecim anticipat, & præcurrit. atque etiam Vergiliarum occasus hyemis initium adducit: & autumnō finem affert. Qui vero annum in septem distribuunt tempestates, æstatem vsque ad Canis exortum producunt. inde vsque ad Arcturi ortum, autumnum. iidem hiemem in tres partes diuidūt. cuius mediū id tempus, quod sub solstitium est, constituūt: extrema vero, primū sementem, postremum inferendi tempus vocant, hæc que anni temporum diuisio ex spatio temporis, quod in eis est, efficitur. nam quod inter Vergilias & Arcturum intercedit tempus, quatuor est mensium: plurium autē, quam quatuor, quod inter Vergiliarum occasum, & æquinoctium verum interest. veris autem tempus ne duorum quidē integrorum est mensium: ex quo fit, vt merito non diuidatur. hinc etiam autumnī tempus maius est, quā veris. in duos enim menses extenditur. hoc tamen ab æstiuo, hibernoquē tempore lōge superatur. Hæc igitur in memoria habeantur, quo facilius ad aliarum nationū menses transire possimus. nam æquinoctium mundana quædam res est, at menses singulis gentibus sunt proprii. sexto Calen. vero Loi mensis sub exortum solis Canis oriri apud nos Pergami existimant. ego vero quadam via & ratione post decem dies ab hac præscriptione eūdem oriri comperi.

Antylli de ventis, ex primo libro de auxiliis.

Cap. 9.

Vetus est aëris motus. ventorum duæ sunt differentiæ. alij vniuersales sunt, alij locorum proprii. qui locis tribuuntur, sunt qui regionibus conueniunt: vniuersales, qui vbique locorum eodem nomine, & vocabulo gaudent. qui ad loca pertinent,

pertinent
à salubrib
vero, qui
qui à mari
estate vere
runt, his hi
qui è stagi
dicantur, q
qui à camp
qui locor
ceterum i
humidi su
corpori au
u. prauū au
solis spiran

De

Vrbium
dum est: i
dix. nam
se vtique
quam ex
admodu
horam v
re situm
in quo se
murum d

Antylli

Loca se
nes, sed
reue per
moda
instrum
idonea
cadum
& qui
item
dum
uoru

pertinent, naturam sequuntur locorum, à quibus efflātur. qui à salubribus, salubres: qui à morbofis, morbofi sunt. pro parte vero, qui à terra spirant, sicciore: qui ab aquis, humidiores. qui à mari prodeunt, salubres sunt, maxime hyeme, & vere: æstate vero calidiores sunt, quam par sit. quos flumina mittunt, his humidiores sunt, hyeme deteriores, æstate meliores. qui è stagnis exhalant, vtrisque absurdiores. pessimi vero iudicantur, qui è paludibus exeūt: neque vllō tēpore sunt boni. qui à campis, & terra perspirata, meliores, ad summam igitur, qui locorum sunt, magis morbofi quā vniuersales censentur. ceterum boreales saluberrimi. Zephyri ab occidente flantes humidi sunt, & lenes: minus tamen, quam boreas, salubres. corpori autem magis quam alij, sunt apti, atque accommodati. prauī autem, & aduersi valetudini sunt Euri, qui ab ortu solis spirant.

De situ ciuitatum ex Galeno.

Cap. 10.

Vrbium situs in quam orbis terræ partem vergant, spectandum est: id quod vsu venit in iis, quæ altis in locis sunt conditæ. nam planæ & æquales ad nullam orbis partem esse versæ vtiq; dicerentur: attamen domos quæ in eis sunt, ad aliquam ex quatuor mūdi partibus versas esse necesse est. quæ admodum domos balneorum, in quibus lauamur, ad octauā horam versas construunt architecti ij, qui optimum coniectare situm videntur. huius rei iudicium ex illo diei tempore fit, in quo sol fenestras totas domus illustrat, nec ad vllum aliū murum deflectit.

Antylli de locis, ex primo libro de auxiliis

Cap. 11.

Loca sublimia saluberrima sunt, cū aër in eis nō sit permānēs, sed perfundatur, & à ventis cōtinēter exagitetur. cūmq; recte perspirentur, omnibus thoracis affectionibus erūt accōmodata. tenuia vero & capiti laboranti, & omnibus sensuū instrumentis conuenient. at loca humilia antedictis non sunt idonea. iis vero qui per halitum digeruntur, qui in syncopas cadunt, & senibus apta sunt. loca vero maritima hydropicis, & quibus quæuis defluxio molesta est, accommodata sunt: itēque vbi detergendum, aut calfaciendum, aut aperiendum est, conueniunt. sed profunt etiam omnibus iis, qui nervorum, & articulorum doloribus torquentur. Iam depraua-

L I B E R

tis quoque appetitibus prosunt. Mediterranea vero sunt maritimis frigidiora, ceterum ad morbos acutos, si neque vitibus consita, neque caua fuerint, sunt maritimis accommodatiora: sed ad morbos diuturnos ineptiora. Stagnantia cum semper sunt in vitio: tum vero etiam aestate sunt pestilentia, praeterea quae metallis propinqua sunt, mala itidem existimantur: siquidem sicca sunt, & suffocantia. quae vero sub terra sunt, si boni succi fuerint, siccioribus affectionibus apta censentur. argillosa vero robur dissoluunt, cum exhalationem habeant in qua exsoluendi vis inest. ruffa maiore exsiccandi vi, quam quae nunc diximus, sunt praedita. nigra vero omnibus bonitate longe praestant.

Ex Atheni libro primo de loco.

Cap. 12.

Sublimia loca frigidiora sunt, & facilioris perspirationis. frigidiora vero ideo, quod à planitiebus exiguitate paucas radiorum solis reflexiones habeant: facilius autem perspirantur, quia undique sunt aperta: nec quicquam sit, quod ventos repellat. ex quo fit, ut qui in eis degunt, plerumque sani viuant. hyeme tamen in morbos, quos frigus excitat, magis incidunt. loca vero humilia non ita salubria sunt. in causa est calor: & praesertim aestiuo tempore: atque etiam quia minus perspirantur, cum humilior sit regio, quod si altis quoque montibus sint inclusa, eorum aer multo magis feruidus ab adurentium temporum reflexionibus reddetur. Praeterea regio plantis consita, minus perspiratur, minusque à sole lustratur, quam nuda: quocirca per hyemem umbrosa est, ac frigida: per aestatem vero difficulter à ventis perspiratur, suffocantque est: & ob eam ipsam causam respirationem habitantibus deteriore parat. Quaecunque autem regiones, & ciuitates flumina habent, quae extrinsecus perducuntur, cum ipsa moderata sint, & praesertim si loca siccissima esse contingat, sunt temperatissima. si vero excedant, non parua fit ad morbos gignendos accessio. quandoquidem & aer humectatur, & respirando, atque inspirando corpora simul humectant. tum etiam matutinas, ac vespertinas aquarum defluxiones frigidiores excipiens corpora perfrigerat, & in aestate constitutione affert autumnum. Stagnantia vero loca, in quibus paludes sunt, multis de causis sunt morbosa. nam à stagnis tota adiacens regio madefacta supra modum humectatur. atque in primis qui in ea fructus proueniunt, morbosi sunt omnes, cum

prae

prae humid
neam mar
midus, cras
genus suscip
lum crassum,
vix per humid
quique den
Praeterea reg
de, & cauae,
per aquas, &
volat, sed en
quibus nem
ta eiusmodi
si sunt, prop
permanens à le
praesertim si
dum. tam vero
palustria: &
rutinae enim
habitantes. m
gerant. & p
nus morbi
habitus sit
atque aer
sed etiam
ficiuntur, si
relique cōst
ferunt quoniam
diteraneis
sicciores sunt
irriguas qu
iores fruct
qualitate
inter insula
mo elata
tātū ab
ab eis et
vitio re
res: fruct
puriori

præ humiditate suam temperiem non sint sortiti, nec ad idoneam maturitatem peruenerint. aer vero in hisce locis, humidus, crassusque est. cumque stagna corruptelarum omne genus suscipiant, exhalatio quæ ab eis manat, aerem non solum crassum, sed etiam prauum reddit. ad hoc accedit etiam ut perhumidæ regiones, plerunque arboribus sint refertæ: quæque densis arboribus obsidentur, difficulter perflantur. Præterea regiones quæ falsæ sunt, ac suaspe natura perhumidæ, & cauæ, morbosæ sunt, id quod eis inest non solum propter aquas, & aerem, quanquã plerique hæc in causa potius esse volût, sed etiam propter alimēta humidiora, frigidioraque, de quibus nemo verbum vllũ fecit. verũtamen quoniam caua loca eiusmodi sunt fere, non modo non perflantur, verũ & crassa sunt, propter humiditatẽ, & æstate æstuosa. etenim idẽ aer permanens à locis adiacētibus solis reflexione nimis calefit: ac præsertim si sublimia sint loca, aerẽ plus æquo æstuosum reddũt. iam vero morbosiora loca esse cõsemus stagnantia, atque palustria: & præcipue per æstatem ob aeris inæqualitatem, matutinæ enim aurẽ à stagnis manantes refrigerant eos, qui inhabitant: meridianæ vero calfaciunt, tum vespertinæ perfrigerant. & propter caloris, frigorisque inæqualitatem autumnus morbosus est. Regiones porro aquis vacantes, & siccæ, habitus simul exsiccant, & melius spirantes, ac puriores faciũt. atque aer quidem siccus non modo sicciores habitus facit, sed etiam si alimenta calidiora, siccioraque fuerint, facile cõficiuntur, facileque distribuentur, & naturas calidiores, purioresque cõstituent. Loca etiam mediterranea à maritimis differũt: quoniam maritima omnia humiliora, calidioraque mediterraneis sunt, idcirco plerq; ex maritimis salubriora sunt, sicciorẽsq; habet regiones potius, quã humidas, & imbribus irriguas. quæ res facit, ut insulæ saluberrimæ sint, & excellentiores fructus ferant. In locis quoque magna differentia ex qualitate regionis versatur. nam montana salubriora sunt, & inter insignia, quæ sicciora sunt. etenim exhalationes ab humo elatæ, tenues siccæq; sunt. quare aer, qui ab eis excitatur, tantũ abest, ut aliquid addat corporibus, ut cõtra etiã, aliquid ab eis euocet, & propter siccitatẽ euacuet. Aquæ si nullo alio vitio terra sit imbuta, tenues cum sint, puræque, sunt leuiiores: fructus ad bonam valetudinem accommodatiores, multo puriorẽ, tenuiorẽq; materiam gignunt: & rite sunt cõcocti.

v ij

Domus, quæ ad terram sunt, cum febricitantibus, tum vel maxime iis, qui ardenti febris iactantur, quique in syncopen eadunt, accommodatæ sunt: quandoquidem sunt apte frigidiores, quam sublimia tabulata: & vires ægrotantium sustinēt & continent. Conueniunt eadæm iis, qui sanguinē reiciunt: & qui capitis dolore vexantur. tabulata vero superiora apta sunt iis, qui pituitam in thorace collegerunt. ad summā, corpori quod multæ materiæ sit, magnæ domus sunt idoneæ: valent enim ad discutiendam materiam, & integrā vim, probāque facultatē, quam corpora quodāmodo rapiunt, propter aëris copiam impertiuntur. parū domus horum contraria efficiunt. sublimes vero respirationis facilitatē gignunt, caput leuant, ac præsertim quod ex febris vitium contraxerit. humiles omnino improbantur. quæ ad meridiem sitæ sunt, ad omnem affectionem sunt accommodatæ, præterquam ad eas quibus refrigeratione opus est: ad quas aptiores sunt, æquilonales, secundo loco censentur, quæ ad orientem solem spectant: pessimæ, quæ ad occidentem: & præsertim æstate. habent enim lucem matutini temporis, in quo maxime ægrotantes sunt meliusculi, tristem, & inamœnam: & vespertinas horas, atque nocturnas cum molestia traducunt. Quæ calce oblitæ sunt, splendore calcis sensum tentant, iniucundæque sunt. sed sunt etiam iniucundiores, quæ sine lapidibus sunt coagmētatæ. Cæterū quæ ex lapidibus constructæ sunt, immitiores & frigidiores, quam quæ ex lateribus, censentur. quæ sunt picturis distinctæ, atque ornatæ, febricitantibus, & insanientibus omnino improbantur: quippe quæ absurda visa excitent, quarū parietes tenues sunt, atq; exiles, prauæ sunt: quandoquidem aër qui in eis est, facile ab externo aëre commutatus, faciles mutationes capit.

Decubitus qui in lectica sunt, præstant iis, qui in paleis, foliis, & gramine: qui in paleis, foliis, & gramine, iis qui in terra. sed hæc duo genera sunt iniucundiora, quam in lectica recubare: ipse vero decubitus in terra præterquam quod iniucundu

cidus est, &
Præterea le
cum exhalat
quæ vero su
sunt plenæ:
laudabilior
quoque le
nimis magn
sed errando
untur, quæ
firmis de
sint, neque
nec dura: q
gunt. ne sin
pant. quibus
quant. Quæ
sordinem g
atque, quæ a
etiqui vero
ueniunt, qu
feriunt, ide
& animalia
ut mēs va
decubitus
calidiora.

Ex

Quæ reg
sum, quæ d
regionis st
ra vero m
magis elin
rem redd
sublimior
refrigera
sita huc
gefaciunt
porro d
lubrici

cūdus est, vapore etiam, qui inferne ascendit, implet corpus. Præterea læticæ, quæ pedes humiles habent, corpus replent, cum exhalationem, quæ ex terra manat, propinquam habeât. quæ vero sublimibus pedibus nituntur, timoris vehementis sunt plenæ: & speciem faciunt, quasi pensiles sint. sunt ergo laudabiliores, quæ mediocrē habēt altitudinem. quin paruæ quoque læticæ damnantur. molestiam enim afferunt, itēmq; nimis magnæ, quia non eodem in statu ægrotantes quiescūt, sed errando, & locum ex loco commutando lassitudine capiuntur. quæ vero quatiūtur, aut quoquo modo mouētur, sunt firmis deteriores, ob eandēque rationem funes contenti sint, neque quicquam se remittant: sint quæ strata nec pauca, nec dura: quia lassant, & concutiunt corpus, atque confringunt. ne sint etiam profundiora, quam vt quæ opus sunt, capiant. quibus hoc accedit incommodi, vt ne quis se vergere queat. Quæ vero sursum repunt, ac vergunt, vehementem lassitudinem gignunt: similiæque sunt figuræ cathedræ cuiusdā. at iis, quæ ad caput pertinent, minime situs ille incommodus est: qui vero situs deorsum repūt, muliebribus defluxibus conueniunt. quæ strata splendidi coloris sunt, implent, & sensus feriunt, idem faciūt, quæ accurate sunt tincta, quæ varia sunt & animalium figuris distincta, in morbis acutis in causa sunt vt mēs vacillet, ac perturbetur. quæ sordida sunt, cum primus decubitus in eis sit frigidus, & si quis in eis diutius moretur, calidiora, quam par sit, euadant, ideo minimē conueniunt.

Ex Sabino, de temperie regionum.

Cap. 15.

Quæ regionibus adiacent, alia deorsum vergunt, alia sursum. quæ deorsum vergunt omnia ad meridiem sita faciunt regionis statum calidiorem. ac maiora quidem magis, minora vero minus. quæque magis æqualia, tenuiæque sunt, id magis efficiunt: quæ sursum vergūt, aërem situ suo frigidiorē reddunt. quæ vero magis ad septentrionem vergunt, sublimioræque sunt, calefaciunt, supina vero constitutionem refrigerant. Quæ ad orientem & occidentem solem sunt posita siue supina, siue sublimia sint, minus calfaciunt, & refrigerant, quam quæ ad septentrionē, & meridiem. Omnia porro & calefacientia & refrigerantia regionibus partim salubriter, partim secus adiacent. nam iis, quæ in calidiore sitæ

v iij

sunt climate, quæ refrigerât, salubria sunt: quæ vero calfaciunt, non sunt salubria. iis vero quæ in frigidioribus sunt, calfacientia salubria: refrigerantia, non salubria. dicitur autem quæ calidiores, quæque frigidiores sint regiones, terræ pars quæ ad meridiem est propinqua ei, quæ non habitabilis est, calidissima earum, quæ habitantur. eam Aethiopes inhabitant. pars terræ, quæ ad vísam est, frigidissima, humidissimaque est, hanc Scythæ incolunt. hæc nostrum habitabilem orbem terminât. quæ inter Scythas atque Aethiopes interiacet, eius partis regiones meridiei attributæ temperamento veris sunt similes: sunt tamen sicciores. quæ ad septentrionem pertinent, autumni temperaturæ comparantur: sunt tamen humidiora. Quæ igitur ex habitu eorum, quæ deorsum vergentia sunt regionibus adiuncta, eueniunt, hæc sunt. Est autem aliud quippiâ additum, quod nõ ex habitu existit, sed per se vnique eorum, quæ adiacent, attributum est. ergo quod ex mari, campestribus locis aqua vacantibus, & montibus, itémque tumulis, & collibus accedit, & affertur, id siccioris constitutionem reddit: quod vero è fluminibus, & omnibus aquis potui aptis emanat, humidioris statum facit, at quod ex stagnis & paludibus affertur, aërem facit crassioris. ex his quæ adiecta sunt regionibus, quæ in siccioris climate sunt constitutæ, suis defluxionibus humectare possunt, atque ita statum eum salubriorem reddunt: quod Nilus Aegypto tribuit. at humidioribus, statum magis morbosum comparant. quæ siccum efficere aërem possunt, si humidioribus adiungantur, proderunt: si siccioribus, nocebunt. cæterum quænam regiones humidiores, quæque sicciores sint, prius exposuimus.

De plantis salubribus, & non salubribus.
Cap. 16.

Eorum, quæ ex terra nascuntur, alia salubres, alia non salubres defluxus habent. quæ fructum ferunt, qui edendo est, salubria sunt, itémque odorata, vt laurus, & cupressus, & flores omnes, qui suauem odorem ex se mittunt, & quæ ita etiam odorata nascuntur, in quorum numerum anethum, apium, thymum, & omnia, quæ tenuiorem reddere aërem queunt regionibus, quæ habitantur, adiacentia, referuntur. at quæcunque

cunque
neque oc
bria non
poration
hanc arb
item, qua
fluxibus

Primu
sumitur.
redoler.
facit. de
dore est in
tantur, v
vt vapor
è terra el
ibiq; mo
rem, at
etiam ti
& prob
bas int
res mag
sublimi
rite nat
rant. Iac
& iucun
ea regio
ni, & co
tum fil
sunt, et
Quare
cæter
eiusd
è reg
nies
cont

cunque exorta neque fructum, quo vesci possimus, afferunt, neque odorata sunt, neque attenuandi vim habent, ea salubria non sunt habenda. quinetiam nonnulla mortiferā evaporationem obtinent, vt taxus: homines enim qui prope hanc arborem dormiunt. moriuntur: qui procul distant, nō item. quandoquidem halitus procul delatus, plerisque defluxibus aliorum commixtus, eam vim amittit.

Cognitio salubris exhalationis regionum.

Cap. 17.

Primum salubris exhalationis regionis signū ex terra ipsa sumitur, ea enim humore perfusa non solum terrenum quid redolet. sed suauem etiam odorem spirat, qualem Aegyptus facit. deinde vero mane cum domus nondum fumo, & nidore est imbuta, odorque eorum, quæ in ciuitatem comporantur, vnā cum regionis exhalatione temperatur: ex quo fit, vt vaporem quendam gratum, quod in Aegypto vsu venit, è terra elatum sentiamus. si quæ in terra quispiam recumbat, ibique moretur, videre videatur se leuiorē, & ad motus aptiorem, atque agiliorem esse factum, cibūque appetere. erit etiam tibi argumento, si quæ ex terra oriuntur, bene tincta, & probe colorata, & odoratiora sint: ac si quis virētes herbas intueatur, nolit aspectum alio cito traducere: si quæ arbores magis lignæ humi incumbentes optabiliore sint, quā sublimiores: si quæ omnia habuerint probe colorata, & folia rite nutrita: si quæ fructus statim maturos, & odoratiores ferant. Iam verò poteris facere coniecturam, vtrum regionis * iucundior exhalatio salubris sit, ex iis animalibus, quæ in ea regione nascuntur. pueri enim omnes floridi, & succi pleni, & coloratiores sunt: itēque catuli, & ceterorū animantium filioli nuper in lucem editi, meliores, præstantiorēque sunt, eōsque salubriores, quam in aliis regionibus cōspicies. Quineriam si quæ homines reponunt. vt triticum, hordeum, cæterique fructus, & caricę, & palmulę, & cetera generis eiusdem, diutius manserint incorrupta, signo erit, salubrem è regione vaporem emitti. sed & somnos suauiores inuenies, & animum à visis in somnis nequaquam perturbari conspicies.

v iij

Cognitio prauæ & vitiosæ exhalationis. Cap. 18.

Cōiectura assequeris, vitiosam esse regionis exhalationē, si terræ glebam capias, & aqua madefacias, odor enim inde emanabit perinde ac è carbonibus restinctis. præterea cum in regionibus omnia contra, quam supra dixerim, comperias, iam cognosces prauam eius esse exhalationem. si vero necessitas aliqua te in ea regione aliquod temporis spacium morari cogat, si in tabulatis, sublimioribus habitationibus moram traxeris, minime læderis. omnia enim, quæ ex terra, aut humoribus exhalantur, in sublime elata, crassiorem eorum partem in aëris parte crassiore relinquētia concoquuntur, atque purgantur.

Regiones quatenus ad Solem pertinent, salubres, aut non salubres esse. Cap. 19.

E regionibus quæ ad meridiem sunt, in omnibûsque anni diebus, ac per totos ferme dies solem habent, sunt maxime salubres, quæ decliues ad septentrionem sunt, utpote quæ non omnibus anni diebus solis splendorem recipiant, per exigua diei parte illustrantur. & quandoque lux maxime inclinata, atque imbecillior eis incidit, ideoque minime sunt salubres, id quod est sane perspicuum. nam si omnis quæ ad meridiem est sita regio, odoratiores est, quam quæ ad septentrionem est posita, magis etiam cōcocta est, & matura. quin omnium quoque arborum fructus, qui maiorem solis partē nacti sunt, præstant iis, qui minoris participes fuerunt. sunt præterea maiores, odoratioresque, & celerius maturescunt, & gratiores sunt gustus. Cuiusque etiam arboris pars, quæ ad meridiem vergit, humidior, rarior, magis tenera, flexibilior, leuior, efficacior, & fabro accommodatior est: & in latitudinem plus augetur. quæ vero versa ad septentrionem est, sicciore, densiore, grauiore, difficilior ad flectendum, & fabris incommodior, minus in ambitu augetur. Quibus quidē sit, ut non solum planum sit, quæ ad meridiem sunt versæ decliues regiones, causa eius relationis, quam habent ad solem, esse iis, quæ ad septentrionem vergunt, salubriores: sed hoc etiam, eas quæ decliues ad orientem, aut occidentē solem versæ sunt, minus salubres esse iis, quæ decliues meridiē spectant: esseque salubriores, quā quæ in septentrionē vergunt.

gunt. causa est, quoniam magis participes solis sunt, quam hæ: sed minus quam superiores, quæ meridiem spectant.

Quenam viæ ciuitatis statum salubrem, aut non salubrem faciunt.

Cap. 20.

Cum in ciuitate viæ distent æquo inter se interuallo, semper mutua longitudine, mutuâque latitudine protèduntur. & quæ sunt eiusdem ordinis, ad orientem, & occidentem recta statuuntur: aliæ vero ad septentrionem & meridiem, quibus omnibus ciuitas diuiditur: vt aliæ per totâ longitudinem, aliæ per latitudinem vsque ad fines progrediantur, nec vllû ædificium inter eas singulas in suburbiis sit constructum: sed puras directo vias per se singillatim habeât: hæ nanque urbem aëri bene comparant, & statum bene à sole illustratum, purumque, & qui bene à ventis perflatur, efficiunt: quoniam Boreas, & Notus, Eurûsque, & Zephyrus, qui maxime sunt ventorum coryphæi, ordinatissimi per vias defluunt, quæ directo ad eos sunt sitæ, siquæ nihil habeant, quod eorum defluxum retineat, per urbem perflati, & perspirantes nihil violenti faciunt: nam venti cum nihil eos impediât, nos in transitu latent: nec lenti ciuitatem præteruehantur. atque ita constitutionem purgant, cum fumos, puluerem, & omnes exhalationes à ciuitate repellant. ex quo fit, vt viæ, quæ sic constitutæ sunt, urbem soli recte exponant, quia sol exoriens & occidens in eas ingreditur: & oriens recta eas luce complet, cum vero medium cælû conscendit, in omnes eas, quæ ad septentrionem & meridiem vergunt, sese pandit: ita vt totû diem viæ ciuitatis radiis solis perfundantur. si vero non omnes viæ pari interuallo inter se distributæ sint, neque rectæ, sed flexus quosdam habeant, qui percurrere non possint, & obliqui ad ventos sint, multâ aëris turbationem excitari contingit. cum enim vnus ventus spirat, multos fieri accidit, eosque pugnare inter se. nam ventus per rectum fluit. at viæ non sunt rectæ. ergo incidens in eas, quæ exitus non habent, ventus non ingreditur, quia ei nulla ibidè patet via. aërem vero, qui in ea via est, collidit, & vndabundus per flexus, easque vias quæ exitus habent, iactatur: quandoquidem aliter ab aliis, atque aliis inflectatur & refringatur. à quibus autem vibratus circumfluit, & sæpe vicissim fertur, in eis ad eadem loca debilis fluit: & vn-

dosus sese iactat: à quibus vero in alios constitutos mittuntur, contrarias spirationes faciunt, vt lumen luminis reflexū. ad pares enim angulos semper reflectitur. illi vero perinde atque aqua, faciunt, vt cum inter se in via inciderint, præterfluant, cum recta transire non possint. accidit autē quandoque vt ventus, qui arcte incidit, in vtrunque latus diuidatur, cum vtrunque sint accessus: atque eundem rursus aliam fluxionem pati, siquid tale ei occurrat: & ex vno multi fiāt: & in sese incidere modo è lateribus, modo ex cōtrariis partibus delatos, & in singulis viarum inclinationibus percussos sua offensione vehementer cœli statum commouere. alius enim venti molliter cedunt, alia vero percutiunt. ex quo fit, vt status ciuitatis nullo * more à contrariis perflatus, perturbetur, cū igitur vnus sit ventus, confundetur aër, & turbabitur, non secus quam spiritus homini innatus. qui cum * ita sit, concoctiones & distributiones impedit. esset autem huiusmodi salubris: sed lux solis, quæ semper directo ab eo fertur, sinuosa in vias, non autem equalis incidit, sed sparſe & vage eas attingit. atque ita ciuitas minime à sole perlustratur. minimèque à sole dissoluitur exhalatio. quocirca status ille crassus est maxime, & perspiratu difficilis: quique talis est, is non est salubris. quod solet vsu venire, cum in plana regione vrbes sunt sitæ. si vero inæqualitates sint, quæ vias habeant æque distantes, aëris difficilis redduntur, cum contra quam sitæ sunt altissimæ viarum partes, ventus spiret. quæ vero sinuosas vias habent, præstantiores sunt: siquidem fit, vt vrbes partes in sublimioribus regionis partibus statutè melius perflentur, & aëre perfruantur.

Galenus de fomentationibus, cataplasmatibus, & curbitulis. Cap. 21.

Fomenta cutim ad transpirationes raram facere, sanguinemque qui inest inflammationibus, attenuare, & digerere consueuerunt. quæ si facta fuerint, non solū aliquid sanguinis euacuabitur, sed etiam affectæ partes, quæ minus distenduntur, mitius dolore prementur. at cum sanguis in inflammatione non minuitur, vel etiam spiritus vaporosus ex calore gignitur, augeri dolorē cōtingit. porro sanguis nō minuitur, propter succorū redūditiā, quæ in toto corpore inest

est. nā ad partē quæ calefit, plus attrahitur, quā ab ea euapo-
retur: cum hoc sit calfacientibus natura comparatum, vt di-
gerant id, quod partibus, quibus admoventur, continetur,
quodque redundat ex propinquis, trahant. Humida igitur
fomenta inflammationibus iis, quæ à succis biliosioribus o-
riuntur, conueniunt: sicca vero iis, quas sanguis tenuis & a-
quosus excitauit. semper enim in memoria habendum est,
contraria esse contrariorum remedia, hoc igitur proposito,
fomenta morfu vacantia ad mordentes succos faciunt: mor-
dentia vero, quod tenuent, ad crassos & tenaces. Cæterum
calefacere præcordia cataplasmatibus, aut perfusionibus, non
est perpetuo tutum: sed in iis tantum ægris, in quibus nihil
superuacaneum est in toto corpore: cæteris omnibus extre-
ma perniciēs est. Eorum igitur quæ in medio sunt corpore,
vt quidam vocant, prouidentia, vbi detractus sanguis non
est, maximum est plane malum: vbi detractus est non maxi-
mum. quanquam sic quoque noxia esse in synochis febribus
potest: siquidem deusta immodico calore viscera etiam am-
plius deurantur, & torrentur. ergo huiusmodi prouidenti-
am illi duntaxat requirent, quibus in vna particula consti-
tit putredo: si tamen iis quoque sanguis fuerit missus. Pro-
uidebitur autem his non statim inter initia relaxando, sed
in plurimis prorsus contra faciendo. Cum enim adhuc ad
affectum locum fluxio fertur, reprimere, remittereque hanc
expedit, non ad ipsum attrahere. si vero tum fluxio humo-
rum per ea remedia cohibetur, tum densitas, quæ ex adstri-
ctione in affecta particula est relicta, crassiora detinet, iam
tempestiua relaxatio est, vt ea, quæ retenta sunt, vacuentur.
Præcipue autem adstringentibus est vtendum, vbi in iecur,
aut ventriculum superuacanea profluunt: quando & è pri-
moribus admodum hæ partes sunt, & munus suum obeant
vel in ipsis morbis, est necessarium. nō est autem exiguum eo-
rum munus, quā ob rem impensius, quam cætera mēbra, ven-
triculus & iecur adstringentia desiderant. ergo cum ea, quæ
iam infixæ sunt, euocandi tēpus est, tum quoque modice ad-
stringi postulant, idcirco si vel minima suspitio sit, iecur, aut
ventriculū laborare, absinthium pōticū oleo protinus inco-
quemus, & eas particulas perfundemus. Vbi absinthiū nō sup-
petit, inter initia vel melinum, vel mastichinum, vel lentisci-
num satisfecit: si exigua febris sit, etiam vnguentum, quod ex

L I B E R

nardo conficitur. atque etiam aliorum medicamentorum, in quibus mista cum amaritudine adstringendi vis est, aliquid in oleum coniicere, & ad eundem modum uti licet. simili quoque modo & cataplasmata compositam vim habeant ex ea, quæ tenuium partium est, ac relaxet, tum vero ex amara, & adstringente. superet autem in iis, vbi scilicet reprimere, & robur addere studemus, quod adstringat: vbi incidere, ac detergere, amarum: vbi euocare, quæ inter relaxantia tenuium partium sint vel maxime, siquidem quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus mouentibus cõuenire docuimus. Vnde nec colo laborante, nec quouis reliquorũ intestinorum, nec musculis, qui sunt in hypochondriis, aut ipso peritonæo, miscenda sunt vlllo pacto adstringentia: sicut nec cum vesica, aut vterus male habent. cum, vt dictum est, nihil præterea ad locum fluat, nec plenitudo, nec multa excrementa in toto sint corpore. Renes & thorax in media prædictorum sunt conditione: quantum scilicet à ventriculi, iecorisque sollicitudine absunt, tatum reliquorum superant. de liene pronunciare absolute non licet, nec nisi prius definita tum corporis totius natura, tum vero affectione, quæ curationis tempore occupauit. nam si vel ægrotus ex iis sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant, vel etiã eo tempore succus in eo abundet, necesse est in liene curando, adstringentia reliquis admisceas, quo visceris robur custodias. ita enim & excrementa ad se trahet, & cum corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculum excernet. si nullum omnino sit atræ bilis excrementum, aut omnino adstringendum non est, aut quam parcissime. Non solum autem in liene, verũ etiam in omnibus partibus, in quibus humor putrescit, obseruandum est diligenter, quod symptoma sit vehementissimum, quod secundo loco, aut tertio: quo ex ipsis inuenta plane affectione, idonea eidem curationi adhibeatur. etenim in membro affecto tum calor superat, tum vero tumor, qui vel propter abundantiam humoris, vel propter crassitudinẽ sit durus. si igitur calor superet, danda opera est, vt sensim per ea, quæ tepentem calorem obtinent, digeratur: cuius generis est tũ lini semẽ, tum chamemelum: quibus adiici vel hordei, vel fabarum farina debet, quippe quorũ neutrum excalfacit. sæpe autem, vti nosti, quod medici artomeli vocat, pro cataplasmate huiusmodi inflammationis præpa-

præparantes aliquid aque miscemus : ad lienem vero etiam aliquid aceti quandoque . si vero inflammate partis calor non multum à natura excesserit , sed magnitudo eius notabilis fuerit , digerere haud timide sine aqua debemus , etiã scirrhusa inflammatio sit propter humorũ , quos continet , vel crassitudinem , vel lentorem , tum aceti aliquid , tum attenuantia medicamenta simul immiscebis , & præsertim in liene . hoc enim viscus propterea quod à iecore crassum succum trahit , eiusmodi humoris occasione plerunque laborat . quo magis cataplasmata quæ ex absinthio , oxymelite , & cappari fiunt , illi sunt idonea . Parcius vero ad pectus est adstringentibus utendum : quoniam talia humores , qui inflammationem excitant , in pulmonem & cor nonnunquam reprimunt , ac cibis potius horum firmitudini consulendum est . sed multo etiam magis in pulmonis inflammatione abstinendum ab adstringentibus est : quando in eo ipsis quoque relaxantibus admiscendum aliquid acrium , & euidenter calfaciẽtium est : quippe foras trahere potius , quã reprimere in eo debemus . Itaque etiam cucurbitula utiliter iis , qui sic laborant , si prius fuerint vacuati , applicabitur . si vero abundantia succorũ sit , cucurbitulis in principio nõ utemur : sicut neque etiam vlla alia re calfaciente : sed cum nihil præterea influat , & totum corpus prius euacuauerimus , vsusque postulet , ut re inflammantem moueamus , aut amoliamur , aut foras abstrahamus . Vbi vero morbi exoriuntur , non ipsis membris laborare incipientibus , sed iis , quæ illis continua sunt , cucurbitulæ ad-mouendæ erunt , reuulsionis causa , inter initia vero , quæ reprimendi vim habent , sunt adhibenda . sed cum in ossibus cranij medium occupantibus in altum descendere reprimentium vim cupimus , eorũ , quæ præire , & deducere ea possunt , aliquid reprimentibus admiscemus . eiusmodi sunt , quæ ex tenui substantia constant , atque acetum quidem non modo tenuium est partium , sed etiam non mediocrem reprimendi vim obtinet . vnde merito in principiis affectionum eo cum rosaceo utuntur , progressu vero temporis etiam spodylii & serpilli , quibus iam non modo partium tenuitas , sed caliditas etiam inest , aliquid admiscet : quo scilicet tempore transire ad ea , quæ concoquant , & digerant , par est , atque hæc utraque valentiora , quam postulet ipsa pars inflammatione

L I B E R

affecta, deligere: ceu viribus eorū, per ea ossa, quę intersunt, remittendis. sane ad eū modum & castoreo vtimur: cum tamen eo in aliis inflammationibus minime vtamur, etiam si in summa declinatione sint. est enim calidius id, quam vt inflammationibus sit idoneum. huic quoque medicamento partium tenuitas inest.

Ex Antyllo de madefactionibus, ex primo de præ-
sidiis libro. Cap. 22.

Madefactio minorem vim habet, quam cataplasma. iis vtimur, cataplasmata vel propter tempus eis minime aptum, aut propter locum, aut propter eorum vim deuitantes. ac temporis quidem ratione, in principio madefactiones adhibentur, cum eo tempore cataplasmatum in-tempestius sit vsus. Propter locum vero, in capite madefactionibus vtimur in iis, qui nō recte admodum ad cataplasmata sunt affecti: propter vim denique in gracilibus: cum vires imbecillę cataplasmatum pondus ferre non queant. Accommodatissimum autem est chamæmelinū oleum: & præsertim * in iis, in quibus oleum capiti admotū, euaporationi finem imponit: eamque, quę in capite est, digerit, aliāmque non attrahit. quod nulli præterea medicamento contigit. Illud sane scire conuenit, madefactiones in phreneticis syncipiti & temporibus adhibendas esse, adhibita diligentia ne verticem, & partem posteriorem attingamus: siquidem hę particule perfrictiones non ferunt, cum sint origines neruorū. quin calidas quoque perfusiones eis large admouere conuenit. Nosse autem debemus, aquam frigidam, aut poscam nouis spongiis esse excipiendam: vinum vero cum oleo lanis sordidis, itēque hydrelęum. linamenta vero ex linteis puris ad omnes madefactiones sunt accommodata.

De irrigationibus, spongie applicatione, aspersioneque,
ex eodem libro. Cap. 23.

Irrigatione vtimur, vt corpora perspergamus, hoc est balnearum vsus imitantes, cum alia circumstātia impediti, balneo vti non possumus. cum autem humectare corpora velimus, id madefactione facere non valemus, cum ea non alte admodum descendat. spongiam vero admouemus, vt sordem adhærentem abstergamus, siue sanies sit, siue sanguis, si-

ue

re strigmentum, siue pus concretum sit, siue ipsa medicamen-
ta, siue quæ inuncta fuerint, aut ut morsum & pruritus cor-
pus vexantes sedemus. In facie vero, cum recreare, & robur
indere volumus. Eiusdem rei causa aspersione utimur. Asper-
gendum vero caput est in vigiliis, & deliriis. Stomachus au-
tem atque hypochondria oleo calido perfunduntur. simili
quoque modo costæ, spina, vesica oleo calido asperguntur,
itemque tetanici, & ischiadici denique, at crura eorum, qui
febris diuturnis & siccis detinentur, si plane * constite-
rint, aut post sudores exsiccata sint, hydrelæo persperguntur,
& alio traducendi causa crura multa aqua, aut hydrelæo ir-
rigamus. quod facimus, ut errantem materiam in partibus
ignobilioribus contineamus: quo tempore calidior utimur
ad morsum usque, & finem irrigationis ruborem, & tumo-
rem constituimus. Iam vero irrigamus, ubi inflammationes
resolvere in animo habemus: aut ubi abscessus citius ad pus
perducere consilium est. aspersione vero utimur ad faciem:
atque in febris ardētibus æstiuo tempore aqua lactea: hy-
berno vero, calidior. præsertim si caput nullo malo vrgea-
tur. Cauenda tamen in diuturnis affectionibus aspersio est:
stupefactionis enim & frigiditatis periculose initium faceret.

Debet autem is, cui adhibetur aspersio, ore contra flare, ne
à perfusione impleatur: sed illi occurrere, spiritum obicien-
do. spongia quoque sicca mento adhibenda est, ne aqua ex
perfusione in pectus confluat. Quandoque vero etiam po-
sca aspergimus, & præsertim in febris simplicioribus, &
quæ nihil maligni habent, ad oculos vero destillantes deco-
cto nucû pinearum confractarum utimur. hyberno tempore
ad vehementes chemoses, sæ nigræci albi decoctum adhibe-
mus. in quo bis, tervè decoctum esse sænumgræcum debet,
ita ut prima decoctio abiiciatur, & ultima nobis vsui sit, ut
perfundamus. spongia autem applicatur, quæ eadem materia
sit imbuta, ex qua constat etiam aspersio: siquidem similem
quoque vim habet. sed abluendi, & abstergendi causa spon-
gia ex aqua calida satis est. quandoque etiam medicamen-
tū quoddā, quod abstergendi vim habeat, aut aqua resolu-
tum, aut antequā spongia admoueatur, inunctū, ut nitrum,
aut aphronitrū, aut aliquod his simile cōuenit. In febricitan-
tibus, in quibus spōgia utendum est, ex aqua frigida id faci-
mus, in incremēto tamē, id vitamus, at in statu, vel declina-

tionibus audacter hoc remediū adhibemus. Musculi itidem, qui ad aures sunt, oleo illinendi sunt. in meatus vero auditus, & nares oleum indendum est, ne refrigerentur. Archigenis autem sententia est, in ardentis febris excessu, spōgia non faciem tantum, sed pectus etiam in vigore fouendum esse. at in intempestiuis in somnum propensionibus, faciem nitro in aqua eliquato perspergendam. totum vero corpus in valde siccis & ardentibus febribus ex hydreleō, expectātes accessionum constitutionem, spongia perfundimus.

De cataplasmatibus, ex eodem libro.

Cap. 24

Inflammationibus, quæ neque madefactiones, neque emplastra recipere apte queunt, cum delicatiores sint, quam ut horum applicationes ferant, potissimum cataplasmata conueniunt. Ex cataplasmatibus autem alia calfaciunt, & digerunt: alia refrigerant, adstringunt, & reprimunt, aliāque sine aqua, alia sine decoctione, & alia cocta parantur. quæ autem non decoquantur, pinfa nominantur. quorum apparatus terminus est, ut valde læuigata, & in vnum conductæ sint, & non inquinent, & non defluant. Coctis vero non est statutus terminus, ut non inquinent, id quod etiam fieri posset, ob copiam rerum siccarum quæ humidis imponuntur: quæ miscendo & vniendo vires suas in ea fundunt. Præterea variis cataplasmatibus utimur tum propter locorū varietatem ea postulantem, tum propter affectiones, quæ neque omnes, neque omni tempore eadem cataplasmata requirunt. Ergo decoctis utimur ad communes hypochondriorum inflammationes, ex decoctis maxime in promptu est commune, quod luteum appellamus. In aquam lini semen, & pollinem inspergimus, & post decoctionem oleum infundimus. si quæ humectare hypochondria, quæ sicca sint, velimus, pollinem adhibebimus: si mollire, pro polline panem lini semini commiscebimus. si calefacere vehementius velimus, & hordeaceum panem semini lini addemus: si calefacere, & siccare, scænum græcū: si calefacere, & euocare, furfures. si vero status hypochondria infestent, lini semen cū cymino eodem modo decocto superdamus: si dissolutus stomachus sit, emplastrū polentam capiat. si non appetat, & imbecillus sit, absinthii coma prius decoquatur, tum ei decocto polenta commiscetur in iis, qui sunt mirum in modum delicati: eam tamen nō siccam,

eam, ut
sed eam
cimus, id
visque du
oxymeli
ma sit, fa
thosum fi
conficitur
uigata vi
rem reda
decoqu
decoctur
que est. si
uones fa
ruode ver
ficam ver
da sunt pi
ex malico
inspergi
quod ex
deinde
conuen
no inco
cit vna
melicra
dum ad
verultu
te tritun
so deco
tentur, d
festa ca
tur: cum
beat, si
cocta
quæ
mat
tribu
inue
cocti
adit

eam, vt lini semen, aut pollinem aut scœnũ græcum indimus, sed eam pingui melicato decoquimus, decoctum colo trailicimus, idque quod traiectum sit, infundimus, tum coquimus vsque dum consistat, si vero febris adiuncta sit, pollinem in oxymelite coctum eodem modo imponimus. si laxum cœdema sit, farinẽ fabarum cuminum æthiopicũ miscemus: si scirrhum sit, id quod ex ficibus constat, imponimus: quod ita conficitur. Ficus absque seminibus contunduntur, & ita læuigata vino dulci incoquantur: quibus parum nitri in leuorem redacti additur. si lien valde obduruit, ficus oxymelite decoquantur. Iecori inflammato scœnum græcum melicato decoctum, & panis cū lini semine prodest. præstantius quoque est, si eryngij semẽ accedat, ad intestinorum inflammationes facit quod ex lini semine & polline constat, ad eorundẽ vero defluxiones, id quod ex milio conficitur. ad vesicam vero lini semen cum rosmarino, pudendis incommoda sunt pingua: profunt autem adstringentia: quale est quod ex malicorio paratur, malicorium vero aridum tusum vino inspergi debet: ei que admisceri galla contrita. valet ad idem quod ex lentibus fit, ita vt lentes prius aqua decoquantur, deinde læuigentur, tum mel eis addatur. Pudendis quoque conueniet id, quod polentã recipit, salis que expers est, & vino incoctum. Ad tumores vero laxos aque intercutem facit vua passa cum acinis trita, vna cum ficibus pinguibus in melicato decocta. huic autem sterces caprinum ad exsiccandum additur, & magis iuuat, obseruatũ quoque est, gypsum vetustum & præsertim quod longo tempore in cataplasmate tritum inueterarit, cū ficibus & nitro rubro in vino mulso decoctum facere, si coxendix & testes inflammatione tententur, si ea ex chirurgica aliqua administratione, aut manifesta causa exorta fuerit, communia cataplasmata imponentur: cum vero per se nata fuerit, cœdematãque adiuncta habeat, farina fabarum cum vua passa pingui in melicato decocta proderit. quandoque etiam lomenta fabarum decoquẽtes, postea læuigamus, & cum melle & cumino cataplasmatibus instar obducimus. Inflammationes vero quæ in partibus sunt, pane melicato incocto mitigamus. sed si febrim inuehant, decocta refrigerantia ei pani admiscemus, vt decoctum plantaginis, herbæ sanguinalis: si defluxio accedat, adstringentia addimus, vt decoctum rhois, rubi, lentisci, ma-

licorij, galleg. In iis vero inflammationibus quæ resistunt, duræque sunt, panem in decoctum malug, aut fœnigræci, aut lini seminis iniicimus.

De cataplasmate, quod citra aquam conficitur.

Cataplasmata, quæ sine aqua parantur, ex melle, & resina terebinthina, aut ex virisque componuntur. mel autem atque resina prius coquenda sunt, quibus sicca insperguntur, ut in humidis cataplasmatibus sit. in humidis enim relaxantur: at in iis, quæ aque sunt expertia, nequicquā tactu faciliora, & molliora decoquendo fiunt. Hoc quoque scitu dignū est, in humidis opus esse concoctione, postquam sicca fuerint iniecta: in his vero ubi mel & resina satis cocta fuerint, sicca imponi, nec præterea coquenda. siquidem vis siccorum in melle frigeretur, & evanesceret. Lini semen imponatur hisce cataplasmatibus, cum ab igni fuerint amota. Cōueniunt autem hæc cataplasmata iis, quos refrigerari veremur, aut in quibus cauemus ne quid humefiat, & iis, quos diutius calefacere, & exsiccare, & defluxionē cohibere volumus. præcipue igitur hisce cōtinēter ad hypochōdria siue cū feбри, siue etiā sine feбри vitimur, nā liquida cataplasmata sunt his, quæ arida, aut aquæ expertia nominantur, exiguo tēporis spatio valentiora. humor enim, qui eis inest, tenuis est, & dissoluit, atque ita facile deducit vim suam in corpora. ac nemo est, qui satis sanus sit, qui cataplasmata cōtinenter mutari delectetur. modus autē est, ut tēperata imponantur. Utendū ergo est hisce quæ expertia sunt aquæ, cū volumus, uti diximus, totū diem, totāque noctē cataplasma loco adherere: & in hypochondriis, & iis, qui cōtinenter exudant, inflammationibusque vrgentur. itēque vtilia sunt iis, qui pondus sustinere non possunt: atque etiam in iis, qui sic perfrigerantur, ut calefieri non queant.

Ex Lyco, de cataplasmate ex fermento. Cap. 25.

Hoc cataplasma ad diffundendū, liquandūque compacta valentissimū est. nam & dothienas iuuat, & suppurationes, quæ tardius ad cōmutationem progrediuntur, promouet, & furculos educit, & duritias maturat, & plantarū pedum contusiones sanat. Variis autem modis conficitur. nam vel fermentū oleo molitur, itaque facit ad dothienas, ad * artuum alienationes, aut si efficacius facere velis, nitrum tritum commiscetur: quo ad scirrhus admodū solidos vitimur. Est quando-

doque, cum fermentum diffundimus, & rursus ipsum deco-
quendo componimus, eique aut olei parum, aut irinum vne-
guentum addimus. quin aliter etiam paratur. fermentum a-
ceto subigitur, vt ad succi crassitudinem redigatur: id quod
scirrhis, qui in iecore, & liene sunt, aptum est, aut ei coma ab-
sinthij, aut iris, aut ebrotionum, aut thymum, aut pulegium
admiscentur: si quidem hæc omnia fermento adiuncta scir-
rhis iecoris, & lienis conueniunt.

De cataplasmate, quod ex pane conficitur. Cap. 26.

Cataplasma quod ex pane fit, ad omnia fere valet. nã om-
nibus propemodũ inflammationibus conuenit, multis id quo-
que modis cõficitur. in aqua frigidissima panis immergitur,
& cum rosaceo subigitur, atque ita imponitur. conuenit au-
tem sic concoctũ cataplasma inflammationibus iis, quæ ery-
sipelatis naturam referunt, aut pro aqua, ad eius confectio-
nem posca vtimur. ita enim accommodatius est inflatio-
nibus erysipelatis naturam imitantibus, aut etiam aqua cali-
da maceratur, & simul cum oleo emollitur: tũ panis calidus
admouetur: conuenitque eo modo durioribus, & feruenti-
bus inflammationibus. vel loco olei butyrum indes, & ad
easdem affectiones accommodatius conficies. Fit etiam ad
hunc modum. Panis aqua dissoluitur, vt cremoris consisten-
tiam acquirat, eique oleum aut butyrum admiscetur, deinde
coquitur donec consistat. Hoc corũ omnium, quæ quidẽ ego
nouerim, est maxime ad vulnerũ inflammationes accommo-
datum, & ad suppurationem celerrime excitandã: vbi ea opus
est. cũque neruus, aut neruea pars aliqua contusa fuerit, tũ
ego parum liquidę picis admiscens, cataplasma perutile con-
fecisse me noui. quod est etiam inflammationibus idoneum,
quæ ex podagra excitantur. Alia quoque conficiendi ratio
est. Hesterni panis medullam manibus cõterere oportet. vbi
vero ad farinæ similitudinem sit redacta, ei farinæ mel ad-
miscendum est, & coquendum donec mediocrem consisten-
tiam nanciscatur. vbi satis esse costum videatur, oleo affuso
miscendum. Prodest hoc hypochondriorum inflatio-
nibus: sed præstantius est, si melli parũ aque fuerit adiectum.
farina enim coquendo magis diffunditur. Iam vero quod ex
tritico, & triticea farina constat, eadem ferme potest effice-
re, & totidem quoque modis conficitur.

Furfures ita parantur, vt sepe stringantur, & premantur, donec in tenuissimas partes abeant: aut in mortario teruntur, & cribro traiciuntur. utimur autem ad scirrhus, qui in quavis corporis parte constiterint: præcipue vero in iecore, atque liene. paratur autem cataplasma ex oxymelite: aut etiã ammoniacum admiscemus, & calidum admouemus, sed melius erit, si quis alterum alteri addat, vt nunquam refrigescat. si vero testes inflammatione tentabuntur, hoc cataplasma erit vtilissimum, quod sine aceto erit conficiendum. Facit etiam ad dothienē & cæteros furunculos. Mirifice vero prosunt furfures, contra animalia venenum iaculantia, si aceto madefacta & imbuta in vicem imponantur.

De cataplasmate, quod ex farina hordeacea fit.

Cap. 28.

Cataplasma, quod ex hordei farina conficitur, valet contra duras musculorum inflammationes: quas vel dissoluit, vel facile ad pus perducit. hoc ita fit. Farina debet pollen esse: & in melicrato coqui. mel autem plus esto, aqua vero parcior. adeo vt ipsa sola farinam ipsam indomitam coquendo diffundat: siquidem hæc non perinde, vt triticea, facile dissolui potest.

Altera confectio, & ad eadem faciens.

Malux radix, aut ipsa herba, postea quam decocta fuerit, vna cum melle terenda est, cumque fuerit dissoluta, cum farina coquitur. hæcque confectio maxime facit ad vtrumque, & ad mollienda ea, quæ hætenus dura fuerunt, & ad pus perducendum. Vbi vero satis concoctum fuerit, etiã pannis exceptum, tunc oleum affundendum est. ita enim gravioris coloris erit, & dum auferetur, à pannis cuti affixum non relinquetur. Ceterum & ad conuulsiones & ad tetanos hoc ita paratum faciet. sed in aqua, in qua farina coquenda est, prius rutæ, aut cucumeris agrestis radix, aut lauri bacce, aut sampluchum, aut iris decoquenda sunt. Erit etiam accommodatum, si post concoctionem, castoreum cataplasmati addatur: & totum pannum illinere, & ita toti spinæ superdare. ac melius erit etiam si cataplasma caput cōprehendat. In pleuriticis vero, aut peripneumonicis, abrotonum, aut lauri bacce prius in

in hydromelite incoquantur, tum farina additur. si vero scirrhus viscera obfideat, ammoniacum, aut terebinthina & nitrum additur: & quandoque acetum, cum intestina sunt inflammata, admiscetur. Vbi vero vesica, tum acetum, tum vero etiam ruta addi solet.

De cataplasmate ex lini semine. Cap. 29.

Cataplasma ex lini semine confectum omnes inflammationes, quæ in quavis corporis parte obortæ fuerint, iuuat. ac præsertim si cum eis dolores quoque vehementiores sint coniuncti, ut cum tansas, dolor augeatur. Hypochondria vero inflammatione obsessa si quis hoc cataplasmate velit obducere, ita conficiet, ut postea quam mel ferbuerit, semen in tenuissimam farinam redactum ei misceat.

De eo, quod ex polenta conficitur. Cap. 30.

Pollen ex polenta fit, subigiturque succo clauiculorum vitis, aut polygoni, aut pomorum. sanat hoc nauseas, & exestuationes. si vero polenta in melle coquatur, salque, aut nitrum adiiciatur, hydropicis erit accommodatum. Idem ad testium inflammationes, sine sale tamen & nitro, faciet.

De cataplasmate ex fœnogræco. Cap. 31.

Farina ex fœnogræco confecta non est ad multa utilis, nam inflammationibus non conuenit. at scirrhis affectionibus, si lini semen assumpserit, idonea erit. sed fœnumgræcum alio modo apparatus, erit ad multas res utile. aqua igitur decoquitur longo tempore, donec satis coctum sit. tum aqua effunditur, fœnumgræcum vero iterum læuigatur, & mellis quod satis est, ei miscetur. cumque recte cum melle fuerit subactum, læuigatum usque decoquitur, dum fiat tam crassum, quam epithema. hoc ita confectum utile est ad multa perinde, ac plurima epithemata: & ferme ad omnes inflammationes facit, quæ extrinsecus oriuntur.

Ad hypochondria, intestina, atque vterum.

Ad hypochondria vero, intestina, vterumque probe facit. cum autem decoctum & in leuorem redactum, ut diximus, loco mellis iterum in aqua decoquitur, oculis & sedi inflammationis conuenit: atque etiam efficacius, si sertulam campanam capiat.

De cataplasmate ex alica

Cap. 32

Aurium, nasique contusiones alica vtiliter obducimus. est autē decoquenda, & læuiganda. eaque præstantior fiet, si gummi, & thuris parum ei misceatur. Est non secus efficax alica ad dothienas, ad lichenas, & ad scabiem.

De cataplasmate ex milio

Cap. 33.

Conficitur hoc cataplasma eo modo, quo etiam ex lini semine parari docuimus. Valet hoc si ventris defluxus dolorē afferat: & oedema sublit. si vero picem liquidam assumat, ischiadicis vtile reddetur, aqua vero, a cetōve, aut posca excerptum contra morsus scolopendræ efficax esse obseruatum est.

De cataplasmate ex ficibus.

Cap. 34.

Multiplex omnino est huius cataplasmatis cōfectio, & ad multa itidem valet. ficus ergo ipsa, & semen quoad eius fieri potest, teruntur, cum hoc feceris, parum irini vnguēti mā suetudinis causa adiungitur. Facit hoc ad duritias neruorum, ad articulos contractos, aut plus iusto relaxatos: & ad scirrhus, præsertimque lienis, & ad eos quoque qui in iecore sunt valet, si vero nitri parum addas, sinus rumpet, aculeosque extrahet. si denique ficibus ita paratis miscueris pulegij, aut origani, aut thymi, aut absinthij comam minutissime tritam, hydropicis cōueniet, eritque totis hypochondriis, lumbis, & toti dorso superdandum.

Alia confectio.

Ficus coquuntur vsquedum facile dissolui possint, deinde læuigantur, & in eadem aqua decoquuntur in qua decoctæ prius fuerant, tum hordeacea, triticeæve farina, aut panis, eisdem admiscetur, & diligentissime subiguntur: & iterum ad cataplasmatism consistentiam decoquuntur. Facit hoc ad tubercula, quæ non facile maturescunt, & ad parotidas, quas deducere ad suppurationem oportet, & ad dothienas: si cum quis vti velit, butyrum addat. si vero rutæ folia trita misceantur, dolores intestinorum à flatu excitatos iuuabit. oleum porro aut pinguedo admisceatur, cum ruta, aut cuminum incoquitur.

De

De cataplasmate ex lomento fabarum

Cap. 35.

Coquitur lomentum fabarum ad consistentiam, tum cyminum nō admodum tritum additur: fitque cataplasma, quod testiculis inflammatis aptissimum est. Idem faciet, si narcissi fructus in tenuissimas partes redacti parum indideris. cæterū ad vetustiores testiculorum inflammationes ammoniaci portiunculam admiscere conueniet.

De cataplasmate ex lupinis.

Cap. 36.

Tenuissima lupinorum farina cum melle, aut per se cum lini semine decoquitur: eisque oleum non multum adiungitur: fitque cataplasma ad helminthas lumbricos accommodatū.

Alia eiusdem cataplasmatidis confectio.

Lupini ex aqua decoquuntur, vt facile læuigari queant: eisque fel taurinum adhibetur: & abrotoni coma tenuissime trita additur: valētque ad idem: est que aduersus heiminthas efficax medicamentum. cum decocti lupini fuerint, malenthiū læuigatum, & mel admiscetur, ac simul omnia læuigantur, & iterum decoquuntur.

De cataplasmate ex lentibus.

Cap. 37.

Lēs coquitur, aqua effunditur: multū læuigatur, rosaceū assumit. epithema præstātissimū pudēdorū inflāmatorum efficitur. cum rubia vero & pane addito egregie facit.

Alia conficiendi ratio.

Punicæ inanes partes cum lētibus incoquuntur: & utrūq; si mul valde cū rosaceo læuigatur. si panis eis accedat, mitius cataplasma fiet. hoc cōueniet, vbi crustæ ex igni excitatę fuerint & vbi vlcera depascātur, ac præsertim in pudēdis. sed scire par est, cum inflāmatio dominatur, maiorem panis copiam indendā esse: cum vero vlcus depascens maius periculum minatur, minorem panis portionem adhibendam.

Alia confectio.

Tenuissimam lentis farinam, & punicæ corticem tenuissimum oxymelite mediocriter decoquimus, & apponimus. acetum non ita multum esse debet. ita enim epithema fit, quod nō facile discinditur, facitque ad nomas & defluxiones.

x iij

L I B E R

Alius apparatus.

Lenticula incocta cum beta, vna læuigatur. valet hoc ad vlcera, quæ circa caput sunt: itémque ad serpentia vlcera, si cum defluxu inflammata fuerint.

De cataplasmate, ex eruo. Cap. 38.

Erui farina ex melle decocta ad carbones, ad crustas ex igni excitatas, facit, & vlcera, quæ depascuntur, repurgat. Eruum quoque per se, & tritum pari modo, quo lentes, mitius cataplasma conficit. si vero maceretur, & tenerum fiat vt læuigetur, facilius cataplasma compones. Præterea mitius quoque cataplasma ex eo ita parato conficietur, quod sit ad crustas abolendas, aut carbones, & depascentia vlcera purganda accommodatius. quod idem ad eorum inflammationes non erit inutile.

De cataplasmate, quod ex ciceribus fit. Cap. 39.

Quod fit ex ciceribus, id hydropibus, quos tympanias vocant, idoneum est. hæc autem eius est confectio. rutæ viridis folia læuigantur valde admodum: deinde subiguntur: tum melle decoquuntur. iis decoctis cicerum farina adiicitur.

De eo, quod ex palmulis constat. Cap. 40.

Palmulæ conculcate modico vino persperguntur, eisque pollen polentæ commiscetur. stomacho autem fastidio oppresso hoc imponitur. si vero huiusmodi palmulæ tibi non suppetant, aliæ pinguiore confrientur: vinoque macerentur adeo, donec humore vini perfruantur: tum contunduntur & læuigantur. additur postea pollen polentæ, itaque conficitur: atque ad eadem valet. quin etiam si inflammatio quædam simul hypochondria obsideat, hoc cataplasma ad eam multum facit. parum nanque mellis cum palmulis coquitur, ac de nique lini semen in leuorem, redactum ei adiicitur.

Aliud.

Palmulæ vino admiscuntur, & cum eis myrti folia tenuissime trita subiguntur. idque vlceribus iis, quæ per se in cute erumpunt, accommodatum est.

Aliud.

Ex papa-

Ex papaueris foliis tenerrimis succus exprimitur: in eo palmula conculcata diffunditur: fitque cataplasma oculis dolentibus aptum.

Aliud.

Palmulae in aqua diluuntur, & cum exiguo melle coquuntur: & rhus coriariorum aridum tenuissime tritum inspergitur, itemque lini semen laeuigatum. valet hoc ad tormina intestinorum, & vehementes sanguinis eruptiones potest sistere.

De cataplasmate, ex acherdis.

Cap. 41.

Oedemata laxa in articulis tum alibi, tum vel maxime in genibus nascuntur, eaque non admodum facile sedantur. fortis ergo prius locis muria, aut marina, cataplasma imponitur, quod ex agrestibus acherdis fit, fructu eorum simul contuso. est enim hoc cataplasma friabile: ideo pannis valde affigendum est, ut permaneat.

De cataplasmate, ex lolia.

Cap. 42.

Lolij furina ita parata, ut in caeteris supra diximus, satis facit hydropibus, calce tamen inspersa. siquidem haec euocat, ac digerit, & scirrhum minuit, siue is lienem, siue etiam iecur occupet. si vero quis continuo utatur, is etiam diuturna oedemata articulorum, & genuum curabit. Ceterum lolij farina sulfuri admixta tumoribus aurium laxis conuenit.

De cataplasmate, quod ex papauere fit.

Cap.

43.

Papaueris tenera folia laeuigantur: fitque cataplasma oculis inflammatis, dolentibusque accommodatum. idque sedi, & capitis doloribus prodest: & podagricos dolentes iuuat. Vitellus itidem ouis coctus simul laeuigatur, & ad eadem efficax redditur. Lini semini molito, aut pani, aut psyllio commista, & subacta faciunt cataplasma ad erysipelas praestantissimum. si quis eorum succum vitellis ouorum admiscere velit, aut pani, aut lini semini, aut psyllio, is optimum medicamentum ad eadem parabit. id etiam ita apparatus, somnium conciliat, si capiti admoveatur. si vero papaueris caput, quod liquidum sit, & probe coctum his, & quae ac folia, admisceatur, fiet cataplasma ad eam valens. Ut etiam si ex ipsis capitibus succus exprimi possit, isque perinde ut succus foliorum, indatur, ad eadem faciet. Ipsum quoque

papauer siccum parum vna cum semine decoctum, vt tenerū fiat, in mortario tūditur: vt in cataplasmatibus formā se induat. humor vero coquendus est, siue aqua, siue oleum sit. Facit ad eadem siue solum papauer superdetur, siue alicui prædictorum commistum. Humor quoque, in quo papauer decoctum fuerit, alicui eorum, quæ diximus, mistum eadem præstat. Caput vero siccum vna cum semine contusum, & concussum, si alicui eorum, quæ supra sunt allata, commisceatur, ad eadem valebit. sique adiungatur iis, quæ fluentem aluum cohibent, medicamenta reddet efficaciora. Fiunt, non secus quam ex foliis, cataplasmata quoque ex floribus papaueris, quæ ad eadem faciunt.

De cataplasmate ex bulbis.

Cap. 44.

Bulbi affati atque impositi crustas, quæ ex adurētibz ortæ sunt, facile amoliūtur. iidē ad carbones simili quoque modo faciūt, superdātur etiā bulbi vtiliter, maculis, lētiginibus, ephe- lidibus, & cæteris quæ in facie nascūtur. ferēda tamē molestia est, quā affert cataplasma. etenim colorē rubrū reddit, & ex- timā cutim excoriat: sed non multo post cutis renascitur, nec vlcus vllum fit, & macula euanescit. Facillime quispiam id su- stinebit, si postquam bulbos admouerit, faciem pane obdu- cat. cæterum panis rosaceo illinendus est.

De cataplasmate ex porris.

Cap. 45.

Vbi ex iis, quæ adurunt, crustæ concitatę sunt, ibi folia por- ri superdata facillime crustas auferunt. vehementer enim cōtū- duntur, & salis non multum eis admiscetur. atque hoc cata- plasma est remedium ad carbunculos efficacissimum.

De cataplasmate, quod ex lactuca conficitur.

Cap. 46.

Cum ex calore caput dolet, lactucæ folia cōtunduntur, & fronti admota valde iuuant. sit autem ad hoc faciendum la- ctuca eius generis, quæ liquorem candidum densūque emie- tat. atque hoc cataplasma somnum quoque inducit. si vero interim dum cōtūdatur, aceto respargatur, etiam erysipelati, quod vlceris expers sit, conueniet.

De cataplasmate, ex hyssopo, & pulegio.

Cap. 47.

Hyssopi herba sicca cōtunditur: & quatitur, vt tenuissima redda-

reddatur: coquiturque cum seminis lini farina: & cataplasma pectori accommodatum conficitur, valétque ad eos, qui propter lentorem sputa non facile educunt, & excreant. vtile quoque est ad scirrhum iecoris. Ex pulegio vero non secus fiet cataplasma: & ad eadem valebit. sed eo, quod ex hys sopo constat, hoc erit vtilius.

De cataplasmate, ex ocimo.

Cap. 48.

Cataplasma quod ex ocimo fit, aduersus ictum scorpionis valet. ipsum enim ocimū contunditur, nec aliud quicquā ei adiūgitur: nisi quispiā parum aceti velit eidem affundere.

De cataplasmate, ex menta.

Cap. 49.

Menta sicca contundenda est, donec tenuissima fiat: misceturque aut lini seminis, aut hordei farinae, aut pani alicui generis eiusdem. eique parum mellis accedit, vt hæc cohæreant. fitque medicamentum aduersus * helminthas molestiam afferentes. idem quoque conueniet tussibus, in quibus propter lentorem difficulter humores educantur.

De cataplasmate, quod ex ficu syluestri fit.

Cap. 50.

Ficus agrestis, quæ & trifolium, & asphaltium dicitur, sua perdata iis, quos scorpio vulnerauit, mirabiliter prodest: id quod ego quoque sum expertus. ea contundenda est, atque imponenda.

De cataplasmate, ex brassica.

Cap. 51.

Brassica contrusa pollini triticeo additur. si vero quis nō ipsam brassicam, sed succū pollini admisceat, is cataplasma conficiet, quod erysipelati, & strumis recentibus conueniet. eas enim graciles reddit, atque extenuat. mammis quoque ex partu succi plenis, & dolentibus, & timorem eruptionis incutientibus, vtiliter admouetur.

De cataplasmate, ex malua.

Cap. 52.

Malua decocta, siue cruda pani, aut pollini farinae miscetur, fitque cataplasma molestis inflammationibus aptū: easque interdum ad suppurationem perduxit.

De cataplasmate, ex beta.

Cap. 53.

Beta & cocta, & cruda ad ichores, & herpes, & lichenas,

L I B E R

& porrigines, si caput arefaciant, superdata mirum in modum accommodata est.

De cataplasmate, ex radícula.

Cap. 54.

Radiculæ ex modico sale contusæ, & admotæ, ad ecchymomata, hoc est, cum sanguis in loco contuso collectus est, faciunt. si ergo ex re aliqua extrinsecus incidente id eueniat, siue ex senectute in tibiis & suris oriatur, radiculæ ad pristinum statum colorem redigentes, medentur. si quis verò succum radicularum pani & modico salis admisceat, is etiã ad ecchymomata medicamentum vtile parabit.

De cataplasmate, ex psyllio.

Cap. 55.

Psyllij semen neque mola frangere, neque cõtundere possumus: sed aqua ei affundenda est, & manibus agitandum: siquidem ita & glutinosum, & emplastri instar efficietur. Facit hoc ad erysipelata: estque sæpius commutandum. Prodest idem ad strumarum inflammationes. nam vel statim eas sedat, aut quam maxime leuat.

FINIS NONI LIBRI.

ORIBASII MEDICI-

NALIVM COLLE-

CTORVM,

LIBER DECIMVS.

Ex Galeni commentariis, de facultate, atque vsu dulcium balneorum.

Cap. 1.



Balneorum, quæ ex aquis dulcibus calfactis sunt, facultas est, si temperatæ sint, humida & calida: si tepidiores, humida & frigida: si iusto calidiores fiât, calida quidem, sed non perinde humida: siquidem horrere corpora, contrahique eorû meatus cogunt: ita vt nec externo humore perfrui, nec excrementi, quod intus latet, emittere quicquã possint, enimuero quæ

tem-

temperatæ sunt, per se semper calefaciunt, & humectât. euenit tamen ex accidenti aliquo, vt aut per halitum humiditates digerant, vel corporis particulas fluxione superuacanea repleant, aut molliant, aut concoquant, aut vires firment, aut infirmant, ad quæ non parum quantitas aquæ confert. Totum autem balneum ex partibus inter se facultate differentibus constat: siquidem ingredientiæ in aëre calido versantur, postea in aquam calidam descendunt, mox ex hac egressi, in frigidam, postremo sudorem detergent. Potest autem prima eius pars totum corpus &que calfacere, materias fundere, inæqualitates æquare, cutim rarefacere, & multa, quæ sub hac ante detinebantur, euacuare. Secunda vero pars vbi quispiã in sicca affectione corporis ea vtitur, potest madorẽ vtilem solidis partibus indere. Tertia vero balneorum pars & totum corpus refrigerare, & cutem dẽsare, & vires firmare potest. quarta vero corpus per sudores citra noxam refrigerationis euacuare. Cum hæc igitur in homine facere possit dulcium aquarum temperatum balneum, & præter hæc etiam, si quis intempestiue lauatur, horrores, & cutis densitatem, danda nobis opera est, vt omnia deinceps distingamus. Multos enim eorum, qui cruditate laborant, plures vero corũ, in quibus mordentium excrementorum inest copia, omnes præterea, qui vel in febris significatione, vel in ascensu, vel in statu sunt, præter admodũ paucos, siue hi sint in balneũ ingressi, siue in calido sole sint morati, siue exercitationes, frictiones, gestationesq; tẽtauerint, merito cõtigit horrescere. hæc enim singula confertim & impetu agi excrementum cogit. Cum igitur eorum, qui lauantur, densa adhuc cutis sit, hæc excrementa detẽta, atque aceruata mordere necessario coguntur. qui vero opportune in balneũ fuerint ingressi, eos omnia prius memorata consequi necesse est. Ac vacuatio quidem excrementorum omni feбри est vtilissima: itẽmque rarefactio, & relaxatio. fusio tamen & calor non item: sed calor est omni feбри inimicus: at fundi æqualiter solidis quidem animalis partibus non est alienum: succis certe non est vtile perpetuo. sed quoties in animante vel inflammatio quæpiam, aut affectio inflammationi similis constitit, aut plenitudo est, tunc inimicissimũ est. inflammationes enim cum calefacti, & liquati succi ad ipsas confluunt, augentur. tunicę vero vasorum multitudinem, quę

ex fufione, fpiritu eft impleta, non continentes, diftenduntur: ac vires hoc ipfo male afficiuntur, ergo calidis his, ficciffis, que affectionibus effundi mordacia eft vtile. fufio enim eorum citra periculum eft. Atque hæc quidem ex prima balnei parte iis, qui ita laborant, prouenire, modo tempeftive balneo vtantur, memoria tenendum eft. ad fecundam eius partem modo trãfeundum. erat enim id, quod maxime proprie lauacrum nominatur, ergo in hac, ficut ex humectatione iuuantur, fic ex calore nihil eis cõmodi accedit. ergo ad tertiam accedamus, in qua & refrigerantur fine moleftia, quæ fuerat excalfacta, & vires roborantur, & quæ rarefacta, & plus iusto funt laxata, ea ad naturalem mediocritatem redeunt. id quod etiam quarta balnei pars indicat. quippe quibus omnia rite funt peracta, ij poft frigide vsum, adhuc fudant: & omnia ipsis excrementa vacuantur. Nullus æger cum lauatur, detergendus eft: nifi sordidus fit, & pruritu vexetur. nam qui lauantur, citra omnem laborem, lefionemque perfundi aqua debent, deterfio vero fit iis, quæ abftergendi, purgandique vim habent, quæ & mordacia, & exficcantia funt omnia. ex quo fit, vt ea tum viribus, tum vfui balneorum fit contraria vel maxime. Veruntamen fi laborans ad sordes, & ad pruritum deterfione indigeat, detergentis medicamenti vim largiore aqua admixta, & modico etiam oleo affufo, debemus exfoluere: & statim copiofam aquam calidam, puramque affundere. A Eger vero prorfus citra laffitudinem feruandus eft: ob eamque caufam labrum facilem ingreffum, & egreffum habeat, quod fane fiet, fi paries, qui aquam cõtinet, neque altus, neque anguftus fuerit. æger vero quiete lauatur. Facit enim quies egrotãtis, vt corpus tum laxius, tum mollius in balneo fiat, dum enim corpus mouetur, mufculi tenduntur: tenfi vero minus molliuntur, atque laxantur. Debet autem ea aqua parata effe, quæ fuper eum, qui lauatur, fundenda eft, poftquam eo lauacro, quod in labro eft, vfus fuerit: quod nunc quoque omnes medici facere folent, cum infirmum lauant. neque enim eum in frigidum folium ingredi finunt, fed aqua tepida perfundunt. alij tota labra huiusmodi aqua implent. etenim ficut relaxatum, rarefactumque eft corpus in calido lauacro, fic contra ipfum cogere fenfim, ac stringere volunt. hoc enim tum ad virium firmitatem confert, tum vero facit, vt homo non facile lædatur, fi
subita

subita in aëre ad frigidum fieret commutatio. quam ob rem qui sani sunt, in frigidam aquam se post calidum lauacrum, coniiciunt. at infirmi frigida contactum citra noxam non ferunt. ideoque frigiditate calida admista frangimus. mistionis porro quantitas inuenitur, primum quidem corporis affectione à nobis inspecta, deinde vero propria natura laborantis, itemque consuetudine, ætate, tempore, regione, & cœli constitutione denique, sane melius agunt ij, qui post lauacrum calidum non minus quam tres aquas tepidas inter se differentes parant: ut prima tepida abunde sit, secunda minus tepida quam prima, tertia magis adhuc ad frigidum vergat. quod faciunt, ut à calido ad frigidum paulatim accedatur: quando subitâ in contrarium mutationem ferre laborans non potest. Quidam etiam medici post lauacrum laborantes inuoluunt, alij vestimentis, & præsertim non puris, eosque ex omni parte constipant, quo plurimum sudent. & tamen non semper opus est laborantem post balneum sudare plurimum. sæpe enim non euacuandi corporis causa ad balneum accedimus, sed contra prorsus, ut humectemus, idque omnino irrigemus, quod immoderatus erat exsiccatus. in hisce igitur non admodum multos sudores intus in balneo expectare debemus, sed statim in aquam, quæ in labro est, coniiciendi sunt. mox à balneo egressi, abstergerendi: nec valde siccum corpus ungendum. Necesse autem est consideremus, utrum postquam sudauerit is qui lauatur, oleum ei perfundendum sit, an antequam sudauerit, sed cum primum se exuerit: an vero neutrum horum, sed cum madescere inceperit. atque is, qui in memoria habeat ea, quæ de olei facultate diximus, nouit optimum ad olei usum in iis qui lauantur, esse id, quod tertium statuimus. illud etiam didicit, oleum ante calfactum corpori eius qui lauatur, adhibendum esse: siquidem tale mollit corpus, & rarefacit. cum frigidum suo contactu non modo horum neutrum facere queat, sed etiam eis, qui lauantur, horrorem incutiat. Postquam autem cibum, potumque sumpserint, lauandi statim non sunt. nam eorum qui biberunt, caput repletur: eorum vero qui comederunt, non solum caput, sed corpus etiam vniuersum: quippe quod cibum ad se, priusquam sit concoctus, attrahat. præstat ergo post balneum, sedata ea turbatione, quâ balneum attulit, esse & bibere.

L I B E R

quemadmodum fit etiam in exercitationibus, ut turbatione sedata corpus alamus. nam si post exercitationem potum, pastumque protinus offeras, cum implebitur caput, tum vero id, quod deglutitum fuerit, interdum supernabit. Cæterum scire conuenit, quibus plura per aluum secedunt, balneum sistere, eadem in corpus vniuersum reuellendo, atque ea ratione nocere, qui vero nihil prorsus deiecerunt, iis satius esse, stercus antiquum vacuasse, neminem præterit: sicut etiam eos, quorum vires resolutæ sunt, à balneo magis resoluui. Iam nec fastidiosos, nec vomitui obnoxios par est lauare. nam ne hi quoque repente resoluantur, est metus, ita ut syncopa, quæ stomachica dicitur, consequatur. proxime ad hos accedunt, qui os ventriculi bili affectum habent: quos ex eructatione biliosa cognoscimus. simili quoque modo lauare non conuenit eos, quibus sanguis è naribus abunde prorumpit. sanguis enim immoderatissime erumpet. consentaneum igitur est, si sanguis minus quam par sit, erumpat, ut lauentur. hi etiam sunt, qui & largo lauacro, & motu vehementiore propter sanguinem, qui in capite est, indigent. simili quoque modo lauamus, si iis quibus sanguinis eruptione opus est, sanguis non erumpat. Concoctis autem iam affectionibus, balneum citra periculum adhibetur: cum etiã ad expurgationem sputorum, quæ pleuriticorum, & peripneumonicorum thorace & pulmone continentur, maxime conferat. in iis ergo, qui sic affecti sunt, cum indicatio itidè, quæ à consuetudine sumitur, accesserit, balneum iterare nihil prohibuerit. Omnino vero scire oportet, nisi prius vacuato corpori balneum adhibeatur, partes affectas fluxione tentari. vacuato vero si offeratur, adiuuari concoctionem.

Ex libris Antylli, de balneis industria paratis, ex primo libro de remediis.

Cap. 2.

Lauacra partim ex aquis dulcibus, & qualitatibus expertibus constant, partim vero ex iis, quæ & qualitate sunt præditæ, & vim habent vehementem, atque conspicuã, eaque in quibus inest qualitas, partim industria parata sunt, partim per se ita nascuntur. porro eorum quæ ex industria fiunt, alia calfaciendi, alia digerendi, alia humectandi, alia refrigerandi, alia adstringendi causa parantur. ac calidus quidem utimur, cum

cum aut refrigeratos calfacere, aut lassitudinem soluere, aut conuulsiones, aut dolores mitigare nobis propositum est. sane his etiam utimur, refectionis causa: cum alimentum non facile distribuitur. Calidas autem aquas reddimus, cum pulgium, aut origanum, aut hyssopum, aut thymum, aut satuream, aut lauri folia, & chamæpityos ramulos, & panacis ac pyrethri radices, & cächri, & alia generis eiusdem incoquimus. oleum quoque in aquam coniicimus. Lauacra autem digerentia faciemus, cum totum corpus, quod prepingue sit, volumus extenuare, aut tumefactum totum corpus, vel membrum aliquod contrahere, idque siue propter inflammationem, siue ob aliam affectionem fluxione laboret. Fiunt autem digerentia cum vel salem iniicimus, vel ipsa marina aqua utimur, aut nitrum admiscemus. Iam mel quoque admixtum digerendi vim aquæ indit: itemque vua taminia incocta: & cinis sarmentorum, & sulfur ignem non expertum, aut baccharum iuniperi, aut mercurialis decoctum. Molliendi vero causa balneis utimur in corporibus, quæ vel inflammatione laborant, vel indurata sunt, atque ad inflammationes blanda esse debent & mollia: at in iis, quæ obduruerunt, si inflammationis sint expertia, potentia & efficacia. quocirca in iis qui inflammatione laborant, maluæ & lini seminis, & fœnigræci decoctum miscemus. in fluxione vexatis inflammationibus, plantaginem, aut herbam sanguinalem, aut malicorium, aut rosas, aut rubi cimas incoquimus. In iis vero quæ conuulsionem minantur, iisdem utimur, quæ adhibemus etiam iis, quæ sunt fluxionis expertes. præter cætera vero hydrelæum, in quo malua, aut fœnumgræcum incoctum sit, iuuat. In durtia autem citra inflammationem balneis eiusdem qualitatis utendum est, quibus ad eos, qui digestionis indigebant, utebamur. Cæterum refrigerant & adstringunt balnea, quæ simili modo parata sunt, quo adstringentes, refrigerantésque madefactiones. quarum sylua potest in hunc transferri locum.

De balneis sponte nascentibus, ex eodem libro.

Cap. 3.

Balneorum sponte nascentium multo maior & efficacior vis est, quam eorum, quæ arte parantur. multæ autem eorum differentia sunt propter terræ, per quam feruntur, qualitatem.

y

alia enim nitri, alia salis, alia aluminis, alia sulfuris, alia bituminis, alia eris, alia ferri vim obtinent, alia composita sunt ex multis harum qualitarum simul coniunctarum. Vis autem omnium aquarum sponte nascentium est exsicicans & calfaciens prorsus, cum valde intensæ sint, quocirca acutis morbis minime conueniunt, sed potius diuturnis, & præcipue humidis, & frigidis. Quæ autem nitri, aut salis facultate præditæ sunt, accommodatæ sunt capiti, & thoraci fluxione male habito, & ventriculo perhumido, & iis, qui aqua inter cutem laborant, & œdematis, quæ ex morbis, vel ex pituitæ concretionibus oriuntur, quæ alumen referunt, ad fluxum sanguinis, ad vomitus procliuatatem, ad immoderatas hemorrhoidum perturbationes, ad inordinatas mulierum purgationes, & continuos abortus adhibentur. In quibus vero vis inest sulfuris, neruos molliunt, concretiones calfaciunt, dolores leniunt, stomachum imbecillum reddunt, atque subuertunt. Quæ bitumen sapiunt, caput replent, ac sensuum instrumenta vitiant, & enixe calefaciunt, & temporis progressu molliunt: quod facere præsertim in vulua, vesica, & colo intestino consueuerunt. Quæ vero æris naturam referunt, ori, tonsillis, vuæ, & oculis mirum in modum apta sunt. In quibus ferri qualitas reperitur, stomacho & lieni male affectis possunt subuenire: quæ vero ex mixtis qualitatibus constant, eæ faciunt pro ratione eius qualitatibus, quæ in eis excellit. His autem aquis sponte nascentibus vti debemus firmis & quietis. vapor enim ab ipsis commotis emergens, cum grauis sit, & feriens, capiti molestus est. quam ob rem in aquam ingrediendum est sensim, ut vis corpori laxato accedens imprimatur. eorum vero, qui cum tumultu & impetu sese in aquas iniiciunt, corpus densatum, qualitatem aquæ non recipit. ita fit, ut in huiusmodi neque natari, neque immergi commodum sit. Vti autem ductibus aquarum sponte scaturientium eos solos oportet, quibus qualitates illarum capiti sunt congruæ: liquidem qui se exhibent aquis, quæ à ductibus bituminosis, & sulfureis fluunt, quam facillime læduntur.

Herodoti, de lauacro, ex libro de præsidiis extrinsecus occurrentibus.

Cap. 4.

Si calidiore interno aëre indigemus, ad hoc auxilij genus accedendum est. Vrna aquæ frigide instillanda ignitæ materię

teriz est. calor enim qui inde emanat, non multo tempore perdurat: sed cito restinguitur. quocirca id paulo ante introitum aggrediendum est.

Herodoti, de aquis sponte nascentibus, ex eodem libro.

Cap. 5.

Facultas singularum aquarum sponte nascentium, quæ magnam habent differentiam, assumenda est ex iis, quæ experientia comprobantur. exquisitam enim omnium singillatim notitiam tradere non possumus, tum quia nos omnibus vñ non sumus, tum vero, quia ne in omnibus quidem est cognitio, quæ facultatibus medicamentorum proportionem respondeat. nam frigida aquæ, quæ sponte nascuntur, accommodatæ sunt omnibus fluxionibus, vesicæ affectionibus, capitis doloribus, & vlceribus malignis. De iis vero, quæ potantur, siue calidæ, siue frigida sint, cum vniuersalem quandam constitutionem non recipiant, in particularibus dicetur. In omnibus autem sit quædam temporis apta mensura. nam si vsurus sit quispiam his aquis per tres hebdomadas, ita exordietur, vt incipiat à dimidia hora, deinde paulatim progrediatur, vt per hebdomada spatium duarum horarum perficiatur. hoc interuallo ad secundam vsque hebdomadam perseuerando, ab ea tantundem auferendum, & in prima mensura desinendum, & ita vicissim subtrahendum. In aquis enim statim à principio diu immorari non est vtile, neque etiam est frugiferum, ad finem vsque permanere eodem temporis spatio. propterea quod confert & incipere, & desinere ab hoc præsidio conuenienter rationi: quo etiam modo exercitationibus vtitur & abstineamus. si vero mensura, quam prius fueramus coniectati, vtilitatem non afferat, aquis per interualla erit vtendum. In exacerbationibus autem accurate omnis hæc faciêda est præparatio. nam qui plurimas partes dolent, hi accedentes toti introeant: si vero aliquas laborantes habeant, madesiant. labore sedato, eos deducemus. deinde cum rursus accessio redierit, vt in aquam descendant, imperabimus, aquis vtentes non secus, quam fomentis, & cataplasmatibus extrinsecus adhibitis. quocirca quantum his aquis vti debeamus, ipsa necessitas commonebit. Noui ego quosdam, cum per totum diem hoc genere curationis vterentur, mirum in modum adiu-

y ij

L I B E R

ros fuisse. nam exacerbatio, quæ prius longa, & ad soluendū difficilis erat facta, cessauit: qua ex re affectioni quoque cōmodum accessit. si vero affectæ partes possint ceteris tectis maderieri, non erit incommodum diutius, & sæpe per diem aquis uti. quod tamen ante cibum faciendū est. inutile enim est, materia noua plenos, aquas etiam sumere, quæ tantopere commouere queant. si vires eos deficient, parum cibi eis offeratur. Cum vero plurimæ ex iis aquis in locis palustribus & æstuosis oriantur, & propterea morbosæ sint, eis opportune vteris vere, & autumno: quatenus hyeme * adurunt. atque illud quidem tempus aquarū vires firmat. si vero in salutaribus locis sint, erunt etiam æstate assumendæ, si frigidæ fuerint. Quoniam autem nonnulli ignari putant calidas aquas conducere ad tuendam sanitatem, & ob eam causam eis impudenter, & nulla habita ratione constitutionis temporis vtuntur, idque cum damno, vt est etiam verissimile: æquum esset, eos ex hac falsa opinione decedere. his autem aquis, si adessent, vterentur etiam communium balnearum loco.

Ex Galeno, de frigidi lauacri vsu.

Cap. 6.

Quemadmodum quispiam frigida lauari primum incipiat, nec vllam ex repentina mutatione noxam sentiat, id vtique ad omnia sciendum est. multi enim cum male inceperint, adeo in frigidam lauationem male fuerunt affecti, vt nec iis, qui tuto eam administrarent, se vnquā permitterent. Esto igitur anni tempus æstatis initium: vt ante hyemem in spatio interposito consuetudo notabilis pariatur. esto præterea dies, in quo auspicabimur, quam maxime tranquillus, & quod id tempus feret, calidissimus: cāq; diei pars calidissima: & gymnasterium temperatum. hæc quæ est externa præparatio. Corpus vero eius, qui frigida lauāus est, sic parabitur. ætas illi esto quarti maxime septenarij mediū, nulla nec eo die, nec præcedenti nocte, noua re alterato. esto autem iuuenis qui frigida vtetur, animo præsentī, & plane hilari. ac primum linteis vberius fricetur, quam prius. subito autem frictiones eo tempore vehementiores, quam ante: atque etiam linteis durioribus administratæ. dehinc, oleo, vt assuevit, fricetur. inde exerceatur: exercitationibus multitudine quidem paribus, sed citatioribus quā prius. ab his in

in frigidam descendat, non tamen cunctanter, sed celeriter, vel etiā semel totus infiliat, nam si sensim aque accedat, horror concitabitur, esto vero & aqua ipsa nec tepida, nec plane cruda, & glacialis, altera nanque non agit, percussu caloris: altera vero ferit insuetos, atque refrigerat: siquidē progressu temporis tali quoque aqua iuuenis aliquando vtetur. Vbi ex aqua egressus sit, fricari oleo, idque à pluribus, expedit, quoad cutis incalescat. post hęc cibum vberiore, quam consuevit, potionem infra consuetudinem capiat. quæ ipsemet vel iniussus faciet, modo omnia rite sint peracta, nam à frigida lauatione, & plus appetunt, & melius concoquunt, ac minus sitiunt: veniuntque postridie ad exercitationes habitu corporis plane meliore, mole quidem pari ei, quæ ante erat, cæterū compacta, & musculosiore, & vegetiore. in hoc igitur omnia ad eundem modum secundo die faciēda sunt, itēque tertio, & quarto, postea vero procedente tempore simili modo frigidam iterum ingredi mandabimus. verū tertio eam ingredi, quod quidam iusserunt, non laudo. nam & iterum id fecisse, mihi satis esse videtur, cum præsertim iubere possimus, vt homo tandiu in ea immoretur, quandiu nobis lubeat. scopus autem temporis, quo sit immorādum, à quotidianā ipsius experientia percipitur. nā si egressus frigidam, coloratus ex frictionibus cito redditur, moderate immoratum indicat: sin & ægrius incalescat, & decolor diutius permaneat, immoderatus in frigida moratum docet. ex his signis cognosces, utrū satis moratus sit, an potius ad minus, aut maius aliquid sit immutandum.

Ex Agathino, de calida, & frigida lauatione.

Cap.

7.

Quam naturam habeat tum calida, tum frigida lautio, considerandum est nobis. optimum autem mihi videtur, la- uacra calida non esse prorsus reiicienda: rarius tamen adhi- benda. iis igitur, tanquam opportunum quid habentibus, vt- tendum quandoque est. nam & lassitudines sedant: & secor- diam, quam cruditates afferunt, ipsa eximunt, ac præsertim, si quis in balneo aquam calidam potauerit, succosque ex ali- mento corrupto aceruatos euomuerit. calidum quoque la- uacrum mollit corpus, quod præter rationē quandoque col- ligatū, constrictūque sit. Conuenit etiā iis qui non ita præ-

y iij

senti animo ad frigidam lauationem sunt affecti, & ad vñ-
ctionem prompti non sunt. Modus * apotheraþiæ est ali-
mentum, & balneum: quod incommodum est, si assidue: non
incommodum vero, si tempestiue administretur. * Qui au-
tem hunc breuem vitæ cursum sani cupiunt transigere, frigi-
da lauari sæpe debent. vix enim verbis exequi possum, quã-
tum utilitatis ex frigida lauatione percipiatur. quod in cau-
sa est, vt qui frigida lauantur, etiam si senio propemodum
confecti sint, corpore tamen constanti, & compacto, & co-
lore florido comperias: & omnino, qui multum virilitatis &
tenoris præ se ferant. quinetiam quæ ad appetitiones, con-
coctionesque pertinent, firma, sensusque plerumque integros
& exquisitos, & vno verbo, naturales actiones rite consti-
tutas habent. qui vero calida lauantur, carnes flaccidas, flui-
dasque solent habere, & colorem auersum: & tenore viden-
tur enervati esse, malèque cibum appetere, atque omnia ha-
bere cæteris deteriora. quid enim re vera mediocre faciat
tã assidua in aëre feruenti, & perhumido elixatio? Equidẽ in
inore positũ barbarorũ audiui, vt infantes in frigidã assidue
dimittant: nos vero calidis lauationibus continuis elixa-
mus, à nutricibus persuasi, quæ tum demũ gaudent, cum post
laborem in balneo perceptum infantibus sopor irrepit: quæ
quidem satis ipsis esse existimant, si infantes non magnope-
re noctu vexentur: aiuntque eos somno vix capi, qui nõ fue-
rint ferme à copia lauationis calidæ soporati. quam ob rem
ego filiolum meum, & pleròsque cæterorũ, vñctionibus so-
lum perfundo: resque mihi successit ex sententia. at pueruli
ab aliis educati, qui assidue lauantur, plurimũque elixan-
tur, non mirũ est, si epilepticis conuulsionibus capiantur, &
ab eo morbo difficulter liberentur. Nulli igitur puerulo, qui
infantum etatem excesserit, frigidam lauationem esse incon-
gruam censeo: modo ne propria quædam natura huic & a-
liis vtilibus rebus obsistat. multa enim huiusmodi sunt me-
morie prodita. Frigidæ autem lauationis initium in iis, qui
ei assueti non sunt, multi sumendum esse existimant, cum
æstas in summo statu est. ego tamen quamplurimos vidi, qui
quocumque anni tempore eam auspicati, innoxie id fecerũt.
ex quo fit, vt omni tẽpore citra noxã possit principiũ frigi-
dæ lauationis sumi. sed si qua inesse varietas debet, ego ver-
num tempus cæteris anteponerem. Cæterum cum ad frigidã
laua-

lauationem
cum in
se debet
rem nos
debemus
grediend
uonum
que per d
supra me
vero ad
ipsa cor
sed præ
tam expe
ambulat
citatum,
nec prius
tardius. v
dus autem
perfrato.
beret, co
tione, p
stea dim
ad multi
rubetier
manica
li frictio
nationes
tum ab a
terquam
dit, nulla
post hanc
moderata
ab aum
atque
si quis
tus sit
erit ex
presti
liis v
tamen

lauationem accedimus, cum semper alias, tum vel maxime, cum incipimus, optime distributum id quod in nobis est, esse debet, & nos leues esse atque expeditos par est. semper autem nosmetipsos exercitationibus eo usque dimouere prius debemus, donec propensione & alacritate in frigidam ingrediendi capiamur. etenim vehementia, & multitudine motionum prius corpusculum defatigare, & ad lassitudinem usque perducere, cum alioqui absurdum sit, (nihil enim, in quo supra modum studium nostrum ponamus, salutare est) tum vero ad frigidam lauationem est ineptissimum: siquidem & ipsa corpora colligat, & vehementiores lassitudines affert. sed præstat, opinor, vtendi rationem sumpto altius initio, totam exponere. Postquam igitur negociis familiaribus, aut ambulationibus, aut gestationibus corpus fuerit antea concitatum, tunc ad frigidæ lauationis usum debet accedere: nec prius, quam sit hora prandij consueta, nec sane multo tardius. vtrunque enim hoc tempus est reiiciendum. Nudandus autem, si tempus permiserit, in sole est, loco à ventis non perflato. Sæpe etiam si, dum exuuntur, rigor eos infestos haberet, corpus iterum vestimentis tectum intentiore ambulatione, poplitibus vehementius tensis, vel etiam cursu postea dimouendum est. ad hæc autem linteis asperis valide ad multam usque contretationem tum per se, tum per alios rubescere debet. optimum quoque fuerit, si ministri ad hoc manicas ex linteis consutas habuerint. alioqui autem inæquali frictione adhibita, complicatis nimirum linteis, cutis excoitationes quandoque consequuntur. postea vero manibus tum ab aliis, tum ipse per se sicce fricandus est. quæ res præterquam quod fouet, tenorem etiã admirabilem corpori inducit, nulla igitur alia re têtata, potest, quatenus alacritas fert, post hanc siccam frictionem frigida lauari. Vngi ergo oleo moderate debet, & fricari multũ, ac præcipue à se, tum etiam ab aliis. nihil enim est quod tã lassitudine, doloréque vacet, atque efficax sit, quã frictio, quam quis sibi ipse administrat. si quis igitur ea pròptitudine ad frigidã lauationem contentus sit, donec spiritulus creber fiat, aliis exercitationibus non erit opus. sed tamen id difficulter omnes consequimur, cum præstantissima quid satietatis res adiunctum habeat, ergo aliis vnique consuetis exercitationibus vtendum est, intra tamen lassitudinem, vt dixi, laborando. nec omnino ex-

y iiii

pectandum quousque in molem extollatur, quod plurimis mos est, sed donec corpusculum fuerit calefactum, & ad frigidā lauationem abunde præparatum. Exercitationibus autem finitis, tunc se ipsos omnino, nisi etiā prius, fricare debent spiritum continendo: aliquando etiam corpore pulvere prius consperso, si madore humescat: atque ita sine ulla mora, & subito, in frigidam descendere: vel subito aqua circumfundantur. aqua autem, si nobis optio detur, nec glacialis, nec remissa omnino frigiditate eligenda est: siquidem hæc magis nocet, quā quæ in altera parte excedit. Aquarum autem ad frigidam lauationem, præsertimque cum primum quis incipit, est marina: quippe quæ frigoris satis habeat, & morsus, qui ex salsedine prouenit, corpus facile percalefacit. qualis autem cūque ea fuerit, pura esto, & perlucida, nec palustris, nec cœnosa, nec alioqui reses. cæterum anteponendum est, si liceat, in aquam descendere, quam circumfundi. sed primo quoque ingressu parum fricandum corpus est, postea ingrediendum: ac sese violenter fricare debet: rursusque descendendum: ac tunc perseuerare natando, aut alio quouis modo, ut diutius ibi cōmoretur: ita tamen, ut rursus & ad oleum, & ad frictionē præsto sit. deinde cum tertio descenderint, & non diutius sint immorati, debent caput, & quæ ad stomachum attinent, aquæ ductibus subiicere: sin minus, pluribus hydriis perfundi: & ita moderate fricandi. quo tempore non dissoluimus oleo eam firmitatem, quæ corpori prius aduenit. Post hæc vero strigilibus non admodū obtrusis diutius corpusculū detergemus, & ad ruborem perducimus. nā & roboratur, & superficies æqualis redditur. si vero etiam in eos qui cibum sumpserunt, incidamus, non omnino à frigida lauatione abstinēbimus: quoniam vehemēter appetimus, & quia motiones quædā ad id nos impellant: vel quia æstus ipse quodāmodo simul elixauerit, nescio enim an quicquam hoc præstantius faciat is, qui exurit, & continenter sudoribus perfunditur. equidem sæpenumero à cœna, cum ægre in somnum propter æstum delabor, in frigidam descendere consueui: & mirabile est, quam iucundam noctem transigam. in ysu tamen frigida, habenda ratio est aurium, ne frigida in eas clam influat. cum enim frigida lautio ad omnia sit multo, quā cæteræ diætæ, utilior, quomodo meatus auditui deferuientes tantum cum noxa contingat, certe nescio.

De

De siccatione per arenam, Herodoti ex libro de remediis
extrinsecus occurrentibus. Cap. 8.

Fomentum quod ex arena adhibetur, accommodatum est
asthmaticis, iis quorum pectus defluxione laborat, cœliacis,
podagricis, iis qui per extensionem resoluuntur, iis qui malo
sunt corporis habitu, hydropicis, & denique omnibus, quos
diuturnus morbus vexat. omnesque, præter infantes, ad hu-
iusce fomēti usum ferme apti sunt. tempus ad hoc idoneum
est æstas, in qua etiam dies ardentissimi sunt eligendi. In or-
tu autem solis, in littore, in arena profunda duæ foueæ aut
tres paris magnitudinis ei, qui usurus sit, parandæ sunt, vt à
sole caleant. ægrotus vero cibos optime confecerit: prius-
que inambulet, & gestetur. cūque aër sit factus calidior, a-
renæque satis feruens fuerit reddita, in fouea recumbens, in
arena quæ circum sit, maneat, vt ratio postulat, conuolutus,
vsquedum facile ferat. caput vero debet contegere, & solis
radios declinare, semperque ante oculos operimentum ali-
quod habere. figura vero, in qua exardescat, esto in primis
diei partibus eiusmodi, vt meridiem, in mediis, vt Boream
spectet. spongia quoque aqua frigida imbuta faciei applice-
tur. iis vero, qui nimium patiuntur, collutio itidem offertur.
si vero necdum calfactam, aut refrigeratam carnem propter
vim sudoris erumpentis senserint, id significare debebunt:
iisque qui adstant, arenam propellent, eosque educent, & in
alia fouea propinqua collocabunt, in qua, vt dictum est, oc-
cultabuntur. id tertio quoque loco erit faciendum, si opus
esse videatur. qua in re spectandus morbus est, itēque vi-
res egrotantis. temporis vero additio ex iis pendet, quæ sunt
dicta prius. Iam vero recumbentes occultabimus ac conte-
gemus asthmaticos, & quorum pectus & costas defluxio ve-
xat, itēque stomachicos, & qui malo habitu corporis sunt,
& qui aqua inter cutem laborant: sedentes vero eos hydro-
picos, quos ascitas nominamus: sique opus sit, etiam tympa-
nitas, ex aliis vero morbis, colicos quoque, & hepaticos, &
spleneticos, & ischiadicos, & podagricos, & quorum resolu-
ti sunt pedes, aut crura: ad finē vero hi omnes sunt toti con-
tegendi. quippe cum relaxatio rite toti corpori adhibetur, &
utilitas partes etiā morbo vacantes debet peruadere, & præ-
sertim si frigida lauatione sint usuri. circa foueas paratæ sint

scenæ ex perlucidis cornibus confectæ. itémque vrne aque dulcis, & folia aquæ maris, in quæ sedatis sudoribus ingrediendum est: tum exeuntes perfundendi, & oleo confricandi. si vero dies tranquillus, corporaque robusta fuerint, natatione etiam vtantur. à quibus abducti, abunde quiescant. sed hydropici quinque aut sex aquæ calidæ cyathos prius epotos, effundere cogendi sunt: cæteris mos suus est seruandus. alendi autem sunt ij, vt propter mala quæ in sole sunt passi. potus augeatur. numerus dierum in morbis intermittentibus non sit minor, quam quatuordecim, nec vnum & vigesimum diem excedat. at in hydropicis numerus dierum est ad rationem inanitionis ipsorum molis referendus, & subducendus. cùmque utilitas post vigesimū primum diem statum nanciscatur, biduum aut triduum intermittere cōuenit: tum redire ad vsum. si vero hyberno tempore hydropem cures, cæteraquæ medicinæ præsidia non iuuent, egérque expectare tempus opportunum non queat, resque vrgeat, vt arena administretur, neque vt ea utilitas, quam tempus accommodatum affert, * expectare liceat, tum in maritimo loco instituenda arena est: & cum æger in somnis horret, ea totus obducendus est, vt diximus: & cætera, quæ admonuimus, facienda: prosperumque successum, qui inde futurus est, diuturnum fore sperandum est.

De insolatione, ex eodem libro Cap. 9.

Insolationes maxime necessariæ sunt iis, qui refectionis & carnis accessionis egent. sol tamē nubilus est vitandus: isque qui sæpe in tranquillis regionibus obscuratur. studendum ergo est, vt hyeme, vere, & autumno intempestiuam insolationem vitemus. estate autem propter nimium calorem debilibus cauenda est. soli vero atque igni præter cætera dorsum admouere conuenit. nerui enim qui voluntatis sunt, in eopotissimum sunt siti: quibus calescentibus totum corpus valentius redditur. caput vero aliquo operimento contegatur.

De utilitate, quæ ex igni, & carbonibus affertur, ex eodem libro. Cap. 10.

Fomentum, quod fit ex carbonibus, adhibendum est in balnei loco, qui yngendis hominibus sit dicatus, iis qui diuturnis doloribus teneantur. partes autem corporis torreantur,

tur, donec difficulter ferre queant. Carbones sunt ex balneis sumpti, aut prius madescant. Cæterum torrerem ad muros ignitos, eandem affert utilitatem, si que placide sint calidi, eis particulæ dolentes admoueantur: si nimis calidi sint, affectæ partes crudis lineis pannis sepietur: atque ita parietibus adhærebunt.

De adustione, ex eodem.

Cap. 11.

Adustionibus utimur tum per cauteria, tum per radices, tum per medicamenta. præstantissimæ sunt quæ cauteriis administrantur: si qui sint, qui chirurgiam reformident. secundum locum tenent, quas medicamenta excitât. quæ vero per multos dies adurant, iis cicatrix non obducitur.

Ex Antyllo, de dropace, ex primo libro, qui est de remediis extrinsecus occurrentibus.

Cap. 12.

Dropax ut malagma paratur, vsûmque cataplasmatibus præbet. conuenit is morbis diuturnis, quibus etiam sinapismus est idoneus. & cum quis sinapismo uti velit, prius dropacem adhibet, ut corpus ad sinapi præparet. & post sinapismum quoque adhibetur, ut reliquæ morbi euellantur. Cæterum dropax, si calfacere præter modum oporteat, accipere debet pyrethrum, cachri, & bitumen. si opus siccatione sit, sulphur ignem non expertum, salem, cinerem sarmentorum. si scari- ficare, limnesium, & euphorbium. Ungere vero locum oportet dropace prius calfacto, eaque crassitudine id efficere, quâ vires egrotantis ferre queant. atque in iis, qui sunt imbecilliores, partes pilosæ prius abradendæ sunt: in robustioribus vero, & efficaciore dropace indigentibus, non abradendæ: nisi forte capiti, aut mento, aut pubi applicandus esset.

Antylli, de sinapismo, ex eodem libro.

Cap. 13.

Cataplasma, quod ex sinapi conficitur, efficacius est: quod in acutis morbis non admodum probatur. in segnioribus nanque naturis solum, stupidisque, in acutis morbis, sinapi utimur, ad diuturnas vero ægritudines ferme omnes, ubi aliorum remedium vim imbecillioris & minorem morbo cognouerimus, efficacissimus sinapismus est. sed tamen in tabidis, & colliuatione laborantibus ex ulcere, quod iecur obfideat, sinapismum non admittimus: neque etiam in vlla alia

L I B E R

ulceratione, quæ intimas partes vexet: si quidem exacuuntur, & efferæ à sinapis acrimonia redduntur. quinetiam in cartilagineis partibus cauendus eius est vsus, vt in auribus, & fummis naribus quippe quæ exurantur, & quandoque etiâ quæ carnis expertia sunt, & cartilaginea nigrescant. cæteræ vero omnes corporis partes, & morbi diuturni hoc remedio perfruuntur. Penis autem & vesicæ resolutiones hoc auxilio gaudent. itémque partes omnes resolutæ. in rectum quoque intestinum resolutum glans inditur. In iis vero qui difficulter audiunt, collyriū linimento impactū auribus imponitur: tum vbi sensum collyrij pars quodammodo perceperit, collyrio per linamentum exacto, pars melicrato abluitur. sinapis autem segnioribus partibus, iis que quæ carnosæ sunt & vi adhibita difficulter sentiunt. terminus autem actionis medicamenti esto, vt ægrotus vehementer doleat, caro que nigrior reddatur, & fiat alrior, quam quæ adiacet: & postquā ablotum fuerit, pustulæ leniter erumpant. ad morbos autem, & partes facile sentientes, mitius vtendum sinapi est, vt eo vtamur donec caro fiat paulo rubicundior. ne tamen mitis ille vsus vanus sit, alio die, aut duobus sæpe erit sinapismo vtendum: vt cōtinuus vsus, vnius robusti sinapismi vim præbeat: cuius sane continui vsus mensura est, cum partes sinapismo obductæ atque illitæ nullum doloris sensum habeant. In acutis vero morbis raro adhibemus hoc remedij genus: eo que solum in lethargicis, & cæteris nimis in somnum propensionibus, quæ in febribus contingunt, & catocha, & perfrictione quæ ægre calefiat. eorum tamen qui in somnum sunt nimis propensi, crura sinapismo obducimus: in perfrigentibus vero & crura, & cubitos. cæterum sinapi tenue cæteris omnibus linteo exceptis inspergatur.

Sinapismi confectio.

Sinapismi conficiendi modus est huiusmodi. Caricæ in aqua tepida pridie macerare oportet: postridie vero eius diei vehementer expressas valde contundere: deinde acre sinapi, quale est Syriacum, & Aegyptiacum, capere, ac per se conterere, aquam, in qua caricæ maderint, paulatim affundendo. nam humore persusum melius læuigatur. tum in massas læues redigito, alteram ex caricis, ex sinapi alteram. Fiet autem sinapismus

napismus vehemens, si duas partes sinapi vni caricarum parti addemus: mediocris vero ex paribus vtriusque portionibus constabit: sin mitior exigatur, tertiam partem sinapi, duas caricarum commiscebimus. Linteo vero aut panno illitus adhibetur. locus vero, cui admouendus sinapisinus est, prius nitro illinatur, & omnino inuētus esto: eiūque ita cataplasma adhibeatur: & supra ligetur. Utendum vero sinapismo in sole, aut aprica domo, & potius ante balneum. certum tamē temporis spatiū, quo teneatur, definiri nō potest: propterea quod alij citius, alij serius eius sensum percipiant. ergo saepe intueri locum oportet, vtrum satis ruboris contraxerit. si vero longo spatio admotum sinapi non agat, spongiis aqua calida imbutis, & panno in quo cataplasma est, apposisis, fouendus est: posteaquam vero sinapismo vsi abūde fuerimus, æger in balneum ducetur, & vt modice laxetur, totus perfundendus est: ac potius etiā partes, quibus sinapismus fuerit admotus: eaque non vngantur. sique ferre possē æger videatur, sustinere debet, & iterum balneum ingredi, & perfundi, ac ne tum quidem vngi. nonnullos etiam vsque in sequentem diem non vinctos seruantes lauamus. post balneum vero vltimum partes rosaceo illinimus. si vehemēs sit dolor, & pustulæ eruperint: partes erūt lana aqua & rosaceo intincta obducēdę: aut etiā amygdalino cum aqua. melius autē est, vt aqua sit maluæ succus. in iis vero, quos vehemens dolor vexat, locus malua probe decocta vel per se, vel cum pane oblinēdus. vbi dolor cessarit, cerato rosaceo cū cerussa vtemur. Lethargici vero & qui acutis morbis detinentur, lauandi sunt. ceterum quibus si napismus adhibetur, oleo perfundimus, & idē facimus in iis, qui carnibus sunt mirum in modum delicatioribus. In quibus vero sinapismo vtimur non propter partes quæ altius resident, sed propter eas, quæ prope cutim sunt, panis læuigatus pro caricis sinapi admiscetur. Hoc etiam sciendum est, si in aceto sinapi maceretur, cataplasma obtusius: si in aqua, minus mordax fieri. qui aures sinapismo oblinūt, panno debet contrectare, aut duplicatis linteis excipere: malleolos vero oleo prius vngere, tum duplicatis linteis excipere.

De scilla.

Scilla in mortario contusa parem sinapi vim habet, si illinatur. sed breui tempore teneatur. nam si tardarit, vlcus excipit. ea priuatim in pectore vtemur ad eos qui nō nisi recta

teruice spirant: & ad resolutionem, cum non solum motus, sed sensus quoque est læsus. sed & nitrum, & balneum, & remediū, vt in sinapismo, administrare conuenit. olei vero perfusio morfiones, quas scilla excitat, proprie mitigat.

De simo caprillo

Caprarum simus viribus sinapismo non cedit: præsertim globuli aceto læuigati, proprie vero cōuenire ischiadicis hoc cataplasma, quippe quod sinapismo sit efficacius, nos ipsi experientia atque vsu didicimus.

Ex Menemacho, de psilothro. Cap. 14.

Psilothrū ex arte, quæ cultui & odorati est dicata, sumptum est. carnem in superficie vellicat. id quod ex rubore, quæ affert, & materia, quæ adurēs est, plane patet. si tardarit, cutim vlcerat, pustulāsque excitat. eius actio minor est, quam dropacis: siquidem hoc carnem delicatam relinquit, dropax vero habitioem, & musculosiorem. huius porro molestus est vsus. cæterū oleosa pars à corpore abstergēda est, propterea quod non adhæresceret: * & in eius vsu multo tempore morandum esset. quocirca pedum lotiones, ad quas psilothrum adhibetur, modice vnctas esse oportet, ne vis plane dissoluatur.

De tonsura, & derafione. Cap. 15.

Tondendorum, abradēdorūque pilorum vsum medicina accepit, euacuandi causa: estque is ad diutinas affectiones accommodatus. In capite autē capilli erūt forfice præcidēdi, tum radēdi: & abrasione etiā vtendū. derafio vero partium, in quibus capilli non sunt, purior est, & mansuetior, quam sit cutis tonsura: verum propter irrigationem & frictionē molestior est, & magis etiā in profunda coma. tonsura vero, quæ æque ac derafio capillis caput nudat, habet nescio quid sensum tētans. quocirca in iis, qui facile mutantur, tactu leni & mansuetu vtendum est, sed cum opus est cucurbitulas etiam admo- uere, locus abradendus est, vt ipse possint excidere. quo sane tempore irrigatione & frictione nihil præterea fuerit opus. cæterum mitis tonsura & derafio perspiratum parat: par- sesque ad alia efficacia remedia paratas & idoneas reddit.

De

In mulieribus quæ ornatum capillorum sanitati antepo-
nunt, pro locali remedio pectere comam vicem gerit frictio-
nis, efficaciusque prodest, cum caro ad cuiusque capilli exor-
tum trahatur. Si que dentes pectinum densiores fuerint, maio-
re etiam vi capillos attrahent.

Ex Herodoto, de pectenda coma, ex libro de remediis extrinse-
cus occurrentibus.

Cap. 17.

Ne caput pectatur primis quidem diebus, cauendum est.
neque enim necessarium est, neque utile, post vñctionem ve-
ro, quæ ante cibum adhibetur, & post clysteris vsum, si ita cõ-
sueuerint. pectendum erit, donec partes capitis nulla molestia
afficiantur. si vero aliquod symptoma extrinsecus appareat,
vt dolor capitis, vt defluxio, quæ nuper constiterit, aut exan-
themata, aut sanguis stillans, aut alia quædam mala suspicio
subsit, omittendum est.

Herodoti, de perstrictione, & interceptione.

Cap.

18.

In quacunque morbi parte perstrictio, interceptioque, & ante
accessionem, & in eius initio, adhibenda est. Colligare ergo
& intercipere partes vna, aut duabus ante horis est accom-
modatum. si vero tempora suspecta ignorètur, accessionesque
inuaserint, non iam magnopere harum rerum auxilio indige-
bimus, veruntamen eis vtendum est. atque affectionibus quæ
cum rigore inuadunt, itémque doloribus, conuulsionibus, de-
fluxionibus, sanguinis eruptionibus, palpitationibus, singul-
tibus, inflationibus, & vigiliis perstrictio conuenit. in-
terceptio vero omnibus qui vel ex morbo, vel ex symptoma-
te refrigeratur, adhibetur. Perstrictiones auté valis latioribus
in quibus multum sanguinis & spiritus est, admoveantur. ergo
ad perstrictionem apte sunt partes brachiorum, quæ ad alas,
& ad carpum pertinent: crurum vero partes, quæ ad ingui-
na, poplites, & malleolos sunt. hoc enim pacto attractio ma-
teriæ morbum gignentis retrahitur, & auertitur. Intercep-
tio vero ad poplites adhibita prodest, quippe quæ ma-
teriam contineat, naturalémque calorem seruet: idque præ-
cipue facit, si cum vngvine admoveatur. hæc autem auxilia
conueniunt iis, qui statis temporibus neruorum dolores

L I B E R

fentiunt, cuiusmodi podagrici, & arthritici sunt: incommoda vero censentur iis, quibus ante accessiōem sudores prorumpunt, & quos accessiōes cum sudore coniunctæ obsident. nam si vinculis exciperentur, eorum symptomata fierent diuturniora. Interceptionis ratio sit, ut lanæ molles in latos orbis redigantur. hisque ab extremis manus digitis ad alas usque brachium intercipientur: eodémque modo ab inguinibus ad digitos usque pedum progrediemur. ac partes quidem pedis, quæ incurvæ sunt, itémq; genua pluribus lanis excipiemus, quoniam hæ partes tum extendendo, tum flectendo facile denudentur. cum alioqui carnis copia sit in eis perexigua, atque ita immoderatus refrigerentur. cōpressiones vero pro viribus fiant. Intercipiemus etiā particulas hoc modo. lana rum carpta extremitatibus superdamus, & vinculis laxis super excipimus, & pro viribus iterum premimus. ubi omnes partes fuerint interceptæ, pulsus est per intervalla contingendus, ne vitare vires nos lateat. quo in casu debemus etiā exteriora contemplari, ut colorem, ut respirationem, excretionē atque decubitum. sudores vero, qui erumpent, si ex mora fiat interceptionis, in eaque perseverent, ac vires nihil minuatur, boni sunt iudicandi. in accessiōibus vero cessandum, & interceptiones solvendæ. in iis vero, quæ calorem extremorum inuadendo augent, æstate citius expediendæ interceptiones sunt: hyeme vero diutius immorentur. Quæ autem intercepta sunt, non sunt directo exoluenda: sed partes brachiorū teneris manibus contrectantes, & ea quæ circuniecta sunt auferentes, æstate cōtegere togis oportet, hyeme vero manibus. nam aëri confertim expositæ refrigerantur. cæteras quoque partes exoluimus, quiete eisdē imperata: sique fieri possit, ut vnico decubitu vtantur.

De deligatione.

Deligationes fiant ad hunc modum. lata vincula ex lana cōtorta, aut cōstricta, & coacta, aut vestes attritas capim⁹, extremitatibusq; circūponimus, & adhibita cura, ne carnes, cōtundantur, comprimendum obsequenter est, ut firmiter liges. quod rite procedet, si vincula & lata, & lenia fuerint. sed magis etiā constringuntur post secundam comprehensionē. neque enim caro offendetur, sed comprimetur: optima vero deliga-

deligationis, quæ satis sit, mensura est, ut tota caro, quæ circū partes deligatas est, cum rubore insurgat, nōsque vasorū excitationem obseruando, iterum vehementius comprimamus, cauendo ne particulæ in stuporem cadant, nōsque doloris causam afferamus. optimus autem huiusce rei terminus, est depulsio rigoris, & extremorum calor: cum scilicet inuasio se remittit. in cæteris vero, cum symptomata remittuntur.

Antylli, de suffitionibus, ex primo libro, qui est de iis, quæ extrinsecus occurrunt. Cap. 19.

Suffiunt medici mulieres, quæ ex utero suffocantur, siue vterus procidat, siue refrigerat⁹, siue siccatus, siue multo humore perfusus sit. Utimur quoque suffitu in morbis comitialibus, heterocrania, capitis dolore, in recta ceruice spirantibus, in asthmaticis, in iis, qui destuxione vexantur, & in iis, qui canina conuulsione capiuntur. In uteri vero suffocationibus, & casu, atque auersione mulieres suffiant se mirrhâ, aut thure aut bdellio. si vero sedere mulier possit, in sella, qua parturientes utuntur, collocabimus, & totam pannis diligenter circumuailabimus, ut nulla pars nuda, præter faciem, sit. si vero sedere aut propter suffocationem, aut propter imbecillitatē non possit, suffienda erit igni sub vestibus contexto. Vbi vulua procidit, teris odoribus suffienda, ut hirundinum nidore, pennis, aut capillis, aut lanis, aut spongiis combutis. Vel ita suffitum parabimus. coniecto in ollam nouam vino hæc inspergemus, atque ita suffitus fiet. Cum vulua refrigerata est, myrrham tritam, amomum, cassiâque adhibemus. cum exsiccata est, sampsuchum, spicam, crocūque. cum nimio est humore perfusa, acetum, pulegium, itida, thymūque. Poculum vero ligneum in ollam coniicimus, quod in medio sit perforatum: poculūq; labris ollæ agglutinamus aut luto figulo. rum, aut pasta. in foramen vero calami recta perforatum ponimus, atque ita aptamus, ut nulla sit perspiratio. alteri vero calami extremitatē fistulam plumbeam aptamus, cuius lene sit labrum. mulierem ipsam in sella ad partum edendum accommodata, cuius effractum medium sit, collocamus: tum ignem leniter sellæ subiicimus, & in sellam calamum imponimus. esto vero calami tanta longitudo, ut plumbea fistula calamo aptata sellam excedat. fistulam hanc ori vuluæ admoueri iubemus, atque ita ignem ollæ subdimus: quo incendente,

L I B E R

vapor ex iis quæ in olla sunt, elatus, & per calamum transiens in vterum perueniet: circumdatur autem plumbum mansuetudinis causa, vt ne calamus locum vellicet. Postquam satis fomenti adhibueris, calamo adhuc vuluë insidente, olla ab igni auferatur. nam si calamus subducatur, cum vapor ascendens adhuc feruet, sinus muliebris exurit. In comitialibus vero, vt cognoscamus vtrum eo morbi genere teneantur, ex gagate lapide suffitus fiet: vt autem qui comate opprimuntur, expergiscantur, ex castorio, capillis combustis, sulfure, eboris rasura, cornu ceruino, & equina vngula: in iis quibus altera capitis pars dolet, qui heterocranici vocantur, itemque in scotomaticis, & qui canina conuulsione corripiuntur, ex serpillio, hederæ foliis, mandragorâ, & fœniculo: in asthmaticis, & recta ceruice spirantibus, ex sulfure, abrotano, hyssopo, & menta. Quibus suffitus adhibentur, sedere debent pannisque circum tegi, & ignem in mediis cruribus habere: & inclinatos hianti ore spiritum attrahere. Vbi suffitus adhibitus fuerit, cætericolluendi sunt melicrato: qui vero thoracem male affectum habent, lacte.

De olfactoris, ex eodem libro.

Cap. 20.

Iis quæ olfactu sensum excitant, vtimur in vteri strangulationibus, vt castorio aceto diluto, capillis combustis, lanis concrematis, spongia itidem, & ellychnio lucernæ nuper restincto, sulfure ignem non experto: quæ omnia ex igne suffiuntur: itemque hirudinibus fumum cruciantibus. Vbi vero vterus procidit, odorari debent spicam, cassiam, costum, iridis folia, vnguenta odorifera. quæ etiâ ad animi defectionem, & nauseam faciunt: & multo etiam magis vinum cum aliquo eorum mistum, aut acetum in quo thymû, pulegium, satireia, origanum, apiûque immaduerint. folia quoque vitis, & rosarum conueniunt. ad dissolutionem autem virium, quæ ex defectione oritur, hæc olfactoria sunt apta, panis vltus, polëta vino madescens, pomum, pirum, melopepo. at qui ex capitis dolore in animi defectionem cadunt, paucedanum, poliû, baccas lauri, cupressi globulos, serpillum, melantium, quod aduritur, odorari debebunt.

De abstergentibus medicamentis, quæ smegmata dicuntur, ex eodem libro.

Cap. 21.

Smegmata solent adhiberi, vt cutis superficies abstergatur, alia

alia vt scarificetur, aperiaturque corpus: alia ad porriginem aut scabiem, aut morbum pedicularem exterendum, aut ad ledium molestias tollendas valent. abstergent autem nitrum, aphronitrum, sal, mel, salis flos, cimolia, lomentum fabarum, fermentum hordeaceæ farinæ, fursur, cinis * communis, pumex omnis, arena. attenuant autem veratrum album tritum, alcyonium, sulfur, herba pedicularis, napy, cachry, pyrethrum, piper, limnestis, granum Gnidium, euphorbium. ad porrigines vero & scabiem, & morbum pedicularem smegmata faciunt, quæ constant ex betæ succo, pissanæ cremore, sulfure ignem non experto, veratro, herba pediculari, testa sepiæ combusta, omnia autem smegmata corpori ad mouenda sunt sine vngvine in linteo sicco, cum siccatum prius fuerit corpus, priusque sudauerit.

De iis, quæ sanguinem sistunt.

Cap. 22.

Eorum, quibus sanguis cohibetur, alia refrigerando, alia adstringendo, alia agglutinando, alia siccando, alia adurendo, sanguinis eruptiones supprimunt. ergo aqua frigida, psyllij succus, cicutæ, seridis, & herbæ sanguinalis sistit refrigerando. acetum vero, oxycraton, succus portulacæ, plantaginis, rhois syriaci, hypocystidos, balauustii, adstringendo: itemque galla, acacia, acrestia, squama, ærugo, gypsû, cadmia, cerussa, diphryges vitum, samius alter, terra samia, electrum, rubrica lemnia, & araneorum tela, & manna thuris cohibet agglutinando. & spogia noua aceto imbuta, vini sex, & aceti exsiccatio. at misy & chalcitis, & atramentum sutorium, & cauterium, adurendo, & corpora congregando. initium vero à refrigerantibus & adstringentibus ducendum est, & ad extremum adhibenda sunt aduretia. Illud porro scire cõuenit, aliarum partium eruptiones sanguinis postulare plurima remedia sanguinem supprimentia: eas vero, quæ ab utero fluunt, quæque in profundis partibus manent, & sunt, omnino aliter curari. nam minus parent refrigerantibus: quippe cum uterus adstringentibus præcipue delectetur, quæ per os erumpunt, siccantia non admittunt, nec quæ modo diximus: sed iis quæ glutinant, curantur: sed ne iis quidem omnibus: verum imponi possunt, & quæ periculo vacant, nam cerussa, gypsum, & diphryges, & cadmia veneni vim habent: quæ quidem in sanguinis eruptionibus partium externarum conuenienter adhibentur.

z ij

Quæ collyria proprie dicuntur, ea oculis adhibentur. leuigata vero, quæ cōmuniter integra nominantur, alia apponuntur, alia imponuntur. apponuntur autem vtero: imponuntur vero fistulis, & sinibus. quæque vtero adhibentur, purgationes prouocant, & fœtum educunt. ea autem ex colophoniamyrrrha, & brassicæ radice, distamno, & elaterio cōficiuntur. Debent autem collyria longitudinis quatuor digitorum esse: eorūque figura caudæ muris esse similis. sunt etiam linamentis, aut filo oblongo appendenda, vt cum temporis quod factus sit, permanserint, auelli foras queant. collyrium quoque cyprino vngendum. sed animaduertendum est, ne vtero inflammato, aut dolenti collyrium admoueatur. Quæ vero fistulis & sinibus induntur, ea vt agglutinentur, imponi solent. hæc autem ex melle cocto fiunt, aut ex taurino glutine, aut ex erugine, aut ære combusto. quæ fistulis induntur, ea ad callos exterendos imponimus, fiuntque ex melle, mysi, atramento sutorio, chalcitide, squama nigra, radice marrubij, cedria, & feride. hæc vero & quæ in sinus inducuntur, esto lōgitudinis paris fistulis, & sinibus: crassitudinis vero minoris, ne cunei instar iponantur. spōgia quoque, & papyrus exsiccata ex lino inditur & in fistulas, & in sinus exsiccandi causa, si exsiccandi sit necessitas: trahūt enim hæc ad se humore: & vt dilatemus, aperiamusque ora fistularū & locū, vt collyria ingredi possint, præbeamus. Ceterū collyriorū, quæ ad oculos pertinet, syluā & materiā exponimus, vbi de madefactionibus, & cataplasmatis, & emplasmatis verba facimus. Vere parare collyria debemus, nam state eorum vis euanescit, & præcipue aromatum aridorū cōtusorum. at hyeme etiam si arida contundantur, nihil tamen lædentur. cum humore autem contrite inhorrescunt, neque vires remittunt, neque inter se permiscuntur. Quandoque etiam, quemadmodum in regionibus, quæ hyberna sæuitia rigent, medicamenta in humore trita suas vires hyeme amittunt, siquidē cōgelantur. sed nec etiā valde sicca medicamenta cōterenda sunt: nā puluerulenta eorum pars, quæ purissima facultate est, euaporat, & in nihilum abit. sicca autem per se terenda sunt vt per tenuissimum cribrum sine vi traici cū humore queant. non tamen humor confertim affundendus est, sed paulatim, vt semper strigmentosum, & viscosum medicam-

dicament
rint, inter
callica re
viri cog
currant, &
ea nanque
vino exci
multo re
poris cor
gata, gum
quam sic
men pro
confecta
los pertim
is vtendu
inuerata

Lippit
croco, &
fluxioni
bustis, q
dolorib
vocantur
ex ceruff
nes que
oculos ad
omnes su
uonibus
morbum
culus non
illina me
subiecte
decori
ex subie
cando
los oby
dines, &
poball

dicamentum teratur. ex quo consequetur, vt quæ iniecta fuerint, inter se cohæreant. si vero totus humor affundatur, metallica residebunt, aromatica vero innatabunt, neque inter se vniri cogentur: neque sub pistillum cadent: quippe quæ præcurrent, & cum humore confugiât. aqua autem esto pluuiâ: ea nanque tenuis est, & omnia permeat. si secus, collyrium vino excipiendum erit. quæ autem ex metallicis parantur, multo tempore læuigantur: quæ ex succis, exigui temporis contritione indigent. vbi vero satis fuerint læuigata, gummi collyriis additur, vt componantur, & quia postquam siccata sint, facit, vt collyria non frangantur. nullam tamen propriam facultatem oculis gummi præbet. vbi vero confecta fuerint, in æneo vase reponantur. nam quæ ad oculos pertinent, meliora ab ære fiunt. at quæ ex succis constât, iis vtendum statim est: quæ vero ex metallicis conficiuntur, inueterata meliora redduntur.

Vsus collyriorum modus.

Lippitudini autê incipienti conueniunt ea, quæ ex glaucio, croco, & sarcocolla conficiuntur, idque præsertim æstate: defluxioni vero, quæ ex rosâ, quæ ex ossibus palmularum combustis, quæ ex summis oleæ colliculis constant: vehementibus doloribus, quæ ex astere, quæ ex amylo, quæque babylonia vocantur. ad chemoses vero facit collyrion ex pompholyge, ex cerussa, ex nardo. ad vlcera, quæ ex thure fiunt. ad affectiones quæ inueterarint, valent æria collyria. eadem ad hebetes oculos accommodata sunt. collyriorum autem materiæ apud omnes sunt. cæterum in chemosi, & vehementibus inflammationibus infundere collyria conuenit, ne specillum contingens morbum irriter. in cæteris casibus, sublinenda sunt, verum oculus non est acie specilli tangendus, sed palpebra inferiore illita medicamentum apponendum. illitiones vero quæ per subiectionem, & quæ per euerfionem adhibentur, nescio quid decori continere videntur: cæterum non sanant. nam quæ ex subiectione fiunt, oculos soluunt, specillo obistente fricando: quæ vero per euerfionem admoventur, palpebris callos obducunt. quæ liquidæ vocantur, viles sunt ad hebetudines, & incipientes suffusiones, fiuntque ex attico melle, opobalsamo, felle, & præsertim hyenæ: si id non sit, viperæ, aut

L I B E R

aquilæ, aut vulturis, aut perdicis, aut gallorum alborum, aut coracinorum piscium. quandoque fœniculi succum capiunt, aut oleum quod ob vetustatem sit pertenuè, & solutum: aut liquorem cyrenaicum, aut cinnamomū. aut semen eius quod besafa dicitur, quod nos agrestem esse rutam existimamus. Humidæ porro attenuare, calfacere, & purgare possunt. omnia autem medicamenta oculorum, & præcipue liquida, si accommodate admoueri debeant, non pleno capite, & mollita aluo adhibenda sunt. quod præsertim in liquidis obseruandum est, idque in puro aëre, austrino, sub dio. nam spirante Notō, & cælo nubilo, aut humido, aut frigido, & condensato inutiliter admouentur. Idem vsu venit in cæteris collyriis quæ ad acumen visus pertinent: itémque in aliis omnibus quæ ad lippitudinem faciunt, eadem aëris obseruatio seruanda est: nisi fortasse quispiam sic vrgeatur, vt eis vtatur. quo casu & raro, & paucis vti debebit.

De pastillis, ex eodem libro.

Cap. 24.

Pastillorum sunt tria genera: quorum vnum potui datur, alterum in aluum coniicitur, tertium illinitur. de pastillis vero qui potui dantur, tum dicemus, cum de iis qui ægrotis offeruntur, verba à nobis fient: de cæteris nunc instituta est oratio. Eorū ergo qui indūtur, alij obtūdunt, alij adstringūt, alij adiūt. iis qui obtūdunt, vtimur in iis, quibus per infernas partes acria excernūtur, & quæ intestinū omnino mordeant. eorum materiæ sunt amyllum, samius aster, pompholyx, gūmmi, tragacantha, dulcis radice succus, opium, manna, bdellium. hi pastilli triti cū cremore ptisanæ, aut etiā cū polline, aut cremore fursuris, aut lentiū decocto iniiciēdi sunt. Adstringētibus vero vtimur, in quibus fluxū immoderatum sistere studemus, & in quibus roborare intestinū volumus. horū materia est alun. ē, acacia, hypocystis, rhus syriacus, balauistiū, cœnāthe, galla, malicorium, myrtus. indūtur hi cū succo rosarū, aut lētiularū, aut plātaginis. Adurētiū vsus est in depaſcētibus vlceribus. fūit illi ex sandaracha, calce viua, squama æris, charta cōbusta, & cæteris huius generis. sunt autē imponēdi pastilli huiusmodi, postquam ægroti comederint & biberint. ne stomachus ab exhalatione feriatur. præterea antequam indantur, clyster ex muria imponendus est: vt vlceribus prius absterſis, pastilli

pastilli indantur: quippe qui eo modo efficaciores sint futuri. cæterum quos iniecturi sumus, in vasculum coniectos plurimum agitare oportet: & ita indere, ne medicamentum in fundo vasis subsidat. vbi autem canaliculum ano imposuerimus, exprimere debemus, & vertere eodem in loco: ne si forte vlcere obsideatur ea pars, medicamentum concidat. pastilli vero qui illinuntur, parem vim habent cum iis, qui infunduntur. nam alij adstringunt, vt is qui ad Andronem auctorem refertur: itémque is, qui à Polyida est confectus, & croceus, & fuluus: qui ex lanis sordidis fiūt. tales etiam sunt, qui ex halicacabo constant: valéntque ad exanthemata, herpetas, ignem sacrum, intertrigines, sanguinis eruptiones, & vlcera fluentia. alij hebetât, & ad epinyctidas, carbunculos, & vlcera maligna faciunt.

De pēsis, ex eodem libro.

Cap. 25.

Pessi vtero soli admoventur. eorum tres sunt differentiæ: alij nanque molliunt, adstringunt alij, alij denique aperiūt. Mollientibus ad vteri inflammationes, exulcerationes, perfrictiones, strangulatus, auersiones, & inflationes vtimur. fiunt autem ex cera Tyrrhenica, cyprino, fusino, pinguedine anseris, aut gallinæ, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, scæno græco, & similibus. Aperientes vtilis sunt, cū purgationem suppressam prouocare volumus, aut conuiuentem, compressamve vuluam emendare: hique ex melle, artemisia, distamno, brassica, dulcis radice succo, ruta, & scammonæa. Adstringentium vsus contrarius est aperientibus. nam fluorem muliebrem cohibet, & vterum suspensum contrahunt, & prolapsum reprimunt. cæterum materiã adstringentium supra comprehendimus, cum de collyriis, & pastillis loqueremur. pessi crassitudo instar strigmeti, & paulo spissior facienda est. deinde lana tortili linamento similis duplicata medicamento tincta in os vuluæ indenda est sic, vt stuppam oblongam alligatam habeat: quo facile pessus extrahatur.

De medicamentis, quæ infunduntur.

Cap. 26.

Vtīmur iis, quæ infunduntur, proprie in vtero per specillū, quod infundendo in ipsum liquori accommodatū est,

z iiii

L I B E R

quod *αντερυχτην* vocant : in sinu vero, qui ante vterū est, per sollem. Id vero quod infunditur & in sinum, & in vterum, est eiusdem generis. potest autem infusio mollire, adstringere, calfacere, inflationes discutere, dolores mitigare: quę omnia pro materia, ex qua constat, solet efficere. debet autem liquida esse, aut oleo paulo crassior.

De vnguibus, ex eodem libro.

Cap. 27.

Vnguibus utimur in iis partibus corporis, in quibus neque madefactioni, neque cataplasmati est locus: ut in palpebris, auribus, summo naso, & tota facie: siquidem à cataplasmati grauat, & à madefactionibus defluentibus leditur. eadem quoque admoemus iis partibus, quę multum mouentur, cum in eis cataplasmata consistere non queant, & madefactionibus uti non possimus. Pręterea inungimus feruidas inflammationes, & quę naturam erysipclatis referunt: quęque & à cataplasmati, & à madefactionibus irritantur. exulcerationes quoque quę in summa cute sunt, & desquamatas inungimus: quippe quę à cataplasmati, & madefactionibus aggrauantur. itęmque sugillata, & laxos tumores, & alia permulta inungimus.

Materia vnguinum ad frontem, & oculos fluentes accommodatorum.

Ex leuibus vnguibus est album oui vel per se, vel cum rosaceo, vel cum vino adstringenti, vel cum sitania farina. valentius fit ex ouo cum manna, aut cum gummi. magis etiā colla aqua feruenti resoluta: & cochleę albę cum testis contritę, eęque vel per se, vel cum ouo. Crocus quoque cum vino illitus mitigat. & magis etiam glaucium ex vino. pręstātissimum est, quod ex Lēnio sigillo, & aceto, aut succo herbę perdicij conficitur. acacia itidem fusua cum vino similiter iuuat. Ex his quędam tensam frontis & temporum cutim faciunt, & idcirco vasa comprimunt, & ad sanguinis defluxionem amoliendam valent. alia vero vna cum protensione sua adstrictione vasa adstringunt.

Vnguiua faciei.

Exanthemata, quę in facie nascuntur, ouo cum cerussa, aut Lycio cum amurca superficie tenuis decocto illinuntur. facit

facit hoc etiam ad fissa labia. suffusiones vero succo thapsiæ illinendæ sunt, aut hyssopo viridi. faciem vero maculatam prius fouere debemus thymo, aut satireia, aut origano in lintheum rarum coniectis, & aqua calida decoctis, & floribus impositis ita illinere.

Vnguen aurium, quæ inflammatione obsideantur.

Aures inflammatae, ac præcipue ex plaga, colla cum aqua, aut myrrha cum vino, aut manna cum vino illinuntur. Exanthemata vero capitis. postquâ dera sum caput fuerit, cimolia cum aceto, aut betæ succo oblinimus: quæ humidiora sunt, cedria: quæ glutinosas sanies excernunt, amygdalino vngimus: quæ nasum & nares obsident, vngvine quod ex alumine, myrrha, & aloë constat, curantur. erysipelati vero glaucium, vel succum plantaginis, vel herbæ sanguinalis, aut lentisci, aut cicutæ, aut acaciæ, aut hypocistidos adhibemus, sed suillum fel ad erysipelata est omnium accommodatissimum. humida vero pinguibus, vt seuo, butyro, Cera Tyrrenica cum rosaceo oblinimus. pudenda vero valde adstringentibus, & attenuantibus, vt melle cum squama gris, aut aloë cum vino mulso: sed melius est brathy aloë inspergere, atque illinere. intumescētes vero partes in hydropicis, aut aliis generibus morborum, cimolia cum aceto, aut cum fece vini liquida, aut ipsa fece vngimus. Corpora vero præpinguia sunt tota melle, cui sal admixtus sit, illinenda. sed melius est in eiusmodi corporibus, vt calami rore vtamur. Myrmecia vero heliotropij, aut chelidonij, aut bathrachij succo inunguntur. Epinyctidas vero liquore cyrenaico, aut parthico cū vino dulci, aut calce viua cum oleo, aut coriandri succo illinimus. Vermes concretos coagulum * leporis, aut alterius cuiusvis animalis illitum educit. scabie obsessas partes cardamo cum aceto illinimus. ad ambusta vero, no pustulæ excitentur, myrrha ex vino leuigata valet. ad idem facit alumen scissile ex aceto, & lixiuio: & calx viua ex aqua. Vnguium quoque reduuias alumen liquidum illitū mire iuuat. Perniones nasci non finit thus, & alumen, & seuum suillum illitum. Ad scabiei molestias, & pruritus facit herba pedicularis cum viuo sulfure, & aceto. ad tumidas eminentias alterci succus valet: ad eminentias vero, quæ in ano & pudendis sunt, alumen scissile, cum myrrha, lacte, & atra-

mento futuro facit.

De malagmatis, ex eodem libro.

Malagmatum tres sunt maxime differentia. alia enim ex quibusdam siccis, radicibus inquā, herbis, & seminibus sunt: alia ex metallicis, aut iis, quæ metallicis proportionē respondent: alia ex succis, seuo, lachrymis, & quæ * coniuncte molliuntur. quæ autem ex siccis conficiuntur, coctione nunquā egent, sed solum liquefactione. in hoc genere sicca sunt liquabilibus affundēda, quoniā radices, & herbæ decoquendo frigerentur. si vero exigua portio aridorum imponatur, cætera erunt prius decoquenda, & cum ea satis cocta fuerint, ab igni detrahentur, & sicca adiicientur. Quæ vero ex metallicis & liquabilibus sunt, quo modo paranda sint, tum exposuimus, cum de emplastris loqueremur. Cæterum quæ ex siccis constant, hypochondriis, & omnibus mediis partibus cōmuniter, & præcipue stomacho imbecillo, aut non appetenti, aut non concoquenti, aut flatus pleno conueniunt, ut quæ ex seminibus, quæ ex fertula campana, quæque ex sampsucho constant. defluxione vero laboranti, aut æstuanti, quæ ex cœnanthe, quæ ex alumine, quæque ex omphacio sunt. Lienī vero & iecori conueniunt ea, quæ ex myrobalano, ex ammoniaco, ex visco, ex aceto, ex calce, ex cardamomo, ex nitro, ex radicibus capparis conficiuntur. Pectori & sanguinis reiectionibus adstringentia sunt idonea, ut quæ ex alumine, ex cœnanthe, ex salicibus, ex bitumine parantur. ad tabem facit, quod ex baccis lauri, quod ex marrubio, quod ex cardamomo, quodque ex lixiuia fit: quæ etiam ischiadicis conueniunt. at capiti, quod ex baccis lauri, quodque ex cachrye constat. Hæc autem exempli causa dicta sint, quoniam alibi, quæ facultates sint malagmatum ad singulas res accommodatorum, explicatum est. Quæ ex adipe & cera sunt, præcipue in nervis & articulis obduratis vtimur. & horum descriptiones apud omnes sunt vulgatæ. iis denique, quæ ex materia metallica parantur, artubus obduratis, & digestionē per halitum indigentibus adhibentur.

De acopis, ex eodem libro.

Cap. 29.

Acoporum cōmodus est vsus, vel in iis qui permāente & affli-

assidente impinguatione indigent, cum madefactiones propter earum defluxū, nihil magnopere possint: vel in iis, quibus, propterea quod morbi inueterarint, madefactiones minime sunt idoneę, in quo genere sic post madefactiones acopa adhibentur, sicut etiam malagmata post cerata. Acoporum sunt tres differentię: calefaciunt, molliunt, cutim scarificant. calefacientibus in acutis morbis utimur, ubi nervos lesū iri suspitio est: vel cū extrema refrigerata sint ita, ut difficulter calferi queant: vel cum sudores cum perfrictione ægrum vexant. Mollientibus vero in morbis diutinis. Scarificantium vsus est in diuturnis morbis, qui difficulter amouentur. Segniores sunt, in quibus etiam sinapismum commendamus. Materiam vero scarificantem, & calefacientem sumus persecuti, cum de madefactionibus, & emplastris disseruimus.

De iis, quę sternutamenta excitant. Cap. 30.

Sternutamenta excitantibus utimur, vel ut eos qui nimia propensione in somnum detinentur, excitare festinemus, vel ut mentem desipientem ad statum redigamus, vel ut fortum, aut secundas expellamus, vel ut aculeos, qui in pectore latent, in aspectum adducamus, vel ut vertiginem sedemus, vel ut aliquid expellamus, quod in aures conciderit, vel ut diuturnam affectionem, quę in capite resideat, amoliamur, & discutiamus: vel ut spiritum prolapsū siue in parte, siue in toto corpore erigamus, & robaremus, ut in resolutione, in morbo attonito, & morbo comitiali. Excitat autem sternutamenta castoreum laeuigatum. penna madefacienda est, & ea castoreum excipiendum, ac in nares indendum. & postquam pennam in naribus versaris, nares comprimendę sunt. si maiore uti velimus, castoreo piper addemus, si etiam vehementiore, struthium pyrethro, aut vuam taminiam piperi admiscebimus. in quo casu piper album adhibendum est. sinapi vero non est accommodatum, quoniam caput replet. pręterea iis, qui dicto audientes esse possunt, imperandum est, ut spiritum intro attrahant, & mansuetum lumen, aut ignem, aut solem aduersum intueantur. Melius est etiam, ut ægrotis supinis, & sursum versus recumbentibus quam sedentibus, sternutamentum excitans medicamentum imponamus: cūque sumperint, deambulent, si modo

possint, sursumque respiciant. quique lauari possunt, lauentur ita, ut caput large perfundatur. In caro, & cataphora, & singultu tempus accommodatum est, ut festinemus. Idem est, cum secundas, aut infantem mortuum expellere oporteat. ne sit autem sternutamentum inefficax: sed & ubi exciderint iam medicamenta, quæ abigendo foetui prius sumpta fuerint, vel etiam infestus, ita sternutamentum ciens medicamentum admoveatur. Idem quoque tempus in aliis observandum est, & item in iis, quæ in aures exciderunt. at in febribus tempus est commodum, cum febris se remittit: in morbis diuturnis, in diebus intermitentibus. ij vero qui praesidiorum materiam persequuntur, ut venæ sectionis, purgationis, clysteris, vomitus, & localium, & maiorum, ut cucurbitulæ, arteriarum sectionis, hirudinum, sinapismique, ea quæ sternutamenta cient, adhibere postremo loco debent.

De medicamentis, quæ insperguntur: quæ emplasmata vocantur, ex eodem libro. Cap. 31.

Emplasmata, cataplasmata, & diaplasmata differunt. emplasmata enim sunt, quæ, ut immoderati sudores, aut alia per halitum digestio cohibeatur, aut ut cutis extremitas scarificetur, aut pruritu tentetur, adhibentur. cataplasmata autem dicuntur, quæ ulceribus superdantur: diaplasmata vero, quæ ad suavem odorem cuti conciliandum, aut toti corpori tribuendum, aut partibus, ut alis, & feminibus, accommodata sunt. Ergo cum sudores, aut digestio per halitum infestant, utendum est cerussa trita, aut gypso, aut argenti spuma, myrro sicca læuigata, malicorio, rhoë syriaco, sorbis siccis tritis, polentis, amylo, polline, galla acerba, acacia. ut autem pruritus & scarificationem excitemus, eos, quibus emplasmata fuerint admoveenda, in sole sicca frictione confricamus, & prius laxamus sensim exercentes: tum emplasmata adhibemus. atque hydropicos quidem arena, sece vini vsta, cimolia, gypso, nitro, saleque: ischiadicos, recta solum ceruice spirantes, & diuturnis capitis morbis oppressos, sulfure, sinape, nasturtio, cachrye, pyrethro, pipere, & nitro oblinimus.

De cataplasmatibus, ex eodem libro. Cap. 32.

Ex Cataplasmatibus alia sordidis ulceribus conveniunt, & ad
ca

ea purganda sunt accommodata. vt es combustum, eruum
læuigatum, aristolochia longa, panax, cadmia, & diphryges:
alia comprimunt carnes excrecentes. Comprimunt autem pla-
cide ærugo, squama: magis vero calx, fex: vehementer vero
misf, chalcitis, atramentum sutorium, elaterium. cōchulę ve-
ro combustę adhibentur, vt morsus ab vlcerebus excitatos
mitigent. pinus vero & spina Aegyptia & cinis femoribus
insperguntur.

De diaplasmatis, ex eodem libro. Cap. 33.

Diaplasmata sunt cerussa, iris, terra felinusia, myrtus sicca
læuigata, lauri baccæ aride, manna, spica, solum, amomum,
iunci odorati flos aridus.

De perunctionibus, ex eodem libro. Cap. 34.

Perunctionibus vtitur in iis meatibus, qui sensu percipi-
untur: in quos medicamenta ad strigenti crassitudinem in-
dimus, vt in os, in nares, in aures, in sedem, in meatum vrinę.
Horum vis est aut exsiccans, aut humectās, aut adstringens,
aut incidens, aut soluens, aut densans, aut leuigās, aut sistens,
aut molliens, aut dolorem leniens. ac siccantibus quidem v-
timur, in aphthis oris, & ceteris humidis vlcerebus. eodē-
que modo si in naribus, aut aliis meatibus humida vlcera, &
sanem emittentia sint. huius generis sunt iris trita, cum mel-
le illita, linteam nouum combustum, pastillus ex hirundini-
bus concrematis, amurca olei, fex vini combusta, & vino, aut
aqua resoluta. Humidæ vero perunctiones siccis & carbo-
num naturam imitantibus vlcerebus cōueniunt: qualia præ-
cipue in auribus, & naribus oriuntur. Humectantur autem
perunctiones, cum ex siccis humectātibus parantur: quorum
sylyam, cum de madefactionibus loqueremur, demonstraui-
mus. sed vitādum est, ne succos huiusmodi capiamus, in qui-
bus aliqua vis corrumpēdi insit: siquidem tales adhibiti non
solum ori, sed cæteris etiam meatibus sensibilibus nocent.
Quæ adstringunt, vlcerebus oris depascentibus, & gingiua-
rum madoribus, & affectionibus herpetis naturam referenti-
bus, itēque tonsillis, & vuę laxationibus, & arteriæ deflu-
xionibus accommodantur. adstringentium vero materia,
tum simplicium, tum compositorum est omnibus perspicua.
in his est id, quod ex moris conficitur: quodque ex capitulis

L I B E R

punici mali constat: & anthera, aut confectio, quæ ex rosis paratur. Leuigantium vsus est in arteria exsiccata, aut quæ asperitatem contraxerit, in vocerauca, in gurgulione, in tonsillis oecclusis. ex eo genere est tragacantha, gummi, nux pinea, vua passa dulcis, mel crudum, faba fresa cum melle: dulcis radicis succus, confectio ex papaueris capitibus, quæ ex vino scybelite sit facta. Incidentibus, & secantibus vtimur in anginis, cum ea, quæ nos vexât, & quæ inflât, quæ ad guttur, & os pertinent, attenuare studemus. hoc vero genere continetur nitrum cum melle, sinapis in succum redacta, succus brassicæ, semen rutæ syluestris, pyrethrû, cardamomum cum melle, iis vero, quæ densare possunt, vtimur ad ea, ad quæ siccantia diximus accommodari. huiusmodi autem sunt quæ refrigerant. Quæ vero mollire pollicentur, eisdem, quibus etiâ humectantes conueniunt.

De medicamentis ad aures accommodatis, ex eodem libro. Cap. 35.

Medicamentorum, quæ auribus conueniunt, alia ad dolores sedandos, alia ad vlcera, alia ad aures purulentas, alia ad sonitus accommodata sunt. opium papaueris lacte, aut aqua resolutum doloribus prodest. ad idem facit mandragoræ & cucurbitæ succus, & oleum, in quo blata animal sit incoctum, aut aselli, qui sub hydriis nascuntur, aut terræ vermes: itemque pinguedo phocæ, delphinique: & butyrum, & animalium medullæ: sandaracha ex melle, amygdalinumque & rosaceum, & irinum, & garus. alumen quoque cum melle, & cedria, & pastillus qui Heræ dicitur. Acoribus vero purulentis vtile est lentiscinum, terebinthina, tetrapharmacû resolutum, confectio ex adipibus, & quæ ex cadmia constat, si resoluantur. Ad vlcera vero, quæ in auribus sunt, adhibeatur etiam oleum, in quo senecta serpentis sit incocta, aut cuminum Aethiopicum. myrrha vero, aut thus, aut veratrum nigrum, aut castoreum cum passo leuigata, & instillata sonitus persanant.

De iis, quæ dentibus conueniunt, ex eodem libro.

Cap. 36.

Quæ dentibus adhibentur, partim concussa, partim erosis, partim dolentibus, partim denigratis conueniunt. stomatica igitur, & perunctiones, vt confectio ex moris, aut quæ

ex

ex rosis
ciunt d
centur
relinqu
launtur
in loco
eundem
& acetu
myrrha
mata, q
genere
tia, aut

D

Defe
nis febr
rudine fu
dolent n
modatu
ptomati
sus in d
tu, par
omnib
rinæ su
calfacie
neis est
ignem
dereur
quo oler
bebit. L
ctus, et
rata per
sint leg
qui can
labunt
fiat, m
carne
nudo
uore

ex rosis fit, aut anthera, concussos dentes sistunt: idemque faciunt diphryges, æs, squama cum melle, si dentes eis confricentur. galla quoque nigra aceto incocta ita, ut quarta pars relinquantur, prodest, ut eo decocto dentes laborantes colluantur. liquidum etiam alumen idem præstat. Iam & piper in loco inani dentis dolentis impositum, dolorem mitigat. eundem lenit galbanum illitum: & cera cum masculino thure: & acetum, si os eo colluatur, & caricæ pingues, & allium, & myrrha incocta. Ne vero nigri fiât, aut corrodat, ea smegmata, quæ ad dentes accommodata dicuntur, faciunt: ex quo genere est sal cum pulegio, aut cornu ceruino, aut sepia testa, aut ouorum læuigata putamina.

De ingressu in oleum, ex Herodoti libro de remediis extrinsecus occurrentibus. Cap. 37.

Descensus in solium ex oleo conueniunt iis, qui diuturnis febribus cum perfrictione consistantur. iisque qui lassitudine fuerunt oppressi: & iis, quibus, dum febris iactantur, dolent nerui, qui ossibus sunt admoti. tempus omne accommodatum est, omnisque ætas, sed magis senilis, atque in symptomatis cum febre coniunctis apti sunt huiusmodi ingressus in declinatione. in quartanis vero febribus, etiam in statu, particularia vero tempora sunt, ut in remissionibus in omnibus conueniant, in conuulsis vero, & dolentibus, & urinae suppressione, ut festinemus. cæterum quinta olei pars calfacienda est: reliquum in balnei solis sit. nam quod in balneis est, neque satis calidum redditur, neque totum rite ad ignem calefieret: siquidem ad secundum usum inutile redderetur: quandoquidem nidorosum fieret. solium vero, in quo oleum sit, ad proportionem ægrotantis magnū esse debet. Locetur autē in tentorio, aut domo ex omni parte inclusus. esto autē in sella: super qua endromis ponatur perforata per interualla quaternum digitorum: cuius initia consuta sint lignis quadratis oblongis. id quod facimus, quia ægroti, qui carnis mole sunt onusti, non facile à solio auferantur. dilabuntur enim gestantium manus. quod si cauendum sit, ne fiat, manibus tenaciter apprehendenda sunt corpora: quæ res carnes tenues & imbecillas contundit. præterea decubitus in nudo solio difficilem actionem tum sua durtia, tum vero feruore efficit. æs enim vehementius incalescit. quam etiam

L I B E R

ob rem iubemus, vt spongiarum substernant, vt ad mollia corpora ægroti adnitantur. foramina vero adhibentur, vt postquam fuerint deportati, oleū defluat. Ergo constitutus æger in sella, carōque reddita æqualis per mollem & moderatam frictionem fuerit. reuolutis autem lignis in oleum rite imponatur. reuoluantur vero in contrarium ligna, vsque dum ægrū in subiectis spongiis statuunt: parsque ad caput spectans, esto sublimior. prima autem olei oblatio mitis esto. vbi paululum immorati homines in humore quieto fuerint, oleum, per se agitent: quique adstant, conuenienter rationi eosdem perfundant. sed non est ignorandum, & multum & præter animi sententiam ex eo motu calorem excitari. si vero feruidiore temperiē indigeant, calidius oleum erit affundendum. infusio vero ad pedes, & ad solium fieri debet. præterea qui caput perspergit, immergendus est, sed spongia mollis ante oculos admoueat. Temporis mensura definiēda est in iis, qui solutionis causa descendunt in oleum, vt vel rigorem, vel febrim, vel inflationes soluant: & in iis, qui alimentum male distribuunt. in principio enim, vt corporis raritate in facie madidum vaporem capiant: postea vero, vt longiore tempore immorentur. Præterea sciendum est, ex hoc ingressu in solium multos sudores, atque adeo plures, quam in balneis excitari. quocirca vires omnium nobis scopi erūt propoliti: cum quibus sudorum etiam, qui excernendi erunt, habenda est ratio. si vero doloris, aut conuulsionis, aut vrinæ suppressionis causa in solium ex oleo descendant, non modo vires, sed etiam eorum quæ infestant, elationem, aut diminutionem considerare conuenit. Vbi autem è folio decreuerimus hominē educere, ligna deuoluimus, & eum auferimus. cūque in sella fuerit locatus, spongiis calidis compressis, tum linteis obductum efferimus: faciem vero aqua lacteo tepore perfundimus: sique ob exolutionem fiat, etiam frigida. his confectis eum in tentorium deferre celeriter oportet: aut in eundem locum traducere, in quo fuerat prius. etenim in puro, temperatōque aëre quamprimum eum statuere necesse est, eandemque diligentiam, & curam, quam iis deberi diximus, quos animi defectio premit, adhibere. Eos autem, qui morbis per circuitus redeuntibus tenentur, alternis diebus, qui vero ob aliquod symptoma vrgens hoc præsidio vtuntur, singulis diebus in solium demitemus.

De

De inſeſſu in ſolio, ex hydrelæo, ab eodem libro.

Cap. 38.

ſi debiles ſint, qui in hydrelæum ſe demittunt, endromide amiſſi ingrediantur: ſi robuſti, etiam ſine veſte id faciât. Oleum autem cum aqua diligenter miſcendum eſt: nec minus, quam ſexta pars eſſe debet. qui vero laſſitudinis, aut diuturni laboris cauſa in hydrelæũ deſcendunt, in ſecunda balnei domo multum temporis inſidere in ſolio debent.

De marinis, ex eodem libro.

Cap. 39.

Deinceps ſequitur, vt de marinis dicendum eſſe videatur. hæ nanque medicamentofa qualitate ſunt præditæ: & ad multas affectiones valent. mordent hæ carnem, & extremitatem cutis vellicât, ſuâque denſatione, ac ſiccitate humorem, qui nimius redundat in corpore, ebibunt, atque conſumunt. quam ob rem vtilis ſunt iis, qui articuli deſluxione laborât. eſto autem hæ tepidæ ad ſummum, vt in eis immorari egroti diutius poſſint. nam maior caliditas citius, quam par eſt, vires ſoluit. natationes vero in eiſdem ſiant, vt prædictę utilitates capiantur. Cum vero ſint vtilis iis, quorum artus deſluxione tentantur, & quorũ male affecti ſunt nerui, eadem ſunt incommodæ morbis veſicę, aut vlceribus: & item exanthematis, quæ per ſuperficiem erumpũt. optimum eſt, vt poſt earum uſum, balneo vtantur. ſi minus, aqua dulci omnino perſpergantur. nam marinæ humor in corpore relictus craſceſcit, & cum ſumma moleſtia aëris attractionibus, quæ ſiunt, aſſidet. natationibus vero in mari vtantur ij, qui frigida, quique calida lauantur. poſt quos, omnes ij, qui oleo ſe vnixerint, vt totam eam humiditatem, quæ corpori adhæſit, abluant, & abſtergant, eradantur. quoniam vero ſæpenumero affectiones exigunt multarum aquarum experientiam, optimum fuerit, ſi vtendum ſit calidis & frigidis, vt ab aquis thermarum, quæ marinas etiam præcedât, initium ducamus.

De ſudorem euocantibus, ex eodem libro.

Cap. 40.

Quæ ſudorem euocant non ſolum iis vaporibus, quos ex ſe calidos, ſiccôſque mittunt, utilitatem afferunt, (huius enim cauſa idem faciunt, quæ ad illorum imitationem excogitantur.)

A

tur) sed quadam etiam propria eorum facultate. etenim tenuēs, euaporatēque exhalationes in puro & vndique aperto aëre perlatę morborum sobolem in corporibus eliquant, & reliquum carnis condensant., & totam corporis molem calfaciunt. eadem res spiritū firmit, sique aliquid in eo crassum & perhumidum fuerit, excernit, simulque humorem qui in capite insedit, consumit. Vt plurimum vero contrariam vim aquis sponte nascentibus id habet. est autem iis accommodatum, qui caput dolent, quique scotomatici sunt, & qui difficulter audiunt, & quos aurium sonitus vrgent: itēque oculis suffusis, & stomachi madoribus, & defluxionibus: & exanthematis in cute efflorescentibus: malo etiam corporis habitui, & regio morbo inueterato: iis itidē, qui & multam & segnem carnem aceruarunt. morbos quoque incurabiles sanat. nam hydropem, quę catasarca vocant, nullo alio praesidio vtentem, emendat, & corrigit. idem iuuat eos, quos ascitas nominamus. Qui permanentibus, diuturnisque morbis tenentur, post accessiones vti sudorem euocantibus debent. qui vero praedictorum morborum causa experiuntur, statim nulla mora interposita vtantur. Neque enim in partibus male affectis licet fluxum intueri, cum inanitiones ex toto corpore equaliter fiant: siquidem humores ex omnibus partibus expelluntur, caroque humiditates emittens, cum quadam densa compressione siccatur, vt ne id quidem quod sibi infundi possit, excipiat: Post exudationes alij in balneas & marinas natationes se demittāt, alij solis natationibus contenti sint: alij calida, aut frigida aqua perfundantur. Ordo autem, qui in iis vtendis seruandus est, similis sit ei, quem in aquis perscripsimus. Quę vero ad imitationem eorum, quę suapte natura sudorem euocant, excogitantur fomentatiunculae, quę multo minorem vtilitatem, quam pollicētur, afferant, cum casus vrget, adhibeantur.

Galenī, de remediis metasyncriticis. Cap. 41.

In omnibus diutissime inueteratis morbis, cum cetera auxilia nihil profecerint, omnes fere ea remedia, quę metho-
dici metasyncritica nominant, adhibere consueuerunt. Ego vero, vbi intemperies quędam humida & frigida aut per se ipsa in partibus affectis inest, aut propter huiusmodi humorum frigiditatē fuerit exorta, medicamenta ex sinape, & thapsia,

pſia, atque ex ſimilibus adhibeo. ad ſiccas vero & calidas nō
v̄tor. Cæterum qui dignoſcere affectiones non poſſunt, ad
eiufmodi medicamenta, velut ad ſacram, vt aiunt, anchoram
confugiunt: & ſæpe id quod opus eſt, efficiunt: quod pleroſ-
que homines eiufmodi affectiones ob malam, & vitiatam
victus rationem infeſtent.

Quæ ruborem inducunt. Cap. 42.

Nāſurtij ſemen coxendicum, capitīſque dolores, & cete-
ra omnia, quibus rubore opus eſt, exalfacit æque ac ſinapis.
eodēque modo helenij radix, eāque cōtinuis articulorum
lapſibus, qui ex humore procedunt, opitulatur. Fimo autem
columbarum ſylueſtrium frequentiffime v̄tor, eo etiam cum
ſemine ſinapis cōtuſo, & cribrato pro ſinapi v̄tor in iſchia-
de, hemicrania, tenebricoſis & terrificis imaginationibus, ce-
phalæa, laterum, ſcapularum, tendinum, lumborūque do-
loribus diuturnis. Iam vero facit etiam ad renum vitia, &
ad colicas affectiones, & ad pedum, articulorūque dolo-
res, cum nondum callum obduxerint.

FINIS LIBRI DECIMI.

ORIBASII MEDICI-
NALIVM COLLE-
CTORVM,
LIBER VNDECIMVS.

*Ex Dioſcoride, de ſimplicium medicamentorum facultate, per or-
dinem literarum ab A, vſque ad M. & eorundem apparatus.*



Brotonum quod fœmina dicitur, arboris
ſpecie frutex eſt, ſubcādīdus, foliis circum
ramulos minutim inciſis ad ſeriphi modū:
florum plenus, corymbis in ſummo auri
fulgore comantibus. quod eſtate natū eſt,
id guſtui amarum eſt. tale autem Siculū vi-
detur eſſe. alter ū vero mas vocatur: eſtque ſarmētoſum. ſcā-
lia habet tenuia, vt abſinthium. plurimum in Cappadocia

A ij

Galatia, & Hierapoli Syriæ nascitur.

Agallochum lignum est, quod ex India atque Arabia aduehitur, thuyæ ligno simile. estque odoratum, cum amaritudine quadam gustum adstringens. cortex corij similitudinem habet: estque versicolor.

Agaricum fertur radix laserpitio similis: non densa superficie, sicut laserpitium: sed tota rara. eius alterum mas, alterum foemina, praestat autem foemina rectas intus habens divisiones, masculum vero rotundum est, & vndique concretum. utrique gustus in initio dulcescens, mox ubi diffunditur, amarus. Nascitur etiam in Galatia Asiae, & in Cilicia in arboribus: sed friabile, & infirmum.

Ageratum frutex est furculosus, duorum palmorum longitudine, humilis, simplex: origano valde similis. umbellam habens, in qua maxime bullæ aureæ sunt. elichryso minor.

Anchusa, quam alij calyca, alij onocleam vocant, folia habet lactucæ, cuius acuta sint folia, similia, hirsuta, aspera, magna, multa: vndique ab radice per terram sparsa, spinosaque. radix est digiti crassitudine. sanguinei coloris estate provenit, manusque inficit. nascitur autem læto solo.

Est & alia, quam Alcibiadium aut Onocholes vocaverunt. differt hæc à superiore, quod minora folia habeat. æque autem est aspera, ramulosque habet exiles, in quibus flos est purpureus, aut puniceus: radices rubras, oblongas, & per mensem sanguineo quodam succo fluentes. nascitur autem solo arenoso.

Quinetiam alia anchusa est, quæ lycopsis nominatur, huic adsimilis. habet autem fructum puniceum. quem si quis com manducatum in os serpentis inspuerit, eum enecabit.

Lycopsis vero, quæ à quibusdam anchusa vocatur, folia habet lactucæ foliis similia, sed longiora, & crassiora, & aspera, ad caput radice decidua. Caulis exit longus, asper, rectus, adnatis multis cubitalibus asperis: in quibus flores parvi purpurei sunt, radix rubra, & adstringens. nascitur in campestribus.

Adiantum, quod alij polytrichon vocant, folia habet exigua, coriandro similia, & in extremo incisuris diuisa. Cauliculi, ex quibus exoriuntur, nigri, extremæ gracilitatis, dodrantales, nec florem, nec fructum fert. radix est inutilis.

Adiantum aliud est, quod trichomenes aliqui appellant, filici simile, paruum, leue: foliis tenuibus in ordinem utrinque di-

digestis, lenti similibus, contrariis inter se, in ramulis paruis, tenuibus, acerbis, subnigris.

Aegilops herbula est, folia habens tritico similia, molliora tamen, in summo autem capite duo aut tria semina rubra fert: inter quæ aristæ, veluti capilli, prodeunt.

Aizoon, id est, semperuium magnum, alij bupthallon, id est bubulum oculum, alij stergethron, hoc est amorem concilians vocant: caules cubitales emittit, & etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues egregie virentes, incisuras habentes ut vallaris, tithymalus. folia habet pingua, pollicis magnitudine, in acumine lingue similia, quæque inferiora sunt, in terrâ conuexa sunt, quæ vero in capite, cœcreta inter se, circuli oculi instar circumscribunt. nascitur locis montanis, & supra domicilia in vasis fictilibus quidam ipsam cœserunt.

Aizoon minus in parietibus, & vmbrosis sepulchris, & petris, & murorum coronis nascitur, cauliculi multi ab vna radice prodeunt, repleti foliolis pinguibus, paruis, & in summo acuminatis. exit etiâ ex medio caulis, dodrantali fere magnitudine, vmbellam habens, floræque, tenues, virides, multos, folia vero eandem, quam superius, vim habent.

Aizoi tertium genus videtur esse, quod alij portulacam agrestem, aut telephion vocant. folia habet latiora ad portulacæ similitudinem, itemque hirsuta. nascitur in petris.

Aethiopis folia habet verbasco similia, valde hirsuta, & densa, in orbem circa imam radicem redacta. caulem quadrangulum, asperum, apiastro, aut arctio similem, multis alis concavum. semen erui magnitudine in singulis vasculis geminum: radices ab eodem fundo numerosas, longas, crassas, sapore glutinoso. siccatae vero, nigrae, duræ, & cornibus similes redduntur, plurima nascitur in Messenia, & Ida monte.

Acacalis fructus est fruticis in Aegypto nascentis: qui semini myricæ quadantenus est similis.

Acacia nascitur in Aegypto. spina est arborefcens, fruticosa, non recta in altum crescens, flore albo, semine ceu lupinorum, candido in siliquis: ex quo succus exprimitur, & in sole siccatur, ex maturo niger, ex immaturo subrufus. eligatur modice rufus, & odoratus, ut in acacia esse potest. aliqui etiam ex foliis vna cum semine succum exprimunt, ex hac etiam spina manat gummi. Lauatur in aqua ad oculorum medicinam succus identidem confricatus, abiectis iis quæ in sum-

A. iij

L I B E R

mo concreuerint : donec pura aqua relinquatur . atque ita in pastillos cogitur . Vritur etiam in olla cruda cum tegulis in fornace: torreturque ad carbones perfiata. huius spinæ decoctū solutos artus fotu sistit. Nascitur altera acacia in Capadocia & Ponto: quæ Aegiptiæ quidem est similis, cæterum minus efficax: & oculorum medicinæ inutilis.

Acalyphes, hoc est vrticæ, quam cniden vocant, duplex est genus. alterum agrestioribus, asperioribus, & nigrioribus foliis est: semēque lini semini fert simile, sed minus: alterū exili semine, & non ita aspero.

Acantha. Spina alba in montanis & syluosis locis nascitur. folia habet chamæleonti albo similia, sed angustiora, candidioraque, & aliquantum hispida. Caulem habet spinosum, candidū, duos cubitos excedentem ad pollicis crassitudinē, aut etiā maiore, subalbum, inanē. in acuminē caput est spinosum, echino marino simile. est tamē minus, & oblongum. flores eius purpurei, in quibus semē est, vt cnicus, sed rotundus.

Acantha Arabica albæ est acanthæ similis. adstringit.

Acanthium folia similia habet albæ acanthæ, in summis extremitatibus aculeata: in quibus est lanugo instar aranæ telæ qua collecta, & in vnum conducta bōbicis effigiem præbent.

Acanthus, aut melanphillos, aut pæderos nascitur in hortis, & petrosis, & aquatilibus locis. folia multo latiora habet, quam lactuca, incisuris distincta, vt erucae folia, nigra, pinguis, læuia: caulem leuem, duorum cubitorum, digiti crassitudine. per interualla vsque ad verticem foliolis quibusdā veluti nucamentis oblongis hyacintho similibus circumdatum. è quibus flos albus, semen oblongum, luteum, caput thyrsi figura. radices subsunt glutinosæ, fuluescentes, longæ. Nascitur etiam agrestior acantha, carduo similis, aculeata, & breuior quam ad ea, quæ in hortis prouenit.

Acinus hoc est ocimastrum, herba est coronaria, tenui ramulo, similis ocimo, hirsutior, & odorata, à nonnullis vero in hortis feritur.

Aconitum, vel pardalianches, vel cynoctonon, folia habet tria, aut quatuor cyclamini, aut syluestri cucumeri similia: minora tamen, & aspera. caulis est dodratalis. radix similis caudæ scorpionis, alabastri modo splendens.

Aconitum alterum est, quod lupicidam vocant. plurimum in Ita-

in Italia montibus Iustinis prouenit, superiore præstantius. folia autem habet platani similia, sed pluribus incisuris distincta, & multo minora, & nigriora. caulem habet ut filicis germine glabrum, cubiti altitudine, aut etiam maiorem. fructus insiliquis quodammodo oblongis, radices cirris squillarum similes, nigrae.

Acorum folia habet iridi similia: sed angustiora: radices non dissimiles, complicatas, non in rectum, sed obliquum tendentes, & in superficie, geniculis intersectas, subalbas, gustui acres, & odori non ingratas. Præstat autem album, & densum, & non exesum, & plenum, & odoratum. tale autem est quod in Colchide, quodque ex Galatia allatum, asplenum nominatur.

Actæ, hoc est sambuci altera species est, quæ in arborem assurgit, surculos arundinis forma habet, rotundos, albicantes, oblongos, cauos: folia quaterna, quinave per interualla ex virgis prodeunt, iuglandi nuci similia, graueolentia, & longiora, in extremo autem caule circinatæ umbellæ, flores candidi, fructus terebintho similis, qui in nigro modice purpurascit, acinosus, copiosi, ac vinosi succi. Altera vero species quam chamæacten, hoc est ebulum, aut heliosacten vocant, minor est, & herbæ similior. caulem quadratum habet, multis geniculis intersectum, folia per interualla ex singulis geniculis exeunt amygdalæ similia, per orbem secta, & longiora, graueolentiaque, in summo umbella est, similis antedictæ, itemque flos, & fructus. radix longa ad digiti crassitudinem subest.

Halimus, frutex est sepimētis idoneus, rhamno similis, spinis vacans. folia oliuæ similia, latiora tamen gerit. nascitur maritimis locis, & præruptis, itemque in sepibus, parantur eius folia coquendo ad vescendum.

Althæa, aut hybiscus sylvestris maluæ species est. folia habet rotunda, ut cyclaminum, & lanuginosa. florem rosaceum, trium cubitorum caulem: radicem glutinosam, intus albam.

Alisma, quod alij damasonium, alij lyrion appellant foliis est plantagini similibus, angustioribus tamen, & in terram deflexis: caule tenui & simplici, ad cubiti altitudinem, capitulo ad thyrsi formam. floribus albis, subpallidis radicibus, quales nigri veratri sunt, tenuibus, odoratis, acris, subpinguibus. aquosa loca amat.

A iiij

Aloë habet scillæ folium, crassum, pingue, in rotundo modice latum, retrorsum pandum. folia vtrinque ex obliquis spinulas raras & mutilas habet. caulis assurgit antherico similis. flos eius albus, fructus hastulæ regię similis, grauis est odor, gustui amarissima, radicem vnicam, ceu palum humi defixum habet. Plurima vero in India nascitur, vnde & liquor comportatur. Oritur quoque in Asia, & quibusdam maritimis locis, atque insulis, vt in Andro. Sed ad exprimendum ex ea succum inutilis. glutinandis vero vulneribus trita, atque illita est accommodata. Duplex autem est eius liquoris genus: alterum arenosum, quod purioris aloës sedimentum esse videtur: alterum ad iecoris formam. eligito pinguem, calculis vacantem, splendentem, subflauam, friabilem, iecoris modo concretam, facile liquecentem, & quæ maximæ amaritudinis sit. nigram vero & quæ non facile frangitur, reprobato. adulteratur gumi admixtione, quod gustu reprehenditur, & amaritudine, & odoris intentione: & quod digitis friata ad minimum vsque ramentum non dissoluitur. Alij acaciam quoque miscent. Torretur autem etiam ad oculorum medicinas in pura, & igni candente testa: radiculæque subinde versatur, donec tota æqualiter candeat. lauaturque abiecto eo, quod arenosum est, tanquam inutili: quod vero pinguius & leue sit, seruetur.

Alfine, nonnulli myosota, id est muris auriculam vocant, quæ inde nomen traxit, quod foliola muris auriculæ habeat similia: dicitur autem alfine, quod ἄλσιν, id est lucos, & vmbrosa amet loca. folia similia habet helxine, sed humiliora, & longiora, non hirsuta. cum teritur, cucumeris odorem refert.

Alysson exiguus est frutex, subasper, singulari caule, foliis rotundis: in quibus fructus sunt vt duplices clypeoli, in quibus semen modice latum continetur. ipsum vero montanis & asperis locis nascitur.

Alypon fruticosa est herba, & subrubra, foliis tenuibus ramulisque tenuibus: flore molli, & leui. radix plena est acris succi. semen vero epithymo simile. nascitur maritimis locis, ac præsertim in Lybia, quanquam in aliis etiam plerisque provenit.

Ambrosia, quam alij botryn, id est racemum, alij artemisiā vocarunt, fruticulus est ramosus, trium dodrantum. huic folia

folia,
liesig
quam
tum. It
Am
exiguu
fert. pr
Am
fyllus d
sapore,
referen
tum vo
cipaue
louis A
rentis.
Amur
mellis e
facit.
Agres
lignosa
& latio
guis vi
norum
Alba
est serp
vocat
tamen
uiculis
cora sp
um &
Am
nollit
similib
bus cau
sa quo
racem
extrin
Am
plex et
prode

folia, qua caulis erumpit, exigua, vt rutæ folia, surgunt, ramuli exiguis seminibus sunt pleni, instar racemulorum: quæ nunquam florent, vinoso odore. radix tenuis est duum dodrantum. In Cappadocia vero coronis inseritur.

Ammi, alij Aethiopium cuminum. notum est semen hoc exiguum, multo exilius cumino est. origani saporem gustui affert, probato quod purum est, & fursuris experts.

Ammoniacum ferule liquor est. totus frutex cum radice agassyllus dicitur. probatur bene coloratum. ligni experts, thuris sapore, calculis vacans, densum, sine sordibus, castorei odorem referens, gustui amarum. hoc vero θραυμα, hoc est fragmentum vocant: quod vero terram, aut lapillos habet mixtos, φύραμα, hoc est mixtionem appellant. nascitur in Lybia ad Iouis Ammonis templum. estque succus arboris ferulas gerentis.

Amurca est olei sedimentum. hæc decocta cupreo vase ad mellis consistentiam adstringit, & ad eadem, ad quæ lycium, facit.

Agræstis vitis sarmenta vitis viniferæ modo longa emittit, lignosa, aspera, folia hortensi solano similia: longiora tamen, & latiora. floræ habet, vt capillos muscosos: fructum fert exiguis vuis similem. cum maturuerit, rubrum. rotunda est, acinorum figura.

Alba vitis ab aliis bryonia, ab aliis ophiostaphylon, hoc est serpentum vitis, ab aliis chelidonium, ab aliis psilothrum, vocatur: folia, clauiculosque satiuæ vitis similia habet. magis tamen hirsuta sunt omnia: & propinquis fruticibus sese clauiculis applicant. fructum fert racemosum, rufum, quo pilis coria spoliantur. huius asparagis decoctis vescuntur, qui aluum & vrinam cient.

Ampellos, hoc est vitis nigra, quam proprie bryoniam nonnulli vocant, alij Chironiâ vitem nominant, foliis est hederæ similibus: sed ad smilacis hederæ folia propius accedentibus: caule quoque ei simili. verum hæc in omnibus maior. ipsa quoque suis clauiculis arbores apprehendit. fructus eius racemosus est, viridis in initio: concoctus vero, niger. radix extrinsecus nigra, intrinsecus coloris buxi.

Ampelos agria, hoc est vitis agræstis, vel labrusca, duplex est. alterius vua non maturescit: sed ad florem usque producit eam, quæ δινάθη, id est flos vitis appellatur. altera

fructum absoluit, eaque paruos habet acinos, & nigra est, acque adstringens.

Amygdalæ amaræ radix decocta, & trita, ephelidas in facie emendat. ipsæ itidem amygdalæ illitæ idem efficiunt. ad motus menses cient: capitis dolori medentur, illitæ fronti cum acetæ, & rosaceo. faciunt ad epinyctidas, ex vino. ad vlcera vero putrescentia, serpentia, & canum morsus, ex melle. in cibo sumptæ leniunt dolorem, ventrem molliunt, somnum conciliant, vrinam prouocant, ad sanguinis reiectionem cum amylo, & menta sumpta valent. ad renum vero & pulmonis vitia ex aqua potui dantur.

Amylum laudatissimum est, quod conficitur ex tritico purgato, & loto, & macerato in aqua dulci, abiecta quinquies per diem aqua, & si fieri potest, etiam per noctem. vbi emollitum fuerit, aqua sensim absque agitatione effundenda est, ne id etiam, quod residere debet, simul defluat. cum mollissimū redditum videbitur, aqua abiecta pedibus terendum est: tum aqua affusa furfures supernatantes cribro eximendi, quod supererit per colum traiciendum, mox vt excolatum fuerit, in nouis tegulis in sole ardentissimo siccandum. nam si vnum paulisper maneat, acescit.

Amomum præstantissimum est Armeniacum, quod auri colore est: habetque lignum subfuluum, & valde odoratum. Medicum vero, quoniam in capestribus & aquosis locis nascitur, infirmius est. magnum, viridèque est, & tactu molle, lignis fibrosis, origani odore. Poticum vero subfuluum, fractu difficile, racemosum, plenum fructu, odore feriens. Eligito recens, album, aut subrubrum, non adstrictum, aut compactum, sed solutum & diffusum, plenum seminis, vuarum racemulis similis: graue, & valde odoratum: sine carie, acre, gustū mordēs: simplici colore, & non vario. Adulterant amomum nōnulli admixta herba amomide, quæ est amomo confimilis: quæ tamen odore & fructu vacat. ea in Armenia nascitur. florem habet origano similem. porro in huiusmodi rerum probationibus fragmenta semper vitanda sunt. elige vero quæ ab vna radice suos ramos integros habent.

Anagallidis duplex est genus, flore differens. nam quæ cœruleum fert florem, fœmina: quæ puniceum, mas dicitur.

Anagyris, alij heleopon vocant, frutex est folijs & virgis vitici

vitici fin
similes. f
solidum.
Andro
dida est
capite hal
Andro
est tenuis
ris, folijs
Complur
quas flos
fructus el
coma ver
Anem
ex statua
tes, & la
maioribus
tenetque
media cap
dia: vel
agrestis
latiora, s
diculas
crior qu
nam, &
ra dicent
viroque
nant, &
nus profi
Præterea
crem, nū
interm
mones q
vero an
nec val
agris il
Aneg
thi tan
primæ
thum

vitici similis. arborefcens, grauiffimi odoris. flores bralficæ fimiles. fructum in exiguis fiquis fert, renum figura, variū, folidum. durefcit vva maturefcente.

Androfices in Syria nafcitur, locis maritimis. herba candida eft tenui ramulo, amara, foliorum expers: folliculum in capite habens, quo femina continentur.

Androfæmon, alij dionyfiada, alij afcyron vocant: frutex eft tenues habens ramulos, furculofus, virgis puniceï coloris, foliis rutæ triplis, quæ trita vinofum fuccum emittunt. Complures alas habet in cacumine vtrinque expandas, circa quas flosculi parui funt, lutei coloris, in germinum capitulis fructus eft nigri papaueris fimilis, veluti punctis diftinctus. coma vero confricata refinofum odorem exhalat.

Anemone duplex eft: altera fatiua, agrestis altera. itémque ex fatiua, alia eft, quæ puniceos flores producit, alia albefcētes, & lactefcentes, vel purpureos. folia habet coriandri, tenuioribus propé terram diuifuris: cauliculos habet fibrofos, tenuésque, in quibus flores, quales funt papaueris, infident. media capitula nigra funt, vel cærulea. radix oliuæ magnitudinæ: vel maiore, ferméque geniculis quibusdam intercepta. agrestis vero in omnibus maior, quam fatiua eft: folia habet latiora, durioraque, caput oblongius, florem puniceum, radículas tenues, & plures. eft etiam quæ nigra folia habet, acriorque eft. Qui vero ab agresti anemona nesciūt argemonam, & papauer, quod rhœam vocāt, de quo inter papauera dicemus, diftinguere quod flos eiuſdē coloris puniceï in vtroque viſitur, fallūtur, & argemonam, eupatorium nominant, & tamen argemones, & papaueris rhœadis color minus profunde puniceus eft: & ferius, quā anemone, florent. Præterea argemone liquorem croci ſaporis, guſtui valde acrem, rhœas vero album & acrem emittit: & vtrūque habet intermedia capitula agresti papaueri ſimilia: niſi quod argemones capitulum in ſuperiore parte latiuſculum, rhœadis vero anguſtius. anemonæ vero neque liquorem emittunt, nec vaſculum habent: ſed quaſi aſparagi cacumē. ad hæc, in agris illę plerunque naſcuntur.

Anethini confectio. Olei veteris lib. ii. vnc. 8. florum anethi tantundem, diem vnum oleo macerabis. tū manibus exprimes, atque repones. ſi iterum velis perfundere, recēs anethum eo modo macerato. poteſt hoc vteri partes mollire, &

aperire, contra rigores circuitu redeuntes accommodatum est, calfaciens, & lassitudines discutiens. prodest etiā doloribus articularum.

Anthemida aliqui leucanthemon, aut heranthemon, aut chamæmelum, aut melanthemon, alij Chrysocalliā, alij calliam vocant. huius tria sunt genera, floribus tantummodo differentia. capitula habent rotunda, intus alba: & flosculi aurei coloris continent. foris vero orbiculato ambitu alba, aut lutea, aut purpurea sunt. colligitur vere.

Antyllis est duplex: altera habet folia & ramulos lenti similes: dodrantis altitudine: recta habet folia, molliāque. radix tenuis, & parua. nascitur subsalsis, & apricis locis. gustui subsalsa apparet, alterius vero folia, & ramusculi chamæpytij similes sunt, hirsutiores tamen. eius flos purpureus est, grauiissimi odoris: radix, vt cichorij.

Anonis, quam ononida aliqui vocant, dodrantales habet ramulos, & etiam maiores, fruticosos, frequentibus geniculis plenos, alas multas habentes, capita rotunda, foliola parua, exilia, ad rutę, aut loti pratensis foliorum similitudinem, subhirsuta, odorata, non insauia. Sale conditur hæc, antequam spinas producat: estque suauissima. Ramuli quoque spinas habent acutas, surculorum more, firmas, crassas. radix ei est firma, & candida.

Aparine, quam philanthropon vocant, semen durum, rotundum, in medio subcauum, vt umbilicum, habet. vestibus hæc herba adhærescit. pastores ea coli vice vtuntur, ad pilos è lacte eximendos.

Apion quidam ischiada, quidam chamæbalanum agrestem, alij linozostin vocāt. ramulos binos, aut ternos ab humo se tollentes spargit. folia habet rutę similia: sed oblongiora, & viridia. fructus exiguus inest. radices asphodelo similes: rotundiores tamen, & ad piri figuram: liquoris plenæ. nigro foris cortice, intus albo.

Agemone est tota agresti papaueri similis. folia habet anemones diuisa, caulem puniceo flori similem, caput rhæadis papaueris: sed oblongius, & latius in parte superiore. radix est rotunda, liquorem emittit, crocei saporis, acremque.

Anisarum perexigua herba est, radice ad oliuæ magnitudinem. estque aro acrior.

Aristolochia rotunda folia habet hederæ figura. odora-

ta cum acrimonia, subrotunda, tenera, multis germinibus ab una radice prodeuntibus. sarmenta oblonga sunt, albi flores, pileolis similes. quod in eis inest, rubrū est, & male olet. Longa vero aristolochia folia habet oblongiora, quam rotunda, & ramulos exiles, longitudine dodrantis: florem fert purpureum, male olentem: qui cum cœpit efflorescere, piro fit similis. rotundæ autem radix orbiculata est ad modum rapi: longæ vero radix est crassitudinis digiti, dodrantalisq; aut maior. utrique folia sunt intus buxea, amara, & virosa. Est etiam quædam longa, quæ clematidis vocatur: quæ ramulos exiles habet, folia subrotunda, semperuiui minoris similia, floribus referta, qui similes rutæ sint. radices eius sunt longissimæ, ac tenues, quæ corticē crassum & aromaticum odorem referentem habent: qui proprie cōficiendis vnguentis est idoneus.

Arcion, sunt qui prosopida vocent. folia habet cucurbitæ similia: maiora tamen, & duriora, & nigriora, & hirsuta. caule vacans herba est. radix magna, & alba.

Arction, alij arcturum vocant, foliis est verbasco similibus, hirsutioribus tamen, rotundioribusque, radice tenera, alba, dulci: caule longo, molli: fructu denique cymino paruo simili.

Arnoglossum, hoc est plantago, quam alij heptaneuron, alij polyneuron vocant, duplex est, maior & minor. nā minor plantago folia habet longiora, & angustiora, ac læuiora, caulem angulosum, in terram inclinatum, flores pallidos, semen in summo caule: maior vero est virentior, latiore folio, oleris figura. caulis etiam huius angulosus est, subruber, cubiti altitudine, à medio vsque ad verticem tenui semine circumdatus, radicibus nititur teneris, multis, hirsutis, albis, digiti crassitudine.

Arum, quod Lupha à syris vocatur, folia emittit dracōtij foliis similia: minora tamē, & maculis minus distincta. caule dodrantalem fert, subfuluū: pistilli specie: in quo croci sapore fructus est. radix alba, ad dracunculi radicem accedēs. quæ quoniam minus acris est, ideo elixa estur. sale conduntur folia, & vesca fiunt. per se etiam siccata, elixa comeduntur.

Artemisia plerunque in maritimis locis nascitur. herba est fruticosa, absinthio similis: sed maiora pinguioræque ei sunt

L I B E R

folia: estque eius altera virens, foliis latioribus, itemque ramulis: altera tenuior, exiguo flore, albo, graui odore. æstate autem floret. Nonnulli vero in mediterraneis locis nascentem herbulam ramis tenuioribus, singulari caule, admodum exiguum, flore refertam tenui, cuius color ceræ similis est, artemisiā appellant: est enim hæc odoratior, quā superior.

Asarum folia habet, hederæ similia: sed multo minora, & rotundiora. flores inter folia ad radicem purpureum alterco, aut cytino similem: in quibus semen est acino simile. radicibus innititur multis, geniculatis, tenuibus, latis, gramine similibus: sed multo gracilioribus, & odoratis, & calfacientibus, & linguam mordentibus. nascitur montibus vmbiferis, plurimum vero in ponto, & in Phrygia, & Illyride, & Iustinis Italiæ montibus.

Asclepias ramulos longos emittit, in quibus folia sunt hederæ similia. radices habet multas, tenues, odoratas, flores grauis odoris: semē, quale est pelecini. in montibus nascitur.

Ascyron, quod androsēmon quidam vocant, hyperici est species, magnitudine differens, ramulis maioribus, fruticosius, & puniceum. flores luteos profert, fructum hyperico similem, odore resinæ: cuius attritu digiti fere cruentantur: ut vel ob hanc causam ἀνδροσαίμων sit vocatum.

Aspalathus probatur, qui grauis est, quisque detracto cortice rubescit, aut purpurascit: densusque est, odoratus gustu amarescens. Est & aliud eius genus albū, lignosum, inodorum: quod etiam deterius censetur.

Asplenū, sunt qui scolopendrium, qui hemioniū, sunt etiā qui pteryga vocant. habet autem folia scolopendræ animalii similia, eaque plura, & ab vna radice prodeuntia. in petris, & parietibus siliceis, & opacis, caule, floribus, fructu vacanti nascuntur. incisuris vero ut polypodium, distincta sunt: subflaua inferius, & hirsuta: at superius viridia.

Astragalus frutex in terra est, foliis & ramulis ciceri similibus: floribus purpureis, paruisque. radix ei subest rotunda, grandis raphani modo. adnatas appendices firmas habet, itemque nigras, durissimas, ut cornua inter se implicatas, gustuque adstringentes. nascitur locis vento perflatis, niualibusque. copiose in Phæneo Arcadiæ provenit.

Aster atticus, aut bubonium, ramulus est lignosus, in quo summo

summo flos est luteus, qualis est anthemidis. capitulum vndique diuisum. foliola quoque habet stellæ similia. folia vero quæ circa caulem sunt, oblonga sunt, atque hirsuta.

Asphaltus, hoc est bitumē, præstat cæteris Iudaicum. probatum autem est, quod purpuræ modo splendet, odore intento, & graue. nigrum vero, & sordidum, prauum est. adulteratur pice admixta. Nascitur in Phœnice, & Sidone, & Babylonia, & Zacyntho. Vocatur etiam quoddam bitumē nēpta, aut aphtha: estque id quod ex bitumine Babylonio excolatum est, colore candido. quin nigrum etiam inuenitur, quod vim ignium rapacem habet, ita vt per interualla ipsos arripiat. Valet hoc ad suffusiones, & albugines oculorum.

Atractylis, aut cnicus agrestis, spina est cnico similis: multo autem minor. folia in summo ramulo habet. magna ex parte nuda est. ea fœminæ pro fulis vtuntur. habet etiā comam in summo aculeatam. flos pallidus est: radixque tenuis.

B

Balaustium est agrestis punici flos. eius multa sunt genera: siquidem & album, & purpureum, & rosei coloris inuenitur. est autem cytino punici simile. exprimitur ex eo succus, vt hypocystis, & cytinus.

Baccaris herba est odorata, quæ coronamentis inditur: cuius aspera sunt folia, caulis angulosus, dodrantis altitudine, subasper, adnata etiam habens. flos ei est purpureus, albicans: radices nigro cinnamomo similes. amat autem aspera, & squalida loca.

Balanos, id est glans vnguentaria, fructus est arboris, quæ myricæ est similis: qui fructus auellane nuci, quæ ponticam vocant, est æqualis. cuius interior pars expressa humorem, vt amara amygdala, ex se mittit: quo ad preciosa vnguenta vtuntur pro oleo. nascitur in Aethiopia, & Aegypto, & Arabia, & ad Petram Iudeæ oppidum. excellit bonitate quæ recens est, plena, alba, cui facile cortex detrahitur.

Ballote, ab aliis nigrum marrubium vocatur. caules quadratos ex se mittit nigros, subhirsutos, ab vna radice permultos: folia habet marrubij, sed maiora, & rotundiora, nigra, & hispida, ex interuallis in caule disposita, apiastro similia, fœdi odoris. quam ob rem hanc nonnulli apiastrū appellauerūt. flores quoque in rotæ speciē caules circūplectuntur,

L I B E R

Batos Idæa, id est rubus, hoc nomen inuenit, quia plurima eius copia in Ida nascitur, estque hic rubus multo tenerior, quam caninus, spinasque paruas habet. atque spinis vacans inuenitur.

Batrachion, id est ranunculum appellant quidam agreste apium. huius genera sunt plura. vnum enim coriandri habet folia, latiora tamen, & subalba, & pinguis: florem luteum, quandoque purpureum: caulem non crassum, ad cubiti altitudinem, cui radix alba, & longa adiuncta est: quæ ellebori modo appendices habet. nascitur secundum aquarum decursus.

Secundum genus est geniculosius, & longiorem habet caulem, & pluribus foliorum sectionibus: atque acerrimum.

Tertium vero est admodum exiguum, molesti odoris, aurei floris: cui accedit etiam quartum eidem simile, sed lacteo flore.

Bdellium est arboris Arabicæ lachryma. probatum autem est, quod gustu amarum est, translucidum ad glutinis taurini modum, interius pingue, facile mollescens, lignorum & sordium expers, in suffitu odoratum, vngui simile. Est autem quoddam sordidum & nigrum, in offas conuolutum, aspalathi odore, quod ex India aduehitur. ex Petraea quoque Arabia resinofum, & liuescens affertur, bonitate inferius. Adulteratur gummi admixtione. quodque tale est, non ita amarescit in gustu, nec ita odoratum in suffitu est.

Betonica herba est, cuius caulis est quadratus, tenuis, altitudine cubiti, & aliquando maior: folia longa, mollia, quercui similia, quorum ambitus incisuris diuisus est, odorata: quæque ad radicem sita sunt, maiora. in summo autem caule semen est satyrii modo spicatum. Huius folia legenda sunt, & siccanda: quorum etiam frequentior est usus. radicibus tenuibus, ut veratrum, innititur.

Beranica, aut Veronica herba est, quæ syluestris lapathi habet folia, sed nigriora, & hispidiora, gustum adstringentia. caulem non magnum producit: radicem vero exilem, & breuem. succus ex foliis exprimitur, qui ad solem, & ad ignem cogitur.

Bechion, hoc est tusilago, folia habet hederæ, sed maiora, sex aut septem à radice prodeuntia, inferius alba, superius virentia, in angulos multos abeuntia. caulis est dodrantis
alti.

altitudine. flos pallidus, verno tempore: sed quamprimum & flores, & caulem amittit. radix tenuis est. nascitur prope aquarum scaturigines, & rigua loca.

Bulbus, qui ad ciendum vomitum accommodatus dicitur, folia habet corrigi modo lentiora, & multo longiora, quam is, qui edendo est: radicem vero illi similem: circa quam niger est cortex. hæc per se in cibo sumpta, & item eius decoctum potui datum, vomitus mouet.

Botrys tota est lutei coloris herba, & in multas alas sparsa. semē totis ramulis adnascitur. folia habet cichorio equalia. tota suauem odorem spirat. & ideo vestibus immiscetur. nascitur præcipue circa profluentes aquas, & torrentes.

Buglossum est verbasco simile. folium humi sparsum, asperius, nigrius, & minus, bouis lingue simile.

Bunio, sunt qui ætion vocent. Napus caule quadratū, oblongum, crassitudine digiti emittit. folia fert apij similia: sed multo tenuiora, coriandris proxima. flos vt anethinus. semen odoratum est, alterco minus.

Butyrum probatum ex pinguisimo lacte, quale est lac pecudum, conficitur. ex caprino quoque fit in vasis agitato: quo motu quod pingue est, à reliquo lacte secernitur. Fuligo etiam ex butyro, colligitur hoc modo. butyrum in lucernam nouā infunde, accēde: vas obtura fictili, angusto, quod superne fistulæ formā, inferne vero foramē habeat, vt clibanus: idque finito ardere. vbi primum butyrum absumptū fuerit, aliud affunde: idque facito, vsque dum tantum fuliginis quantum volueris effectum sit. penna postea deradito, atque vtilior.

Buphthalmion caules profert teneros, folia fœniculo similia, flores luteos, anthemide maiores, oculi similitudine: unde etiam nomen inuenit. nascitur circa vrbes.

Brabe herba est cubiti altitudine, tenues ramos, multosq; spargens: & ex utroque latere folia, ceu lepidij: sed molliora: & candidiora. in summo umbellam gerit sambuci figura. in qua candidi flores insunt.

Brathy, hoc est herba sabina, duorum generum est: alterū foliis cupressi simile, spinosius tamen, grauioris odoris, & acre, feruidęque nature. curta est hæc arbor, & in latitudinē magis effunditur: cuiusque foliis ad suffitus nonnulli vtuntur. alterum vero genus est myricæ foliis simile.

B

LIBER

Bryon, vel splanchnon, id est muscus in arboribus cedro, populo alba, & quercu inuenitur. cæteris præstat cedrinus, viridis, montanus. secundo loco censetur is, qui ex alba colligitur populo, ex quo etiam probatur is, qui odoratus, albusque est: nigricans vero est deterior.

Bryon marinum nascitur in lapidibus, & piscium testis prope mare, capillaceum, gracile, caulis expers, egregia ad stringendi vi præditum.

Bryopteris nascitur in muscosis vetustarum quercuum partibus, filici similis: sed multo minoribus foliorum incisuris. radices habet implicitas, hirsutas, sapore cum dulci, acerbo.

Γ

Gallium, sunt qui gallarium vocent, eo quod γάλα, id est lac instar coaguli cogat, ramulum & folium aparinæ simillimum habet: sed rectum, & in eo summo flos luteus, tenuis, densus, multi odoris infidet, nascitur in palustribus locis.

Galiopsis, aut galeobdolon, totus frutex cum caule, & foliis vrticæ est similis: sed leuiora sunt folia, & in attritu valde grauis odoris: flores tenues & purpurei, nascitur circa sepes, ædificia, & semitas vbique.

Gentianæ folia, quæ ad radicem sunt, iuglandi nuci, aut plantagini sunt similia, colore subrubra. quæ vero in medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paululû dissecta. caulis est vacuus, cauus, digiti crassitudine: altitudine binû cubitorû: geniculis interceptus: ex maioribus intervallis foliis circumdatus. semen habet in folliculis latum, leuem, glumosum, quod ad spondylii seminis similitudinem accedit: radicem vero longam, aristolochiæ similem, crassam, amarâque, nascitur in celissimis montium verticibus, itemque umbrosis locis, & aquosis. Succus autem ex radice ad hunc modum exprimitur. confusa radix quinque diebus in aqua maceratur: tum ex aqua decoquitur, donec radices superstant. vbi aqua refrigit, linteo excolatur: & coquitur donec ad mellis consistentiam redigatur: & in testaceo vase reponitur.

Geranium folia dissecta anemonæ similia habet: verum longiora. radix ei rotunda est, & cum estur, dulcis.

Glancium succus est herbæ ad Hierapolin Syriæ urbem enascentis. habet folia cornuti papaueris foliis similia: sed pinguiora, & humi depressa, grauis odoris, gustanti amara.

succo

succo
olla co
cescane
refriger
pio adit
Glauc
fena pa
n: prod
res purp
mare.
Gleuc
citur ex
tha, aspa
vinacens
triginta
reponitur
Glycyrr
paciocia
bet cubit
guia, & t
ctas pilu
quas hab
longis, l
bus, vt e
Glycyrr
drantur
genera
sunt folia
dalis simi
acius pur
purpurea
dine, dnt
Formosa
aut oñm
Gleuc
calfacit
trahit
mone
sus ex
ex vino

succo abundat, qui crocei coloris est. Eius folia incolæ in ollâ coniecta in furnis semicalidis calfaciunt, vsquedum flacescant: tum contundunt, succumque exprimunt, qui quoniâ refrigerandi vim habet, ad oculorum medicinas in principio adhibetur.

Glauz cytiso, aut lenticulę folia habet similia: quorū inferna pars candidior, viridis superna. ramuli quini, aut seni prodeunt è terra, tenues, ab radice dodrantem alti, flores purpurei, vt albę violę, sed minores. nascitur prope mare.

Glucinum, hoc est musteum vnguentum simplex conficitur ex omphacino oleo, iunco, calamo, nardo celtico, spatha, aspalatho, fertula campana, costo, & musto, circumdato vinaceis vase, quod aromata, vinum, & oleum contineat. triginta diebus bis in die mouetur: tum expressum oleum reponitur.

Glycyrrhiza, hoc est dulcis radix, nascitur plurima in Capadocia & Ponto, brevis frutex est, ramulosque duum habet cubitorū, in quibus folia densa sunt, lentisco similia, pingua, & tangenti glutinosa, flos ei similis hyacintho est, fructus pilularum platani magnitudine, sed asperior: qui siliquas habet, vt lenticula, ruffas, & longas, radicibus innititur longis, buxei coloris, vt gëtiana: subacerbis, dulcibus: è quibus, vt ex lycio, succus exprimitur.

Glycyfis, id est præonia, caule nascitur fere duorum dodrantum altitudine, multa habens adnata. Huius duo sunt genera. mas, folia regie nucis similia fert: fœminę diuisa sunt folia, vt smyrnio. summo caule siliquas emitit amygdalis similes: in quibus apertis rubentia grana exigua, multa acinis puniceorū similia, & in medio nigra, quinque aut sex purpurea inueniuntur. Radix maris tenuis est, digiti crassitudine, dodrantis vero longitudine, gustu adstringens, alba. Fœminę vero radicibus appendiculę, ceu glandes, septem aut octo inhaerent, vt in asphodelo cernitur.

Glechon, id est pulegiū, herba est nota omnibus. attenuat, calfacit, concoquit, potui data menses, secundas, & fœtus extrahit. pulegium autem cum melle & aloë potum ex pulmone educit. cōuulsis auxiliatur. nauseas & stomachi morsus ex posca permulcet. nigram bilem per aluum euacuat, ex vino epotum venenatorum ictibus subuenit. naribus

L I B E R

cum aceto admotum eos, quos defecit animus, reuocat. siccatum, tritum, combustumque gingiuas confirmat. Inflammationes omnes cum polenta emplastri modo superdata lenit. podagris subuenit per se impositum, vsquedum rubescat locus. cum cerato varos extinguit. splenetis quoque cum sale illitum prodest. pruritus eius decocto lauando sedantur. in infestationibus denique ad inflationes, duritias, & conuersiones vuluæ est accommodatum.

Gnaphalium. huius foliis, quæ alba, & mollia sunt, quidam pro tomento vtuntur. quæ quidem folia ex vino austero pota ad dysenteriam sunt efficacia.

Gogyale, id est rapum. huius radix decocta alit, inflat, flaccidas carnes creat, venerem stimulat. eiusdem asparagi decocti in cibo sumpti vrinam cient. semen antidotis & theriacis, quæ leuando dolori sunt, inditur. sed syluestre rapum in agris nascitur, frutexque est cubiti altitudine, ramis refertus: in summo læuis, & folia item læuia: digiti crassitudine, aut maiora: semen in calyculatis siliquis fert. cumque ea inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua visitur ad capitis figuram accedens: quo semina parua nigra continentur: quæ cum franguntur, alba intus sunt.

Δ

Daucus, Creticus scæniculo similia habet folia, sed minor, tenuioraque, caulem dodrantis, umbellam coriandro similem flores albos: in quibus acer inest fructus, albusque & hirsutus: suauis odoris in mandendo. radix digiti crassitudine, & dodrantis longitudine est. nascitur saxosis, & apricis locis. Alter etiam est agresti apio similis: aromaticus, acer, odoratusque, & gustui feruens: sed Creticus est præstantior. Tertium porro genus est folio coriandri, albo flore: capite & fructu anethi similibus: habetque erraticæ pastinacæ umbellam, oblongi seminis, vt cumini, acrisque plenam.

Daphne, id est laurus, quædā tenui folio, quædam latiore constat. vtraque calfaciendi, & molliendi vim habet. quocirca decoctum earum insidendo vuluæ, & vesicæ affectionibus conuenit. folia virentia leuiter adstringunt. trita atque illita vesparum, atque apum ictibus medentur. eadem quoque cum pane aut polenta superdata inflammationes cunctas leniunt. pota vero stomachum subuertunt, & vomitus cient.

Daphne

Daphne, hoc est laurus Alexandrina folia rusco similia, sed maiora, & molliora, & candidiora habet. fructum in mediis fert rubrum, ciceris magnitudine. ramulos humi spargit dodrantes, aut etiam maiores, radix ei rusco similis est: sed maior, odorataque, & mollior, nascitur montanis locis.

Daphnoides frutex exiguus est, cubitalis, ramos habet multos à medio in superiorem partem corrigie modo flexiles: in quibus insunt folia. eorum ramulorum cortex est egregie glutinosus, folia lauri, molliora, gracilioraque, & fractu facilia. quorum gustatu os & fauces mordentur, atque inceduntur. flores candidi, bacca nigra, ubi matura est. radix inutilis, nascitur locis montanis.

Delphinium, sunt qui diachrysin, qui hyacinthum vocant: ramos ab una radice duorum dodrantum longitudine, & aliquando maiores emittit: in quibus foliola diuisa, tenera, oblonga visuntur, delphini formam referentia, unde ei nomen est datum. flos similis albe violæ est, purpureoque colore. semen in siliquis milio simile continetur. Alterum quoque delphinium est, quod superiori est simile, sed ramos, foliaque habet multo, quam superius, graciliora.

Dictamnium sunt qui agreste pulegium vocent. Cretensis herba est, acris, levis, pulegio similis: sed foliis maioribus, quæ tomæto & lanosa pube sunt obducta. ea neque florem, neque fructum fert. facit ad omnia, ad quæ satiuum pulegium, sed efficacius. Quod vero falsum dictamnium vocant, plerisque locis nascitur antedicto simile: sed minus acre est, & non æque efficax. Affertur etiam ex Creta aliud dictamni genus, foliis sisymbrij, ramis maioribus, in quibus flos insidet origano sylvestri similis, niger, & mollis: odor foliorum medius inter sisymbrium & saluam est iucundissimus.

Dipsacon, id est labrum veneris, inter aculeatas referunt. caulem habet excelsum, aculeatumque, folia caulem completentia lactuæ similia, in singulis geniculis bina oblonga, ceu bullas quasdam intus & extra in medio dorso aculeatas habentia. concauo, qua se in geniculis coniungunt, sinu, quo rores & pluuie continentur: unde etiam *Διψακον*, id est sitientis nomen inuenit. in cacumine caulis singula capitula furculis insunt, oblonga, spinosa, echino similia: quæ cum aruerunt, candida videntur. habet & capitula illa diuisa vermiculos in media medulla.

L I B E R

Dorycnium Cratenas halicacabum, aut caleam vocat. frutex est oleæ nuper prodeunti similis. ramulos habet cubito breviores. nascitur in petris non procul à mari. foliis oleæ similibus colore, minoribus tamen, firmioribus, & valde scabris: flore candido, in cacumine siliquis, vt ciceris, densis, in quibus exigua semina quinque aut sex insunt, rotunda, exigui erui magnitudine, leuia, firma, varia. radix ad digiti crassitudinem, & cubiti longitudinem accedit.

Dracunculum magnū aliqui aron, aliqui isaron appellāt. nascitur is vmbrosis locis circa sepes. caulem habet læuem, rectum, fere duorum cubitorum, ad baculi crassitudinē: pro tempore versicolore, vt angui similis videatur. vincunt tamen in eo purpureæ maculæ. folia instar lapathi, inter sese implicita, fructum in summo caule racemosum fert, cinereo primum colore, mox vbi maturuit, croceo, puniceoque. radixq; ei satis magna est, rotūda, alba: quæ tenui cortice vestitur. Minor vero dracunculus habet hederæ folia, magna, candidis maculis insignia, caulem rectum, duum cubitorum, varium, draconis formam præ se ferentem, purpureis variegatum notis, baculi crassitudine: fructum in cacumine racemosum, colore primum felleo, cum maturuit, croceo, gustum erodentem. radicem quodam modo rotūdā, bulbi forma, aro similem: quæ tenui cortice circundatur. In sepibus, sepiisque vmbrosis nascitur.

E

Ebenus probatissima est Aethyopica, nigra, pectinum expers, leuore suo cornu laborato similis: cum frangitur, dēsa, mordens in gustu, & subadstringens: prunisque iniecta suauem odorem, & sine fumo, euaporans. recens ob pinguedinem igni admota accenditur. trita autem in cote subfulua redditur. Est etiam alia Indica, quæ internatas habet lineas candidas & fuluas, & maculas eodem modo densas. & tamen prior est præstantior. Vendunt nonnulli sesamina, aut spinea ligna pro ebena. quod vel ex eo dignoscitur, quod ea inania sunt, & in exigua fragmenta purpurei coloris cōscinduntur: nec in gustu quicquam mordent, nec in suffitu suauem ex se odorem mittunt.

Elaphoboscum, quod elaphicon, aut ophigenion vocāt, caulis est rori marino, aut fœniculo similis, & geniculatus.
folia

folia habet duorum digitorum latitudine, admodum longa, ut terebinthus, circumfracta, quodam modo aspera. quin etiam multas appendices caulis habet: quæ umbellas anetho similes ferunt. flores ei sunt sublutei, semen anetho simile: radix ad trium digitorum longitudinem, & vnius crassitudinem accedit. eaque alba est, dulcis, & vesca. caulis tener pro olere manditur.

Elatina folia habet helxinæ similia, sed longiora, rotundiora, hirsuta, ramos tenues, dodrantes, quinque, aut sex ab radice prodeuntes: plena est foliis gustui acerbis, nascitur in segetibus, & cultis locis.

Ελένιον, sunt qui symphitum nominent, folia habet verbasci angustis folijs, sed asperiora, & oblonga. Caulem aliquibus in locis non profert: radicem vero subalbidam, subfuluam, odoratam, magnam, subamaram: ex qua ad constitutiones germina liliorum & ari modo capiuntur. nascitur montanis, umbrosis, & squalidis locis. Radix autem ætate foditur, & in frusta dissecta siccatur.

Elleliphacus, hoc est saluia, frutex est oblongus, multos habens ramos, virgæque quadratas & albicantes, folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassioraque: & quæ sensim attritæ vestis modo scabra sunt, subalba, vehementer odorata, virosa, fructum in summis caulibus, ut agreste orminum, continet, locis asperis provenit.

Ελίχρυσον, quod chrysanthæmon, aut amaranthum vocant, virgula est alba, virens, recta, solida. foliis angustis per intervalla, ad abrotoni foliorum similitudinem. coma ei est in orbem acta, aureum colorem ostendens, umbellam gerit orbiculatam, veluti corymbos arescentes: radicem habet tenuem, locis asperis, & aquosis conuallibus provenit.

Elleborus albus folia plantaginis aut betæ sylvestris similia, sed breviora, nigriora, & rubri coloris fert, caulem habet palmi altitudine, cauum, & cum cœpit arescere, cortice circumuoluto. Radices ei subsunt multæ, tenues, ab exiguo capitulo, & oblongo, velut à cœpis prodeuntes, nascitur in montibus, & asperis locis. radices per messem colliguntur, præstat in hoc genere is, qui modice extentus & albus est, & friabilis, & carnosus: non acuminatum tamen, & iunceum. puluerem emittens dum frangitur: quique est medulla tenui: gustu neque admodum, neque confertim feruens, neque sa-

L I B E R

liuam proritans. nam huiusmodi strangulat. Porro principem locum tenet Cyrenaicus, siquidem qui apud Galatas, & Cappadocas nascitur, candidior, puluerulentusque est, maioremque strangulandi vim habet.

Elleborus vero niger, quem melampodium, aut polyrhizon vocant, folia habet virentia, platani similia, sed minora ad spondylii similitudinem, pluribus diuisuris incisa, nigriora, & subaspera, caulis asper. flores albi, purpurascetes, figura racemosi. semen cnico simile: quod Anticyris sesamoides vocant, ipsoque ad purgationes vtuntur. radicibus nititur tenuibus, nigris, veluti ab vno cephe capitulo dependentibus. quarum etiam vsus est. nascitur locis asperis, collibus, & siccis locis.

Ελξίνη, quam alij sideritim, vel heracliam, vel elitin vocant, nascitur in sepibus, septis, vinetis, & segetibus. folia habet mercuriali similia, hirsuta. circa caules sunt veluti semina exigua, vestibus adhaerentia.

Ελυμος, id est panicum, Μελίνη alij dicunt, inter frumentacea numeratur, estque milio similis, & pari modo ad panem conficiendum, & ad res easdem accommodatur. minus tamen nutrit, quam milium, & minus adstringit.

Epithymū est flos thymi durioris, & saturię similis. habet autem capitula tenuia, inania, caudas ad formam capillorum habentia.

Epimedium, quod πολύρριζον, id est multarū radicum herbam alij appellant, caulis est non magnus: cuius folia sunt hederæ foliis similia, eaque sunt 10. fere, aut 12. nec semen, nec florem fert. radices ei sunt tenues, nigrae, graueolētes, sapore insipidae. aquosis nascitur locis.

Epipactis, seu elleborine, paruulus frutex est: foliola habet minima: quæ contra venena, & iecoris vitia pota facit.

Erice fruticosa arbor est, myricæ similis: sed multo minor. eius florem sumentes in cibo apes mel non probum faciūt, & tamen coma, floresque serpentum ictibus medentur.

Erinum, sunt qui ocimoides nominent, nascitur prope flumina & fontes. folia ocimi, sed minora habet, & è partibus superioribus incisuris distincta, ramulos quinque, aut sex, do drantales profert. flores candidi sunt, semē fert nigrum, paruum, acerbo sapore. porro caulis & folia liquore abundant.

Ερπύλλος, id est serpyllum, duplex est, hortense, quod sam-

sampsuchi odorē refert, & coronis additur. à serpendo nomen trahit, & quod quæcunque eius pars terram contigerit, facile radices agit. folia, ramulósque origano similes, verum candidiores profert. Quod vero sylvestre est, zygísque vocatur, per terram nō serpit: sed rectum ramulos erigit surculosos, foliis refertos rutę similibus, angustioribus vero, oblongioribúsq; ac durioribus. flores habet gustanti acres, odoranti suaues, radicemque inutilem. in petris nascens efficacius est, & maiore calefaciendi vi, quā hortense, præditū.

Erysimum, aliqui chamæplion nominant, nascitur iuxta vrbes, domicilia, atque hortos. folia habet agresti ærucæ similia: cauliculos corrigiæ modo: folia lutea. in cacumine siliquas cornu forma, graciles, vt fœnum græcum, habet: in quibus exigua semina sunt, nasturtio similia, feruida gustantibus.

Erythrodanon, id est rubia, radix rubra est. ad tingendum accommodata. alteráque sylvestris est, satiuæ altera. qualis in Thebana Galileæ, & Rauennæ in Italia nascitur. In Caria vero inter oleas, vt in aruis, seritur, vtiliter autē seritur, quia magnus ex ea proventus capitur. eius caules quadrati sunt, longi, asperi, aparinæ caulibus similes: sed maiores, ac robustiores omnino: in quibus folia sunt per interualla in singulis geniculis, stellarum modo in orbem radiata. fructum fert rotundum, in primis viridem, postea cum maturuit, nigrum. radix tenuis, longa, rubráque subest.

Eryngium in genere aculeatarum plantarum est, cuius folia in principio inter cibos sale condita capiuntur. ea autem lata sunt, per ambitum aspera, & gustu aromatica. vbi augentur, spinis implentur per multas caulium eminentias: in quibus capitula quædam globosa sunt, spinis acutissimis in orbem, vt stellæ, & duris circumdata. quarum color modo viridis, modo albus, modo cœruleus inuenitur. radix oblōga, lata, nigra foris, intus candida, pollicis magnitudine: quæ est etiam suauius odoris, & aromatica. nascitur autem campestribus locis, & asperis.

Eupatorium aliqui epatorium, aliqui heparitin vocant. fruticosa herba est. virgam vnicam profert tenuem, lignosam, rectam, nigram, pilosam, cubitalem, & etiam maiorem. folia habet per interualla partibus distincta quinque fere, aliquando pluribus, quinquefolij, aut cannabis foliis similia, eadem

L I B E R

subnigra sunt, in extremitatibus ad modum ferre incisa. semen in medio caule adnascitur, subhirsutum, infra annuens: quod siccatum vestibis inhæret.

Euphorbium Lybica arbor est ferulæ speciem gerens, quæ in Atlante monte iuxta Mauritaniam acerrimo succo plena inuenitur. eius nimium feruorem timētes incolæ ouillos ventres lotos arbori circumligant, & eminus caulem hastilibus præcidūt: statimque velut ex vase quodam, copiosus succus in ventriculos effluit. ex quo etiam vulnere liquor in terram proiicitur. Huius succi duo sunt genera, alterum orobi magnitudine, pellucidum, vt farcocolla est. alterum in ventriculis vitreum, & concretum est. Adulteratur euphorbium farcocolla, & glutine admixtis. eligito quod pellucidum, ac crêque sit. nam gustu haud facile probatur. propterea quod linguæ semel admotum, linguam ita incēdit, vt cum eius feruor satis longo tempore perduret, quodcūque linguæ obiiicias, euphorbium esse videatur. inuentum autem hoc est in Libya, regnante Iuba.

Echion, aliqui aridam, aliqui alcibiadion appellant: folia habet prælonga, aspera, subalbida, anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pinguiora. spinas tenues habet adiacentes, quibus etiam folia fiunt horridula. cauliculos exiles, multos, foliolâque ab utroque latere tenuia, ad modum pennæ nigra, habet, quæ ad summum caulis cacumen accedendo, minora pro sua proportionem decrescendo fiunt. Flores fert iuxta folia purpurascens. in quibus semina capiti viperarum similia sunt. radix est digito tenuior, & nigricans.

Z.

Zea duplex est: altera simplex, vniûsque grani, altera grani duplicis: quæ binis vtriculis coniunctum semen continet. nutrit magis, quam hordeum, ori suavis: & in panes redacta minus alit, quam triticum.

Zinziber sui generis planta est, in Troglodytica Arabia plurimū nascens: cuius frōde ad multa illi, perinde ac nos ruta, vtuntur: ac primis potionibus, pulmentisque immiscent. radices habet cyperi modo paruas, albicantes, piper sapore imitantes, odoratâsque. eligito quæ tineas non senserunt. & quoniam facile computrescunt, ab aliquibus sale cōdiuntur, &

& vasculis impostę in Italiam comportantur : & ita ad v-
scendum vtiles cum salsamentis sumuntur.

H.

Hediosmos, quā mintham alij, calamintham alij vocant, cognita omnibus herba est, calfaciendi autem, adstringendęque, ac siccandi vim habet. Est etiam agrestis menta, quam mentastrum appellant, hirsutior folio, & vndecunque maiore, quam sisymbrium, & odore magis viroso nascens. & idcirco minus ad vsum sanitatis accommodatur.

Hedysarum vnguentarij pelecium vocant, frutex est foliola ciceri similia ferens: siliquę corniculorum modo inflexas; quibus rufum semen cōtinetur, securi ancipiti simile: quę res ei nomen imposuit. ęstque id amarum gustantibus.

Heliotropium maius alij scorpiuron, hoc est caudam scorpionis appellant: quod ea sit floris ipsius effigies: heliotropion vero, quod ad solis motum circumagatur. Ocimo similia habet folia: sed hirsutiora, nigriora, maioręque: ramulos ab radice tres fere, aut quatuor, aut quinque profert: ab his alas permultas: in cacumine flos candidus, subfuluus, inflexus instar caudę scorpionis. radix tenuis est, & ad nullam rem utilis. asperis vero locis nascitur.

Heliotropium minus, quod & aliqui scorpiuron vocant, iuxta lacus palustribus locis provenit. folia habet prędicto similia, rotundiora tamen. semen rotundum verrucarum instar pendens fert.

Hemeracallis, hoc est lilium sylvestre, folia & caulem habet lilio similia, viridia vero, vt porrum. flores in caule per singulos exortus terni, aut quaterni exoriuntur: lilio diuisura similes vbi dehiscere inceperint: colore admodum pallido, radici innititur permagno bulbo consimili.

Hemionitis, à quibusdam splenion dicitur, folium dracunculo simile profert, lunatū. radices ei multę, tenuęque subsunt, nec caulem, nec fructum, nec florem fert. nascitur saxosis locis. adstringenti gustu est prędita.

Ηερύρεον, hoc est senecio, quam erechthitem aliqui vocāt, est cauliculus cubitalis, subruber, foliis continuis, in summitatibus erucae modo diuisis: sed multo minoribus, luteis floribus: qui celeriter dehiscunt, & in pappos euanescent. atque ex eo nomen traxit, quod flores vere more capillorum

canescant. radix eius inutilis. nascitur præcipue in aggeribus murorum, & circa oppida.

⊙

Thalitrum coriandro similia habet folia, pinguiora tamē: cauliculum rutę crassitudine: in quo sunt folia: quę concisa & superdata diuturna ad vlcera cicatricę perducūt. nascitur potissimum in campestribus.

Thlaspi, sunt qui thlaspidion vocent, exigua herba est, angustis foliis, digiti longitudine, in terram versis, in summo diuisis, subpinguibus: caule tenui, duorum dodrantum altitudine, in quo pauci exortus sunt: circa caulem fructus est in summo modice latus: in quo semen est simile nasturcio, ad di sci formam veluti infractum, ex quo ei nomen est ductum. flos albus est: semen acre. nascitur in semitis, sepibus, & septis.

Thelipteris à quibusdam nymphæa pteris dicitur, ea habet folia filici similia: non singulari vt illa pediculo fulta, sed multis, hisque altioribus adgnationibus. radices subsunt longę, latę, plures. & in nigro colore subflauę: & quędam etiam rubrę inueniuntur.

Thymelæa, quę à quibusdam chamælæa dicitur, est ex qua Cnidium granum colligitur. virgas autē ex se pulchras, multasque emittit, fere bicubiti longitudine. folia habet chamælæa similia: nisi quod angustiora, pinguioręque hac sunt, viscosa, glutinosęque mandendo. flores fert candidos, in quibus fructus est exiguus, rotundusque, myrto similis, in initio viridis, mox rubens: operimentum durum, & nigrum: interna vero pars, candida.

Thymbra hoc est satureia, nota omnibus herba est, tenui & aspero solo nascens: thymo similis, veruntamen minor, & magis tenera. spicam flore plenam, & viridi colore fert. eadē potest quę thymum, eodem sumpta modo. aptus eius ad sanitatem vsus. Est etiam quędam satiua, siluestris omnino minor. sed quia tantam acrimoniam non habet, ideo est ad vescendum accommodatior.

Thymum quidam cephaloton, quidam epithymum vocāt. Frutex omnibus notus exiguus, furculosus, foliolis multis, & angustis interceptus: in cacumine capitula floris purpurascētis habens. gracili solo, & petroso nascitur.

Iberis

I

Iberis folia habet nasturcio similia, vere magis florentia. longitudo eius est cubiti, aut minor. incultis locis nascitur. lacteum florem æstate profert: atque eo tempore est efficacior. binas præterea radices nasturcio similes habet.

Idæa radix folia habet rusco similia, his adherent velut exigui pampini: in quibus flos est.

Ιεράκιον τὸ μέγα, maius hieracium, hoc est erratica lactuca, aspero, rubente, spinoso, & concavo caule est: foliis ex intervallo rariuscule diuisis, similibus soncho per ambitū. in oblongis eius capitulis flos luteus continetur. Minus vero hieracium, quod sonchitè aliqui vocant, folia habet per intervalla diuisa in ambitu: cauliculos teneros, virentesq; emittit, in quibus flores lutei circulum describunt.

Ιππομαθρον, quod alij μαθρον ἄγριον, id est agreste feniculū vocant, magnū est. semē fert cachry simile. radix odorata est.

Ιπποσίλιον vero, hoc est olus atrum, hortensi apio maius est & candidus. caulem habet cauum, excelsum, tenerum, & quasi lineis intersectum. folia latiora in puniceum vergentia, libanotidis comam, floris plenam corymborum modo, antequam floreat, concretam. eius semen nigrum, longum, solidū, acre, aromatum odorem referens: radix odorata, alba, origrata, non crassa. nascitur in umbrosis, & palustribus.

Ιππόγλωσσον, exiguus frutex est, foliis sylvestri, tenuique myrto similibus: coma aculeata: & in summo veluti lingulis secus folia exeuntibus.

Ιπποφαῖς, quod hippophies aliqui, id est lappaginē vocāt, qua fullones vestes poliunt, in arenosis, maritimisque nascitur locis. furculosus frutex est, densus, frondosus, foliis longioribus, ut oliua, angustioribus tamē, & tenuioribus: inter quæ albicantes spinæ siccae, angulose, intervallo quodam diducte emicant. flores hederæ corymbis similes, ceu racemi inter se adiacent. sunt tamen minores & molles, candidi, ex parte rubescentes. radix crassa, & mollis succi plena, gustanti amara. ex qua nō secus, quā ex thapsia succus exprimitur, qui cū crui farina subactus siccatur, atque reponitur.

Ιππόφαιον, sunt qui hoc quoq; hippophaēs esse velint, nascitur iisdem, quibus hippophaēs, locis. estque fullonū spinæ enus. serpit autē humi, foliolaque tantum parua, & capitula

L I B E R

inania habet. hæc caulis & floris expers est: radix ei subest crassa, mollisque.

Ixopis, id est cauda equina, nascitur aquosis locis, & fossis, cauliculos inanes habet, subasperos, solidos, geniculis interceptos, in vicem insertos, circa quos folia sunt iuncorū figura densa, graciliūque, in sublime autem tollitur, vicinos arborum caudices ascendēs, pendetque ex eis circumplexa multis, nigrisque comis, ceu cauda equina, radix ei lignosa, duraque est. Est & aliud equisetum, comas ex interuallo habens breuiiores, candidiores, & molliores.

Ixos, id est viscum optimum est recens, quod intus porri colorem habet, foris vero flauescit. in quo nihil asperum, aut furfuraceum sit, sit acinis in quercu nascētibz, foliis buxo similibus, tunditur fructus, tum lauatur, deinde in aqua decoquitur, quidam etiam commanducando viscum conficiunt. Gignitur quoque in pomo, piro, & aliis plerisque arboribus, atque etiam in quorundam fruticum radicibus inuenitur.

Ios, hoc est viola purpurea foliis est minoribus, tenuioribusque; quā hederā, nigrioribus itē, & non dissimilibus, caulis medius inter folia ab radice prodit. in eo est flosculus suauicolens, purpureus, vmbrosis hæc & asperis locis enascitur.

Iris ab aliquibus Illyrica, ab aliis vrania nominatur, folia habet gladiolæ herbæ similia: sed maiora, latiora, pinguiorāque: flores in summis caulibus altero situ incuruos, variōsq;: siquidē cādidi, vel pallētes, vel nigri, vel pupurei, vel cærulei conspiciuntur: ob quam colorum varietatē ad cælestis iridis imaginem nomen hoc inuenit. radicibus nititur geniculatis, solidis, odoratis, quę in partes dissectæ, & in vmbra siccatæ, tum funiculo traiectæ reconduntur. Probatissima iris est Illyrica, & Macedonica, inter has præstantior est, quæ quasi decurtatam, ac densam habet radicem: frāgenti contumax, colore subfuluo, valde odorata, gustui feruida, siacero odore, nullum situm redolēte: quæ cum tūditur, sternutamenta cieat, secundo loco censetur Libyca, colore candida, gustu amara, ceterum omnes, cum inueterarint, à tineis tentantur: sed tum odoratiores fiunt,

Ifatis satiuā herba est, qua tingendis lanis insectores vtuntur, folia plātaginis habet, pinguiora tamē, & nigriora, caulis cubitum excedit, syluestris vero ifatis est satiuæ similis, folia tantum

tantur
que ca
in quo
pendat
nuētiq
Ilop
cumine
tur, cap
melanti

Calar
ocimi
poreum
quare n
proxim
uelit est
nam su
tu valde
peru, &

Cala
fuluus, e
fistulis
candū
Cāt
similes
altitud
griora
ro & ra

Cap
mili, va
cuerice
Cap
qui cap
rūteru
nei ma
cādidi

uenire
rubēti
habet
sulis i

tantum habet maiora, ad lactuæ foliorum similitudinē: itēque caules tenuiores, multis diuisionibus refertos, rubescētes: in quorum cacumine veluti folliculi instar linguarum multi, pendulique habentur: quibus semen continetur. luteum, tenuemque florem profert.

Isopyron, sunt qui phasiolon nominēt, quia in summo cacumine folium eius more phasiolorum in clauiculas torquetur. capitula in summo sunt tenuia, plena seminis exigui, quod melanthij gustum præ se fert.

K

Calamintha, id est nepita, quædam montana est, habetque ocimi folia, subalbida, ramulos & surculos angulosos, & purpureum florem: quædā vero est similis pulegio, maior tamē. quare nonnulli eam agreste pulegium vocarunt: quia odore proxime ad ipsum accedit, tertium denique genus mentæ syluestri est simile, foliis longioribus, caule & ramis maioribus quam supra dictæ, sed minus efficacibus. omnium folia gustu valde feruentia, & acria. radix inutilis. campestribus, asperis, & humentibus locis enascitur.

Calamus aromaticus in India prouenit: probatissimus est fuluus, crebris geniculis refertus. qui in assulas multas frāgitur fistulis aranearum plenis, subcandidus: & inter commanducandum glutinosus, adstringens, subacer, amarus.

Cānabis, ab aliquibus hydraestina vocatur, virgulas althææ similes profert, minores tamen, nigriores, asperiores, cubiti altitudine, folia habet satiuę similia, verum asperiora, & nigriora. flores ei sunt rubescētes, Lychnidi similes, semen vero & radices althææ.

Capnos, id est fumaria, herbula est fruticosa, coriandro similis, valde tenera, foliis candidioribus, vndique numerosis, cinericei coloris, flore purpureo.

Capparis, sunt qui cynosbaton, hoc est sentem canis, sunt qui capriam vocent, aculeatus frutex est qui per terram in gyrū sternitur. hamatas spinas, vt rubus habet: folia rotūda coto nei mali foliis similia, fructū oliuæ figura: qui dehiscēs florem cādīdū promit: quo cadente quiddā velut oblonga glans inuenitur: quod apertum grana acinis puniceorū similia, exigua, rubētīaq; ostēdit. radices lignosas, magnasque & numerosas habet, nascitur vt plurimū asperis locis, & tenui solo, & in insulis iuxta domicilia. caulis & fructus ad cibū sale cōdiūtur.

Cardamomum probatissimum est, quod ex Comagene, Armenia, & Bosphoro aduehitur. prouenit etiam in India, & Arabia. eligito quod difficulter frangitur, quod plenum, praelusumque sit: (nam quod huiusmodi non est, intempestiuum est) quodque odore sensum feriat, gustuque acre sit ac subamarum,

Cassia complura sunt genera, quæ in Arabia odorifera nascuntur. habet cassia virgam crassi corticis, piperis folium. eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corallij similis, perquam angusta, longa, crassa, fistularum plena, gustum mordens, adstringens cum multo seruore coniuncto, aromatica, odorēque vini referēs, qualis est, quæ ab incolis achy, ab Alexandrinis vero mercatoribus daphnitis appellatur. hanc autē antecellit nigra, quæque purpurascit, & crassa est, Zigir nominata, rosarū odore: cuius vsus in medicina est præcipuus. secundum locum tenet antedicta. tertia est, quæ mosyleticus blastus nominatur. reliquæ viles sunt.

Caucalis ab aliquibus myritis, à Democrito bryon quasi muscus dicitur. dodrantalis est cauliculus, aut etiam maior, lenitèrque hispidus: foliis apio similibus, & ad sceniculi similitudinem per extrema multifidis, & hirsutis. candida vero umbella in cacumine est, odore suauis.

Cedrus arbor est grandis, ex qua cedria colligitur. iuniperi modo baccas fert rotundas, ad myrtæ baccæ magnitudinē. Cæterum præstantissima cedria est, quæ crassa, perlucidaque est, & graui odore: quæque dum effunditur, guttis sese continet, nec diffluit.

Centaurium maius est, & minus. ac maius quidem folia habet iuglandis, oblonga, colore virenti, vt brassica, serrata in ambitu. caulem, ceu lapathum, duorum, triumve cubitorum: multa ab radice adnata: in quibus capita papaueris similia, teretia. florem cæruleum profert, fructum cnico similem, floribus veluti floccis quibusdam laneis inuolutum. radix eius crassa, solida, grauisque est, & binos cubitos excedit: succi plena est, sapore acri, cum adstrictione, & dulcedine quadam: rubescens. solum vero pingue & apricum, syluasque ac colles diligit, abundat in Lycia, Peloponeso, Helide, Arcadia, Messene, ac pluribus circa Pholoen, Lyciam, ac Smyrnam locis.

Centaurium vero minus herba est hyperico, aut origano similis.

milis. caulem habet palmo altiore, angulosum, flores in puniceo Lychnidis colore purpurascens: folia parua, prelonga, vt ruta: fructum tritico similem: radicem exigua, nulliusque vsus.

Cepæa herba portulacæ similis est, nigriora tamen habet folia. radix ei tenuis subest.

Cinnamomi genera sunt multa, quæ à patria, in qua oriuntur, nominantur. omnibus vero præstat, quod mosylicum dicunt, quod casie, quæ mosyletica appellatur, aliquam similitudinem gerat: & in hoc ipso genere, recens, colore nigro, ex vino in cinereum vergens, tenuibus virgulis, læue, frequentibus nodis cinctum, odoratissimū. ac fere optimi temperaturæ ex suavis odoris proprietate constat. siquidem in optimo quoque, & quod verum propriūque sit, odor rutæ, cardamomove similis inuenitur.

Circæa, quam & dircæam aliqui vocant, folia habet hortensis solani, multa adnata, flores paruos, nigros, multos: fructū in quibusdam veluti corniculis milio similem: radices palmi longitudine, ternas, aut quaternas, candidas, odore præstātes.

Cistus frutex est saxosis locis exorians, ramosus, foliosus, non procerus, foliis rotundis, acerbis, hirsutis. flore puniceæ figuræ, sed in fœmina, colore candido.

Cissus, hoc est hedera, multas habet differentias speciei ratione, sed præcipuas tantum tres. quarum vna dicitur, alba, altera nigra, tertia helix. candida fructum candidum fert, nigra nigrum, aut croci emulum, quam etiam vulgus dionysiā vocat. helix fructum non edit: sed tenues habet palmites, foliaque parua, angulosa, & rubra.

Clematis læto solo prouenit, viticulas exiguas spargit, iunci crassitudine, folio breui, lauro simile colore, figuræque, sed multo minore. Altera vero clematis vitieulam emittit rubentem, lentam, folium gustanti acerrimum, & exulcerans. circūuoluitur arboribus, vt smilax.

Clinopodium frutex surculosus est, duorum palmorum, in petris nascens, foliis serpilli similibus, floribus ad pedum lecti similitudinem, & per interualla marrubij modo dispositis.

Clymenō caule quadratum fert, fabaceo cauli simile: folia habet plātaginis, folliculos in caule inter se anuētes, iridi, aut polyporū cyrris similes. montanū autem est præstantissimum

L I B E R

Cnicus oblonga folia, diuisa, aspera, referta spinis habet, caulésque dodrantes:capitulo magnitudine grandis oliuæ, flore croco per similis, semine cádido & ruffo, lógo, anguloso.

Colchicum, quod ephemerum aliqui nominant, florem albicantem crocino similem sub finem autumnii profert. postea vero folia producit bulbo similia, sed pinguiora: caulem dodrantalé, fuluum fructū continentē. radix eius corticē habet in nigro fuluescentem. ea nudata cortice alba, tenera, succique plena & dulcis inuenitur. habet bulbus in medio fissurā ex qua flos prodit. nascitur plurimū in Messenia, & Colchis.

Colocynthis viticulas, foliaque diuisa satiuo cucumeri similia per terrā spargit. fructū fert rotundum, globo medio-cri similem, amarissimum: qui colligendus est, cum vergere ad pallidiorem incipit.

Comarus, id est arbutus cotoneæ malo est similis. folia tenuia, fructum prunorū magnitudine sine nucleis habet, quē mæmecylon vocant: subfuluo, aut rubente in maturitate colore. is cum manditur, veluti acus palearum linguæ & dentibus affert. estque alienū stomacho, & capitis dolorē gignit.

Condrilla, quam alij serin vocant, caulem, flores, & folia habet cichorio similia. ideoque agrestis intybi speciem aliqui eam esse dixerunt: sed est tota tenuior. in huius ramulis gummi simile mastiches, fabæ magnitudine inuenitur.

Conyza, quæ & ischys, & danais à quibusdā dicitur, altera est, quæ parua dicitur, estque odoratio. altera maior frutice, foliisque latioribus, & graui odore minorē superans. vtriusque folia oliuæ similia sunt, hirsuta, pingua. altitudo caulis in maiore, est duum cubitorū: in minore pedis. flos squalidus, luteus, suba maris: qui in pappos euanesceit. radix ad nullum vsum accommodata.

Est & tertiū conyzæ genus, cuius caulis crassior, molliorque est. foliis tamē maioribus, quā gracilis: & minoribus, quā maior hæc autē pinguis nō est, multo tamē grauiore odore, inuicūdioreque, & minus efficax: eaque humētibus prouenit locis.

Coriandrum, quod etiam hypericon vocant, folia habet erices foliis similia, sed minora, pinguiora. & rubra. frutex est palmi altitudine, ori gratus, acer, odoratus.

Cotinos, hoc est oleaster, alij oliuam syluestrem, alij Aethiopicam oleam nomināt, folia habet adstringētia. tūc dūtur autem eius folia tum aqua aut vino effuso exprimuntur, siccat usque

catúsque in sole succus in pastillos redigitur, quique ex vino validior est, & ad recondendum accommodatior, quam qui ex aqua fuerit expressus.

Vruntur cum floribus folia, vt cinis spodij vicem gerat, in cruda olla oblito ore luto vsquedum fistile percoquatur, tum vino restringuntur, & subacta rursus eodem modo cremantur: postremo elota vt cerussa, in pastillos coguntur. hic autem cinis in medicamentis oculorum spodio cedere nõ videtur. Idem possunt satiuæ oleæ folia: sed minore efficacia sunt: & ideo quoniam mitiore facultate sunt, oculorum medicinæ magis conueniunt. Lachryma vero, quæ ab olea Aethiopica destillat, scámonæ fere similis est. fuluescit exiguis è guttis concreta, & erodendi vi prædita. quæ vero similis est gummi, magna, & læuis, non erodit: at quæ nigricat, erodens est, atque inutilis. talem vero apud nos oleastri ferunt.

Coronopus oblonga herba est, quæ per terram sternitur, foliis fisis. coquitur inter olera.

Costus laudatissimus omnium est Arabicus, candidus, & leuis, plurimo, & iucundo odore: secundas fert Indicus, speciosus, niger, & velut ferula leuis: tertiæ tribuuntur Syriaco: qui grauis, buxæque colore est, & odore sensum ferit. præstantissimus autem est recens, albus, piensus, vndique densus, siccus, à teredinibus intactus, non virosus, feruido & erodente gustu. Quidam vero vt eum adulterinum faciant, solidissimas comageni helenij radices commiscunt. sed est facilis dignotio: siquidem helenium neque gustu feruet, nec odoris suauitatem adeo eximiam, nec sensum ferientem affert.

Cotyledon aliquibus scytalion est, & vmbilicus Veneris dicitur. folium habet ad acetabuli vasis formam in orbem circumactú, leni in cõcauitatē descēsu, vt sensum fallat. Cauliculū breuē habet, in quo semē est: & radicē oliuæ modo rotūdā.

Est & alia cotyledonis species, cuius latiora, & pinguiora sunt folia, lingularū modo circa radicē desā: tāquā oculum in medio describētia: vt in maiore semperuiuo cernitur. adstringentis porro gustus est. caulem vero gracilem profert: in quo flores, & exigua semina hyperico similia insunt: sed maiore radice. facit, ad eadem, ad quæ semperuiuum.

Cræbe agria, id est brásica agrestis nascitur plerūq; maritimis & præruptis locis: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiórque, & amara.

L I B E R

Crithmon, quod crithamon vocant alij, fruticosa herbula est, vtrinque foliata, cubiti altitudine. eaque saxosis, & maritimis locis exoritur, foliis vndique plena, pinguibus & albescentibus: portulacæ foliorum figura, sed tamen latioribus, & prælongioribus, & in gustu salis. flores fert luteos, albos fructum rori marino similem, mollem, odoratum, rotundū: qui siccatus rumpitur. & intus semen quasi ruffum habet. radices sunt digiti crassitudine tres, aut quatuor, odoratę, & suaues.

Κρίνον τὸ ἄνθος, id est lilij flos, quem aliqui liriū vocant, est ex quo vnguentū conficiunt, quod lirinum alij, susinum alij nominant.

Crocodilion nigro chamæleoni simile est. nascitur in syluosis locis. radicem habet longam, subcrassam, atque acrem, odorémque nasturcio similem.

Crommyon, id est cepa, longa est acrior, quam rotunda: & flaua magis, quam alba: & sicca magis, quam viridis: & quæ cruda est magis, quam cocta, aut sale condita.

Crocus optimus est corycius, recens, boni coloris, parum candidi habens in capreolo, oblongus, integer, non fragilis, non mancus, plenus, facile manus madefactas inficiens: qui carium non senserit, vel humescat: odore autem iucundo, & acriter sit. nam qui talis non est, is aut vetus est, aut humore perfusus, adulteratur admixto crocomagmate cōtuso, aut spuma argenti, aut plumbagine propter eius pondus: aut defruti aspersione. verum insidens pulvis & defruti odor fraudem indicat. Vt autem facile teratur, nouo fictili calido in sole siccā dus est, & celeriter conuoluendus.

Crocomagma vero fit expressis crocini vnguenti aromatis: & in pastillos redactis. præstat in eo genere odoratum myrrham modice olens, graue, nigrum, ligni expers: quod cū subigitur, colorem valde croceum reddit, læue, subamarum, dentes, & linguam vehementer inficiens: & quod aliquot horas continuas perdurat. tale autem est, quod ex Syria aduehitur.

Cyminum agreste plurimum, efficaciusque Carthagine Hispaniæ nascitur. caulem habet dodrantalē, tenuémque. foliola quatuor, aut quinque exilia gingidij modo serrata. habetq; in summo capitula quinque, aut sex rotunda, molliāque. in quibus fructus ciceris plenus est, qui gustanti acrior est, quam satiui fructus. nascitur in collibus.

Alterum

Alterum quoque agreste cuminum est, satiuo simile: quod è singulis floribus siliquas sublimes emittit, quibus semē melanthio simile continetur.

Cyclaminus folia habet hederæ, varia, supra, infraque maculis albicantibus. Caulem quatuor digitorum longitudine profert, nudū, in quo flores rosarū figura sunt, purpurascētes. radix nigra est rapo similis: modice lata. radix secta reponitur vt scilla. nascitur vmbrosis, & præcipue sub arboribus.

Est etiam altera cyclaminus, quam cissanthemon vocant. folia habet hederæ similia, sed minora, caulēque crassos, geniculatos, & capreolorum modo vicinis arboribus se implicātes: flores albos, odoratos: fructum acini vuae figura, hederæ similem, mollem: gustanti leniter acrem, & glutinosum. radix est inutilis, asperis locis provenit.

Cyperus præstantissima est grauiissima, densa, plena, non fragilis, aspera, odorata cum acrimonia quadā. talis autē est, quā Cilicia, & Syria mittit: & à Cycladibus insulis affertur.

Cyprus arbor est foliis circum virgas oleæ similibus, sed latioribus, & viridioribus. flores habet candidos, racemosos, odoratos, semēque nigrum sambuco simile.

Conion, id est cicuta inter letalia numeratur, refrigerando enecans. ei remedio est meri potio. succus autem fit è summa coma, antequam semen siccescat, contunditurque, atque exprimitur: & in sole subigitur: cuiusque in medicina vsus est plurimus, est vērō efficacissimus Creticus, Megaricus, & Atticus: & is denique qui in Cilicia conficitur.

Λ

Λαγώς θαλάττιος, id est lepus marinus, parvæ loligini similis est, isque tritus & per se, & cum marina vrtica illitus pilos euellit.

Latyris, totus frutex est succi plenus quēadmodū tithymal.

Lapathū aliud oxylapathū vocant, quod in paludibus nascitur, durū in cacumine, & acutū. aliud satiuū est non omnino simile priori: tertiū est agreste parvū: quod est plātagini simile, molle, parvū, humile. Est etiā quartū genus, quod alij oxalida, aut anaxyrida, aut lapathum agreste vocant: habētq; folia silvestri & paruo lapatho similia. caulis nō magnus est, fructus subacutus, rubens, acer, in caule, & adnatis appendicibus nascens. Hippolapathū vero lapathum grande est in paludibus exoriens, & easdem, quas supra dicta, vires habet.

C iij

L I B E R

Leōtopetalō, sunt qui leōtopodiō, qui pardalium, qui thorybethrum vocant, caulem vnius palmi emittit, qui alas multas habet: in quibus summis filiquæ sunt similes ciceri. in iis duo, aut tria semina exigua, folia brassicæ similia, radix nigra, vt rapi: quæ tubercula quædam, pugni instar habet, nascitur in aruis, & inter segetes.

Lepidium herbula nota omnibus est. muria cum lacte adseruatur.

Leucoion, id est viola differt in floribus, nam vel luteo, vel candido, vel purpureo flore inuenitur. Luteus vero ad medicine vsum valde est accommodatus.

Libanos, id est thus nascitur in Arabia, quæ thurifera nominatur, primas fert, quod masculū dicitur, indiuiduū, albū cū fragitur, pingue, in suffitu statim ardēs. Indicū vero subfuluo & liuido colore est, sitq; rotūdū industria, ipsū enim in quadratas figuras diuidētes, & in fictilia cōiicientes, in gyrū versant, vsq; dū in rotūdā formā se induat, sed quod tale est, progressu tēporis flauescit: id quæ syagrū appellant, secūdū autem locū tenet orobiū, quod minimū est, & maxime fuluum.

Est etiā aliud, quod amomite dicitur, candidū quidē, sed cū mollitur, lētescit, vt mastiche. Adulteratur thus omne pinea, resina, & gūmi: quod dignosci facile potest, nam gūmi suffitū nō emittit flāmā, & resina in fumū abit: at thus ardet, sed dolū quoque odor indicat. Ei vis inest adstringēdi, calfaciēdi, caliginē oculorū discutiēdi, caua vlcera implēdi, ad cicatricē perducēdi: cruēta vulnera glutinādi: omnes sūguinis eruptiones, atque adeo eas, quæ ex mēbranis cerebri fluūt, cohibēdi: sedis, ac reliquarum corporis partium maligna vlcera leniendi.

Crematur thus in puro fictili impositū, succēssū grumo à luccerna accēso, donec exuratur, postquā vero totū incēsum fuerit, operiēdū fictile est, vsque dū extinctū sit, sic enim in cineres non redigitur. Torretur etiā in fictili nouo ad carbones ignitos, donec nullę bullæ excitentur: nec pinguedo, nec vapor ex eo remittatur: facile enim cōminuitur, quod est crematū. Cortex vero thuris omnibus præstat is, qui pinguis, odoratus, recēs, læuis, nō scaber, & mēbranis est vacans, adulteratur admixto pini, aut nucis eius cortice, huius rei index ignis est, ceteri enim cortices in suffitu nō accenduntur, sed fumo edito absque vlla odoris suauitate euanescent, at thuris cortex accenditur, & cum odoris fragrantia vaporem ex se mittit.

hic

hic etiam eodem modo, quo thus, vtitur.

Māna vero thuris probatur ea, quæ alba est, pura, grumosa, vim eandem habet, quam thus, sed multo inualidiorem. Quidam eam adulterant mixta resina pinea, aut polline, aut tuso thuris cortice. sed ignis dolū arguit, neque enim æque, & pari motu adulterata vaporem ærium emittet, sed fuliginosum, & impurum. præterea odoris suauitas alieno halitu permista sentietur. Thuris vero fuliginem sic facito. singulos thuris grumos forcipicula exceptos lucernis accendito, in nouam fictilem ollam concauam coniicito. tum æreo vase medio perforato, & diligenter deterſo obtegito. ex altera eius parte, aut vtrobique lapillos altitudine quaternū digitorum subiicito, quo facilius queas perspicere vtrum grumi exuratur: & vt locus sit, quo subiicere alios grumos integros semper possis. & antequam primus grumus penitus restinguatur, alium adiicito, donec fuliginis quod satis sit, collectum fuisse videatur. Continuo tamen externas ærei vasis partes spongia ex frigida aqua abstergeto. sic enim alieno non magnopere calente fuligo omnis adhærebit: quæ alioqui per leuitatē cadens thuris cinerī cōmiscetur. deraſa itaque prima fuligine cremati thuris cinerem per se excipito, & idem vsque dum volueris, facito. Eodēque modo ex myrrha, & styrace fuliginem conficies, valet fuligo ad eadem. præterea vero ex aliis lachrymis fuliginem similiter excipito.

Libanotis, fructum fert altera, qui cachry dicitur, foliāque fœniculo habet similia, sed crassiora, & in rotæ speciem humi sparsa, odorata, caulem cubiti altitudine, aut maiorem: cui multæ insunt alæ: & in cacumine umbellæ, in quibus fructus copiosus est, albus, spondylīo similis, circinatus, angulos habens, acer, resinæ sapore, & qui mansus gustum incēdit. radix prægrandis, quæ thus redolet. altera vero libanotis est superiori in omnibus similis: semen fert latum, nigrū, vt spondylium, odoratum, non feruidum. radix foris nigra, fracta vero, alba cernitur. Altera vero quæ fructum non fert, est in rebus omnibus similis superioribus: eaq; nec caulē, nec florē, nec semē gignit. nascitur asperis & saxosis locis. In potionibus vero vtēdū est semine eius libanotidis, quæ cachryn nō fert: siquidē illud acre est, & arteriam exasperat.

Libanotis vero, quā rosmarinū Romani vocant, qua vtitur ij, qui coronas nectunt, tenues virgæ sunt, in quibus præ-

longa insunt folia, gracilia, intus alba, foris virentia, graui odore.

Ligusticum plurimum nascitur, apud ligures. panaces incolæ non immerito vocant: nam & radix heracleotico panaci similis est, & ipsum viribus eisdem est præditum. semen nigrum, durum, oblongum, ad fœniculi similitudinem, gustanti acre. radix candida, odorata. miscetur autem vtiliter oxyporis, hoc est cito transeuntibus medicamentis, & iis, quæ concoctionem adiuuant, ori valde gratum est: quocirca pro pipere eo vtuntur incolæ ad obsonia conficienda. adulteratur semine quodam consimili. sed gustu discernitur, amarissimum enim est. nonnulli vero fœniculi, aut seseleos semē addentes adulterinum faciunt.

Lithospermon, quod ægonichon, aut ætonychon, aut diospyton aut heracleam ob seminis duritiam vocant, folia habet oliuæ similia: longiora tamen, & in imo per terrā strata. ramulos tenues, rectos, crassitudine acuti iunci, firmos, succi plenos, in quibus summis bifidi exortus cauliculorum speciem præbent, foliis exiguis, inter quæ semen rotundum, lapideum, album, paruo eruo simile. asperis & excelsis locis nascitur.

Limonium, quod neurodes alij vocant, foliis est betæ similibus, sed tenuioribus, & longioribus, ac numerosioribus: caule tenui, recto, vt lilium, rubro semine referto, gustumque adstringente. nascitur in pratis, & palustribus locis,

Linozostis, hoc est mercurialis herba: quæ fœmina est, fructum fert racemosum, & multum: mascula vero iuxta folia exiguum, rotundum, ceu binos testiculos vna cohærentes. totus frutex exiguus dodrantalis est, & maior.

Lichen in petris nascens est muscus petris rore conspersis adhærens.

Lonchitis folia habet porri latioris: sed latiora, subrubra, plurima, ad radicem circumfracta, vt ad terram procumbentia: pauca etiam habet in caule: in quo flores sunt pileolis similes, more comicarum personarum hiantes, nigri, candidum tamen quiddam hiatus oris veluti lingulam ad labrum inferius exerētes. semen est lanceæ simile, triquetrum in inuolucro clausum. radix dauco similis. asperis, squalidisque locis exoritur.

Lonchitis vero altera aspera folia profert scolopendræ similia:

similia: asperiora tamen, maioraque, & magis diuisa.

Lycium arbor est spinosa, virgas trium cubitorum, & maiores proferens: in quibus folia insunt densa, buxo similia. fructum fert piperis, nigrum, amarum, læue. cortex ei est pallidus, diluto lycio similis: radices latæ, lignosæ, plurimum in Cappadocia, & Lycia nascitur: itémque in aliis plerisque locis, asperum amat solum. succus ex eo exprimitur tuis vna cum frutice radicibus, & postquam aliquot dies in aqua maderint, decoctis: tum exempto ligno, iterum eo, qui superest, liquore ad mellis consistentiam decocto. adulteratur amurcâ inter coquendum admista, aut absinthij succo, aut felle bubulo. spuma autem coquendo innatans auferitur, & ad medicamenta oculorum adseruatur. reliquo ad alia vtilior. Succus quoque ex semine expresso & in sole siccato conficitur. Lycium optimum est, quod igni accenditur. & restitutum spumam rubentem habet, foris nigrum: cum frangitur, fuluum, non virosum, adstringens cum amarore, colore croceo, quale est Indicum: quod præstat ceteris, & est efficacius.

Lyfimachia caules cubitales, & maiores, tenuésque, fruticososque fert: in quorum geniculis folia falici similia exoriuntur, quæ gustu adstringente sunt. flos rufus est, aut aureus. nascitur palustribus, & aquosis locis.

Lychnis coronaria flos est albæ violæ similis, purpurascens, qui ad coronamenta adhibetur.

Lychnis agrestis in omnibus est satiuæ similis. eius seminis binæ drachmæ potui datæ bilem per aluum educunt.

Lotus agrestis in Lybia nascitur caule duorum cubitorum, atque etiam maiore, qui alas multas habeat, folia vero trifolio in pratis nascenti similia: semen scœnogræco simile: sed multo minus fert: gustuque medicato.

M

Macer cortex est subflauus, crassus, gustu valde adstringens, qui ex Barbaria aduehitur.

Malabathri folium laudatur, quod recens est, & cum nigrore quodam candicat, non fragile, integrum, odore caput feriens, & odoris bonitate diutius permanens: nardum sapore imitans, gustu non falso. quod vero infirmum, minus contusum, & cariosum halitum affert, vitiosum est. eandem vim habet, quam nardum, sed illud ad omnia est efficacius. malabathri tamen vis ad vrinam ciendam est maior, &

stomacho magis congruit.

Mandragora alter mas, alter femina. ac femina quidem mādtagora niger est, qui tridacias dicitur, foliis angustioribus, ac minoribus, quam lactucae: virosis, graueolentibus, in terram sparsis. inter quæ poma sunt sorbis, aut achradibus similia, odorata. in quibus fructus est, vt piri. radices prægrandes binæ, aut ternæ inter se conuolutæ, nigra superficie, intus albæ. crasso cortice. caulem non habet. mas vero folia habet alba, lata, admodum magna, vt betæ. poma duplo maiora, crocei coloris, odorata, cum grauitate quadam. quibus etiam pastores vescuntur, & sopore quodammodo corripiuntur. radix est alterius radici similis: sed maior, & candidior. est hic quoque caulis expers. succus colligitur ex cortice radicis viridi, contusoque, & prælo subiecto, qui in sole versatus densatur, & in fictili reponitur. succus quoque è pomis similiter exprimitur, sed ignauus est is, qui è pomis collectus fuerit. Cortex itidem à radice detractus lino trahitur, & suspensus adseruatur. nonnulli radices ex vino ad tertias decoquunt, & defecatū seruant: & cyathi vnus mensura ad magnos dolores, vigilias, & vbi sine sensu doloris secare, aut vrere velint, vtuntur. Iam liquor ex radice profundius excauata, in orbem punctis aperta, emanat defluente in eam cavitatem liquore, atque ibidem collecto. succus vero est liquore efficacior. sed radices non vbique liquore ferunt.

Marathron, hoc est fœniculum, agreste, magnum, quod hippomarathrum vocant, semen cachry simile fert: radix ei subest odorata. Quinetiam aliud hippomarathrū vocatur, quod folia habet exigua, angusta, oblonga, fructum rotundum ad coriandri similitudinem, acrem, odoratum, & calfaciendi vi præditum. viribus autem antedicto respondet, sed ramen agit imbecillius.

Marum herba est furculosa: origani flori similis: eius tamē folia multo candidiora sunt: & flos odoratus, plurimum vero ad Magnesium & Tralles nascitur.

Mancoron genus quoddam mellis est, concreti, quod in India & Arabia fœlici in harundinibus inuenitur, salis consistentia, & quod dentibus subiectum ita, vt sal, confringitur.

Melilotos præstantissimus est Atticus, quique in Cizico nasci-

nascitur, & Carthagine, croci colore, & odoratus. oritur etiam in Campania prope Nolam colore luteo, odore infirmo.

Melissophyllon herba est, qua apes delectantur. eius folia cedri odorem exhalant.

Mespilum arbor spinosa est, fructum exiguum, pomo similem, iucundum ferens. habetque tria officula. adstringit. & in cibo sumptus idoneus stomacho est: sed aluum supprimit.

Medion herba nascitur vmbrosis saxosisque locis, folij seridi similibus, caule trium cubitorum, floribus purpureis, magnis, orbiculatis: fructu paruo, cnico simili, radice dodrantali, quæ baculi crassitudinem habet, acerbique saporis est.

Mecon rhœas, id est papauer erraticum, ita nominatum est, quia eius flos celeriter decidat. nascitur in aruis verno tempore, quo etiam colligitur. folia habet origano similia, aut cichorio, aut thymo, diuisa, longiora: caulem iunci figura, rectum, crassum, ad cubiti altitudinem: florem puniceum, quâdoque candidum, anemonæ flori similem: fructum rufum: radicem oblongam, subalbam, & parui digiti crassitudinem habentem.

Papauer autem paruum alterum satium est, & hortense, cuius semen panis inditur ad tuendæ valetudinis usum: & cum melle pro sesamo eodem vtuntur, thylacitem vocant, oblongum habens capitulum, semen album. alterum vero agreste est, capite demisso, nigro semine: quod etiam pithite nominatur: idque ab aliquibus rhœas papauer vocatur: propterea quod ex eo liquor defluat, est tertium genus his agrestius, & magis medicatum, & longius, oblongo capite, probatissimus autem liquor est densus, ponderosus, odore soporiferus, gustu amarus, qui facile aqua diluitur, leuis, albus, non asper, neque grumosus. quique inter colandum non coëat, veluti cera, & in sole diffunditur, & ad lucernam non atra flamma ardet: quique vbi restinctus sit, odoris vim conseruat, hunc adulterant miscendo glaucium, aut gummi, aut agrestis lactucæ succum. quique glaucio indito adulteratur, in dilutione croci colorem reddit: qui ex lactucæ agrestis succo, infirmo odore est, & asperior: qui ex gummi, ignauus & pellucidus. quidam vero ita sunt absurdi, vt terram etiam ei indant. torretur ad oculorum medicinas,

L I B E R

in fictili nouo, donec mollis, & fuluus videatur. nō erit for-
tasse alienum, describere quonam pacto liquor colligatur.
Aliqui igitur capita & folia contundunt, ac prælo expri-
munt: tum in mortario terunt, & in pastillos redigunt. idq;
meconium nominatur: potestate multo ignauius, quam li-
quor sit. In liquore autem colligendo, oportet cū ros exa-
ruerit, cultello asterisco circundante, ne ad interiora descen-
dat, ex obliquo in rectum summam capitum superficiem in-
cidere, & lachrymam exeuntem in conchulam digito deter-
gere: & non ita multo post redire. siquidem concreta in-
uenietur. atque etiam sequenti die simili modo comperie-
tur: quæ in pila teri debet, & in pastillos conformari, ac re-
poni. cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne liquor à
vestibus deteratur.

Mecon ceratitis, id est, cornutum papauer, quod aliqui
paralium, aliqui agreste vocant, folia habet candida, hir-
suta, verbasco similia, in ambitu ferrata, vt papaueris a-
grestis folia, caulēque similem: florem pallidum, fructum
paruum, inflexum, fœnigreci corniculis similem, semen exi-
guum papaueris semini consimile, radicem, cuius extrema
pars nigra, crassaq; nascitur maritimis & asperis locis. Qui-
dam errore ducti glaucium ex hoc papauere propter folio-
rum similitudinem fieri putauerunt.

Mecon aphrodes, id est spumeum papauer à nonnullis
heraclea nominatur: caulem dodrantalem habet, foliūque
admodum paruum, struthio simile. in eo fructum fert albū:
totāque herba ipsa alba est, & spumea. radice nititur ple-
runque tenui. huius fructus colligitur æstate, cum perfecte
adoleuit, & siccatum reponitur.

Meum Athamanticum nascitur plurimum in Macedo-
nia, caule & foliis anetho similibus: bicubiti plerunque alti-
tudine, radicibus in partes distractis tenuibus, obliquis, &
rectis, longis, odoratis, linguam calfacientibus.

Medullarum præstantissima est ceruina, deinde vitulina,
tum taurina, postea caprilla, denique ouilla. concrescit me-
dulla sub finem ætatis autumnō appropinquante: reliquis
vero temporibus concrementum sanguinis, & veluti caro
friabilis in ossibus inuenitur. nec cognosci facile potest, ni-
si quis eam ex ossibus extrahat, atque recondat. curatur
medulla recēs aque aspersione mollita ex selectis ossibus: &

per

per
suat
pena
in no
gente
nia, q
My
funt
res, a
xias o
lentor
putre
faciun
culter
afferan
riuij cu
stercon
so deli
Mye
les mit
ga, do
ra, &
cauli
ces ci
nes, a
tame
qui he
My
fructu
autem
su simi
stum a
betur.
My
que ra
vnde
præd
lultri
My
cand

per linteum excolata, & similiter elota, donec pura aqua defluat. tum in duplici vase liquata, sordibus supernatantibus penna exceptis, & in pilam percolata, vbi compacta fuerit, in nouo fictili vase reponitur, omni fece, quæ subsidit, diligenter derasa. si vero libet non curatam reponere, facito omnia, quæ in anserum & gallinarum adipè fiunt.

Mycetæ, hoc est fungi, qui perniciosi sunt, multis de causis fiunt. nam vel apud clauos rubigine obritos, aut vestes putres, aut serpentum latibula, aut arbores sua proprietate noxias oriuntur. continent, qui tales sunt, concretum supra se lentorem quandam, & è terra eruti, si ita sinantur, celerrime putres redditi corrumpuntur. at qui esculenti sunt, iusculum faciunt. sed ipsi quoque liberalius sumpti, nocent. cum difficulter in stomacho coquantur, aut strangulent, aut choleram afferant, omnibus succurritur potione olei, aut nitri, aut lixiuij cum acida muria: aut decocto saturciæ, aut origani, aut stercore gallinæ cum aceto epoto: aut cum melle copioso delincto.

Myosota, id est auricula muris multos ab vna radice caules mittit, subrubros ab imo concauos: folia angusta, oblonga, dorso elato, nigricantia: per interualla deinceps geminata, & in acutius desinentia. exoriuntur etiam ex alis tenues cauliculi: in quibus flosculi cærulei, vt anagallidis, sunt. radices crassitudinis digitorum, multas habent progerminationes. ad summam, est herba hæc scolopendræ similis, tenuior tamè, & minor. huius radix illita ægilopas sanat. sunt etiam, qui helxinem auriculam muris appellent.

Myrica arbor est, quæ prope paludes, & stagna nascitur, fructum veluti florem ferens, consistentia muscosum. Satiua autem in Aegypto, & Syria prouenit: sed in cæteris est agrestis similis. fructum vero edit gallæ similem, inæqualem, gustum adstringentem. qui vice gallæ oris medicamentis adhibetur.

Myriophyllon, hoc est millefolium, caulis est tener, vniûsque radicis, circa quam multa folia læuia, sceniculo similia, vnde nomen traxit, conspiciuntur. caulis ipse est fuluescens, prædensus, ac veluti de industria expolitus. nascitur vero palustribus locis.

Myrtus satiua medicinæ accommodatior est nigra, quam candida, & in hoc genere, potius montana: & tamen fructu

imbecilliores fert.

Myrtidanum vero, quod vocant, inæqualis exortus est, tumensque, & myrto concolor, truncum eius quasi manu complectens: sed maior in eo, quam in myrto adstringendi vis inest. tusus addito vino austero reponitur: & in pastillos redactus in umbra siccatur. estque & cortice, & fructu efficacior.

Myrtus agrestis, aut oxymyr sine, cuius asparagus nuper in lucem editus estur, urinamque ciet, fructum orbiculatum, rubrum dum maturescit, & interioriorem partem osseam habentem profert.

Myrrhis, quam myrrham aliqui vocant, & caule, & foliis cicutę similis est, radice nititur tenera, oblonga, orbiculata, odorata, ad mandendum suavi.

Moly folia gramine similia, latiora tamen, humique sparsa habet, florem albae violę similem, lacteo colore: minorem tamen, & ad violę similitudinem accedentem. caulem fert tenuem, quatuor cubitorum: in cuius summo quiddam allio simile est. radix ei parua, bullosaque subest.

FINIS LIBRI VNDECIMI.

ORIBASII MEDICINALIVM COLLECTORVM,
LIBER DVODECIMVS.

Ex Dioscoride, de simplicium medicamentorum facultate, atque apparatu. ab N litera, vsque ad Ω.



Ardi sunt duo genera. alterum Indicum, Syriacum alterum nominatur: non quod in Syria nascatur, sed quod motis, in quo oritur, vna pars ad Syrios, altera ad Indos vergit. ceterum in Syriaci genere præstantius est recens, leue, multam comam habens, flauo colore, admodum odoratum, cyperum odore referens, breui spica, gustu amaro, & linguam ex-

ficcante, & multo tempore in odoris iucunditate perduran-
te. Indicum vero alterum Gangitin vocant, à flumine quo-
dam Gange, quod præterfluit, deducto nomine: iuxta quod
nardum exoritur, eius autem vis est propter aquosos tractus
imbecillior, ipsumque est oblongius: & ab vnica eius radice
numerosæ spicæ, eæque admodum crinitæ, & implicitæ ac
virofi odoris exoriuntur. Quod vero altius in monte nasci-
tur, odoratius, curta spica, cyperum suauitate redolens, aliâ
que habens omnia, quæ Syriaco inesse dicta sunt, vocatur e-
tiam aliud quoddam samphariticum à regione, in qua nasci-
citur, estque magna spica, candidiore caule, quem medium ex
se interdum mittit, hircorum odorem vehementer exhalan-
tem: quod genus est reiiciendum. venditur etiâ nardum ma-
defactum, quod ex eo cognoscitur, quod alba, squalida, & si-
ne sua lanugine spica sit. Adulteratur stibio cum aqua, aut
palmeo vino, & densetur, & ponderosior fiat, inspirato. vbi
viti velimus, auferendum est ab radicibus lutum, si sit, & cri-
bro excutiendus est puluis, qui ad manus eluendas accom-
modatus est. Reconditur autem ad oculorum medicinas in
fistili nouo non picato tritum, & ex vino in pastillos redactum.

Nardum vero Celticum in alpebus apud Ligures nascitur,
idque ab incolis Gallicum nominatur. nascitur etiam in I-
stria, estque exiguus frutex, breuisque, qui cum radice velli-
tur: & in fasciculos, manipulósque ligatur, & componitur.
folia habet oblonga, subflaua: florem luteum. caulibus tan-
tum, radicibusque vtimur, hique soli odoris bonitate sunt
præditi. quam ob rem fasciculi pridie aqua spargendi sunt,
& siquid terreni inheferit, abiiciendum: humido pauimento
subiecta prius charta sternendi sunt: sequenti die purgandi:
siquidem quod vtile est, ab aceroso & alieno propter vim
humoris non excutietur. Adulteratur imposita eidem herba
persimili, quam ob virosum odorem, hircum vocant. sed fa-
cile dignoscitur. quoniam ea herba caulis expers est, atque
candidior, & minus oblonga habet folia. quin ne radicem
quidem amaram, & aromaticam habet, vt nardi radix est. Ita-
que cauliculos & radices, abiectis foliis, ad vsum reponito:
si que seruare volueris, trita vino excipito, in pastillos cõfor-
mato, fistili nouo diligenter operto recondito. Laudatissi-
mum vero Celticum nardum est, quod recēs est, odoratum-
que, ac multis radicibus præditum, non fragile, plenum.

Nardum montanum in Cilicia nascitur. eius caules & folia eryngio similia sunt: minora tamen, & non aspera, & aculeata. radices illi sunt nigrae, odoratae, binæ aut etiam plures, ut asphodeli: sed multo graciliores, candidiores, & minores. nec caulem, nec fructum, nec florem profert. radix ad eadem, ad quæ Celticum nardum, facit.

Narcissus habet folia porro similia, sed tenuia, & multo minora: cauliculum paruum, inanem, foliis vacantem, dorante maiorem: in quo flos albus est, interius croceus: & in quibusdam purpureus. radix ei est alba, rotunda, ad bulbi formam. fructus veluti in membrana niger, prælongus. nascitur præstantissimus in montanis locis, odoratusque. at qui in pratis, & arenosis oritur, porrû sapit, & herbaceum halitum ex se mittit.

Nascaphthon, quod narcaphthon aliqui vocant, ex India affertur, corticis formam gerit, libro sycamini similem. Ad suffitus adhibetur propter suauem odorem, quæ ex se mittit.

Nymphaea in paludibus & stagnis nascitur. folia habet ciborio similia: minora tamē, & oblongiora quodam modo, aquam excedentia: aliqua etiam in aqua demersa, multa que ex vna radice prodeuntia. flos albus est lilio similis: eius media pars crocea est. cum defloruit, in rotundam formam redigitur, ad pomi aut capitis papaueris similitudinem. colore nigro fit, in quo fructus latus, densus, gustanti glutinosus includitur. caulis non levis, crassus, niger, ciborii cauli similis. radix nigra, crassa, clauæ similis: quæ autumnopreciditur. Plurima in Cilicia in Anigro flumine, & in Haliarto Bæotiae. Nascitur & alia nymphaea antedictæ similibus foliis: attamē alba radice, & aspera, flore luteo, & modo rosæ splendente. Oritur hæc in Thessalia ad flumen Peneum.

≡

Xanthium, quod phasganon aliqui vocant, in pinguibus locis, & paludibus nascitur. caulem pinguem habet, angulosumque: in eoque alarum caua permulta sunt. atriplici similia sunt folia, sectiones habentia, odore nasturcij: fructum rotundum fert, ut oliua magna: aculeatum, ut platani pilulae, & vestibus contactu inhaerentem.

Xyris, quam aliqui agrestem iridem appellat, Romani gladiolum vocant, folium gerit iridi simile, sed latius, & in summo acutū. è mediis foliis caulis prodit cubitalis, valde crassus:

fuſ: in quo ſiliquæ ſunt triquetrae, & in eis ſlos purpureus, idque quod in medio eſt, puniceū. fructus in folliculis eruo ſi milis, rotundus, magnus, acer: radixque geniculofa, longa, ruſſa.

Xyphion, quod phaſſanon, id eſt enſem, propter figuram foliorum nominant, iridi ſimile eſt: ſed breuius, atque anguſtius, & cultelli modo in mucronem deſinens, ſibroſum, cau- lem emittit cubitalem, ſucci plenum: in quo purpurei flores in ordinem digeſti, inter ſe diſtant: fructum edit rotundum. radices duas profert, alteram ſub altera conſidētem exiguo- rum bulborum figura: quarum inferior eſt gracilis, ſuperna vberior. potiffimum vero in aruiſ naſcitur.

O.

Oenanthe folia habet paſtinacæ, florem candidum, cau- lem craſſum, dodrantalem, fructum atriplicis, radicem ma- gnam, multis rotundis capitibus abundantem. naſcitur in petris.

Oenanthe etiam agreſtis vuæ fructus nominatur. cum flo- rer, recondi debet ſictili non picato: collectaque ſubſtrato linteo in vmbra ſiccanda.

Omphacium eſt acerbę vuę, vt Thaſiæ, aut Aminę nō- dum matureſcentis ſuccus: qui ante canis exortum expri- mendus eſt: expreſſuſque in æreo rutilo vaſe linteo operto uſquedum cogatur, inſolandus. oportet autem ſemper quic- quid concretum ſit, liquido permiscere: & cauere ne per no- ctem ſub dio maneat: ſiquidem ros cōcretionem impedit. Eligito flauum omphacium, friabile, perquam adſtringens, mordēſque linguam. quidam etiam coquendo ſuccum con- denſant.

Onagra frutex eſt arboris inſtar, prægrandis, amygdali- no folio, ſed latiore, lilio nō diſſimili, flore roſaceo, magno, radice candida, longa: quæ ſiccata vini odorem refert, mon- tanis locis naſcitur.

Onobrychis folia habet lenti ſimilia, paulo tamē longio- ra, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem paruam, naſcitur humidis & incultis locis.

Onyx, hoc eſt vnguis, conchylij tegumentum eſt, ei ſimi- le, quo tegitur purpura: quod in India in lacubus nardum

ferentibus inuenitur. quod ideo suauem odoré spirat, quod conchylia inibi nardo vescantur. Præstantissimus onyx est, qui è rubro mari affertur, albicans, pinguisque. nam qui Babylone aduehitur, niger est, & minor. uterque in suffitu odoratus: sed castoreum quodam modo olet.

Oxyacantha, hoc est acuta spina, arbor est pirastris similis, sed minor, & valde spinosa. fructum fert myrti baccis similem, plenum, rubrum, fragile: & intus nucleum: radicem habet multifidam, alte descendentem.

Oreoselinum, hoc est apium montanum, caulis dodrantalis est ex tenui radice prodiens: circa quem ramuli, & capitula sunt cicute similia: multo tamé tenuiora: in quibus fructus est prælongus, acer, odoratus, cumino similis. montanis vero locis prouenit.

Olostia herba est parua, tribus aut quatuor digitis terram excedens, foliis & viticulis coronopidi, aut gramine similibus, adstringentibus: radice prætenui, ut capillus est, alba, uinosa, quatuor digitorum longitudine. nascitur in collibus.

Origanum Heracleoticum, quod Conilam vocant, folium hyssopi habet, umbellam vero non in rotæ speciem, sed veluti multifidam: seménque in summis virgis non densum.

Quod vero onitin appellant, folia habet candidiora: & hyssopo magis similia: seménque fert veluti coniunctos corymbos. vim Heracleotici habet, sed non ita efficax est.

Syluestre autem origanum, quod alij panaces Heracleum, alij conilam nominant, folia origani, virgulta dodrantalia, tenuia, in quibus umbellæ sunt anetho similes. radix exilis est, atque inutilis.

Orminum herba est foliis marrubio similibus, caule semicubitali, quadrato, circa quæ eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant: in quibus diuersum inest semen. nam in syluestri rotundum & fuscum inuenitur: in alio vero oblongum, nigrumque, quo utimur.

Ορέβιον λευκόν, hoc est erui farinam sic cōficito. vberiora, candidaque grana deligito, permiscédoque aqua perspergito, donec quod satis sit, combibant: deinde torreto vique dum cortex rumpatur. tum mola trita cribro tenui trajecta farina reponatur.

Ορχίς, hoc est testiculus, quem cynosorchin, id est testicu-

culum canis vocant, folia habet circa caulem, & imam ejus partem humi strata, oleæ molli similia: angustiora tamen, & longiora: cauliculis longitudine dodrantis, in quibus purpurei sunt flores: radicem bulbosam, oblongam, duplicem, angustam, ut oliuæ, superius alteram, & alteram inferius, alteramque plenam, alteram mollem, ac rugosam.

Alius testiculus est, quem serapiadem aliqui vocant. is folia habet porri, oblonga, sed latiora, & crassa: caulem dodrantalem: flores subruffos, purpureosque, radix testiculis similis subest.

Orchis, id est testiculus Castoris. Eligito semper huius animalis testiculos, qui ex vno principio connexi sunt, (non possunt enim duo folliculi in vna membrana coniuncti reperiri) & qui liquorem intus cerosum habent, odore graui, & viroso, gustu acri, mordente, ac friabili: & qui naturalibus membranis vndique intersepti sunt. Adulterant castoreum nonnulli, ammoniacum, aut gummi cum eiusdem animalis sanguine, aut castoreo ipso subactum in folliculos instillantes, & exsiccantes. Falso aiunt hoc animal, cum à venatoribus vrgetur, auellere sibi testes, atque abiicere: cum ne eos tangere quidem possit: sunt enim parum exerti, ut in sue. oportet autem diuisa pelle, melleum liquorem cum ambiente membrana assumere, & ita siccatum reponere.

Osyris exiguus frutex est, niger, tenuis, virgulam fractu difficilem habens, & in ea, foliola, ut lini, in initio nigra, quæ deinde mutato colore rubescentia fiunt.

II

Panaces, quidam herculeum vocant. ex hoc opoponax colligitur, plurimumque in Bæotia, & Phocide Arcadiæ nascitur: & inibi, ob quæstum, quem ex liquore faciunt, studiose colitur. foliis est asperis, in terra iacentibus, viridibus, ad ficulna multum accedentibus, in ambitu quinquepartita diuisione partitis. caulem, ut ferulam, fert altissimum, alba lanugine præditum, folia circa ipsum minora, umbellamque in summo, ut anethum, habentem, florem vero luteum, semen odoratum, & feruidum: radices multas, ab vno principio exorientes, albas, graui odore, crasso cortice, subamaro gustu. Nascitur idem in Cyrene Libyæ, & Macedonia.

D. ij

LIBER

Colligitur liquor secta radice cauliculis nuper pullulātibus, album autem liquorem ex se mittit, qui siccatus crocei coloris habet extremitatem. Excipiunt etiam liquorem effluentem foliis excavato solo substratis. eaque siccata tolluntur. Ex caule quoque per messem secto, liquorem eodem modo excipiunt. Ex radicibus vero præstantiores sunt albæ, distentæ, quæ cariem non senserint, gustu feruidæ, & aromaticæ, fructus ex media ferula prodiens cibo idoneus est: qui vero ex adgnatis oritur, minus nutrit. Liquor vero laudatissimus est, qui amarissimus est, intus albus, foris croceus, lævis, pinguis, friabilis, cito liquefcens, gravis odoris, nam niger, & mollis, vitiosus est, adulteratur ammoniaco, & cera, probatur digitis in aqua confricatus, qui enim vitio caret, resoluitur, & lactei fit coloris.

Panaces Alclepium, & Chironium caulem tenuem è terra emittit, geniculis interceptum, cubitalem: circa quem folia fœniculo similia funduntur: sunt tamen maiora, hispidiioraque, & graueolentia. supra vero umbella est, in qua flores aurei coloris sunt, acres, odorati. radix exigua, tenuisque. sunt etiam qui sylvestre origanum panaces vocent, alij vero conilem. de quibus, cum de origano ageretur, dictum est.

Panaces vero Chironium præcipue nascitur in môte Pelio, foliis amaraco similibus, flore aureo, radice tenui, non profunda. herba ipsa gustu acri est.

Pancration, quod aliqui etiam scillam vocant, radix est magno bulbo similis, subruffa, amara, feruida ad gustum: folia lilij habet, sed longiora.

Parthenium, quod aliqui amaracura, aliqui leucanthemon appellant, folia coriandri habet, flores per ambitum albos, in medio luteos, odore subuiroso, & sapore amarescente.

Paronychia exiguus frutex est, nasciturque in petris, peplo similis, longitudine minor, foliis maior.

Piper fructum fert in principio prælongū, veluti siliquas, quod longum piper est: habetque intus aliquid tenui milio simile: quod absolutum, piper euadit. id autem suis temporibus dehiscens racemos ex se mittit grana, quæ videmus, ferentes: & alia acerba, quæ albi piperis nomen habent: quod oculorum medicinis, antidotisque accommodatissimum est. nigrum vero est suauius, & acrius albo. atque album quidem quod acerbum sit, ceteris imbecillius est. Eligito piper, quod ponde-

ponderosius sit, plenum, nigrum, nō valde rugosum, recens, non furfuraceum. In nigri vero genere, inuenitur etiā quod defectum, inane, leuēque sit: quod brasma, quasi abortus vocatur. In fictili nouo ad carbones torretur continue mouendo. Eius radix non est zinziber, vt quidam sunt rati. costo autem est similis, & gustum excalfacit.

Peplus, sunt qui sycen, qui spumeum papauer nominant, frutex est exiguus, albi liquoris plenus, folio paruo rutę simili, sed latiore, tota vero coma fere dodrantalis est, in orbem circumacta, in terra iacens. sub foliis minutus fructus, rotundusque est. radix vnica, inutilis, in hortis nascitur, & vinitis. colligitur per messem, in vmbra siccatur, & continuo versatur. fructus tufus, & seruefactus reconditur.

Peplis vero, quam syluestrem portulacam vocant, Hippocratēsque ipse pepliō nominat, in maritimis maxime nascitur locis. frutex frondosus, liquoris candidi plenus, folio satiuę portulacę, sed in orbem actō, & in parte inferiore rubescente. Fructus rotundus foliis subest, vt in peplo: feruido gustu. radix tenuis, inutilis. colligitur, reponitur, & sale conditur, & datur, vt peplus, eadem vi prędita.

Periclymenon, quod alij splenion, alij etiam clymenon ipsum vocant, frutex paruus est, simplex, caule quadrato, & per interualla foliolis circumdato albicantibus, hederę figura, inter folia surculi exeunt, in quibus fructus est hederę similis: qui quasi in folium procumbit, durus, qui difficulter auellitur, radix longa.

Oritur in aruis, & sepibus, sese fruticibus adstantibus inuoluens.

Peristereon aquosis locis nascitur. videtur autem inde nomen traxisse, quod περιστερι, hoc est columbę in eo libenter versentur. herba est dodrantis habens altitudinem, aut etiam maiorem. folia ex caule prodeant incisa, & subalbida, eaque plerunque ex vnico ramo, vnicaque radice constare comperitur.

Persea arbor est in Aegypto proueniens.

Petasitis pediculus est cubito maior, pollicis crassitudine: in quo petasi figura solum est, grande, ad fungi similitudinem impositum.

Peucedanum caulem gracilem emittit, sceniculo similem: comam habet copiosam, & densam, florem luteum, nigram

LIBER

radicem, graueolentem, vberē, liquoris plenā, in montibus
vmbrosis nascitur. Liquor excipitur radice tenera cultello
concisa: & quod defluit, statim in vmbra reponitur. gignit ve
ro, dum colligitur, capitis dolorem, & vertiginem: nisi quis
nares rosaceo inūgat, & caput perfundat, vbi detractus liquor
est, radix ad nullam rem est utilis. sed ex caulibus quoque li
quor, succūsque colligitur, vt ex mandragora, succūsque mi
nus efficax est, quam liquor: & citius euanescit. quandoque
autem concreta lachrima inuenitur thuri similis caulibus, ra
dicisque peucedani inhærens. Liquor laudatissimus est is, qui
in Sardinia & Samothracia conficitur, odore graui, fuluescē
te, & gustu feruido.

Peganon, id est ruta, acrior est montana, quam satia: & in
eptior, ex hortensi vero ruta ea quæ prope ficus nascitur, est
ad vescendum accommodatior.

Peganon vero agreste, quod moly quidam vocant, in Cap
padocia, & Galatia Asia natum, frutex est plures ab vna
radice virgas proferens: foliaque multo longiora, quam alia
ruta, itēque magis tenera, & graui odore: florem album. in
cacumine capitula habet paulo maiora, quam ruta satia:
quæ maxime ex tribus partibus cōstant. in iis semen est sub
fuluū, triquetrum, valde amarum gustantibus: cuius est vsus.
Autumno maturescit semen: quod nonnulli harmala vocāt:
Syri vero besasa: Capadoces moly: quoniam cum moly simi
litudinem quandam habet. radice nigra, flore albo. nascitur
in collibus, & fecundis locis.

Pix liquida ex pinguisimis picæ, & pini lignis colligitur.
probaturn splēdē, leuis, pura. Fit quoque pisselæon ex pice,
separato eo, quod aquosum in ea inest: quod vt serum in la
cte, sic in pice supernatat: excipiturque in pice coquenda pu
ris supra eam lanis expansis: quæ vbi euaporato halitu made
scunt, in vas exprimuntur. id quod vsque faciendum est, dum
pix coquitur. Fuligo vero ex liquida pice colligitur ad hunc
modū. In lucernā nouā, quæ ellychniū habeat, aliquid picis in
de, atque accēde, obturāq; fictili vase, quod clibani formā ha
beat, superne quidem fornicato & angusto, inferne vero fora
men habente, vt clibani habent, atque inibi sine, vt ardeat,
vbi vero prior humor consumptus fuerit, nouum infundito,
donec tantū fuliginis, quātum satis sit, feceris: tum ea vtor.

Pix vero sicca ex liquida decocta fit, ex ea quædā est viscosa,
quædam

quædã sicca, probatur autem, quæ pinguis est, pura, viscosa, subfulua, & resinosa, talis porro est Lycia, & Brutia, coniuncta simul picis, resinæque natura. Vocatur etiam quædam pissasphaltus, eaq; in Apollonia ad Epidaurû fit, quæ ex Cerauniis montibus impetu fluminis rapitur, æstûque in littus eructatur coacta in glebas, mixtam bitumini picem redolês.

Polemoniû, alij phileteriû vocât, ramos tenues habet, vtrinque pinnatos: folia paulo maiora, quã ruta: sed longiora, ad polygoni, aut nepitæ similitudinẽ. in eis summis veluti corymbi sunt, in quibus semen nigrum. radix ei cubitalis est, subcandida, struthio similis, montanis & asperis nascitur locis.

Polium alterum montanum est, cui nomen est teuthrio, & cuius est vsus, exiguus frutex est, albus, tenui folio, dodrantalis, fructu refertus, capitulum in summo habês corymbi forma, paruum, cano capillo simile: graui odore, cum quadam odoris suauitate. alterû fruticosius est, non vsque adeo odore valido: atque etiam inefficacius.

Polygalon, quidam osirin vocant, caulem dodrantalẽ habet, folia lenticulę, gustum subacerbum.

Polygonon, id est herba sanguinalis, mas, ab aliis carcineþthron, ab aliis teuthrobanon, ab aliis clema dicitur, herba est, quæ ramos tenues, teneros, multosque habet, ac geniculis interceptos, qui per terram serpunt, vt gramen: folia rutę similia, longiora tamen, & molliora. fructû in singulis foliis fert, quã ob rê mascula noĩatur. flos albus est, aut puniceus.

Polygonõ scemina paruus frutex est, multos ramos ferês: cuius caulis est tener, harûdini similis, dẽsis geniculis, & inter se tubarum modo insitis. geniculos cingût in orbem foliolis pini similes. radix est inutilis. nascitur in riguis locis.

Polygonatum nascitur in montibus, frutex est cubito maior, folia habet lauri: sed latiora & læuiora: saporem cydonij, aut punici mali, cum adstrictione. in vnoquoque exortu foliorum flores albi prodeunt plures, & numero maiores quam folia cœpta à radice supputatione. radicem fert albã, longam, mollem, geniculis plenam, hirsutam, graucolentem, crassitudine digiti.

Polycnemon paruus frutex est furculosus, foliis origani, caule, vt pulegij, geniculis multis intercepto: vmbellã tamen non habet, sed in summo paruos corymbos, acres simul, & suauitatem etiam odoris spirantes.

D iiij

L I B E R

Polypodium nascitur in petris muscosis, & antris. aut arborum, ac præsertim quercuū caudicibus: palmi altitudine, filici simile, subhispidum, incisuris diuisum, sed non adeo minutis, radix subest hirsuta, in qua cyrri, ceu polyporum, continetur crassitudine parui digiti. abrasa vero interna pars viridis, gustu acerbō, & subdulci.

Poterium, sunt qui phrynion, Iones neurada, qui acidotō appellant: grandis frutex est, ramis mollibus, longis, lentis, tenuibusque, ac tragacanthæ similibus: foliis paruis, orbiculatis: totus denique frutex est lanosa circumdatus lanugine: estque aculeatus, floribus exiguis, viridibus. fructum fert gustanti odoratum, & acrem, sed nullius vsus, nascitur arenosis locis, & in collibus, radices subsunt duum cubitorum, aut triū, firmæ, neruæ: quæ ad terram rescissæ lachrymam gummi similem ex se mittunt.

Potamogeton folium betæ habet, hirsutum, paululum extra aquam eminens.

Propolis eligenda est, quæ flaua est, odoratæque, & styracæ redolet: & quæ in subarido mollis sit, ac mastiches instar sit ductilis.

Ptarmica exiguus frutex est, multis ramis, tenuibus, orbiculatis, abrotono similibus, refertus. circa quos folia sunt oblonga, oleis similia, in summo capitulū, vt in anthemide est, paruum, orbiculatū, acre, & suo odoratu sternutationes excitās.

Pteris, id est filix (sunt qui blanchnon, qui polyrrhizon vocent) folia habet caulis, fructus, & floris expertia, ex vno pediculo prodeuntia, ad cubiti magnitudinem, multifida, & alarū autum modo pennata: sub graui odore. radicem habet nigræ extremitatis, prælongam, ex qua plures alię veluti adnatæ exoriuntur: gustu subadstringenti, nascitur montanis & saxosis locis.

Pycnocomon erucæ similia habet folia: sed aspera, acria, & crassiora: caulem quadratum, florem ocimo similem, fructum, vt porrum, radicem nigram, rotundam, pallidam, vt paruum pomum: terrestris quid redolentem. oritur locis saxosis.

Pyrethrum herba est, caulem, foliæque emittit, vt daucum sylvestre, aut fœniculum. umbellam instar rotæ, vt anethum. radix est pollicis crassitudine, longa, gustui seruidissima: & eadem pituitam elicit.

Rha,

P

Rha, aut rheum probatissimum est, quod teredinem non sentit: quod in gustu glutinosum cum leni adstrictione lentescit, cōmanducatūque pallefcit, & croci colorē aliquē refert.

Rhamnus frutex est in sepibus nascens, ramos rectos ferens ut oxyacantha, folia oblonga, subpinguia, mollia. Est & altera rhamnus candidior: atque etiam tertia nigrior: quæ folia habet latiora, & etiam leniter rubescentia: cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, magis spinosi illi quidem, sed spinis infirmioribus, & minus rigentibus. fructus latus tenuisque, folliculi figura, & spondylia similis.

Resina ex lentisco fit, quæ lentiscina nominatur, & ab aliis quibus mastiche, ea plurima, præstantissimāque in Chio insula conficitur. cæteris præfertur in eo genere, quæ pellucet, & suo cādore ceræ Tyrrhenicæ similis est. adulta, retorrída, friabilis, odorata. viridis minus probatur. adulteratur hæc admisto thure, pineæque nuci resina.

Resina terebinthina cæteris excellit, quæ dilucidior est, alba, vitrei coloris, odorata, terebinthum olens. ac terebinthina quidem cæteras omnes antecedit, proxima huic lētiscina, deinde pinea, & abiegna, postea vero ex picea, & pineis nucibus confecta numeratur.

Resina liquida ex pinu, & picea ex Gallia, & Hetruria aduchitur, & olim etiam ex vrbe Colophone asserbatur: ex qua etiam nomen traxit, ut Colophonina resina diceretur. A Gallia quoque subalpina venit, quam incolæ laricem vocant: quæ egregie facit ad tussēs inueteratas. Colore autem differūt inter se. alia enim cādida est, alia olei colore, alia meli similis, ut larinx est. Cupressus quoque liquidam resinā fundit. Quæ vero sicca est, alia est ex pineis nucibus, alia ex picea, alia pinea, alia abiegna. Inter omnes elige odoratissimā, pellucidam, non torridam, neque dilutam, friabilē, ac ceræ similem. inter eas præstat cæteris pinea, & abiegna. sunt enim odorata, & thus olent. Ex Pithyusā Hispaniæ insula multæ resinæ cōportatur. quæ vero ex picea & nucleis pineis fit, itēque ex cupressu, inferiores sunt, nec pares aliis vires habent. Et tamen ad eadē, ad quæ aliæ, itidem adhibentur. Lentiscina vero proportionē respondet terebinthinæ. Vritur liquida resina omnis in vase, quod quadrupli capax sit eius humoris, qui infunditur. resinæ autē congrius in duobus aquæ plu-

nię congiis in vase æneo coquitur leniter ad carbonēs. continue agitando, donec odorē omnem amiserit, friabilisque & torrida efficiatur: ac digitis cedat. tum refrigerata in vase fictili nō picato reponēda est. eximij autē candoris fiet, si resina omnis eliquata percoletur, & sordes ab ea excernātur. Cremanantur etiam resinæ sine aqua ad carbonēs leuiter primum: & vbi coire cœperint, maior carbonū copia subiicienda est, & tres dies ac noctes absque vllō interuallo discoquendæ, vſque dū antedictas suas proprietates amiserint: ac postea, vti dictum est, reponēdæ. Aridas vero vnus diei spatio satis eris decoxisse, atque ita reponere. Ex resina quoque non secus, quam ex thure fuligo colligitur, si vas aliquod cauum superponatur.

Rosa refrigerat. quæ sicca est, magis adstringit. succus ex teneris exprimitur vnguibus excōtis: reliquum in pila conteri, ac premi debet in vmbra, donec cogatur: atque ita reponendum ad oculos circumlinendos accommodatum. folia in vmbra siccantur continuo versata, ne situm contrahant.

Rodia radix in Macedonia nascitur, costo similis, sed leuior & inæqualis: eaque contrita rosarum odorem præfert.

Rhus obsoniorum fructus est rhois, qua coriorum infiores vtuntur.

Rhous vero arbuscula est in petris nascens duum fere cubitorum altitudine: in qua folia oblonga, subrubentia, in ambitu ad serræ modum diuisa, fructus illi racemulis similis, dēsus, terebinthi magnitudine, quadantenus latus. cuius id, quod vice corticis eum continet, perquam vtile est. Liquamentū vero ex foliis aridis fit aqua incoctis, vt lycium, ad consistentiā vſque, ad eadem, ad quæ lycium, valens.

Σ

Sagapenum liquor est herbæ ferulacæ in Media nascentis. præstantius est id, quod pellucidum est, extra fuluum, intus candidum. olens aliquid medium inter sulphij liquorē, & galbani: & quod gustu acri sit.

Salamandra species lacertę est, iners, varia, quę falso creditur igni non cremari. vim habet erodentem, vlcérantem, & calefacientem. miscetur exedentibus, & vlcérantibus facultatibus, & lepras abolentibus, veluti cantharis: & simili modo adseruatur. liquefacta etiam in oleo pilos euellit.

Sampſuchum laudatissimum est Cyzicenum, & Cyprium.
secundo

secundo loco censetur Aegyptiū, vocatur autem à Cyzice-
nis, & Siculis, amaracus. herba autem est multis ramis præ-
dita, per terrā serpēs, foliis hirsutis, & orbiculatis, atque eius
calaminthæ, quæ tenui constat folio, similibus. odoratissima
herba est, ac calfaciens: & coronis inseritur.

Sarcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, polli-
ni thuris similis: subfulua, gustu amaro. adulteratur gummi
admixto.

Satyrion aliqui trifolium vocant, quoniam tria folia ple-
rūque fert, ut ad terrā fracta, lapathum, aut lilio similia: minora
tamē, ac rubescētia. caulē longum, nudūq; cubiti altitudine:
florem lilij forma candidum: radicē bulbosam pomi magni-
tudine profert ruffam, intus vero albā, ut ouū: gustu dulci, &
ori grato.

Est etiam alterum satyrion, quod erythraicum, id est ru-
bens dicitur, semini lini simile, sed maius, & splendescens, &
læue, & æque firmū. eius vero radicis cortex tenuis est & ru-
fus: interior vero pars alba, estque gustanti ori grata, & dul-
cis. Nascitur in apricis, & montanis locis.

Santonicum absinthio simile est: non tamen ita semine
refertur: itēque subamarum, & ad eadem, ad quæ seriphū,
efficax.

Eleoselinon, id est apium palustre, nascitur aquosis locis, sa-
tius aliquanto maius.

Seris agrestis est, & sativa. agrestis picris, aut cichorium vo-
catur: cuius & latiora, & ori iucundiora, quam hortensis, sunt
folia. hortensis vero duplex est genus, altera enim magis ad
lactuæ similitudinem accedit, & latis foliis est, & amarescēs,
altera folia habet angustiora, & subamara est.

Seriphum, hoc est marinum absinthium in monte Tauro
copiosissimum prouenit. herba est tenuis, abrotoni parui si-
militudine, referta minutis seminibus, subamara, stomacho a-
liena, graecolens, & cum quadam caliditate adstringens.

Seseli Massiliense folia habet fœniculo similia: crassio-
ra tamen: & caulē vegetiorem: umbellam profert anetho si-
mitem, in qua fructus oblongus, angulosus, acer in cibo sta-
tim. radix longa, odorata.

Seseli vero Aethiopicum hederæ folia habet, sed mino-
ra, & oblonga, ad periclymeni similitudinem accedentia. fru-
tex est grandis. viticulas fere duorum cubitorum habet: in

L I B E R

quibus ramuli dodrantes sunt. capita, ut anethi: semen nigrum, dēsum, ut triticum: & acrius, & odoratius Massiliensi: & valde suaue. ēstque ad eadem efficax.

Seseli Peloponnesiacum folia habet cicutæ: crassiora tamen, caulēque Massiliensi maiorem, ferulaceum: in quo summo umbella est ampla: in ea fructus latior, & carnosior, & odoratus continetur. easdēque vires habet. nascitur in asperis, humidisq; locis, & collibus. In Ida quoq; exoritur.

Sesamoides maius, quod Anticyraicum veratrum vocant, quoniam albo veratro in purgationibus miscetur: folia habet rutæ similia, longa, florem album, radicem gracile, ignauam, semen sesamo simile, gustu amarum.

Sesamoides minus cauliculos dodrantes habet, foliis coronopi, hispidioribus tamen, & minoribus. in summis cauliculis capitula sunt florum pene purpureorum: quorum medium albicat: semen Sesamo simile, amarum, fuluum. radix tenuis, nascitur in asperis locis.

Sideritin, aliqui heracleam vocant, folia habet marrubij: sed longiora, ad saluæ, aut quercus formam accedentia, minora tamen, & aspera. quadratos caules, ac dodrantes, vel etiam maiores producit: non ingrato gustu: & qui quodāmodo adstringat: in quibus per interualla orbiculatæ vertebrae, ut in marrubio, sunt, atque in eis semen nigrum. nascitur locis lapidosis.

Sideritis altera est, ramulis duorum cubitorum, exilibus. folia habet longis pediculis inherētia, foliis filicis similia, numerosa, utrinque per oras diuisa. habet etiam à superioribus alarū cauis alios ramulos prodeuntes, tenues, longos: in quorum cacumine orbiculata capitula, & aspera sunt: quibus semen betæ simile, sed rotundius ac durius continetur.

Sideritis tertia est, quam heracleam quoque Cratenas nominat: quæ in parietibus, vinetisque nascitur, foliis paruis, numerosis, ab vna radice exoriētibus, coriandro similibus. circa cauliculos dodrantes, teneros, subcandidos, & subrubicundos: flores puniceos, paruos, gustanti amaros, ac glutinosos habet.

Sideritin quoque nonnulli achilleam vocant. hæc ramulos dodrantes, aut maiores profert, fusorum forma: circa eos foliola parua, tenuia, ex obliquo multas, densasque diuisiones habentia, ad coriandri similitudinem subrufa, multum

tum olentia, glutinosa, multi odoris, non iniucundi, sed medicati: umbella in eis summis orbiculata insidet, flores candidi sunt, & deinde aurei. nascitur pingui solo.

Σίκος ἄγρεος, hos est agrestis cucumis est, ex quo id, quod elaterium vocant, ad hunc modum conficitur. decerpito huiusmodi cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, & diem unum seruato. postridie vero cribrum non adeo densum crateri superponito, & cultro supino, cuius acies sursum vergat, utrisque manibus cucumeres singulos apprehendito, ac findito: humorēque in subiectum cratera per cribrum exprimito: simulque carnosum, quod cribro inhererit, exprimito. quod ita ex cucumeribus expresseris, in peluim paratam demittito, coaceruata autem in cribro omnia, quæ incisa fuerint, aqua perfundantur, & ubi expresseris, abiiciantur. humor vero, qui in pelui est, agitandus & subigendus est, ac linteo contextus in sole statuendus. ubi constiterit, tota aqua supernatans, & quod in summo concreuit, effundatur. quod identidem facies, usque dum aqua supernabit. quam cum diligenter exteferis, tum subsidencia in mortarium coniecta contere, & in pastillos redige. videtur autem præstantissimum elaterium esse, quod cum candore leniter humectum est, ac leuorem, & leuitatem habet: gustūque amarissimum, & lucernæ admotum, facile accenditur. contra vero quod porri colorem habet, asperumque est, & aspectu turbidum, sordiumque ac cineris plenum, id & graue est, & vitiosum. Nonnulli etiam sunt, qui cucumeris succum misceant, nonnulli amyllum, ut & candorem, & leuitatem imitentur. Duorum autem annorum usque ad decem annos purgationibus accommodatum elaterium est. perfecta mensura, est obolus: minima, semiobolus: pueris ærei duo. copiosius datum, periculum affert.

Silybum spina est, cuius latiora sunt folia, chamæleon albo similia: quæ recens decocta ex oleo & sale comeditur.

Silphium, hoc est laserpitium, radix nascitur in Syria. Armenia, & Libya. eius caulem mastieron vocant, ferulæ similem, foliis apio similibus, semine lato, quod magudarin appellant. radix autem excalfacit, flatu gignit, ructus excitat, exsiccat, egræ concoquitur, & vesicæ nocet. colligitur è radice scarificata, & item caule ex silphio liquor, in quo gene-

L I B E R

re præstat is, qui rubescit, ac pellucidus est, quique myrrham olet, & odore valet, gustuque suavi: non porraceus, neque cuius immitis gustus est: & qui cum diluitur, facile exalbescit. Cyrenaicus vero, si quis modicum eius gustarit, humorem in toto corpore ciebit: blandissimo autem odore est, ut gustantis os ipsum, nisi paululum, oleat: at Medicus, & Syriacus imbecilliores sunt, sed magis virosum odorē reddunt. liquor omnis, prius quam siccatus fuerit, adulteratur indito sagapeno, aut lomento fabarum: quod gustu, odore, aspectu, & diluendo deprehenditur. Quidam etiam ipsum silphij nomine appellauerunt: radicem vero magudarin, folia vero maspeta. Efficacissimus autem est liquor, deinde folia, tum caulis. flatus gignit, acérque est. Ad potiones resoluitur amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane, aut melle, aut aqua. Foliorum vero liquor eadem præstat, sed efficacia multo minore. estur autem ex aceto mulso, ad arteriæ asperæ vitia accommodatum. vescuntur etiam cum lactucis, silphium pro eruca adhibentes.

Altera quoque magudaris in Libya esse perhibetur, cuius radix silphio est similis: minus tamen acris, & laxa. & quæ liquorem nullum habet: quæ eadem, quæ silphium, præstat.

Sinapi eligi debet non magnopere siccum, & retorridū, sed quod fractum intus virescat, & veluti quendam succum habeat: siquidem quod tale sit, id & recens, & vigenz est. Exprimitur ex viridi succus, & siccatur in sole.

Sinon semen paruum est in Syria nascēs, apio simile, oblongum, nigrum, feruens.

Sium frutex est rectus, pinguis, foliis olusatris, minoribus tamen, & aromaticis. De hoc Crateuas ita memoriæ prodidit, ut esse herbam fruticis specie, pauca ferentem folia, rotunda, maiora, quam menthæ, nigra, pingua, ad erucam accedentia, scriptum reliquerit.

Sisymbrium, quod alij Cardaminem, alij sium vocant, a quatilis herba est, in eisdem locis, in quibus sium, proueniens. hanc cardaminam alij nominant, quoniam cardamo, id est nasturcio sit gustu similis, folium habet in principio orbiculatum: ubi adoleuit, crucæ modo fissum.

Sisymbrium, sunt qui serpillum maiorem nominēt, nascitur incultis locis menthæ fatiuræ simile: latiore tamē folio, & odo.

odorato coronis inseritur.

Scamorica multos ab vna radice ramos ternos, aut quaternos mittit trium, aut quatuor cubitorum longitudine, pingues, aliquid crassitudinis præ se ferentes: folia hirsuta, elixina, aut hedere similia: molliora tamen, & triangula: flores albos, orbiculatos, & in calathi modum cauos, & graucolentes: radicem oblongam, crassam, vt brachium: albam, graueolentem, liquoris plenam. Colligitur autem liquor capite ab radice dissecto, & in testudinis formam excavata cultro radice: ita enim in cauum liquor defluit, qui postea conchulis excipitur. Alij scrobes in terra mortarij instar effodiunt, in quos substratis nucum folijs radices abradentes, liquorem effundunt, atque ita siccatum extrahunt. Probatur qui pellucidus est, levis, rarus, taurinae collae colore, tenuibus fistulis, spogiosus: qualis est is, qui in Mysia Asiae conficitur. Nec solum autem animum attendere oportet, vtrum linguam tangendo, exalbescat, siquidem hoc etiam fiet permixto eidem tithymali liquore: sed potius adhibere mentem antedictis conuenit, & item si non vehementer linguam exurat: quod tithymalo ei admixto solet contingere.

Scinchus alius Aegyptius est, alius Indicus, atque alius etiam in rubro nascitur mari: alius denique Apolloniae in Mauritania reperitur. Est autem terrestris crocodilus suum proprium genus habens, & cum nasturcio sale conditur.

Scilla acrem, feruidamque vim habet, assata ad multas res utilis efficitur. Crusta autem ex polline, aut luto inuoluta in furnum, aut fornacem iniicitur, aut carbonibus obruitur, donec lutum, aut crusta obducta sit abunde tosta, ea ablata, si scilla nondum emollescat, eam iterum oblinemus, atque idem faciemus. si vero ne tum quidem assata erit, maxime noxia est, vt per interna detur. Assatur eadem in olla, quae luto clausa in furnum demittitur, ex ea sumitur quod maxime intimum est, & exteriora abiiciuntur: & dissecta in partes scilla coquitur effusa priore aqua, & alia imposita: donec nec amara, nec acris aqua sit. atque ita secta in umbra siccatur: lino traiecta ita, vt frustra sese non contingant.

Scolymus, hoc est carduus, folia habet media inter chamaeleonem, & spinam albam: sed nigriora, & crassiora. caulem longum foliorum plenum profert: in quo est aculeatura

L I B E R

caput. radix nigra est, crassaque: in qua vis & facultas inest.

Scordiū in montanis, & palustribus nascitur, foliis chamedryos, sed maioribus, nec sic in ambitu diuisis, odore aliquantum allium olentibus: gustu amaris, & adstringentibus: caulibus quadratis: in quibus flos rubescens insidet.

Scordon, hoc est allium quoddam satium est, quod hortēse est, & in Aegypto nascitur vno capite, albū: vocantque eius diuisiones, spicas: quoddam vero agreste, quod ophioscorodon, quasi anguinum allium nominant.

Scordoprasum vero porri magnitudinē exæquat. ēstque porri, & allij qualitatis particeps.

Smilax hortensis, cuius fructus ab aliquibus lobia, id est paruę siliquę, ab aliquibus asparagus vocatur, folia habet hederę, molliora tamen: caules tenues, & capreolos, qui vicinis fruticibus sese inuoluant: qui vsque adeo crescunt, ut scenas etiam representent. fructum fert scenogræco similē: sed longiorē, & magis torosum. in eo semina sunt renibus similia: sed non equali colore: sed in parte, subpurpureo.

Smyrna, hoc est myrrha, lachryma est arboris in Arabia nascentis, ēstque spinę Aegyptię similis. ē qua vulnerata defluit lachryma in tegetes substratas: alia vero circa arboris truncum concreuit. Vocatur ex his vna pediasimos pinguis, qua expressa stacte emittitur: alia vero gabira pinguisima, quę læto & pingui solo nascitur: quę multum stactes ex se mittit. Principem vero locum tenet quę Troglodytica nominatur à regione, quę eandem parit. subuiroidis hæc est, trās lucidāque. Quinetiam legitur tenuis quędā, quę post Troglodyticam in myrrhę censu reponitur, bdellij instar lentescens: odore subuiroso: & apricis locis proueniēs. Alia quędam cauealis dicitur, admodum exoleta, nigra, & torrida. Omnium pefsima est ea, quę ergasima nominatur, squalida, & pinguedine vacans, acris: gūmi odori & viribus proxima. Quę itidem minea vocatur, reprobanda est. Ex omnibus expressiones fiunt. sed à pinguibus odoratę, & pingues: à siccis, non pingues, nec odoratę. minus vero odorata est expressa myrrha, quę cum exprimeretur, & in pastillos redigeretur, oleum non assumpsit. Adulteratur macerato gummi in aqua, in qua myrrha maduerit, & myrrhę admixto. Eligenda est recens, fragilis, leuis, concolor ex omni parte, & quę cum frangitur, diuisiones vnguuium modo, læues,

ues, candidasque ostendat, minutis glebis, amara, odorata, acris, calfaciens. grauis vero & quæ piceo colore est inutilis est. Fuligo etiam ex ea fit, vt ex thure fieri ostendimus, quæ ad eadem est accommodata.

Smyrna vero, hoc est myrrha Bæotica incisa, radix est arboris in Bæotia nascētis. eligito eam, quæ myrrham suauitate odoris refert.

Sonchi sunt duo genera: alterum agrestius est, & spinosius, alterum tenerius, & vescum. caulis angulosus, subrubescens, inanis, folia in ambitum ex interuallis dissecta.

Sparganium folia habet gladioli: angustiora tamen: in summo caule veluti pilulas, in quibus fructus est.

Spartus frutex est virgas longas, foliorum expertes, firmas, non fragiles ferens. idem siliquas, vt phaseoli, producit, in quibus semina exilia, vt lenticulæ, continentur. flos luteus, vt albæ violæ.

Spondylium folia platano quodam modo similia habet, ad panacis accedentia similitudinem: caules cubitales, aut maiores, sceniculo similes. in cacumine semen fœli simile, duplex, crassius tamen, & candidius, & plus acris habēs: graueolens. flores albi sunt, radix alba, raphano similis. palustribus, & aquosis innascitur locis.

Stactæ nominatur pinguedo recentis myrrhæ tusæ, cū exigua aqua, & prælo expressa. est autem odoratissima, præciosaque, cum per se etiam vnguentum faciat, cui stactæ nomen est. probatur ea, cui oleum admixtum non sit, & quæ in exigua portione maximam vim habeat calfaciendi, quæ proportionē myrrhæ, & ceteris calfacientibus vnguentis respondeat.

Staphis agria, id est herba pedicularis, aut vua taminia, folia habet labruscæ diuisa, coliculos rectos, nigros, florē isati similem: fructum in folliculis viridibus, vt cicer, triangulum, scabrum, in nigro subfuluum. interna pars alba est, gustu acris.

Staphilinus, hoc est pastinaca sylvestris, à nonnullis ceras, hoc est cornu dicitur, habet gingidij folia, sed latiora, & subamara. rectū fert caulē, asperū, in quo umbella est anetho similis: in qua flores albi, & in medio paululum quid purpurascēs quasi croceum. radix ad digiti crassitudinē, palmique longitudinem accedit. odorata est, & cocta estur.

E

Stear, hoc est adeps. vuluæ conuenit recens anserinus, aut gallinaceus, & sine sale conditus. nam qui salem assumpfit, vtero infensus est: & item is, qui progressu tēporis acrimoniā contraxit. Ex iis recentem aliquem capito, & mēbranulis exemptis in nouam fictilem ollam, quæ altero tātō capaciōr sit, quam adipis modus, quem curare velis, coniicito: & vas diligenter opertum ardentissimo soli exponito. liquatum subinde adipem in aliud picatum vas, vsque dum totum fluxerit, excolato: tum loco gelido reponito, atque vtitor. Quidam pro sole in seruētī aqua, aut tenui & molli pruna fictile constituunt. Est etiam alia curandi adipis ratio, huiusmodi. vbi membranas exemeris, teritur, & in fictile coniectum exiguo, tritōque sale conspersum eliquatur: tum linteo pāno defecatus, reponitur: & acopis vtiliter additur. suillus vero & agnus adeps hoc modo curatur. recēs, præpinguis, qualis à renibus detrahitur, adipem in copiosam aquam pluuiā, & quam frigidissimā coniicito, membranas adimito, manibus diligenter subigito, ac confricato, quasi distringas. tum alia aqua sæpe ablutum in ollam fictilem dupli capacem imponito: aquam affundito, vt adipem superet, lenibus prunis admoueto, ac rudicula agitato. vbi eliquatus sit, colo in aquam transfundito: ac refrigerari finito. & rursus excolata diligenter aqua in aliam ollā prius lotam coniicito: & aqua affusa, permittito vt sensim liqueat. amotum deinde ab igni, & breui spatio sic dimissum, vt fex subsidat, in mortarium spongia ex aqua prius madefactum versato. vbi coire cœpit, relidens in imo sordes eximitur: & tertio sine aqua liquatur: liquatūque in mortarium iterum effusum, purgatum in fictile coniicito, & operculo imposito, perquam frigido loco reponito.

Hircinus vero, & ouillus, itēque ceruinus ita curantur. Capitur, vt diximus, alicuius horū adeps, lauaturque, ac mēbranulis purgatur, vt in suillo ostēdimus: in pilā cōiicitur, ac manibus fricatur aquam paulatim affundendo, donec nullū sanguinis vestigium excernatur, nec vlla pinguedo supernatet, sed aqua limpida reddatur. deinde in ollam fictilem conice, & affusa aqua, vt superemineat, lenibus prunis admoueto, & agitato. cum totus fuerit liquatus, in aquam versato, & refrigeratum, ac lotum in fictilem iterum indito, & eliquato. & idem facito, quod in cæteris. tertio ve-

ro loco citra aquam liquato, & in pilam humore perfusam excolato, & vbi refrixerit, reponito, vt de suillo admonuimus.

Bubulus quoque adeps à renibus detractus membranulis purgandus est, & marina ex alto petita abluendus: & in pila contundendus diligenter, aspersa maris aqua. vbi totus fuerit dissolutus, in fictilem ollam coniciendus, & marinæ aquæ tantum indendum, quantum supernatet non minus, quam palmi altitudo sit: tum coquendus adeps, vsque dum proprium odorem abiecerit: additis ad singulas adipis atticæ minas quaternis ceræ Tyrrenicæ drachmis. colandus vero est, & abiectis, quæ in imo residebant, fordibus, in nouum fictile reponendus: opertusque interdiu in sole tenendus, vt exalbescat, & virus odoris aboleatur.

Taurinus vero ita parandus est. tauri adipem recentem, & ex renibus capito, in amne fluenti abluito, membranis exëptis in ollam fictilem coniecito, salis parum inspergito, liquefacito. tum in aquam pellucidâ per colum traicito, vbi cœpit concrefcere, manibus vehementer confricando iterû lauato, aqua sæpius infusa, atque effusa: donec optime elotus videatur: ac deintegro in ollam coniectum coquito cû pari vini odorati portione. vbi autem bis efferbuerit, amoue ab igni ollam, finito adipem ita per noctem esse. sequenti die siquid fœdi adhuc odoris relictum sit, eundem adipem in aliam nouam fictilem ollam coniecito, ac vinû odoratum affundito, & eadem, quæ prius, facito, donec omne odoris virus amiserit. Liquatur idem sine sale ad quasdam affectiones, quibus sal aduersatur. veruntamen qui sic paratur, non admodum candidus redditur. Si quis verò anserinum, aut gallinaceum, aut vitulinum adipem non curatum seruare imputrem velit, sic faciat. capiat recentem, cuius velit, adipem, eumque diligenter lauet: tum in vmbra super cribro siccat. vbi siccatus fuerit, linteo inuoluat, & manibus vehementer exprimat: mox lino traiectum vmbroso in loco suspendat: & post multos dies noua charta inuolutû frigidissimo loco reponat. permanet etiam incorrupti adipēs, qui in melle reponuntur.

Stachys frutex est marrubio similis: qui longiora, plurâq; folia habet subhispida, dura, odorata, alba, virgulas item plures ab vna radice prodeuntes, easque marrubij virgis cæ-

E ij

didiores. oritur in montanis, asperisque locis.

Stœchas in insulis iuxta Galliam, contra Massiliam, quæ Stœchades appellantur, provenit: atque inde etiam ei nomen est ductum. herba tenuibus furculis est, coma thymi, sed folio longiore, eaque aliquantulū acri gustu, & subamara est.

Stratiotes, qui in aquis nascitur, hoc nomen inuenit, quia sine radice in aqua supernatat, folium habet semper uiuo simile: sed tamen maius.

Stratiotes vero millefolium, paruus frutex est, pusillus, do drantal, & etiam maior. habet folia auicularum pennis similia, breui admodum, ac dissecto foliorum exortu. folia aggregati cymino maxime sunt sua breuitate similia: sed sunt etiam breuiora. umbella hirsuta est, sed densior, & adultior in cacumine furculos exiguos gerit, in quibus insident umbellæ anethi instar. flores albi, paruique. nascitur præcipue locis subalperis, & potissimum circa semitas.

Strychnon, hoc est solanum, quod hortense est, frutex paruus est cibus aptus, multis concavus alis, foliis nigris ocimi, & maioribus, & latioribus. fructus rotundus, viridis: ubi maturuit, niger, aut fuluus. innoxij gustus herba est.

Est etiam aliud solani genus, quod halicacabum vocant, foliis antedicto similibus: latioribus tamen, cuius caules, cū adoleuerunt, humi sternuntur. fructum fert in folliculis rotundis vesicarum instar, rufum, leuem, acinorum vix forma: quo vtuntur etiam ad componenda ferta ij, qui coronamenta conficiunt.

Strychnon vero hoc est solanum, quod soporiferum vocatur, ab aliis halicacabi, ab aliis calliæ nomine appellatur: estq; frutex multis, densis, caudicosis, & ægre fragilibus caulibus: foliorum pinguium plenis, malo cydonio similibus: flore rubro, iustæ magnitudinis, in saxosis nascitur.

Strychnon vero manicô, hoc est furiosum, quod alij perfron, alij pentodryon vocant, folia habet crucæ: sed maiora ad acanthi, quem pœdarota nominant, folium accedentia, caules ab radice proceros emittit denos, aut duodenos: vlnę altitudine, in quibus oliuarum figura superposita sunt capitula, sed hirsutiora, vt platani pilulæ: maiora tamen & crassiora. flos illi niger, post florem, fert fructum racemi forma, rotundum, nigrum, ex denis aut duodenis acinis constans.

stantem, hederę corymbis similibus, &, sicut vua, mollibus. radix alba est, crassa, caua, cubitalis, montanis, vento perfla-
tis, & platanis confitis locis nascitur.

Styrax arboris cotoneo malo similis lachryma est. ex-
cellit ceteris flavus, pinguis, resinofus: grumos habens albi-
cantes, quamplurimum in odoris bonitate permanens, &,
dum emollitur, melleum quendam humorem emittens. talis
Gabalites est, Pisidiacusque, & Lycius, at niger, friabilis, &
furfuraceus, deterior est. Reperitur quoque lachryma gum-
mi similis, pellucida, myrrham olēs, sed ea perexigua est. A-
dulteratur sue arboris scobe: quam vermes erofuerunt, ad-
mixtis melle, atque iridis sedimento, & aliis rebus quibusdā.
Alij ceram, aut adipem odoribus imbutum ad solem arden-
tissimum cum styrace subigunt: & per laxa cribri foramina
in aquam frigidam, tanquam vermiculos exprimunt, ven-
duntque: huncque scolociten, à vermium figura nominant.
atque imperiti hunc vt minime adulteratum, ceteris antepo-
nunt: ad intentam odoris fragrantiam nihil animum aduer-
tentes, nam qui fraudis expers est, is est admodum acer. Cæ-
terum non secus, quam thus, torretur, assaturque: & ex eo fu-
ligo colligitur.

Sycomorum aliqui etiam sycaminum vocant: cuius fru-
ctus etiam sycomorum propter imbecillem & ignauum gu-
stum nominatur. Grandis arbor est, fico similis, multi ad-
modum liquoris, foliis mori. fructum ter, aut quater anno
fert, non ex ramis, vt ficus, sed ab ipso caudice, caprifico simi-
lem, sed grossis dulciorem: ac sine granis interioribus: qui-
que nisi vngue, aut ferro scalpatur, non maturefcit. Copiose
nascitur in Caria, & Rhodo, ac locis tritici non feracibus, in
caritate autem annonæ, propter fructum, quem continuum
fert, auxilio est: fructus aluo utilis est, sed exiguum alimen-
tum præbet: estque stomacho alienus. Liquor ex arbore col-
ligitur vere prius, quam fructum ferat, lapidis ictu summo
cortice confuso, nam si altius vulneretur, nihil emittet. La-
chryma colligitur spongia, aut lana: ac siccata, & in pastillos
reducta fistili vase adseruatur. Gignitur etiā in Cypro arbor
genere ab hac differens: siquidē folia nō sycamini, sed plata-
ni gerit. fructū vero fert pruni magnitudine, sed dulciorem.
in ceteris omnibus similis est iis, de quibus modo diximus.

Symphytum petræum in petris nascitur, ramulis origani,

E iij

L I B E R

tenuibus, capitulis thymi. totum vero est lignosum, atque odoratum: gustu dulcius, & adstringens. radicem habet longam, subruffam, digiti crassitudine.

Symphytum, quod alij pecton vocant, caulem bicubitalē emittit, aut maiorem, angulosum, inanē, vt sonchi caulis est. circa quem non ex magnis interuallis folia sunt hirsuta, angusta, prelonga, ad buglossi formam. & secundum eos angulos, caulis strictus est foliis à singulis alarū cauis prodeuntibus. flores fert luteos, & fructum in caule, vt verbascum. ac totus denique caulis, atque folia subaspera lanugine quadam horrent, ac tangenti pruritum excitant. radix subest, cuius extremitas nigra est, interior vero pars alba, & glutinosa.

Schinos, hoc est lentiscus, nota arbor est: cui toti vis adstringendi inest. nam & fructus, & folia, & cortex ramorum & radice, parem vim habent. Exprimitur etiā succus ex cortice radice, foliisque in aqua vsq; adeo decoctis, vt satis sit. vbi vero refrigerata sunt, foliis abiectis, aqua iterum coquitur, donec fiat tam spissa, quam mel.

Schœnus, id est iuncus. vocatur alter leuis, alter vero acutus, qui in mucronē desinit, cuius etiā duo sunt genera. nam alter sterilis est, alter vero fructum edit nigrum, orbiculatū, cuius crassiores & carnosiores sunt calami. Est etiam tertius iuncus antedictis carnosior: quem holoschœnon vocant: ipsēque fructum in cacumine suprascripto similem paria.

T

Teucris herba est virgata, chamædryi similis, foliis tenuibus, ciceris figura. plurima vero nascitur in Cilicia in ea parte, quam Cissadem, Gentiadēque nominant.

Telephium, quod alij agreste semperuium, alij agrestem portulacam, alij muscum vocant, folia, & caulem habet portulacæ. binas alas habet, quæ in singulis foliorumgeniculis exoriuntur. ramuli à radice sex, aut septem exeunt: foliis referti crassis, carnosis, & glutinosis. flores albi sunt, nascitur vere, in vinetis, & cultis locis.

Tithymali genera sunt septem: quorum masculus characias, quasi vallaris dicitur, ab aliquibus propter comam, cometes, ab aliquibus vero amygdaloides, & ab aliquibus gobius: femina vero myrtites vocatur, quem quidā à nucibus caryitem

caryitem vocant. alius est paralius, quem quidam tithymalida nominauerunt: alius est helioscopius, alius cyparissias, alius dendrodes, alius platyphyllos appellatur.

Tithymali, qui characias dicitur, caules cubitum excedunt, rubri, liquoris albi, & acris pleni. folia in virgis oliuę similia, sed minora & angustiora, crassa, lignosaque: in quorū summo coma est, qualis in iuncorum virgis. sub ipsis vero caua peluibus similia, in quibus fructus inest. oritur hic in asperis & montanis locis.

Liquor ex omni tithymalo per messem colligitur, ramulis congestis, tum dissectis, & vase conclusis. quidam erui farinam adiiciunt, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. alij siccatis ficibus tres, quatuorve guttas instillant, & cum inaruerint, reponunt. per se etiam tusus in pila, & in pastillos redactus reponitur. Dum vero liquor excipitur, neque vento expositum esse hominem oportet, neque manum oculis admovere: sed antequam ad excipiendum liquorem accedat, corpus, ac praesertim faciem & scrotum adipe aut oleo cum vino perungere. Fauces etiam exasperat.

Fœmina vero, quam myrtitem aliqui vocant, & caryitem nominauerunt, similis daphnoidi est, suaptęque natura alba est: & folia habet myrti, sed maiora, & firma, & in summo acuta, aculeatęque. viticulas ab radice mittit dodrantes. fructum alternis annis nuci similem fert: qui leniter linguā mordet. hæc quoque asperis provenit locis. eius liquor, eiusque folia, & fructus eandem vim habent, quam superior, & eodem modo reponuntur. superior tamen est efficacior.

Tithymalus vero, qui paralius dicitur, quem tithymalidem, aut meconem appellauerunt, maritimis locis nascitur. ramos habet dodrantes, rectos, quinos, senosve, subrubentes, à radice prodeuntes. in quibus folia sunt deinceps digesta, parua, subangusta, oblonga, lino similia. caput in cacumine densum, orbiculatum: in quo fructus instar erui, varius: flores albi, totus denique frutex, radixque copioso liquore albo abundant. hic etiam ad eodē vsum, eodēque modo, quo superiores, asseruatur.

Qui vero helioscopius, quasi solis assecla nominatur, portulacę habet folia, tenuiora tamen, rotundioręque: ramos quatuor, aut quinque ab radice dodrantes mittit, tenues, rubros, liquoris albi copiosi plenos: caput anethi forma. fructus

E iij

ecu in foliis includitur. Circumagitur huius coma ad cursum solis: vnde ei nomen est ductum. nascitur potissimum in ruderibus, & circa oppida liquor fructusque ex hoc, vt ab aliis, colliguntur: qui eandem vim, sed non ita efficacem habent.

Cyparissias caulem profert dodrantalem, & maiorem, sub rubescentem: ex quo folia pino similia exoriuntur: teneriora tamen, tenuioraque. omnino autem pino nuper nascenti similis est: ex quo etiam nomen inuenit. est hic quoque liquoris albi plenus, & eandem, quam superiores, vim habet.

Dendrodes vero, hoc est arborefcens, in petris nascitur, frondosus ex omni parte, & multa coma refertus, liquoris plenus, ramis subrubentibus. foliis myrti tenuis, fructu characiz simili. hic ad eandem efficax, & eodem modo, quo supra dicti, reconditur.

Platyphyllos, hoc est lata folia habens tithymalus verbasco similis est: cuius liquor, radix, & folia per aluum aquosa trahunt. pisces itidem enecat, tufus, & aquæ inspersus. id quod etiam ij, de quibus supra diximus, efficiunt.

Pithyusa, quam aliqui sarmentum, vel crambion, vel paralion, vel canopicon vocant, specie à cyparissia tithymalo differre existimatur: vnde inter tithymalos hæc etiã numeratur. caule assurgit cubito maiore, geniculato, foliolis acutis, tenuibusque vestito, pini similibus. flores habet exiguos veluti purpureos: fructum latum laticulæ instar: radicem candidam, crassam, liquoris plenam. quibusdam autem in locis valde grandis inuenitur.

Tordylon, quod aliqui seseli Creticum vocant, nascitur in Amano Ciliciæ monte. exigua herba est, surculosa, semine rotundo, duplici, clypeolis simili, subacri, aromatico.

Tragoriganum paruus frutex est agresti serpillio similis folio, & ramulis. pro locis autẽ, in quibus oritur, lætior. & lætioribus foliis inuenitur, glutinosusque valde est. Alterum tragoriganum est tenuioribus surculis, & foliis, quod marrubium quidã vocauerunt. optimum vero est Cilicium, Smyrnum, & Creticum.

Tragacantha radix lata, lignosaque est, supra terram emergens: ex qua rami humiles, densi, firmi, & late se pandentes prodeunt: in eis foliola tenuia, numerosa sunt, in quibus mediis aculei se proferunt foliis operti, candidi, recti, firmi. Est etiam-

etiamnum tragacantha lachryma, quæ ex vulnerata radice manâs concreuit. in qua præstat ea, quæ pellucida, læuis, gracilis, pura, & subdulcis est.

Tragus formam habet alicę similem. multo minus, quam zea nutrit: quia multum aceris habet. quocirca egrius conficitur, & aluum emollit.

Tragium in Creta solum nascitur. folia, virgas, & fructum lentisci fert: omnia tamen minora. Liquorem etiam gummi similem profert.

Tragium alterum est, quod folia scolopendræ habet, radicem albam, tenuem, sylvestri raphano similem.

Tragium, quod scorpium, aut tragoriganum vocant, prope mare nascitur. paruus frutex est, non admodum supra terram grandis, magnitudine dodrantis, aut maiore. foliis vacat. pusillos tamen circa ramos ceu acinos habet, rufos, tritici magnitudine, acuminato cacumine, multos, gustanti adstringentes.

Tragopogos, id est barba hirci, ab aliis coma dicitur, breui caule est, foliis croci, radice longa, dulci, magno supra caulem calyce. in summo nigrum semen, vnde ei nomen est inditum, herba esui apta est.

Tribulus terrestris folia habet portulacę, tenuiora tamen. viticulas habet longas, per terram stratas: spinas in foliis duras. nascitur secus flumina, & in arcibus domorum. est alius aquatilis, qui in fluminibus nascitur, comam exerens, spinam recondens. habet is folia lata, longum pediculum, caulem in summo crassior, quam in imo: adsunt ei & capillamenta quædam spicę forma. fructus, ut alteri, durus. nam vterque adstringit, refrigerat.

Thraces vero Strymonis fluminis accolę viridi herba tribulorum equos saginant: & semen eorum dulce, & ad nutriendum aptum pinsunt, ac pro pane vtuntur.

Tripolium nascitur locis maritimis: ad quæ vnda maris peruenit, & recedit: sed neque in mari, neque in sicco. folia isatidis habet, crassiora tantum: caulem dodrantalem, superne diuisum. Huius flos ter in die colorem mutare perhibetur, mane candidus, meridie purpureus, vesperti puniceus. radix ei alba, odorata, & gustu calfaciens.

Trifolium, alij menyantes, alij asphaltion, alij cnicion, alij oxyphyllon vocât, frutex est cubiti altitudine, aut etiam

L I B E R

maiores: virgis tenuibus, nigris, iuncis, appendiculas habentibus, in quibus folia loti arboris terna in singulis germinationibus prodeunt. his recens natis rutæ odor est: adultis, bituminis. florem emittit purpureum, semen hirsutum, quodammodo latum: in altera extremitate veluti apicem habens. radix tenuis, longa, firma.

Tyros hippica, caseus equinus est, virus redolens: ac magnopere alens ad bubuli proportionem. Nonnulli vero hippacem, equinum coagulum vocarunt.

Typha profert foliū cyperidi simile: caulem læuem, æquabilem, florem in cacumine ambientem, densum, qui in pappos resolvitur, quem paniculam aliqui nominant.

Y

Υάκινθος, hoc est hyacinthus, folia habet bulbi, caulem doratalem, læuem, paruo digito tenuiorem, virentem, comam procumbentem, incuruam, florem purpureum plenum: & radicem item bulbi.

Υδροπέπερι, hoc est hydropiper maxime iuxta stagnantes aquas, aut leniter fluentes nascitur. caulem geniculatum fert: in quo alæ, & folia menthæ, maiora & cãdidiore, & tenuiora, gustus acris, vt piper, non tamẽ aromata redolet. fructum acrem in ramulis fert prope folia nascentem, continuum, & acinorum figura.

Υοσκύαμος, hoc est altercum (sunt qui adamantia vocent) frutex est, qui caules crassos, lata folia, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta profert. per caulem vero deinceps flores tãquam cytini punicorum clypeolis septi, ac seminis, vt papaueris, pleni prodeunt. Alterci autem est triplex differentia: vnũ enim flores subpurpureos fert, folia smilacis, semen nigrum, & cytinos duos, ac spinosos. alterius flores lutei, folia ac siliquæ teneriores, semen subflauum, vt erysimum. vtrunque autem insaniam, & soporem inducit: & idcirco inutile, vt ad curationem adhibeatur. mitissimum est tertium, quod pingue, tenerum, lanuginosumque est, floribus albis, & albo itidem semine. oritur id in maritimis, atque ruderibus. albo igitur vtendum est: si hoc non suppetat, flauo. nigrum, vt deterrimũ, reiiciendum censeo. ex fructu tenero, foliis, caulibusque confusus succus colligitur: & humor in sole siccatur. vsus ad anum pertinet: siquidem facile putrescit. colligitur etiam succus

cus ex sicco semine, cum per se teritur aqua calida affusa, & exprimitur. atque hic quidem succus est antedictio melior: & ad dolores leniendos magis valet. ipsa etiam herba recens tusa, & farina trimestris tritici admixta in pastillos conformatur, & reponitur.

Υπίρικον sunt qui androsæmon, qui corion, qui chamæpityn appellent, quoniam semen odore pineam resinam imitatur. folia rutæ habet, fruticem surculosum, dodrantalem, subrubrum, violæ albæ florem, siliquam subhirsutam, terebentem, hordei magnitudine: in quo semen nigrum resinam olens continetur. in locis cultis atque asperis gignitur.

Υπόκισις, ad cisti radices nascitur, quæ hypocistis nominatur: quam aliqui orobethron, aliqui cytinum vocant: estque puniceorum cytinis quodam modo similis. quædam autem fulva est, quædam alba, ex qua succus, ut ab acacia, colligitur. quidam tamen eam siccatam, tusamque macerant, & coquunt, & cætera faciunt omnia, sicut in Lycio.

Υπέρκοον in segetibus, arvisque nascitur. foliū rutæ, ramosque paruos habet, vis eius papaveris succo proportionem respondet.

Υσσώπος, hyssopus herba est nemini incognita. duplex hæc est, montana, & hortensis. omnium vero laudatissima, quæ in Cilicia nascitur.



Φαλός, id est lenticula, quæ palustris nominatur, in aquis stagnantibus reperitur: foliaque habet lenti similia.

Phalangium, sunt qui phalangiten, sunt qui leucacantham vocant, ramos habet binos, aut ternos, aut etiam plures inter se dissidentes: flores albo lilio similes: multas incisuras habentes: semen crassum, nigrum, ad dimidiatæ lentis figuram: sed multo tenuius: radiculam tenuem, viridem, dum è terra eruitur. nam postea contrahitur. in tumulis gignitur.

Phalaris cauliculos emittit è radicibus tenuibus, & inutilibus geniculatos, ac culmis zeæ similes: sed graciliores, & gustu dulci: foliis itidem est zeæ similibus. semen candidum, oblongum, milij magnitudine.

Philyris arbor est magnitudine cypro similis. folia fert oliuæ, sed latiora, & nigriora: fructū echino similem, nigrum, modice dulcē, quasi in racemis iacētē. nascitur locis asperis.

L I B E R

φλόμος, hoc est verbasum, duas summas habet differentias alterum enim album est, nigrum alterum. album vero alterum masculum, alterum foemina. ac foeminae quidem folia brassicae sunt, sed hirsutiora, candidioraque: caulis cubitalis, & maior, albus, modice hirsutus, flores candidi, subvirides, semine nigrum: radix longa, acerbi gustus, crassitudinis digiti. nascitur in campestribus. Alterum masculum dicitur λευκόφυλλον, hoc est albis foliis, oblongum, sed foliis angustioribus, & caule tenuiore. Nigrum quoque est albo in rebus omnibus simile: veruntamen latiora, nigrioraque habet folia. Quod vero sylvestre nominatur, excelsas virgas, arborescentesque, ac folia salviae similia fert: & ramos in virgis habet, ut marrubium: florem luteum auri fulgore. sunt etiam verbascula duo hirsuta, terrae inhaerentia, foliis rotundis, est & tertium verbasum quod lychnitin, quidam vero thryallida vocant. id tria, aut quatuor, aut etiam plura fert folia crassa, pingua, hirsuta, ad funiculos lucernarum accommodata.

φοίνιξ, id est palma, quam aliqui elaten, aut spatham vocant, fructus palmarum adhuc florentium inuolucrum est. eo utuntur vnguentarii in vnguentis conspissandis. praestantissimum est, quod odoratum est, adstringens, graue, preclusum, intus pingue.

Phœnix ab aliquibus rhus, ab aliquibus anchynopes vocatur, folia habet hordei, sed breviora, & angustiora: spicam lolio similem: ramos radici inuolutos senum digitorum: spicas vero septenas, aut octonas. oritur in aruis, & testis recens illitis.

Phu, quod aliqui sylvestre nardum vocant, nascitur in Ponto foliis elaphobosci, aut olusatri. caulem habet cubitalem, aut maiorem, leuem, tenerum, purpureum, in medio cauum, geniculis distinctum: flores narcisso proximos, maiores tamen & in subalbo colore purpureos. Radix vero superius ad digiti minoris crassitudinem accedit. habetque adnascens ex aliquo radices exiguas, ut iuncus odoratus, aut veratrum nigrum, inter se complicatas, subflauas, odoratas, nardum odore referentes, cum quadam virosa grauitate coniuncta.

φύκος θαλάσσιος, id est alga maris, vel fucus marinus, partim latus est, partim oblongus, & puniceus, partim candidus, qui in Creta ad terram nascitur, valde floridus, & non putrescens. omnes vero habent adstringendi potestatem.

Nicádes

Nicander autem autor est, puniceum venenatis prodesse: quem existimauit quidam esse fucum, quo mulieres vtuntur: cum tamen sit radícula eiusdem nominis, quam ad eam rem mulieres adhibent.

Phyllitis folia emittit lapatho similia, oblongiora, vernantioraque, sena, aut septena, recta, interiore sui parte læuia, & tergo autem pensiles quasi vermiculos quosdam tenues habentia. nascitur in vmbrosis locis, & hortis, gustu acerbo: eaq; nec caulem, nec fructum, nec florem profert.

X

καλβάνη, hoc est Galbanū, liquor est ferulæ in Syria nascentis, quod nonnulli metopium vocant. probatissimū galbanum est, quod thuris speciem gerit, grumosum, purū, ligni expers, seminis ac ferulæ aliquid admixtum habens: odore graui, neque valde humidum, neque adeo aridū. Adulteratur admixta resina, & lomēto fabarū, & amoniaco. si tamē purgare ipsū velis, in seruētē aquā demittito. cū enim fuerit liquefactū, eius sordes fluitabunt: quibus separatis, mūdo lintheo, raroque alligatū in fictili picato aut ærea pyxide ita pendeat, vt imū vasis ne cōtingat: & obturato vase in aquā feruidā demittito. sic enim quod vtile in eo est, in vas quasi per colum cli quiescet: quod vero lignosum fuerit in lintheo remanebit.

Chamædaphne, quam aliqui laurum Alexandrinā vocant, virgis assurgit cubitalibus, singulari constantibus ramo, tenuibus, rectis, læuibus, foliis lauri: multo tamen læuioribus, & viridioribus. fructum rubrum fert, foliis adnatum.

Chelidonium maius, quod aliqui othonion, vocant, caule habet cubitalem, & maiorem, tenuem, qui multas habet apices foliis plenas: folia ranunculi: tenuiora tamen, & colore modice cæcio. in singulis foliis flos est vt albæ violæ. Succus croceus ei inest, acer, mordens, & aliquantulum subamarus, graueolēs, radix in superiore parte vna, in inferiore multæ. Fructus est qualis papaueris cornigeri, tenuis, lōgusque: in quo semina sunt, papaueris semine maiora. Huius succus in vase æneo cū melle coctus ad carbones ignitos, ad oculorum claritatē facit. Exprimitur autem succus ex foliis, radice, & fructu ineunte ætate, in vmbra siccatur, in pastillos redigitur, reponitur.

Chelidonium minus, quod agreste triticum quidam vocauerunt, parua herba, ex pediculis pendens, caule vacās: foliis

hedere, rotundioribus tamē, subpinguibusque vestita. radices habet ex eodem callo prodeuntes pusillas, complures, tritici modo coaceruatas: quarum tres, aut quatuor in longitudinē abeunt. iuxta aquas, & lacus exoritur.

Chamæcissus folia habet hederæ similia, lōgiora tamen, tenuioraque, & multa: ramulos dodrantes, foliorum admodū plenos, quinque aut sex à terra prodeuntes: flores albæ violæ sed minores, & gustu valde amaro: radicem albam, inutilem. nascitur cultis locis.

Chamelea ramos dodrantes profert. frutex ipse furculosus est: foliis oliuæ, sed tenuioribus, & densis, gustum mordentibus, & arteriam deradentibus.

Chamædrops, quæ aliis chamedrys, aliis teucrium est, asperis, saxosisque locis prouenit. frutex dodrantal, foliis minutis, figura & diuisura quercus, amaris, flore subfuluo, paruo. carpenda est semine prægnans.

Chamæpytis, quam in Ponto holopyron, in Eubœa sideritin, Athenis vero Ioniam vocant, herba est per terram serpēs, subcurua: folia habet minoris semperuiui: sed paulo tenuiora, hirsuta, frequētia, pinguiora circa ramos. pini odore. flores habet tenues, luteos, aut albos: radicē, vt cichorion. Est & altera chamæpytis ramis cubitalibus, in anchoræ speciem curuatis, tenui cortice, coma supradictæ, flore candido, semine nigro: quæ pinum itidem redolet. Tertia est, quæ mascula dicitur. herbula autem est foliola habens candida, tenuia, hirsuta, caulēque album, hirsutum, & flosculos luteos, exigua denique semina circū alas: quæ nō secus pineū odorem exhalant.

Chamæleo albus, quod ixiā tracto à visco nomine vocant aliqui, propterea quod alicubi viscū ad eius radices inueniatur, & quo, loco mastiches, mulieres vtuntur, folia habet filibo, carduove similia: nigri tamē chamælonis foliis asperiora, acutioraque. caulem non promit: sed ex medio spinam echino marino, aut cinaræ similē erigit. flores habet purpurascētes capillorum figura, qui in pappos euanescent: fructum cnico similem: radicem læto sono crassā, montanis vero graciliorem, candidāque intus, aromaticam quodammodo, grauis odoris, & dulcem.

Chamæleo vero niger, quam aliqui vlophonon, aliqui ixiā, aliqui cynomachon, aliqui ocimoidem vocauerunt, habet ipse quoque folia carduo similia: minora tamen, & tenuiora,
& ru

& rubra distincta. Caulem promit digiti crassitudine, dodran-
talem, rubentem, in quo umbella, & aculeati flores tenues, hy-
acinthi figura, & versicolores insident. radix subest crassa, ni-
gra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flavescit, & comman-
ducata mordet. Oritur autem campestribus, siccis, cliuosis, &
maritimis tractibus. Chamæleo vero nominatur, quod folio-
rum colorem mutet, colorem enim cum terra, in qua herba
nascitur, mutant, ut hic admodum viridia, illic ruffa, alibi sub-
candida, alicubi cærulea, & non nullibi rubra pro locorum
differentia comperiantur.

Chamæsyce, aut Syce ramos quaternū digitorū in terrā de-
iectos, teretes, liquoris plenos emittit, folia lēticulæ figura, pe-
plo similia, parua, tenuia, humi strata, sub foliis fructus est ro-
tundus, ut in peplo. hæc neq; flores, neq; caulē profert. radix ei
est tenuis, ad nullā rē utilis. nascitur saxosis, squalidissq; locis.

Χολὰ, id est sel. eius omnis seruandi hæc est ratio. Fel recēs
capito, osculum lino obligato, tandiu in feruenti aqua tene-
to, quandiu spatium trium stadiorum quis currendo confi-
ceret: mox eximito, umbroso & humoris experte loco siccato
Quod vero oculorum medicinæ seruandū est, ligatum lino
in vitreum vas quod mel habeat, immittito, lini principio ad
os vasis circumuoluto, & operto vase recondito.

Χόνδρος, hoc est alica, fit ex zea, quæ bina grana gerit, quā
ἀίχνοκον vocant. magis nutrit alica quam oryza: aluumque
cohibet, & stomacho est utilior.

Condrilla foliis, caule, floribusque est cichorio similibus:
quam ob rem nonnulli hanc intybi agrestis speciē esse dixe-
runt: sed est tota tenuior. in cuius ramusculo gummi simile
mastichæ, fabæ magnitudine inuenitur.

Est etiā aliud chōdrillæ genus foliū ferēs circūrosum oblō-
gū, humi sparsum, caulem liquoris plenum, radicem tenuem:
in cuius summo vertex est rotundus, subflauus, liquore refertus.

Chrysocome, quam chrysin vocant, virgula est dodranta-
lis: quæ comam corymborum figura hyssopo habet similem:
radicem valde pilosam, tenuem, ut nigri veratri: gustu nō in-
suauis. qui ut in cypresso fit, in dulci leniter austerus sentitur,
in opacis saxosisque nascitur.

✧

Ψύλλιον. Psylliū aliqui cynocephalō, aliqui christalliō, ali-
qui cynomyiam vocāt. folia habet coronopi, hirsuta, ramos

L I B E R

dodrantes, totaque herbula fœni instar sarmentosa est. eius coma à medio caule incipit, duobus tribusque conuolutis in cacumine capitibus: in quibus semen est pulicibus simile, nigrum. in aruis gignitur.

Ψευδοβούνιον frutex est palmi altitudine in Creta nascens: habetque folia bunio similia.

Ω

Ωκίμορ. Notum omnibus ocimum est. hoc, si largius eo quis vescatur, oculorum aciem hebetat, aluum etiam molli, inflationes facit, urinam ciet, lac prouocat, ægre mutatur in stomacho. Afri addunt, si à scorpione vulnerentur qui ocimum comederunt, eos nullo dolore confictari.

Ωκίμοειδής hoc est ocimastrum, folia habet ocimi: ramulos dodrantes, eisdemque hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, nigri seminis plenas, ad melanchi similitudinem.

F I N I S L I B R I D E V O D E C I M I.

ORIBASII MEDICINALIVM COLLECTORVM,
LIBER DECIMVSTERTIVS.

De facultate, atque apparatu metallicorum, ex Dioscoride.



As, hoc est sal. In omni salis genere fossilis est efficacissimus: communiter vero candidus, calculis vacans, pellucidus, densus, concretionem suam æqualis, peculiariter genere ammoniacus, scissilis, & qui rectis sit venis. Virtus fictili diligenter operto, ne exiliat, conditoque prunis, donec igni candescat. Aliqui fossilem subactio polline oblinunt, & carbonibus subiiciunt, usque dum eius crusta exuratur.

Αλὸς ἄχνη, hoc est spuma salis, est maris spumofum rametum.

tum, in exilibus petris inuentum, quod eisdem est, quibus sal, viribus præditum.

αλὸς & ὄθος, id est flos salis, flumine Nilo defluit. lacubus tamen quibusdam innatat. sumendus qui crocei coloris est, odoris ingrati, ut gari, & grauioris etiam, gustu mordacioris subpinguisque, qui vero rubricæ colore rubet, grumosusque est, improbatum.

Adarce vero quæ dicitur, in Galatia fit. est autem tanquã concreta salsugo, humidis, ac palustribus locis siccitate emergens, harundinibusque & herbis agglutinatur. colore vero flori lapidis Assij similis est: totaque forma molli, & modice cauo alcyonio proxima, ut lacustre alcyonium videatur.

Alcyonij sunt quinque genera. vnum densum est, rhythmo spongiosum, tetri odoris, graue, picem olēs: quod copiosum, in littoribus inuenitur. Alterum est pinnis oculorum, aut spōgię simile, fistulosum, leue, algæ odorem referens. tertium vermiculatum est, colorēque & forma purpureū, ad vnguis similitudinem, quod Melesium quidam vocant. quartum est lanis succidis simile, fistulosum, leue. quintum fungi figuram refert, odoris expers, asperum, intus ad pumicis similitudinem quandam, foris læue, acréque. ex his primum & secundum vsui sunt mulieribus & ad lentigines, & ad lichenēs, & ad lepras, & ad vitilignes, ad nigrores, & ad maculas faciei, ac totius corporis extendas. tertium vero facit ad eos qui vexantur vrinæ difficultate, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum quoque & renibus affectis, aquæ inter cutem, & licni, vstum autem, & ex vino illitum, alopecias curat. quarum dentes facit cādidos, & ad alia megmata, & psilochra assumitur. Si aliquod horum cremare velis, in crudam ollam conicito, lutoque circumlito ore eius, in fornacem mittito. cum fctile coctum fuerit, extractum ad vsum reponito. Lauatur autem vt cadmia.

Armēnius lapis præfertur is, qui læuis est, colore cæruleo, æqualis, & calculo vacans, & friabilis. eadem præstat, quæ chrysocolla: sed tamen inefficacius. auget etiam pilos palpebrarum.

Auripigmentum in eisdem metallis, in quibus sandarachignitur, optimum est censendum, quod mustaceum, aureoque colore est: & crustas eas habet squamarū modo sibi inuicē superiacentes: & quod alteri materię nō permixtū est.

F

L I B E R

tale est quod in Mysia Hellesponti nascitur .huius duo sunt genera. alterum quale diximus, alterum glebæ modo, & colore sandaracham imitans ex ponto, & Capadocia adfertur: quod etiam secundas tenet. Crematur hoc modo. in nouam testam coniectum ignitis carbonibus superponitur, assidue versatur, donec igni flagret. colorémque mutet: tum refrigeratum, tritumque reconditur.

Αεῖρος, hoc est calx viua hoc modo fit. sumito marinarū buccinarum testas, carbonibus eas obruito, aut in ignitum cli banum imposito, & nocte permittito. postero die si candidissimæ fuerint, extrahito: sin secus, iterum vrito, vsquedum penitus albæ fuerint redditæ: deinde vbi in frigidam aquam fuerint immersæ, in fictile nouum coniicito: & pannis diligenter operiens noctem vnā finito. mane eas extrahens, vbi ex omni parte calx confecta fuerit, reponito. Fit etiam ex litoralibus calculis igni crematis, & ex vili marmore, quæ cæteris antefertur. Vis omni viuæ calci communis est feruida, mordens, adurens, & crustas inducens: quibusdam aliis immixta, vt adipi, aut oleo concoquendi, molliendi, disiciendi, vlcera ad cicatricem perducendi vim assumit. efficacior existi manda est recens, & quæ aqua non fuerit conspersa.

Αεβολῆ, hoc est fuligo, qua pictores vtuntur ex officinis vitrariis fumenda est: siquidem est ea præstantior.

Γ

Γῆ, hoc est terra. Omnis terra, quæ ad medicinæ vsum recepta est, summam vim habet refrigerandi, & meatus obducendi. specie vero differt inter se: cum alia aliis quibusdam adiuncta sit ad alia utilis. Eretriæ igitur altera est vehementer candida altera cinerea. optima cinerea est perquam mollis, quæque per æs ducta violacei coloris lineam in eo linquit. la uatur vt cerussa, aut hunc in modum. læuigato ex ea quantū velis per se, & per diem in aqua terito, finito deinde vt confidat, vbi confederit, omni aqua leuiter excolata terram in sole siccato, & iterum per diem in aqua terito. vesperi dimittito, vt confidat. mane vero omni aqua excolata in sole terito, ac pastillos cōformato. si tosta opus sit, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum coniiciuntur, oréque vasis accurate obturato supra carbones igni candentes continenter folliibus perflantur, cum vero cineri aërio magis similem colorem fuerint nacti, aufer, atque repone. vim habet hæc adstringendi,

stringendi, caua explendi, & cruenta agglutinandi.

Samia vero terra anteferenda est, quæ candidissima est, levis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, succosa, mollis, friabilis: qualis est quam quidam collyrium vocant. eius duæ sunt species, ea quæ modo est dicta, & altera qui Samius nominatur: est quæ hæc glebosa, & cotis modo densa. Vritur, lauatürque ut Eretria, & eandem vim habet. sanguinis reiectiones sistit, & cū balauatio datur mulieribus fluore vexatis. Testium & mammarum inflammationes ex aqua & rosaceo illita sedat: sudorésque cohibet.

Chia eligi debet candida, ad cinereum colorem vergens, ac Samiæ similis. glebosa autem est & tenuis: sed efficiendi forma differens. eandem facultatem habet, quam Samia. faciem extendit, & splendidam reddit: in eaque & toto etiã corpore colorem commendat. in balneis vero pro nitro deterget.

Selinusia vero idem efficit. præstantissima est, quæ candidissima est, & splendet, friabilis, quæque humore conspersa cito diluitur.

Cimolia quædam candida est, quædam purpurascens, & innata pinguedinem quandam habet, tactuque frigida sentitur: quam optimam esse existimandum est.

Quæ vero Pnigitis dicitur, colore quodammodo est eretrix similis. crassiores autem habet glebas. refrigerans, & friabilis est, si quis eam manibus cōtingat. linguæ vero ita glutinatur, ut ex ea pōdeat. eadem vi prædita est, qua cimolia, sed paulo inferiore. hanc aliqui pro eretria vendunt.

Melia terra colore cinerea eretriad imitatur, aspera tactu, & manibus friata derafi pumicis instar crepitat. vim habet aluminis, sed minus efficacē. id quod gustu dignoscitur. modice autē linguā siccatur: purūq; ac coloratū corpus potest reddere pilosq; extenuare, vitiliginésque ac lepras exterere. pictoribus vsui est, ut colores diutius durēt. & viridibus emplastris est accommodata. ex hac vero, & item ex aliis omnibus terris eam eligito, quæ calculis vacat, mollis, recens, friabilisq; est, & quæ nacta humorem celeriter diluitur.

Ampelitis vero, quam pharmacitin vocant, in Seleucia Syriæ nascitur nigra, picæ longos carbonēs referens, assulæ modo scissa, æquabili splendore, quæ detrita accepto oleo statim liquefcit, primas tenet. improbatur vero, quæ tenuis

L I B E R

est, cinereaque. & quæ non liquatur. vis ei dissoluendi, refrigerandi que inest. vsus eius ad palpebras cohonestandas, & capillum tingendum. utilis quoque est vngendis vitibus, antequam geminas emittant: utpote quæ vermiculos innascentes enecet.

Lemnia terra, quam sigillum vocant, ex cuniculo quodam antri defertur.

Gypsum vim habet adstringendi, obstruendi. sanguinis eruptiones, & sudores cohibet, epotum vero strangulando iugulat.

A

Diphrygis sunt tria genera. quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola nascitur. lutosum nanque extrahitur ex cæno cuiusdam inibi specus. tum in sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. unde diphryges nomen inuenit, propterea quod & à sole, & à sarmentis propemodum frigatur. alterum quasi æris cum perficitur, subsidens, & sex est: habetque & adstrictionem æris, atque gustatum. Tertium hoc modo conficitur. lapidem, qui pyritis vocatur, in fornacem coniiciunt, vrūtque pluribus diebus calcis modo. cūque colorem rubricæ contraxerit, eximunt, atque recondunt. Anteponendum cæteris est, quod æris gustum refert, adstringitque, & linguam vehementer exsiccat. quod exustæ ochræ nō inest: quam qui cremant, pro diphryge vendunt.

Θ

Θεῖον, hoc est sulfur præstantissimum est, quod ignem non est expertum, colore splēdido, pellucido, & quod calculorum est expertum. quod vero ignem expertum est, probatur viride, & præpingue. plurimum in Melo, & Lipara gignitur.

I

Indicum alterum sua sponte nascitur tanquam spuma ex Indicis arundinibus exiens: alterum in officinis insectorū inuenitur. estque spuma purpurea cortinis inuadens, quam detractam artifices siccant. optimum censetur, quod cœruleum est, succūque & leuorem habet.

Ιεγ, hoc est ærugo rasa fit hoc modo. In cadum, similēve aliud vas acetum quam acerrimū infunditur, deinde vas æneū inuersum superponitur, aptius quidē cōuexo, sin minus, ex quoato fūdo. sit autē abstersum, nullūque spiramētū habeat. post

post decimū diem operculum, quo vas obturaueras, detrahi-
tur, insidensque ærugo deraditur. In Cypriis quoque metallis
æruhinem gigni ferunt: lapidibus quibusdam æs habenti-
bus, in quibus efflorescit ærugo. adduntque per caniculæ
estum è specu quodam prodire: sed illam & paucam esse, &
optimam: hanc vero è specu effluentem, copiosam quidem,
& boni coloris, sed vitiosam, quod lapides permultos colle-
gerit. Adulteratur multis aliis rebus admixtis, vt pumice, vt
marmore, vt atramento sutorio, pumicem, marmórque, & si-
milis deprehendemus, si sinistra manus pollice humore con-
sperso, æruhinis portiunculam altero atteramus: siquidem æ-
rugo diffundetur, marmor vero, aut pumicis partes nondissi-
patæ coibunt: ac denique ex maiore attritu & humoris per-
missione exalbescent. quin dentibus quoque dignoscitur. nā
quæ sincera est, lævis & non aspera illis cedit. atramenti su-
torii index est ignis. si enim fissile, aut lamina æruginè adu-
terata illinatur, & feruente cinere, aut carbonibus alterutrum
incalescat, mutabitur, rubescetque ea, quæ atramentum suto-
rium habebit: quod ei natura comparatum est, vt cremando
talem colorem nanciscatur.

Aeruginis autem quæ vermicularis dicitur, genera sunt
duo: alterum fossile: alterum sic conficitur. in mortarium ex
Cyprio ære, cui pistillus ex eodem ære sit coniunctus, albi a-
crisquæ aceti dimidiam heminam infundito, pistillóque tan-
diu conterito, dum ad strigmenti crassitudinem perducatur.
deinde aluminis rotundi drachmam, salisque fossilis pelluci-
di, aut marini quamcandidissimi, & solidi: si sal non suppetat
nitri par pondus conuicito, atque in sole terito sub estu cani-
culæ, donec æruhinis colorem, & strigmenti sordiumve cōsi-
stentiam acquirat: denique in vermiculos Rhodiis similes
conformato ac reponito. Efficax autem, & valde boni colo-
ris redditur, si aceti partem vnā, vrinæ veteris partes duas
indas, ceteraque, vt dixi conficias. sunt qui ærugini rase gū-
mi admisceāt, in formāsque digerāt. quod genus vt vitiosum
improbatur.

Est & alia ærugo, quam aurifices mortario, pistillóque
Cyprij æris, & pueri vrina conficiunt. eaque aurum ferru-
minant, antedicta autem æruhinis genera æri combusto pro-
portione respondent: sed efficacius agunt. Sciendum vero
est vermicularem æruhinem fossilem principē locum tenere:

L I B E R

rasa fert secundum. ea denique, quæ sit, postremum. & tamen hæc mordacior est, & magis adstringit. aurificum autem ærugo rasæ respondet. Vrat ærugo, quamcunque velis, hoc modo. minutissime fracta in fictili patina imposita ignitis carbombus admouetur: versatur donec se mutet, coloremque cinereum contrahat: tum refrigerata ad usum reponitur. Nonnulli vero in olla cruda, ut supra diximus, eam comburunt: sed non prorsus in eundem colorem cremata mutatur.

K

Cadmia præstantissima est Cypria, quæ botryitis nominatur, densa, modice grauis, & ad leuitatem potius vergens, superficie racemosa, colore spodij, quæ confracta cinerem intus habet, & eruginosa est, huic proxima est, quæ foris cerulea est, intus vero decursus venarum onychitæ lapidi similes habet.

Est etiam alia, quæ crustosa dicitur, sectionibus quibusdam quasi zonis, cincta: quam ob rem zonitem eam vocant.

Quedam ostracitis appellatur, gracilis, & magna ex parte nigra. eaque terream, aut testaceam superficiem habet. candida vero reprobatur.

Cæterum botryitis, & onychitis oculorum medicinis sunt vtilis. reliquæ ad emplastra, & sicca medicamenta cicatricem inducentia sunt accommodatæ. Cypria ad eadem facit. quæ vero ex Macedonia, Thracia, & Hispania afferuntur, improbantur. sunt qui in lapidum fodinis inueniri cadmiam asserant, falsi nimirum à lapidibus, qui sunt cadmiæ per similes. nam alius lapis ignem expertus atque refrigeratus colorem mutabit, & leuior fiet: cadmia vero nihil mutat, nisi quis per multas eam horas adurat. Fit etiam in argenti fornacibus candidior, minus ponderosa, minusque efficax. Vritur prædicta cadmia carbonibus obruta, donec pellucida fiat, & modo scorix ferri bullas emittat. mox vino Amineo extinguitur: quæ ad scabiem paratur, aceto. Alij sic exustam in vino terunt, rursusque fictili crudo torrent, donec pumicis speciem acquirat: iterumque tritam ex vino, tertio vrant, donec in cinerem prorsus redigatur, nihilque asperitatis habeat: eaque spodij loco vtuntur. Lauatur in mortario trita, aqua effusa vsquedum sordes nullæ subsidant, tum in pastillos redacta reponitur,

Cinnabam

Cinnabaren idem esse, quod minium quidam falso existimant. nam minium in Hispania ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto conficitur: qui alioqui non dignoscitur. in fornacibus autem floridum, & fulgentissimum colorem contrahit. in metallis vero strangulantem halitum eructat. itaque faciem vesicis obducunt, ut per illas videant, aëremque non attrahant. eo utuntur pictores ad elegantiora parietum ornamenta, at cinnabaris affertur ex Lybia: & maiore precio venditur. tantæque est eius copia, ut vix pictoribus ad variandas picturæ lineas satis sit: profundi autem coloris est, ob eamque causam cinnabarin esse draconis sanguine plerique crediderunt.

Cisleris, hoc est pumex probatur qui levis, fistulosus, scissilis, & non calculosus est, quique teri facile potest, & candidus est. Vritur hoc modo. cape eius quantum velis, flagrantissimis carbonibus obrue. ubi igni candens sit redditus, extrahe, vino odorato restingue: iterumque incensum extingue. tertia vero vestione peracta sine ut per se refrigeretur, & ad usum reponere. Theophrastus vero auctor est, si quis in bulliens vini dolium pumicem coniecerit, feruorem statim sedari.

Corallium, quod aliqui lithodendrum vocauerunt, marina esse planta videtur: quæ profundo extracta mari duratur: tanquam offuso nobis aëre concresecat. plurimum prope Syracusas ad promontorium pachynum inuenitur. laudatissimum est rufum, colorumque antherico aut sandici saturatæ similem habet, & simili modo friabile est, & tota concretionem suam æquale: algæque aut fuci marini odore reddit: ad hæc ramosum, cinnamomi modo, forma fruticis. quod vero lapidosum est, concretionem scabrum, fistulosum, & inane est, vitiosum esse censendum est. adstringendi vero, & leniter refrigerandi vim habet.

Cæruleus in ærariis fodinis in Cypro nascitur. copiosior vero ex arena litorali, & in quibusdam subcauatis maris specubus inuenitur: qui est etiam præstantior. Eligendus est is, qui valde satur sit. Vritur ut chalcitis, lauatur ut cadmia. vim habet reprimendi, modice astringendi, & crustas inducendi.

Lithargyros, hoc est argenti spuma quædam ex arena fit, quæ molibditis nominatur, in fornace vsq; dū tota in igne penitus transierit, excocta: quædam vero ex argento, quædā ex plumbo, cæteris præstat Attica. secundo loco censetur Hispana. quas sequitur ea, quæ in Dicæarchia, & Sicilia est, appellatur vero quæ flauo colore est, & splendet, chrysitis, quæ est etiam potior: liuida vero, argyritis: quæ ex argento fit, calauritis. Vim habet adstringendi, refrigerandi, occludēdi, molliendi, caua explendi, carnes excrecentes reprimendi, cicatrices inducendi. vritur confractis partibus ad iuglandium magnitudinē prunæ superpositis: & foliis ita perfatur, vt igni candescat. sordes inherentes absterguntur, & ipsa purgata reponitur. Quidam aceto, aut vino eam extinguentes terrunt: hæcque re confecta, eam reponunt. Lauatur vt cadmia, candore autem perfunditur hoc modo. sumitur argyritis, aut si hæc desit, alia. eam in partes fabarum magnitudine confractam modij Attici mensura, in fictile nouum conuicito, aquam affundito, candidi tritici par pondus addito, priuatimque pugillum hordei linteo puro, colligato, & è fictilis aure suspendito: & donec hordeum disrumpatur, coquito. deinde omnia in craterem amplioris transfunduntur, triticum abiicitur, spuma argenti manibus adhibita vi confricatur, & aqua affusa lauatur. tum excepta & siccata in Thebaico mortario teritur aqua feruente affusa, donec dissoluta fuerit. aqua excolata iterum tota die teritur, & vesperi calida aqua infusa finitur. mane colo traiecta, alia infunditur, & sic permittitur, & excolatur: hocque ter in die fit per dies senos: postea vero ad singulas spumæ argenti minas additis quinque salis fossilis drachmis, affusq; aqua calida ter die teritur: & addita aqua excolatur. cum inalbuerit, calidam aquam infundens idem facito, donec falsuginem prorsus deposuerit. demum ardentissimo sole siccata, humore prius abiecto reponitur. Quidam salis pondo, spumæ argenti tantundem in sole ex aqua terunt continenter mutantes, dum candor ei accedat. Lota videtur oculorum medicinis conuenire, ad fœdas cicatrices, & facies rugis, & maculis plenas facere.

Lapis Phrygius, quo insectores in Phrygia vtuntur, præstat.

stantissimus est pallidus, modice grauis & inæquali concre-
tione coloris. candidas siquidem cadmiæ modo venas ha-
bet. Vritur autem hoc modo. vino optimo perfusus, viuif-
que carbonibus obrutus follibus assidue perflatur, donec
mutato colore fuluescat: rursus extractus eodem vino restin-
guitur. iterumque ad carbonem admouetur, atque idem faci-
to: eumque tertio vrito. sed animum attendito, ne frietur, &
in fuliginem euanescat.

Lapis pyrites species est lapidis, à quo æs conflatur. eligi
debet. qui eri sit similis, & facile scintillas emittat. sic vren-
dus est, melle irrigatur, mollibus carbonibus imponitur, fol-
libus continuo perflatur, donec fuluum colorem acquirat.
alii in multos carbones igni candentes lapidē copioso mel-
le perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum vergere colorem cœ-
perit, extrahunt: statumque cinerem disiciunt, & rursus non
perfusum vrunt, donec totus æqualiter fragilior fiat. sæpe e-
nim sola tantummodo superficies vritur. ita autem crema-
tus, siccatusque reconditur. si loto opus sit, ut cadmia lauan-
dus. quidam vero hunc ita crematum diphryges vocant.

Lapis Afsius probatur, qui pumicis colore, fungosus, le-
uis, & friabilis sit, venasque in profundo luteas habeat. eius
flos est falsugo summo lapide insidens, tenui compage, co-
lore cum albo, tum pumici simili, ad luteum vergente. Lin-
guæ autem admotus eam leniter mordet. Fiunt ex hoc lapi-
de folia, in quæ podagrici pedes mittentes iuuantur. fiunt
etiā pulueres carnem exedentes. corporaque carne onusta,
crassaque extenuant in balneo pro nitro illiti. si lauare hos
quispiam velit, cadmiæ modo lauabit.

Lapis hematites optimus est, friabilis, in se ipso durus, sa-
turatus, æqualis, nullius sordis particeps: nullisque lineis va-
riatus. vim habet adstringendi, aliquantulum calfaciendi, at-
tenuandique. Vritur perinde, ac lapis phrygius, sed nullo
vino perfunditur. modus vstionis est, ut modice leuis fiat,
& bullis intumescat, sunt qui eum sic adulterinum faciant.
densam, rotundamque Schisti lapidis glebā, quales sunt
que radices eius appellantur, in fictilem vrceum, qui cinerē
feruentem contineat, obruunt. ubi paululum dimiserint, exi-
munt, attritūque in cote probant, si hæmatitæ colorē duxit. si
ita sit, reponunt, sin minus, iterum in cinere cōdunt: & sub-
inde conspiciunt, & periculum faciunt. nam si diutius in

eo cinere relinquatur, colorem mutat, moxque diffunditur. Vitiatus deprehenditur, primum lineis, quas pectinum modo per longitudinem diuisas habet, hæmatites vero eas habet, ut fors tulit: tum colore, quem hic floridum reddit, hæmatites vero profundiorum, & cinnabari similem. Inuenitur etiam in Sinopica rubrica: itémque in magnete lapide permultum combusto hæmatites fit, qui vero per se nascitur, in Aegypto inter metalla prouenit.

Lapis Schistos, hoc est scissilis, in Iberia Hispaniæ gignitur. Laudatissimus est, qui croci colorem emulatur, estque friabilis, & suapte natura bene scissilis. concretionem vero, & mutuo linearum, quas pectinum modo habet, discursu, ammoniaco sali similis videtur.

Gagates probatur, qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. niger plerunque est, squalidus, crustosus; & valde levis. Nascitur in Lycia, inueniturque prope ostia fluminis in mare exeuntis. flumen autem Gagas nominatur.

Thracius in Scythia nascitur in fluuio, qui Pontus vocatur. eadem ei vis, quæ Gagatæ. traditur aqua accendi, oleo restingui: quod etiam in bitumine accidit.

Magnes optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, densus: & non admodum grauis. vim habet crassos humores educendi, si cum aqua malsa pondere trium obolorum detur. quidam hunc vrentes pro hæmatite vendunt.

Arabicus lapis maculoso ebori similis est.

Qui vero Galactites dicitur, hoc vocabulo gaudet, quod lacteum succum ex se mittat: cinerei tamen coloris est, ac gustu dulcis. ad oculorum fluxiones, & vlcera vtiliter illinitur, is in aqua tritus pyxide plumbea reconditur, ob vim glutinosam, quæ in eo inest.

Melitites est in omnibus galactitæ similis. hoc tantum differt, quod dulcissimum succum emittit. facit ad eadem, ad quæ galactites.

Morochthus, quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocant, in Aegypto nascitur. hoc lapide, quoniam mollis est, & facile diluitur, linteorum artifices ad candorem linteis indendum vtuntur.

Lapis alabastrites, qui onyx vocatur, crematus resina aut pice assumpta duritias discutit, stomachi dolores cum cera-

to mlti
Lapis
rifi col
deur. ve
Iudaic
ma quam
no factu
aert.
Amia
quo, vtp
ardet, sed
Sapphi
eritima
omni qu
reprimi
Lapis
rum mag
& illi
sensum
Selen
aliqui
in Ara
Iaspi
li, pitui
nigrati
terebin
milis. o
femoril
Oph
nialiqu
alligati
qui ver
dolori
Lap
pides,
Ost
sus. h
Sm
mia
La

to mitigat:gingiuásque comprimit.

Lapis vero, qui Vettenus in Aethiopia nascitur, est subviridis colore, iaspidem imitans. cum vero diluitur, lacteus videtur. vehementer autem is morder.

Iudaicus in Iudea exoritur, glandis effigie, candidus, forma quam elegantissima, lineis inter se æqualibus, veluti toro factis distinguitur. is solutus nullam qualitatem gustu affert.

Amiantus in Cypro nascitur, alumini scissili æqualis: ex quo, utpote flexili, telas faciunt, coniectus autem in ignem ardet, sed minime crematus exit splendidior.

Sapphirus lapis potui datus ad ictus scorpionum facere existimatur, contra internas quoque ulcerationes bibitur: omniæque in oculis excrecentia, itémque vuas, & pustulas reprimit: & ruptas eorum membranas agglutinat.

Lapis Memphites ad urbem Memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, versicolórque. Aiunt húc tritum & illitum locis, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo sensum eis adimere.

Selenites lapis, quem aphroselenem, hoc est Lunæ spumá aliqui nominát, quia noctu in Lunæ incremento reperitur, in Arabia nascitur, candidus, pellucidus, levis.

Iaspis lapis, alius smaragdi colorem imitatur, alius crystalli, pituitæ similis, alius aërius, fumosus alius, veluti fumo denigratus, alius lineis albis, resplendentibus præcingitur: alius terebinthinæ similis dicitur: alius calaino gemmæ colore similis. omnes amuleta esse creduntur, quæ alligentur: quæque femoribus appensa partum accelerent.

Ophites lapis alius est grauis, & niger: alius cinerei coloris: alius punctis variatus, alius lineas candidas habet, omnes alligati cōtra serpentum morsus, & capitis dolores prosunt. qui vero candidas habet lineas, priuatim lethargo, & capitis doloribus auxiliari perhibetur.

Lapides, qui in spongiis comperiuntur, cum vino poti, lapides, qui in vesica sunt, confringunt.

Ostracites lapis testæ similitudinem gerit, éstque crustosus. hoc ad pilos euellendos pro pumice mulieres vtuntur.

Smyris lapis est, quo gemmas annularij extergunt. is in samia terra inuenitur.

Lapis quo aurum flantes ad leuigandum, & splendorem

inducendum vtuntur, probatur qui candidus, grauisque est.

M

Melan, hoc est atramentum quo scribimus, ex thedarum collecta fuligine conficitur, singulis libris gummi ternæ fuliginis vnciæ miscentur. Fit etiam ex fuligine resinæ: & fuligine pictorum. sumitur autem fuliginis pictorum mina, gummi sesquilibra, glutinis taurini vncia vna, oboli duodecim, atramenti sutorij denarius, & oboli tres.

Melanteria præstat cæteris, quæ sulfuris colore est, læuis, æqualis, pura, & quæ contactu aquæ statim nigrescit. vim habet adurendi, sicut etiam misy.

Miltos, hoc est rubrica Sinopica, præstantissima est dēsa, grauis, iecoris forma, calorū expers, concolor, valde fusilis cum diluitur, in Cappadocia colligitur. Fertur in Sinopē urbem, in eaque vānit. vnde etiam cognomen accepit.

Quæ vero fabrilis dicitur, est in rebus omnibus Sinopica inferior, optima est Aegyptia, & Carthaginienfis, lapidūque expers, & friabilis, gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, ochra cremata, & in rubricam degenerante.

Misy anteponendū est Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem æmulatur, & stellæ modo splendet. vim & vstionem cum chalcitide eandem habet: nisi quod pforicum ex eo non fit: excessūque ac defectione differens. Aegyptium vero efficacia præstat cæteris, sed ad medicamenta oculorum est supradicto multo inferius.

Molibdos, hoc est plumbum ita lauatur. aquam in plumbeū mortariū coniicito, & plūbeo pistillo tandiu terito, donec aqua nigra, & seculēta reddatur. per linteum eā traicito aquā superfundēs, vt quod detritū est, totū trāsfundatur. idque iterū facito, donec satis tibi esse videatur. finito, vt quod lotum sit, confidat, aquā effunde, aliam adijce, laua vt cadmiā, quo vsque nihil nigri superfit, & in pastillos redactum repone. quidā purum plumbum lima deterentes in lapideo mortario, pistillo lapideo terunt, aut manibus cum aqua adiecta fricant, donec nigrescat. mox vbi confederit, effusa aqua, in pastillos cogunt. quod enim diutius cōfricatur, cerussæ simile fit. Alij scobi lima detrite parum plumbaginis addunt: aiuntque plumbum ita lotum esse præstantius.

Cre-

Crematur vero ad hūc modum. plumbi laminas quam tenuissimas in nouum fictile composito, inspersoque sulfure, alias plumbi laminas superponito, rursusque sulfur inspergito: idque identidē facito, donec fictile impleueris. tum succendito, accenso autem plumbo, ferrea rude versato, donec in cinerem perfecte redigatur, nihilque plumbeum appareat. auferto deinde, naribus occlusis: noxius enim est halitus. lauandum id est, vt cadmia, & reponendum. vim eloti plumbi habet: sed efficaciorē.

Molybdæna, hoc est plumbago, probatur argenteæ spumæ æmula, flaua, modice splendens, fulua cum teritur: cocta cum oleo iecoris colorem trahit, vitiosa est quæ aërem, aut plumbi colorem præfert. ex auro, & argento conficitur. Est etiam quædam fossilis ad Sebastam, & Corycum inuenta, in quo genere præstat ea, quæ non habet recrementi speciem, nec lapidosa est: flaua vero est, & splendens. vim habet spumæ argenti, & recremento plumbi similem: eodēque modo lauatur, & vritur. aptior hæc emplastris, quæ liparæ dicuntur, & iis, quæ non mordent, vtilius miscetur. carnē creat, vlcera ad cicatricem perducit. abstergentibus tamen medicamentis non conuenit.

N.

Nitrum præferendum est, quod leue, roseo colore, aut candido est, perforatum spongiæ modo. est autem huiusmodi id, quod ex insulis affertur.

Nitri spuma optima esse videtur quæ leuissima est, crustasque habet, ac friabilis est, & subpurpureo colore, & spumosa, & mordens: qualis ex Philadelphia Lydiæ affertur. Aegyptiæ secundus locus datur. Quin & Magnesiæ Cariæ gignitur. Vires & vitionem & hæc & nitrum salī pares habent. Quidam hæc carbonibus igni candentibus vrint, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

II

Pompholyx specie differt à spodio, genere vero non item: siquidem spodium nigricat, & est plerunque ponderosius: ac festucis, pilis, & terra plenum, ex ærariis officinis, fornacibusque veluti derafum, & earum pauimenti purgatio. Pompholyx vero pinguis est, & candida: & item leuissima, vt etiam

L I B E R

per aërem volitare possit. optima habenda est Cypria : quæ aceto macerata, aeris halitum ex se mittit. colore æruginis aliquantulum, cœni sapore. si quæ fraudis expers flagrantibus carbonibus effervescat, aërium colorem contrahet. his autem notis est diligenter attendendum. nam à quibusdā adulteratur glutine taurino admixto, agninis pulmonibus, aut marinis combustis grossis, & quibusdā aliis consimilibus. sed facile dignoscitur. siquidem in his probandis nihil eorum, quæ dicta sunt, inuenietur.

Lauanda communiter pōpholyx hoc modo est. puro linteo mediocris raritatis pompholyga aut aridam, aut aqua maceratam colligato, in peluim aqua pluuiā plenam coniicito, & aqua identidem proluito, huc atque illuc linteolum aligatum agens. sic enim quod in ea limosum, vtilēque erit, effluet: totum vero sedimentum in linteo remanebit. finito postea residere, & aquam cum cinere colis traicito: & noua aqua infusa agitato, & effundito: totiesque id facito per colum traiciens & effundens, donec nihil arenosum subsidat. postremo vero aquam exprimito, & siccatum cinerem reponito. si vero cinerem cremare oporteat, eā diligenter tritam aqua consperges, & in pastillos redactam in fictile nouum indito: subiectis que leuibus carbonibus orbiculos continuo versabis, donec sicci, & igniti reddantur.

Sciendum quoque est, ex auro, argento, plumbōque fieri spodium: & post Cyprium, maxime commendari plumbum.

Quoniam vero sæpe deest spodium, antispodia quæ parem vim habēt, & nō mediocri vsui sunt, necessario & quæ, nam sint, & quo modo sumi debeant, ostendemus.

Folia itaque myrti cum floribus & baccis immaturis in ollam nouam coniecta, indito operculo, quod continua foramina habeat, in fornacem figulorum demittito. cum fictile coctum fuerit, in crudum alterum fictile transferto, & iterum assato, vbi vero hoc quoque fictile fuerit assatum, extrahere, laua, vt ere. Simili quoque modo sumito coliculos agrestis oliuæ: sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut mala cydonia dissecta, & à quibus ossa fuerint detracta, aut gallas, aut immatura mora in sole prius siccata, aut lentiscum, aut terebintum, aut cenanthē, aut rubi tenera folia, vt buxi comam, aut eam, quæ pseudocyperus dicitur, cum flore. alij ficulnas frons

fronde
ten cau
aut mel

Sanda
ra. & qu
halitum
Scori

ma voca
possidet.

Spon

nibus, de

minas ve

cyoniu

ætus sal

cente, qu

ro qua fu

is spuma

didissim

Sibiu

cū fragi

bet, & f

son vo

Cren

nibus c

tum lac

guitur.

igni det

Lauatu

rum lau

Stryp

nam ve

inter qu

reces,

adstrin

pacitur

nescen

uenitu

In r

tur: de

frondes in sole prius siccatas eodem modo parant: alij gluten taurinum, alij succidam, asperamque lanam pice liquida, aut melle irrigatam pari modo cremant.

Σ

Sandaracha eligenda est saturata & ruffa, floridæque, & pura, & quæ colorem cinnabaris præ se ferat: quæque sulfuris halitum redoleat.

Scoria argenti, hoc est recrementum, quod etiam helcysma vocant, habet eandem vim, quam plumbi recrementum possidet.

Spongias aliqui mares appellauerunt tenuibus foraminibus, densasque, duriores autem tragos nominauerunt: sceminas vero eas, quæ contra essent affectæ, cremantur ut alcyonium. Candidæ vero fiunt eæ, quæ molliissimæ sunt, per æstus salis spuma in petris herente conspersæ, & in sole deudentæ, quodque in eis cauum est, sursum spectet, deorsum vero qua fuerunt abscissæ. si vero cælum serenum fuerit, & salis spuma, aut marina aspersæ ad lunam teneantur, fiunt candidissimæ.

Stibium præstantissimum est quod splendet, & fulget: & cū fragitur, crustosum videtur, nihilque terre, aut sordium habet, & facile frangitur. hoc alij platyophthamon, alij labrason vocauerunt.

Crematur Stibium crusta ex farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec crusta in carbones abeat. ab igni emotum lacte mulieris, quæ maré peperit, aut vetere vino restinguitur. Vritur etiam succensis carbonibus perflatum, donec igni deflagret, si enim plusculum vratur, in plumbum transit. Lauatur, ut cadmia, atque æs. sunt qui ut plumbi recrementum lauent.

Stypteriæ, hoc est aluminis sunt plura genera: ad medicinam vero adhibentur hæc, scissile, rotundum, & liquidum. inter quæ scissile præstantissimum est, & in hoc genere, quod recens, candidissimum, radicum expers, mirum in modum adstringens, lapide vacans: nec modo glebæ, aut assulæ compactum, sed singillatim quasi in capillamenta quædam canescentia dehiscens. Lapis quoque huic alumini similis inuenitur, qui quoniam non adstringit, gustu discernitur.

In rotundo alumine, quod ita manu est factum, improbat: idque ex forma cognoscitur. sumendum autem est id,

L I B E R

quod suapte natura rotundum est, estque bullarū instar, sub-
candidum, & valide adstringens: quodque nonnihil palloris
cum quadā pinguedine habeat. præterea vero calculorū ex-
pers, & friabile. quod denique Aegyptium sit genere, aut in
Melo insula natum.

In liquido vero præstat id, quod est maxime pellucidum,
lacteūque, & æquale, & ex omni parte succū habeat. quod-
que lapidosum non sit, & caseum redoleat. Id vero est cen-
sendum, scissile esse rotundo efficacius. Cremantur autem &
assantur, vt chalcitis.

Sory melanteriam esse quidam falso putauerunt. est enim
sory sui generis, magisque viosum, & nausēa ciet. Aegyptiū
cæteris excellit: quodque cum frangitur, nigrius apparet, &
in multa foramina dehiscit, subpingueque est, & præterea
adstringens, & in deglutiendo, atque olfactu virus olet, sto-
machūque subuertit. Ceterum in his fere omnibus, & item
in aliis, quæ vstionem non sunt experta, crematis potentiora
sunt existimanda: præter salem, fecem, nitrum, calcem, aliāque
cōsimilia, quæ cruda, vi remissiore sunt prædita: quæ crema-
ta, efficaciora, & perseverantiora redduntur.

T.

Τερξ, hoc est fex, maxime ex vino vetere, Italico: sin minus
ab alio consimili eligenda est. fex enim aceti est acriore vi
prædita. Crematur vt alcyonium, ante diligenter siccata. Sūt
qui noua testa igni largo cument, donec altius tota incen-
datur. alij secis glebā ignitis carbonibus obruētes idē faciūt.
legitimæ vstionis signo erit albus, aut aërius corporis ipsius
color: & cum linguæ admota eā quasi vrit, aceti fex eodem
modo crematur. vim adurendi, adstringendique habet. re-
centi fece vtendum est: siquidem cito vis eius efflatur. quo-
circa operculo occludenda est, & non nisi in vasculo adser-
uanda. Lauatur pompholygis modo.

Y.

Υσάργυρος, hoc est argentum viuum, fit ex minio, quod
falso cinnabaris dicitur, in fictilem patinā ferream concham
habentem cinnabarin coniiciunt. calyce concham tegunt,
argillāque illinunt: & carbonibus succendunt. nam fuligo,
quæ calyci inhæsit, derafa argentum viuum est. quin etiam
inue-

inuenitur in argenti fodinarum tectis in guttas concretum
seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stanneis vasculis. aliam
nanque materiam exest.

X.

Χαλκὸς κικλυνμῖνος, hoc est æs cōbustū probatur rubrum,
& quod in attritu cinnabaris colore est, nigrum vero, magis
quam par est, crematum fuit. Fit autem ex clauis nauium so-
lutarum fictili crudo compositis asperso sulfure cum pari sa-
lis portione, alternisq; his insperis fictili operculum adhi-
betur, & luto sigulorum oblinitur, & in fornacem demitti-
tur, vsque dum plane assetur. hoc cum hydromelite potum,
aut cum melle delinctum, aut allitum vomitus ciet. Lauatur
porro, vt cadmia, quater in die aqua commutata, donec ni-
hil splendoris ei super sit. Eius vero recrementū eodem modo
lauatur, habetque eandem vim, sed tamen imbecillio rem.

Chalcuanthos, hoc est flos æris, quem aliqui veteres, pse-
gma hoc est resegmen vocauerūt, optimus est friabilis, in at-
tritu rufus, milij forma, grauis, modice splendens, delinata
æris scobis expers: qua fit adulterinus. quod deprehenditur,
cum dentium attritu ramenta dilatantur.

Chalculepis, hoc est squama æris laudatissima est quæ ex
Cypriis officinarum clauis excussa, crassa que est, & helitis à
clauis ducto nomine appellatur. Improbatur vero, quæ ex
albo cre confecta tenuis est, atque imbecilla: quam utpote
tenuem, & inualidā reiicimus: eamque probamus, quæ cras-
sa, fulua que est, & quæ aceto inspersa æruginem contrahit.
Lauatur autem ad hunc modum. purę æris squamæ siccæ se-
libram in pilam cum limpida aqua coniecito, manu diligen-
ter miscero, donec squama subsidat, auferto deinde quę sub-
federunt, effusa que priore aqua, aquæ cœlestis cyathum su-
perinfundito, diducta manu vehementer squamam cum pi-
la confricato, quasi eam perpolias. cūque lentorem quen-
dam cœperit emittere, aqua sensim vsque ad sex heminas af-
funditur valide confricando, & squamā per pilæ latera con-
uertendo valide cōfricabis. tū omnibus colo traiectis, quod
defluxit, in pyxidem rubri æris seruato. est autem id veluti
squamæ flos: viribúsque efficax: & ad oculorum medicinam
accommodatum. reliqua pars imbecilla est, quod superest pa-
ri modo lauatur, donec nullum lentorem ex se mittat. po-

G

stea vero linteolo opertum biduo quiescere finitur. tum effusa extante aqua siccatur, & in pyxide reconditur. Quidā æris squamam, vt cadmiam lauant, atque reponunt.

Squama vero, quam stomoma vocant, habet eandem vim, quam æris squama: eodémque modo lauatur, & reponitur: in aluo tamen purganda est, quàm squama æris, inferior.

Chalcanthum, hoc est atramentum futuriū, genere vnum, idémque est. humor enim concretus est. specie vero tres habet differentias. Vnum humoribus in cuniculos quosdam stillando colatis concreuit, quam ob rem ab iis, qui Cypria metalla tractant, stillatitium vocatur: alterum copiose exercitatum in speluncis inuenitur: postea in fossas transfusum cōcreuit: quod concreuit proprie nominatur. tertium vero decoctum appellatur: sit quē in Hispania: sed inutile & viribus infirmis. hoc autem modo parant. id aqua diluētes coquant: tum in cisternas transfundūt, ac residere sinunt. hoc certis diebus concreuit in multas diuisum formulas tessera- rum instar, vix modo inter se cohærentes. præstantissimum censendum est cæruleum, graue, densum, purum, & pellucidum: quale est stillatitium, quod ab aliis lonchoton appellatur. secundas fert id, quod concreuit vocant. coctum vero tingendo, & denigrādo esse aptius cæteris videtur: ad vsum vero medicinæ infirmius esse reliquis experiētia nos docuit. Crematur autem, vt mox de chalcitide dicemus.

Chalcitis antefertur aliis, quæ æris speciē præ se fert, friabilis, calculorum expers, & non vetus: quæque fibras oblongas, fulgentesque habet. ex ea fit quod psoricum vocāt: duabus eius partibus vni parti cadmiæ additis: & ex aceto tritis. hæcque omnia in fictile coniecta, & fimo obruta per caniculæ ardore 40. diebus dimittuntur: siquidem ita maiorem acrimoniam acquireret, eadémque potest, quæ chalcitis, quidam pares vtriusque portiones mistas ex vino terunt: & eadem faciunt.

Crematur fictili nouo chalcitis viuis carbonibus superposito. modus vstionis in humidioribus est, dum bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit. in cæteris vero, dum mutata in magis floridum colorem fuerit. cum enim rubricæ colorem in profundo contraxerit, auferenda ab igni est: insidentisque sordes flatu sunt pellendæ, & ipsa reponenda. torretur etiamnum perflatis carbonibus donec modice palleat:

aut

aut fictili prunis candentibus subiectis, subinde versata donec igni conflaret, & colorem mutet.

Chrysocolia laudatissima est Armeniaca, porri colorem usque ad satietatem reddens. secundo loco censetur Macedonica: hanc sequitur Cypria, quo in genere præfertur pura; damnatur vero quæ terræ, calculorumque plena est. Lauatur antedicta ad hunc modum: tufam in pilam coniice, & affusa aqua manu diducta ad pilam valide fricato, mox ubi confecerit, percolato, & alia aqua affusa, iterum fricato, idque identidem facito donec pura, sinceræque reddatur. tunc in sole siccata reponito, atque vitiorum. si cremare eam velis, sic facito, tere ex ea, quod satis sit, patinis impone, carbonibus admo- ueto: & alia facito, quæ supra diximus.



Plimmythion, hoc est cerussa, fit hoc modo. in dolium laticoris, aut fictile labellum acerrimum acetum infundito: subiectæque arundinea tegete ori fictilis, plumbeam laminam superimponito, & velamina adicito, ne acetum per halitum expiret. Vbi resoluta fuerit, defluensque deciderit, humorem purum, & in summo fluitantem per colum traicito. quod vero limosum subsederit, in aliud vas transferendum, & in sole siccandum, & mola trusatili terendum, aut probe læuigandum, cribrandumque. postea quod duri superest, in tennes partes redigendum, & cribrandum: hæcque vicissim, tertio, & quarto facienda. præstantius autem est id, quod prius fuerit cribratum, id quod etiam ad oculorum medicinam adhibetur: secundum locum tenet sequens, & cætera deinceps. Quidam in medio vase ligna suspendunt, & sorde derasa imposita, ne acetum contingat, ori operculum indentes dimittunt, post aliquot dies operculo ablato intuentur, ubi resoluta materies fuerit, reliqua omnia, ut dictum est, fiunt. si quis in pastillos velit redigere, aceto acri subiget, & ita in pastillos digestam in sole siccabit. hæc tamen estiuo tempore peragenda sunt. ita enim & candida, & efficax redditur. fit etiam hyeme, vrceis supra balneas impositis. nam calor ascendens, idem quod sol, præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, aut Corinthi, aut Lacedæmone. secundo loco censetur, quæ ex Dicæarchia affertur. Torrenda vero est ad hunc modum: tritam cerussam ignitis carbonibus fictili

G ij

L I B E R

nouo, ac præsertim Attico imposito, & assidue versato, cūque cineris colorem contraxerit, auferto, refrigerato, vtitor. si cremare eam velis, in nouam patinam cauam conuicito cerussam tritam: carbonibúsque superpositam rudicula misceto, donec colorem sandarachæ similem duxerit: tum auferto, & vtitor. quæ ita confecta est, ab aliquibus sandyx nominatur. Cerussa lauatur, vt cadmia.

Ω

Ochra eligenda quæ leuissima est, & ex omni parte lutea ad satietatem vsque, calculorūque expers, & item friabilis, & genere Attica. est autem & cremanda, & lauanda non secus, quam cadmia.

FINIS LIBRI DECIMITERTII.

ORIBASII MEDICINALIVM COLLECTORVM,
LIBER DECIMVSQVARTVS.

Hoc nobis loco non est propositum formas simplicium medicamentorum conscribere, cum eas accurate Dioscorides nos docuerit: neque etiam singulas cuiusque actiones recensere. siquidem de eis copiosius agetur, cum de componendis medicamentis, deque morbis curandis loquemur, ubi vsus postularit. nunc vero omnium simplicium medicamentorum facultates vniuersales duntaxat memorabo.

Ex Galeno, de nominum distinctione. Cap. 1



Numquodque corpus aut calidum, aut frigidum, aut siccum, aut humidum quandoque suapte natura & dicitur, & apparet: quandoque vero, quia aduentitiā qualitatem acquisiuit. Nos autem dicere consueuimus id quod suapte natura tale est, primo, & per se, & ex se, & potestate tale esse, atque appare-

10:

re: quod vero aduentitiâ qualitatem contraxit, id ex aliquo accidenti esse tale, atque apparere. Quæ vero propria natura aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida esse dicimus, alia talia esse actione, alia potestate pronunciamus. in quo id quod potestate nunc dicimus, differt à superiore. nam ea potestas accidenti opponebatur, hæc vero actioni. Ceterum ex iis quæ actione dicuntur, aliud absolute calidum, frigidumve, aut humidum, aut siccum dicitur, vt elementa: aliud pro superante facultate, vt homo, & equus, & omnino cetera animantia: aliud collatum cum eo quod in eodem genere, eadémque specie est temperatum: qualis est leo homini comparatus: homóque florentis ætatis cū puero: aliud cum quocunque fors ferat, vt Dion cum Theone. Quinetiam quæcunque potestate talia, aut talia esse dicuntur, necesse est vt singula ita nominentur, tanquã ad id, quod actione dicitur, referatur: vt quod facile acceditur ad id, quod actione absolute calidum est: animalia vero calfacere, ad id quod excedit & superat, referendo. Eadémque ratione id quod hominem calefacit, tanquam homo sit potestate calidus: quod bovem, aut equum, tanquam bos aut equus tales potestate sint. itémque hoc illi homini, illud vero illi calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum esse, id est illius vnus naturæ comparatum.

De differentia medicamentorum. Cap. 2.

Varia est medicamentorum natura, nam vel qualia sumpta sunt, talia quoque permanent, & vincunt, corpúsque mutant eo modo, quo id cibos: hæcque cum vniuersæ substantiæ sint contraria, prorsus venena sunt, & animantis naturam corrumpunt: aut mutationis initium ab animalis corpore sumentia, inde putrescunt, & corrumpuntur, deinde corpus vna putrefaciunt, vnâque corrumpunt, quæ venena quoque sunt. est etiã tertia medicamentorum species, quæ corpus calfaciunt, veruntamen nihil mali afferunt. est & quarta eorum, quæ & agunt aliquid, & patiuntur: sed tandem vincuntur, planèque assimilantur, quibus accidit, vt & medicamenta, & alimenta sint.

De vsu medicamentorum. Cap. 3.

Vtuntur plerunque medicamentis homines ob id solâ, vt

L I B E R

vel refrigerent, vel calfaciant, vel siccent, vel humectent, vel horum aliquid coniuncte faciant. quandoque vero, ut quod supra modum laxatum est, contendant, & contrahant, vel quod intensum est laxent, vel quod est condensatum rarum faciant, vel rarum condensent: vel durum emolliant: vel immodicam molliem ad duritiam reuocent: vel plenum inaniant, vel inane impleant: vel denique ut aliquid huius generis agant.

Ad temperatissimam naturam omnia esse dirigenda.

Cap. 4.

Medicamenta, quæ mediæ naturæ sunt, quæque in utranque partem parum vergunt, interim calfacere, rursusque refrigerare videbuntur: interim vero, nec calfacere, nec refrigerare, sed corpora, sicut acceperunt, ita etiam conseruare, cum enim affecta corpora variis modis disponantur, id quoque quod afficit, non eodem agere modo videtur, ex quo planum est, neque oleum, neque rosaceum, neque chamæmelum, neque lini semen, neque anethum, neque scœnigræci farinam, neque triticeam, neque alia sexcenta, quæ partim exquisite mediæ temperiæ sortiuntur, partim ab ea parumper recedunt, eandem perpetuo actionem esse editura. Iam rosaceum exustos sui caloris tepore refrigerat: argentes vero modicum etiam calfacit, id quod est tepidi caloris munus: quemadmodum balneæ quoque calfaciunt rigentes, & estuantes refrigerant. Ergo ad temperatissimam naturam animum aduertere, ad eamque omnia dirigere oportet. Esto ergo corpus temperatissimum regula facultatis medicamentorum: quodque similem illius temperiæ caliditatem accendit, temperatum nominetur: etiam si senem refrigeratum maxime excalfacere videatur, quod vero calfacit aut refrigerat huiusmodi corpus, illud quidem quod calfacit, calidum, quod refrigerat, frigidum appelletur.

De differentia, & facultate, quæ in succis est.

Cap. 5.

Succi, qui tum in singulis plantis & animalibus, tum in terra comperiuntur, cum plurimi sunt, tum vero speciebus facile comprehendi non possunt. gustus vero eorum diuersos Plato esse octo numero censuit, nominatque tum austerum, quem

quem nos adstringentem vocamus, tum acerbum, tum vero nitrosum, tum amarum, tum salsum, tum acrem: deinde acidum, postremo dulcem. Theophrastus vero pinguem eisdem adiunxit. Ergo quod adstringens, acerbumque est, terrestre, frigidum esse fuit ostensum: acidum vero, tenuium partium esse, & frigidum. quod vero absque aliqua insigni qualitate frigidum est, aqueum id frigidumque esse, amarum terrestre, tenuium partium, ita etiam quod nitrosum est, acre vero, esse feru idum: salsum vero, terrestre, & calidum sed nondum feruidum. Eodemque modo dulce, calidum quidem, sed non adurens, quæ oleosa sunt, aquea & æria sunt omnia. Actiones quoque ex eorum temperie, consequuntur. nam adstringens, acerbumque cogit, stipat, densat, repellit, & increassat. & ante hæc omnia refrigerare, & siccare aptum est: & quandoque etiam stuporem dentium quem vocant, inducere. acidum vero secat, diuidit, attenuat, obstructionem expedit, & absque calore expurgat. acre vero par quidem acido est in attenuando & expurgando, sed tamen ab eo differt, quod acidum refrigerat, acre calfacit. itemque illud repellit, hoc attrahit, & euocat. Eodemque modo amarum & nitrosum meatus expurgant, abstergent, attenuant, secantque humorum crassitudinem, nec euidenter calefaciunt. quod vero aqueum frigidumque est, spissat, sistit, contrahit, condensat, stuporemque & mortem parti inducit. acre autem attenuat, expurgat, euocat, rumpit, attrahit, & crustas inducit: salsum vero cogit, stringit, sale condit, & citra insignem calorem, aut frigus siccatur. dulce laxat, concoquit, mollit, rarefacit. oleosum denique humectat, mollit, atque relaxat.

De vaporibus.

Cap. 6.

Quæ odorata sunt, ea omnino sunt calida. odorum namque copia à calore provenit, at non protinus quicquid odoratum est: id suaue est: propterea quod non omne est accommodatum spiritui, qui cerebri ventriculis continetur. quemadmodum enim saporum, qui sub linguam cadunt, aptissimi sunt dulces, qui non apti sunt, multas sunt nacti differentias: ita vapores qui spiritui cerebri sunt familiares, iidem & grati & suaues sunt: qui vero non familiares, non paucis inter se differentibus dissident. non omnibus tamen, perinde ac saporibus imposita sunt nomina. dicimus enim aliquid acidum, acremque

G iij

odorem habere, at austerū, aut acerbum, aut salsum, aut amarum, non item. sed his duabus appellationibus pleraque eorū quæ sub odoratum cadunt, comprehendimus, vt benevolentia, & graueolentia nominemus. ac benevolentia ad proportionem eorum, quæ lingue sunt dulcia: graueolentia vero ad eorum, quæ dulcia non sunt, totum enim hoc genus in saporibus vno appellari nomine non potest. à corporibus autem non odoratis aut omnino parum defluere videtur, aut quod mensuræ eorum molis nō respondeat, quemadmodum in iis, quæ exquisite salsa & acerbata sunt. exquisite vero cum tale, aut tale quidpiam dico, sincerum, & quo ad eius fieri potest, alterius qualitatis expers intelligo. crassa nanque vtrisque est substantia, & præterea, acerborum est frigida, ex quo veri simile est, quod ab his defluit, paucum esse & crassum, & mole sua terreum, & proinde per inspirationem in cerebrū non incidere. quam ob rem de sensibilibus temperie non ita tuto ex odore, sicut ex gustu iudicamus. nam quæ vacant odore, crassæ essentia sunt: quæ vero in eis sit vis frigoris & caloris, non constat. quæ autem odorata sunt, tenuium illa quidem sunt partium, & calida: at quantum tenuitatis, calorisque habeant, non iam discernitur. Præcipua autem causa, quam ob rem in odoratis nihil euidens de eorum temperie iudicetur, est inæqualitas naturæ, de qua sæpenumero diximus, vbi corpora ex dissimilibus inter se particulis consistere demonstrabam.

Ex coloribus quoque faciendam esse coniecturam de simplicium medicamentorum temperie.

Cap.

7.

Ex coloribus quoque aliquam facere coniecturam de medicamentis simplicibus licet. in vnoquoque enim genere aut feminis, aut radicis, aut succi ex colore indicationem quandam sumere possumus: vt in cepa, scilla, & vino, quæ quanto albidiora fuerint, tãto minus erunt calida. quæ vero subflaua & fulua, calidiora. idem in tritico, milio, ochris, fælis, cicere, iridis radice, asphodelisque, & aliis compluribus vsu venit. in quoque enim genere plerumque fit, vt quæ fulua, & flaua, & rubra sunt, albis sint calidiora. itaque si hinc quoque de medicamentorū facultate cōiectura fieri potest, hoc etiam sermōni addatur, præstabit tamen, vt sæpe diximus, distincta experientia vires eorum inuenire. in hac enim non decipieris. quāquam

quam antequam vires eorum dignoscas, gustus pleraque indicat, paululum etiam, vt dictum est, odore approbante.

Quomodo & qua experientia facultates inueniendae sint.
Cap. 8.

Facultates sunt vsu inueniendae ad hunc modum. cum primum corpori hoc, vel illud medicamentum, cibúsve admouetur, expers esto omnis vehementis caloris, aut frigoris, quod acquiri possit, nam cum hoc corpori applicas, corpus primo occurso qualitatis acquisitae, non eius temperiei, quae est rei admotae propria, sensu afficietur. Vt igitur admotae rei vera, sincerique natura exploretur, tepidum, quoad fieri maxime potest, esto: nec vilam extrinsecus notabilem alterationem valentis caloris, aut frigoris contraxerit. adhibeatur porro, cum eius naturam exploras, non cuiuslibet corporis affectioni, sed simplicissimae, & vt maxime fieri potest, summae. Si autem affectioni summi caloris admotum, frigoris sensum exciter, id profecto erit frigidum: simili quoque modo si frigidae affectioni adhibitum, ita tamen calidum appareat, id etiam erit calidum, sin vel calidae affectioni calidum vel frigidae frigidum sentiat, non est, quod hoc calidum, frigidum illud omnino pronuncies. est interdum summi caloris affectio, quam medicamentum modice frigidum non alterat, vt refrigerando densandoque totam externam superficiem, calorem intuscludat, ipsumque diffusi prohibeat: atque ita magis accendat affectionem. Ita vero & si quid frigidae affectioni admouetur, nullum calorem afferat: videndum est, num id, cum aliquid sit mediocriter calidum, nihil in affectionem agat, quae summi caloris indiguit. ergo non est ita vis exploranda medicamenti: nec si ex accidenti aliquid efficiat, non per se. id vero quod ex accidenti aliquid facit, tum ex affectione, tum ex tempore iudicabis: ex affectione autem, si ea simplex, vnaque est. à tempore vero iudicium ad hunc modum orietur. quod simulatque admotum est, refrigerare, aut calfacere manifeste videtur, id vtrique per se, & vi sua tale est: quod tempore id facit, fortasse ex aliquo accidenti huc adactum fuit: vt iuueni quadrati corporis tetano aestate media laboranti frigida liberaliter effusa caloris repressum facit. ceterum non calfacere per se aquam frigidam est ex primo eius occurso per-

spicuum. nam sensum inuehit frigoris: & cutim quoad ei affunditur, frigefacit: tum calorem non in omnibus corporibus, nec dum affunditur, affert: sed solum in iuuenibus quadrati corporis, æstate media, & ubi cessarit affusio. nā stipata, clausūque corporis superficie extima percussus sit eius calor, qui à profundo ascendit. est quandoque, cum calor ex accidenti refrigerat, intercedente nimirum euacuatione: vt cataplasma inflammationem. cum enim inflammatio ex calida fluxione consistat, propria eius curatio in superuacanei euacuatione est posita. euacuationi autem particule, quam excalfecit inflammatio omnino succedit refrigeratio. cum igitur hæc disceruenda sunt, tum vero id agendum, vt pro modo simplicis affectionis, etiam virium medicamenti modus inueniatur: vt si calida in summo sit affectio, frigidū quoque in summo medicamentum paretur: sin à summo paululū recedat affectio, medicamentum quoque paululum à summo declinet. si magis à summo calore absit affectio, medicamentum proportionē à summo frigore absit.

Simplicia medicamenta ferme omnia ex dissimilibus inter se particulis constare.

Cap. 9.

Simplicia medicamenta quamuis sensu simplicia videantur, natura tamen sunt composita, & ex dissimilibus inter se particulis constant: & subinde quoque diuersissimas inter se continent facultates: vt excernendi & sistendi, & cæteras omnes repugnantias. ac ne illud quidem mirum videri debet in huiusmodi facultatibus, cum vni & eidem medicamento vim calfaciendi, & refrigerandi inesse appareat, aut exsiccandi, aut humectandi, aut renuium partium, aut crassarum: siquidē nisi primæ hoc modo complicarentur, ex quæ ex illis sequuntur, neutiquam essent similiter complicatæ. ergo in corporibus, quæ ex similibus inter se particulis constant, caliditas, frigiditas, siccitas, & humiditas singularum rerum differentias efficiunt: in iis vero quæ ex dissimilibus sunt facta, acrimoniar, aciditates, austeritates, acerbitates, amarores, dulcedines, falsedines, & pinguedines: ita vt vnaquæque similiū inter se particularū non multas, sed vnam in se qualitatem obtineat: quod vero totum ex dissimilibus constat, permultas. nam si mille verbi

verbi gratia, hoc cyatho huius succi corpora contineantur, quæ ex similibus inter se particulis consent, fieri potest vt centum adstringat, sexaginta mordicent, sexcēta sint dulcia, ducenta amara, quadraginta salsa: sicque mutua sint mistione temperata vt nullam sensibilem partem, quantumuis exiguā, possis accipere, quæ non sit omnium particeps: vt in linguæ contactu omnes agant, in diuersa tamen eius parte cui scilicet appellere: ipsam contigerit: ipsaque affectio ex eo, quod primo affectum est, in eam totam diffundatur.

Quæ ex dissimilibus inter se particulis facultates conflatas habent. Cap. 10.

Graminis radix habet aliquid acrimoniæ, & adstrictionis. Aloë amara est, cum adstrictione coniuncta. itēque radix anchusæ, quæ onolea dicitur: & item bryoniæ tum albæ, tum nigræ austera sunt germina.

Bubonium digerit, & repellit. vua, culta quidem adstringit, & leniter digerit. Asphalti partes quædam adstringunt, quibus refrigerat: partes quædam sunt acres quibus calfacit. Glādis vnguentariæ reliquæ, vnde expressus est succus, absterget incidunt, contrahunt, & stipant. Daphnes radice cortex absterget, abstringitque. Oleum lentiscinum, terebinthinum, mastichinum mollit, & adstringit. quod vero ex agrestis olea fit, absterget, atque adstringit. Ephemerum, siue iris agrestis repellit, digerit. Zythus partim acer est, & calidus, parte vero plurima frigidus, aqueus, acidus. Fermentū particeps est acoris cuiusdam frigidi, & caliditatis ex putredine exortæ: & præterea eius, quæ ex salis, & farinæ natura existit. Hedyfari aut pelecini semen amarū, subadstringensque est. Hemerocales radix digerit, & repellit. Hemonitis adstringit, cum amaritie coniuncta. Senecio refrigerat, & digerit. Isopyron, aut phasiolum exterget, incidit, contrahit, & constringit. Centaurij maioris radix acris est & adstringens, vt caliditatis, & crassæ frigiditatis sit particeps. succus idem facit, quidā pro Lycio vtuntur. Coriandrum plurimum habet amaræ substantiæ, quæ tenuium est partium, & terrena: nec parum aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis est facultatis. his accedit parum adstrictionis. in eo tamen calida, siccaque facultas excellit. Cypri folia, summæque germina habent quippiam digerens, cum aquea substantia moderate calida.

L I B E R

Habent etiam adstrictionis quippiam ex terrena substantia frigida. Capnios vel fumus acer, amarúsque, est, & adstringit. Capparis radices cortex exterget, incidit, expurgat, digerit, contrahit, spissat, stringit. Fructus vero eiusdem, foliaque, & caulis eandem vim, imbecilliolem tamen possident. Hedera habet aliquid adstringentis, acrisque, & aqueæ ac tepidæ substantiæ. Cotyledon vero refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Lycium, siue pyxanthos, ex quo Lycium conficitur, tenuium partium, digerentis, & calidæ facultatis est particeps: itemque adstringentis, & terrestris ac frigidæ. Mandragora refrigerat, sed caloris etiam cuiusdam est particeps: & in pomis humiditatis, proinde soporem inducit. radices vero cortex, qui est valentior, non solum refrigerat, sed etiam exsiccatur: at reliquum quod est intus, imbecillum est. Melilotum adstringit, discutit, & concoquit. maior enim in eo est calida, quam frigida substantia. Myrtus ex contrariis substantiis constat. terrena tamen frigida in ea excellit. habet etiam aliquid tenuium partium calidum. quam ob rem vehementer siccatur. folia vero & germina, & fructus, & succus in adstrictione non magnopere differunt. porro quod ramis, & trunco adnascitur tuberis instar, quam myrtada quidam vocant, quo prædictis est siccior, eo etiam magis desiccatur, & adstringit. quidam id tundentes reponunt: postea vino excipientes in pastillos redigunt. ceterum folia sicca magis quam viridia exsiccant. succus exprimitur non ex viridibus solum foliis, sed etiam ex fructu. hæcque omnia restringendi vi sunt prædita corpori adhibita. Mel amarum mixtæ facultatis est, ac si quis nostrum ei absinthium miscuisset. Mori partes omnes purgantem & restringentem facultatem habent. in cortice tamen radices purgans vis exuperat: in moris vero immaturis restringens. in foliis vero & germinibus media quodammodo utrisque temperies est. Myrice, hoc est tamarix, incidentis, abstergentisque est facultatis, & tenuium partium citra perspicuam exsiccationem. fructus vero, atque cortex non mediocrem adstrictionem sunt sortiti, ut ad gallam omphacitida prope accedant. possentque ad eosdem usus, ad quos galla, adhiberi. porro myricæ combustæ cinis desiccantis facultatis est: inestque ei plurima incidendi, abstergentisque vis, exigua vero adstringendi. Acetum mistæ est substantiæ frigidæ, & calidæ, & utrius-

que

DE
que tenuium
est partium, vi
temque & disci
discutens qui
adstringit. hipe
becillus tamen
duplici vis inest
tem habere ex
detur, at minor
peres ad calidum
vulcorum edunt
quandam cum an
acrimonie, amari
cari verbis non po
teret frigidum
que calor quidam
in subtilis est par
tem maius, ite
et aquea subtili
erum magis eni
care plane patet
actis. Symphit
git, & modice
loschæni fructu
ter frigida, & aq
re queat cap
circa somniculos
quidpiam habet
am, & digerit. A
tu cerdoniam
na furorum egr
calens recess gub
De etiam fa

Atque hæc qui
in singula pro
tem hoc aut illud
cum in eo sit co
que exuperat

que tenuium partium, in eo tamen sicca facultas quæ tenuiū est partium, vincit. ex quo fit, vt repercutientem, attenuantemque & discutientem simul vim habeat. Oxylapathum discutiens quidpiam & repellens habet. at semen perspicue adstringit. hippolapathum vero eiusdem facultatis est, imbecillius tamen, orchios, hoc est testiculi radices bulbosæ, & duplici vis inest humida, & calida. ceterū maior radix multum habere excrementitū statūque plenæ humiditatis videtur. at minor, contra, valde inquam elaborata, vt eius tēperies ad calidius, & siccus vergat, hæ radices tostæ modo bulborum eduntur. Pityides & adstringunt, & acrimoniam quandam cum amaritie habēt. Polygonatum adstrictionis, acrimoniæ, amaroris quidpiam, & insuauitatem, quæ explicari verbis non potest, in se habet. Rheum habet quiddam terrestre frigidum, quemadmodū declarat adstrictio: ei quoque calor quidam inest. quin etiam aëreæ cuiusdam substantiæ subtilis est particeps. Qui vero aiunt rheum esse centaurium maius, ij melius sentire mihi videntur. Rosarum vis ex aquea substantia calida & adstringente, & amara est, flos earum magis etiam, quam rosæ, absterget: & eundem exsiccare plane patet. Scordium amari quid habet, acerbique, & acris. Symphitum vtrunque incidit, digerit, contrahit, stringit, & modice calefacit. oxyschœni, hoc est acuti iūci, & holoschœni fructus compositus est ex terrestri substantia leniter frigida, & aquea leniter calida: vt inferiores partes siccare queat: at capiti leniter frigidos vapores submittere: quo circa somniculosos facit eos, qui eo vtuntur. Diphryges quidpiam habet adstringens, acréque. Phrygius lapis repercutit, & digerit. Ageratus quoque lapis idem facit, quo vtuntur cerdones: nam repellit ipse quoque, & discutit. Atramētum sutorium egregie adstringit: & non ignauiter calfacit. Caseus recens glutinat, discutit, & adstringit.

De ordine facultatis simplicium medicamentorum.

Cap. II.

Atque hæc quidem ita dicta sunt nobis. tempus autē est vt ad singula progrediamur. optimus enim medicus nō tantum hoc aut illud medicamentum esse calidum, sed quantus etiam in eo sit calor, scire debet. Ac satis quidē erit in vnaquaque exuperantia quatuor ordines statuere, quatenus ad

usum pertinent: ut calidum primi ordinis dicamus id, quod nos calfaciat, non tamen euidenter. eademque sicci, humidique, & frigidi est ratio, at quæ iam perspicuo calfaciunt, aut refrigerant, aut siccant, aut humectant, secundi esse ordinis dicentur. quæ vero vehementer, non tamen ad summum, tertij, quæ denique ita possunt calfacere, ut crustas inducant, & vrant, quarti ordinis, ita etiam quæ sic refrigerant, ut stupidum locum reddant, quarti ea quoque ordinis censeantur, quod siccet vero in quarto ordine, nihil est, si non etiã vrant, nam siquid extreme siccet, id etiam adurit.

De calidi, frigidiq̃ue actionibus.

Cap. 12.

Ergo quæ temperata sunt, grata sunt, atque amica. quod enim in corporibus nostris constiterat, concretumque fuerat, id funditur: ex qua potissimũ affectione iucunditas animantibus existit. si vero diutius immorentur, ipsa quoque molesta redduntur, ad tantam enim fusionis immoderantiã sic recidunt, ut substantiam nostram digerant, dissoluãt, atque dispergant. veruntamen ne sic quidem mordicatione infestant, sed animi defectione inuehunt, virẽsque deiiciunt, ut etiam mors consequatur. quæ vero adhuc magis sunt calida, ea secant, diuidunt, distrahũtque substantiam, ut necessario mordacia esse videantur: qualis est aqua feruens, & ignis, eadem est ratio frigidorum. quæ nanque contacti corporis continuitatem nondum diuellunt, frigida solum sunt, non tamen etiam mordacia, at quæ præter quam quod contrahant, etiam conuellunt, ea violente mordacia apparent. subiectam igitur materiam contrahere, & condensare, frigidi semper est proprium: diffundere vero, & liquare, calidi: vtrisque commune, ut aucta immoderatus, mordeant. quocirca plerumque difficile est discernere, vtrum quis perfrigeratus sit, an ab humorum acrimonia mordeatur. sed enim in refrigerantibus statim contrahi & constringi substantiam sentimus: in calidis, dissolui atque fundi. vtriusque ramen affectionis celeritas nõ est par atque æqualis: sed in frigidis ferius, in calidis celerrime morsus sentitur. Ad huiusmodi autẽ affectiones essentia medicamentorum vel tenuitas, vel crassitudo plurimũ facit. siquidẽ frigida, quæ tenuium sunt partium, cum magis in profundum transeant, mordent vehementius: calida vero, quæ ex crassis partibus constãt, magis

gis ulceram
mordent, quæ
rie constant
pe cū aut de
illa, quæ ex

Quæ sunt

Adiantum,
etiam splacit
du, oleum du
etur, cera, fabi
lone linc tribol
indigera, leon
Cha, Sami, quæ

Quæ

Viciis folia
li folia, acant
non conficit
ces, vtraque
robi stultus
fermentum,
num, quod
provenit, cal
upericlyme
pe quam tere
mer has sunt
calidit ea, qu
culatem habi
eo conicitur,
corati flos, ph
linter, molar
fira canina va
purgum, la
cum radix, d
falsum dicitur
bulis. Zing

DECIMVS QVARTVS. 240
gis vlceraunt, & proinde violentius affligunt. sed magis etiā
mordent, quę & tenuium sunt partium, & inæquali tempe-
rie constant. inæqualia autem sunt propemodū omnia. quip-
pe cū aut non possit, aut sane difficillime, inueniri substantia
vlla, quę exquisitè ex particulis inter se similibus constet.

Quę sint media inter calefacientia, & refrigerantia.

Cap. 13.

Adiantum, asparagus myacanthinus, asplenū, muscus, quę
etiam splanchnon vocāt, dulcis radicis succus, dracuntij ra-
dix, oleum dulcissimum, quod præcipue ex oliuis drupis effi-
citur, cera, faba, vesca, pinearum pars aqua macerata, lyciū,
lotus siue trifolium, macer, citrij cortex, filicis radix, itēque
thelypteris, lentiscus, hyacinthi fructus, lens, terra felinusia,
Chia, Samiāque, cadania, spuma argenti, lapis galactites.

Quę res calfaciunt, sine ordinis adiectione.

Cap. 14.

Viticis folia, & semen moderate calfaciunt. vrticę semen
& folia, acanthij radix & folia, alimum cum humiditate, quę
non conficitur, statūque excitat, cōiuncta, amygdalę dul-
ces, vtraque anagallis, atrastylis, aut cnicus agrestis, aphace,
rubi fructus maturus, radix pœonię, oleę baccę maturę,
fermentum, eryngium, cisthus, aut citharus, cisthus aut lada-
num. quod enim apud nos est refrigerat, quod locis calidis
prouenit, calefacit. brassica agrestis vehementius quam sati-
ua: periclymeni fructus, polygalum, resinę omnes, picea ma-
gis quam terebinthina, qua etiam magis strobilina: medię
inter has sunt pinea, & abiegna. inter liquidas resinas magis
calfacit ea, quā capnelæon vocāt: nam cyparissina acrem fa-
cultatem habet. Sesamum modice, itēque oleum, quod ex
eo conficitur, & herbę decoctum. Soncus siccatus, iunci o-
dorati flos, phaleris, palmulę, & magis etiā dulces: lapis me-
litites, molaris, fordes, cochlearū combustarum cinis. bras-
sica canina valde calefacit, ranunculi radix, totāque herba.
pulegium, lauri folia, & magis baccę, cortex vero minus,
quam radix. daphne herba, dictamnū æque ac pullegium,
falsum dictamnū vero, minus. saluia, erysimum, lanę com-
bustę. Zinziber, thapsia, cardamomum, liquor, & ma-

L I B E R

xime omnium cyrenaicus . panacis heraclei radices cortex,
& fructus, sed minus, quam liquor. panaces asclepium, & pa-
naces chironium minus, quam heracleum. Silphij liquor, &
folia, & fructus, & radix, & caulis. capilli vsti . Calefacit etiā
alba vitis, & bryonia radix: alterius vero quæ nigra est, im-
becillius. anagiri folia, & magis etiam arida, aristolochia,
asphodeli radix, eiusque combustæ cinis. glandis vnguen-
taria succus, buniū, buglossum, quod & arction, pseudobu-
nium, glaux herba. daucus, qui etiam staphilynus nuncupa-
tur, & magis etiam agrestis, eiusque herba foris admota, &
magis quoque semen. chamædaphne, daphnoides, dracun-
culi radix calidior quam ari radix, ideoque acrior, & ma-
gis amara, & extinguunt vero oleum dulce & verus, magis-
que raphaninū, & his magis sesaminum, & melathinum, &
laurinum, & cedrinum, & quod è liquida pice conficitur: &
tædinum. elenij radix, cicer, serpillum, viscum, caucalis æque
ac daucus, libystici radix, & semen, smylax aspera, & lenis. fe-
rule semen, peplij semen, sagapenum, satyriū, apium, & ma-
gis etiam semen, hipposelinum, apium montanum, seseli, sesa-
moidis albi semen, sium, sinon, myrrha Bœotica, styrax, fi-
cus arbor, hydropiper minus quam piper, hypericon. sal la-
xior est calidior ceteris: sulfur, sanguis, fel, & flauum magis,
quam pallidum: & taurinum magis quā boum exctorum.
imbecillius est porcorum, præterquam agrestium. ouillū est
paulo acrius suillo: hoc magis etiā caprinū. simile vero quo-
dāmodo est vrsinum & bubulum. at taurinum est vehemen-
tius. hyenæ vero est debilius: sed hoc magis, quam calliony-
mi, & scorpij marini, & testudinis marinæ. omnium vero pē-
nigerorum animalium fel acrius, sicciusque est, quam qua-
drupedum. inter pennigera, gallinarum, & perdicum fel est
melius. milui vero & aquilæ acre est grauter, & erodit, Vri-
na omnium animantium calida est: magis vero vel minus pro
cuiusque temperie. nam calidiora, urinam calidiorem emit-
tunt: hominum vero vrina, & suum castratorum est omnium
debilissima. Salvia imbecilla est in iis, qui biberunt, & co-
mederunt: vehemens vero, & acerrima in iis, qui siti faméque
laborāt, carnes viperarū, adeps anserinus calidior est adipe
gallinaceorum, & gallinarum, & suillo. taurinus vero mul-
to calidior, sicciorque, quā suillus. Vitulinus inferior est tau-
rino: vt hædinus caprillo: & caprillus hircino: & taurinus
leonino.

DECIMVS QVARTVS. 241
leonino. Omnis pinguedinis vis est calfaciens & humectas:
muria denique piscium sale conditorum calefacit.

Quæ primi ordinis sunt calfacientium.

Cap. 15.

Aloë primi ordinis intensi calfacientium est, anthemis,
aut chamæmælū, arum, absinthium, calidior est succus, lada-
num primi ordinis completi. leucacanthæ radix, & fructus
lini semen, malabathri folium, spica nardi. hac imbecillius
calfacit celticum nardū: & minus etiam montanum. mustū,
serum, caseus extrinsecus impositus: ficus sicce primo ordi-
ne completo excalfaciunt.

Quæ secundo gradu calfaciunt.

Cap. 16.

Amurca, & anethum secundi ordinis intensi sunt: ane-
thum viride minus est calidum. artemisiæ utræque, balsamū,
elaphoboscus, calamus aromaticus, crocus, thus, lychnis co-
ronaria cōpleti est secundi ordinis. loti agrestis semen, chia,
mastiche, mel, myrrhis, quam aliqui myrrham vocant. vi-
num, peucedani radix, liquor vero magis: pix, polium minus
completi est ordinis. polycnemon, melissophyllon, marru-
bium, propolis, completi. ptarmices frutex adhuc virēs. Rho-
dia radix completi secundi: seriphum in secundo ordine in-
tenso. cucumeris agrestis succus, cui elaterio nomen est. Si-
fari radix, scandix, secundi est intensi: scilla, cardui radix,
completi secundi est: smyrna, terebinthi cortex, folia, &
fructus: teucrium, fœnumgræcum, vtriusque chamæleon-
tis radix completi: chamæpytis, ocimum.

Quæ tertio ordine calfaciunt.

Cap. 17.

Abrotonum, & magis vltum: lolium incipientis tertij est,
ægyri flores, & resina, folia vero imbecilliora sunt: acorum,
amomum, amaracus, ammiū, anethum vltum, anisi semen,
iuniperus, & eius fructus: asari radix, herba sabina, veratrum
vtrunque. epithymum, mentha, nepita, thymum, arundinis
vallis cortex vltus: caron, casia, cedrus vtræque: cinnamo-
mum, clinopodium, cnici semen, conyza maior & minor. nā
græueolentior humidioribus locis exorta imbecillior est: cu-
minum, leontopetali radix, leucas, thuris fuligo, fœniculum,
melanthium, mei radices: moly, aut ruta agrestis, aut harma-

II

L I B E R

lo, aut besafa, aut orium, rododaphne est tertij incipientis: vinum satis antiquum: ononidis cortex: origanum omne: opopanax, paronychia, petroselinum, ruta sativa: ptarmices frutex aridus: radícula agrestis est efficacior, & semen etiam efficacius est. samfuchus, sesamoides maius: sisymbriū, scorpioides, smyrnium, stachys frutex marrubio similis: polij radix, trifolium, quod asphalthion nuncupant: hyssopum, galbanum, incipientis est tertij. chamædrys, chamæleuce, chelidonium maius tertij est completi.

Quæ res quarto ordine calefaciunt.

Cap. 18.

Adarce, ampeloprasum, euphorbium, oleū cedrinum, folia clematidos, incipientis: costus, cepa, lepidium, sinapi, ruta agrestis, allium, & magis etiā, quod agreste est, ophioscordo: struthij radix, tithymalorum liquor, eorum vero fructus, & folia, minus: chelidonium minus, quartū est incipientis: & quæcunque caustica sunt.

Quæ refrigerant absolute, absque ordinis adiectione.

Cap. 19.

Graminis radix mediocriter: herba quoque illita mediocriter: auricula muris citra adstrictionem, pira illita, modice, sed quæ aultera sunt: bubonium sine adstrictione: balaustrū, rubi folia, germina, & fructus immaturus, & flos: auena modice, muscus marinus, glauciū modice: dulcis radice succus, dorycnium valde, quippe excellit frigiditate aquea efficaci. oleæ rami, & immaturus fructus: oleum omotribes: oleum myrtite, sesaminum, balaninum, hyosciaminum, elatine modice, helxine, quæ & perdicium, modice. panicum vel meline, si illinatur. epimedium modice, violę folia modice. arundinis vallaris folia modice: cicuta in summo. lichen in petris nascens. papauera omnia, eorumque liquor. mali fructus & folia, & succi, & cortex, præterquam dulcium. siquidem in eis aqueum temperatum exuperat. persicę fructus, citri caro. fungi valde, acrestę succus valde. amyllum ex tritico mediocriter, oleum rosaceum mediocriter, sordes ex palæstra, sideritis vtrique. sonchus nondum siccatus: stratiotes, tribuli vtrique: sed alter humidam habet frigiditatem, terrestris vero terream: palmę ramorum cortex, & cerebrum: & id quod

quod elaten vocant. terra samia modice: terra Cimolia, lap-
pis hæmatites, scissilis vero minus. naxie cotis retrimētum:
plumbago modice. plumbum non vltum, & vltum, cerussa,
sandyx modice: caseus mollis & recens modice.

Quæ res primo gradu refrigerant. Cap. 20.

Acacia non lota, atriplex citra adstrictionem: acini vux,
miliū, hordeum, orobanche, platanus, rhamnus completi
primi est. seris, quam picrida quidam & cichorium vocant,
& chondrile, quæ seridis est species.

Quæ res refrigerant secundo ordine. Cap. 21.

Acacia lota, plátago, eiusque fructus, blitum, galla, imma-
tura, cucurbita, mali armeniacæ fructus, rhus, cucumis, pepo,
solanum hortense, cui similia sunt solani halicacabi folia.
hyacinthi radix completi secundi ordinis est: lenticula pa-
lustris: alga virens: quæ quæ adhuc humida ex mari sit euul-
sa: psyllij semen.

Quæ res tertio ordine refrigerant. Cap. 22.

Semperuium vtrunque, portulaca, eiusque succus, man-
dragora, citrii pars acida, quæ circa semen est: herba sangui-
nalis tertij est incipientis: potamogiton eodem modo. so-
lani fruticosa pars, soporiferi solani radice cortex, altercū,
quod & flores, & semen album habet: hypecoon. quarto ve-
ro ordine refrigerat papaueris liquor.

Quæ res siccant, nec ordo gradus adiungitur.
Cap. 23.

Vitici folia, & semen: rutæ minus: graminis radix modi-
ce: semen eius graminis, quod in parnaso: adiantum, vtrū-
que semperuium modice. ægyri flores, & resina modice,
ceteræ eius partes, debilius. acanthi, siue melamphylli, si-
ue pædarotis radix: spinæ albæ radix: spina Aegyptia,
aste & arborea, & quæ humi sita est, vel herbacea. alyssoni,
amaratus, quæ fluxiones pota desiccant. albæ vitis, quæ bryo-
nia dicitur, radix: nā nigræ bryoniæ est imbecillior: anagyri
folia arida vehementer: androsæmi, quod ascyron etiam di-
citur, estque hyperici species, & dionysados folia androsaces,

L I B E R

anthyllis vtraque moderate : a parine moderate . pira illita
 * rhine moderate , magis vero summa eius pars . aristolochia
 valde , magis vero rotunda . arctium vtrūque . asparagus mya-
 canthinus , aspalathus , astragali radix , asphodeli radix , & eius
 exustę cinis etiā magis . atractylis , aut Cnicus agrestis me-
 diocriter : aphace magis , quam lens : balauustum valde . ru-
 borū fructus immaturus : siccatus vero magis : itēque flos .
 ranunculi radix , totāque herba vehementer : bulbus illitus :
 gallium , glycyfida , aut pentorobi , aut pœoniæ radix : lau-
 ri folia vehementer : & baccæ magis : minus vero cortex ra-
 dicis . quercus partes omnes . magis vero fagus & ilex . quin-
 etiam harum plantarum tenera folia illita non mediocriter
 ficcare possunt . alterius quercus partes minus siccant . oleum
 laurinum , & magis tædinum : panicum illitum : echini her-
 bæ fructus . heryngium multum : isatis agrestis magis , quam
 satiua : corticis salicis cinis vehementer : canabis fructus : na-
 sturtium , caucalis , vt daucus , ceratonia , vt eius itidem fru-
 ctus : siliquę , gummi . Lixiuum maxime omnium siccatur , &
 absterget quod ex ficulno factū est cinere : & tithymalorū :
 & ferme adurentis facultatis est . corni arboris fructus , & fo-
 lia , & germina valde . brassica in cibo sumpta , & foris ad-
 mota . caules eius combusti valde exsiccantem cinerem red-
 dunt , vt fere adurentem iam vim quandam acquisuerint .
 brassica agrestis vehementius , quam satiua . crethmon , li-
 lij folia , & læuigata radix . crocodilij semen , & radix . ca-
 nina brassica , lagopus , lichen in petris nascens , lepidium
 minus , fuligo omnis , lotus , aut trifolium moderate . lo-
 tus arbor , fœniculi agrestis , & radix magis , quam satiui .
 vocatur hoc propter magnitudinem hippomarathrum . hu-
 ius ergo non solum radix , sed multo etiam magis semen est
 cachryi simile . alterum vero hippomarathrum , cuius semen
 rotundum , acréque est , & coriandro simile . est simile il-
 lud quidem viribus hippomarathri , sed est imbecillius , my-
 riophyllon , narcissi radix , neurę , nymphææ radix , quę albam
 radicem habet , ea vehementius desiccatur . xereos aut xeri-
 dis radix , & multo magis fructus , xiphij radix : & præci-
 pue pars superior . acresta , orchis , quem etiam serapiada vo-
 cant , magis quam alius orchis , quem canis testiculum no-
 minant . siccata hæc herba magis siccatur . papyrus combusta :
 sed minus quam cinis chartę . panacis heraclij radicis cor-
 tex :

ter: sed min
 globuli rae
 radis, polem
 dium, filicis
 lectum mod
 ligatis, verb
 qui vltim: car
 de terra: & f
 sumus modic
 multum: nitru
 locorum. om
 nia: siliu: &
 oleum inu
 eo: n: n: q
 dicitur, car
 vide: contusa
 item cochle
 n: n: adru
 n: n: sale
 pulum comb
 combustum: g
 n: n: debent
 vultæ, pili
 cancerorum,

Q
 Vritę sem
 vultæ: anagall
 m: digens, o
 eris, quę ite
 quę in amo fi
 anagall: eni
 regalis facit
 siliu: & flos
 secum expri
 mentum ad m
 documento m
 canceri rad
 quod est eni

tex: sed minus quam liquor. perillereon, platani cortex, & globuli mediocriter. aut cortex vltus, magis. herba sanguinalis, polemonium, quod alij phileterium vocant, polypodium, filicis radix, & thalypteris. amyllum ex frumento confectum modice, resinæ omnes: sparganium, hipericon, phalangitis, verbasco folia, sal, aphronitrum, gypsum, idque magis vltum: cadmiæ omnes, omniæque metallica & lapidosa, & terrea: & squamæ omnes, & squama æris magis. argenti spuma modice. lapis phrygius, lapis Arabicus, & ostracites multum: nitrum, atramentum scriptorium, testa, & magis cli banorum. omne recrementum: ferri vero recrementum maxime: stibium, chrysocola, coagulum omne: stercus omne: anserinum inutile est propter multam acrimoniam, quæ in eo inest. itemque stercus miluorum & aquilarum, sordes mediocriter, carnes viperarum, caro cochlearum in mortario valde contusa, & in leuiorem postea redacta, vehemeter. quæ ad rem cochleæ recentes esse debent. cinis quoque earum satis crematarum. adeps taurinus magis, quam alij: caput menularum sale conditarum crematum, cornu ceruinum, & caprillum combustum, valde. corium vetus ex calceamento combustum: purpurarum, ostræarumque testa cõbusta, multum. debent autem in puluerem redigi. sepia testa, lanæ combustæ, pili combusti, valde: ouorum vitellus assatus: cinis cancrorum, garum, multum, muria piscium sale conditorum.

Quæ res sine morfu siccant.

Cap. 24.

Vrticæ semen & folia, aloë, amurca, & magis etiam siccant costæ. anagallis vtraque, plantago, auena, quæ illita per halitum digerit. oleum dulce, insulsum, lotum, maxime omnium, erica, quæ itidem digerit, fermentum sine morfu attrahit ea, quæ in imo sunt corpore, atque digerit: thalicttrum, lupinus amarus, eiusque farina, quæ etiam digerit: quod magis etiam agrestis facit: hippuris vehementer. isatis vehementer: salicis folia, & flos cum adstrictione quadam. nonnulli vero ex eis succum exprimunt, qui morsus expers est, & siccans medicamentum ad multas res vtile. nihil enim multo vtilius est medicamento non mordente, siccante, & leniter adstringente. cancani radix modice. iuglandis putamen aridum vltum, quod est etiam tenuium partium. pôticæ nuges, æque ac ma-

L I B E R

gnæ. sunt enim terreæ, frigideque essentiæ participes: milium, minus centaurium valde: itémque succus eius. gummi cerasi arboris. granum quod ad tingendum valet: oleum liliaceum: foliæque & radices lilij. faba foris imposita, compressi folia, germina, globuli noui, & teneri. cyperi radix, quæ simul quoque calfacit. Cypri folia, & germina, & globuli noui, mollésque. pinearum vesca pars in aqua macerata, neuras, nymphææ radix, sireon, multum: paronychia, pēta-phylli radix, & thelyptereos. myrrha, sarcocolla, stœbes fructus & folia: calx lota: tragacantha, palmæ radix, & fructus. ocimoidis semen: quod philitarion etiâ vocant: * terra omnis, ad quod facit etiam quies: lemnia est efficacior. cadmiæ læuigatæ ex fornacibus lotæ, lapis quem leucographida vocant. Assiæ petræ flos carnes marcescentes eliquat: petra vero, minus: pompholyx continenter lota. calx extincta, & lota, generosè, pforicum magis, quam chalcitis. oui candidum & tenue morfu omnino caret. eiusdem quoque naturæ vitellus est: sed assatus minus mitigat.

Quæ res siccant primo ordine.

Cap. 25.

Anthemis, vel chamæmelum, bacce iuniperi, arum, vtraque artemisia, intensi. hordeum magis quam farina fabarum abiecto putamine. polenta vero hordeacea magis. crocus, thus, fœniculum, nerium, aut rhododaphne, mustû, orobanche, seridis omnes species. cucumeris, peponisque semen, & radix siccata: fœnumgræcum, hyacinthi radix, chamæleuce.

Quæ res secundo ordine siccant.

Cap. 26.

Lolium secundi est ordinis completi, amaracus, bitumen, amurca intensi: anethum, plantago, eiusque fructus, opobalsamum, acini, gingidium, dipsaci spinæ radix, elaphoboscus, calamus aromaticus, milium intensi: cisthus vel cistharus, thuris cortex intensi, lycium, lychnis, quæ ad coronamenta adhibetur, completi: malabathri folia completi: fœniculû, Chia mastiche, & magis Aegyptia. Citrij cortex, & semen, & arboris folia: mei radices: auricula muris, spica nardi, completi, nardum celticum est imbecillius, quo infirmius quoque est montanum. vinum, crum intensi: opopanax, pix, polycnemum, ptarmices frutex adhuc virens: rhamnus,

nus, radícula, agrestis etiam magis: scandix intensi: cardui radix: scorpioides, myrrha, lentiscus, terebinthi cortex, foliaque, & fructus: hæcque præcipue siccata: solani furiosi radicis cortex, completi. lentes, alga etiamnum virescens, & humida è mari eruta: galbanū incipientis secundi ordinis censetur.

Quæ res siccant tertio ordine.

Cap. 27.

Abrotonum, & magis vltum. acacia, acorus, aloë, amium, anethum vltum, anisi semen, iuniperus, asari radix, absinthium, herba sabina. veratrum vtrunque. epithymum, thymum, nepita, arundinis vallaris cortex vltus, caron, casia, cedri vtræque, cinnamomum, clinopodium, conyza, maior, & minor. nam quæ grauius olet, & humidis locis provenit, imbecillior est. leontopetali radix, spinæ albæ radix, thuris fuligo. macer, melanthium, citrij pars quæ sub semine est: vinum sativis vetus. acetum, completi, cum vehemens sit. origanum omne, paronychia, quinquefolij radix, petasites, petroselinum, smyrnium, sed minus: paucedani radix, liquor magis. ruta sativa, polium minus: melissophyllum, marrubium, ptarmice frutex aridus. rhus, sampsuchus, seriphum, sesamoides maius: sisymbrium, stœbes folia, fructusque, incipientis: teucrium, trifolium, quod aliqui asphaltion vocant, hyacinthi fructus, hyssopum, chamædrys, chamæleontis vtriusque radix, chamæpitys, & maius chelidonium.

Quæ res siccant quarto ordine.

Cap. 28.

Ampeloprasum, oleum cedrinum, sinapi, ruta agrestis, alium, & magis agreste, quod ophioscordon nominant.

Quæ res humectant. ordinis vero gradus non adiungitur.

Cap. 29.

Alfene, buglossum, glaux herba, dulcis radicis succus: lactuca modice: violæ folia modice. mali persicæ fructus: fungi: polygalum, rosaceum magis, quam oleum, satyrium, stratiotes.

Quæ res humectant secundo ordine.

Cap. 30.

Portulaca & ipsa, & eius succus: atriplex: blitum, cucur-

H iij

bita, mali armeniacæ fructus, cucumis, pepo, lenticula palustris.

Quæ res aquosam frigiditatem habent.

Cap. 31.

Acacia, alfine, portulaca, plantago, atriplex, rubi folia, tus-silago herba cum humida est. nam siccata non æque est hu-iusmodi. blitum, muscus marinus. glaucium, dorycnium, epimedium modice. Lactuca, viscû, violæ folia, cucurbita, umbilicus venëris, cicuta. Leuce arbor. malua sativa, papauera, mala, præcocia, fungi, platanus, herba sanguinalis, potamo-giton, sideritis, cucumis qui edendo est, sonchus, stratiotes aquatilis, holoschœnus, nux pinea, hypecoon, lenticula palustris, psyllij semen, plumbum.

Quæ res media sunt inter siccantia & humectantia.

Cap. 32.

Graminis radix illita, oleum dulcissimum, ex oliua maxime drupa.

De iis, quæ tenuium, crassarumque sunt partium.

Cap. 33.

Quoniam tenuium esse partium dicuntur ea, quæ in tenu-es partes facile comminuuntur: solidarum vero, crassarum-que partium, quæ contra. viscosa vero atque dura ægre, aut difficulter, aut omnino in tennes comminui partes nõ pos-sunt. fragilia vero, & quæ sine viscositate mollia sunt, in te-nues partes facile soluuntur, perspicuum esse hinc arbitror, multa esse facultate calida, & facile accendëti: nos tamen ab eis nõ facile ex cal fieri. nam ignis qui est omnium tenuissi-mus, simulque calidissimus, in profundum facile penetrat, & comminuit, & extenuat, & mutat, & in suam denique natu-ram conuertit: simile reddens ex omni parte, & superans id quod contingit. at noster calor præterquam quod crassarum est partium, & vaporosus, est etiam debilis, vt quod contin-git, non facile cõmutet, ostensum enim est, nihil eorum, quæ nos calfacere apparent, æque ac ignem, posse calfacere: sed veluti materiã, quæ facile accendatur: siquidem initium mu-tationis à nostro calore accipientia, vt aridæ arundines ab igni, nos contra calfaciunt, & vt illæ ignis partes fiunt, ita hæc natiui caloris nostri partes reddantur, quinetiam admo-dum

dum exile corpus facile ab eo cui admotum est, alterari, maius vero tractu téporis, & ita vt eius alteratio vix sensu percipiatur, est sane satis comprobatum, quocirca mirandum non est, si nos celerius ab eo, quod in minimas partes accuratius comminutum fuerit, immutari sentiamus. Euidenter autem apparet, nullum ex iis, quæ ex crassis partibus constant, prius quam ad vnguem comminuatur, neque ipsum à corpore nostro quicquam pati, neque rursus in nos posse agere, neque enim solum in pipere, sinape, & ceteris omnibus nos calefacientibus, sed etiam in iis, quorum frigida vis est, eodem modo se res habet. nam si quis radices mandragoræ corticem in magnas con fractum partes cuti imponat, aut illinat, plane nihil officiet: at is in tenues partes comminutus, refrigerare potest, sic etiam papaueris semen, & cicutæ, quod quanquam est omnium refrigerantium valentissimum, tamen antequam exquisitè comminutum fuerit, nostræ cuti admotum, est plane imbecillum. ne igitur mireris, si aridæ arundines, pilique, etiam si facile accendantur, non tamen nos contactu exalfaciant: quippe qui à nostro calore non immutentur, vt nos contra calefaciant: quod scilicet in pollinem redigi non queant: quandoquidem & calamus indicus, eo quod rundi, & pollinis modo per cribrum traici potest, magis quam is, qui apud nos nascitur, euidenter nos calefacere conspicitur. Non est igitur censendum, quemadmodum nonnulli putant, ignem omnem tenuium esse partium, nec omnia quæ tenuium partium sunt, ignem esse, nam carbo ignis est ille quidem, nō tamen tenuium partium, aër quoque tenuium partium est, non tamen est ignis. est etiam aliquid frigidum exquisitè tenuium partium, & aliquid calidum, quod ex crassis partibus constat.

Quæ tenuium partium sunt.

Abrotonum vltum, viticis semen & folia. Scandix, semen graminis in Parnaso nascentis, ægiri flores: vrticæ fructus, & folia, acanthi, siue melamphylli, aut pæderotis radix, acanthij radix, & folia, spinæ albæ semen, acorus, amomum, asari radix, vitis agrestis albæ radix, radices anagiri cortex, & magis eo semen, anthillis vtraque, magisque ea, quæ est chamæpityi similis, anthemis vel chamæmelum, aparinæ, aristolochiæ radix, & magis etiam rotunda: arction quod est simi-

L I B E R

Le verbasco. plátaginis fructus, & folia siccata. artemisiæ am-
 bæ, asplenum, asphodeli radix, & magis eiusdem vstæ cinis,
 balsamum, & plantæ liquor magis, fructus vero minus: radix
 rubi, sabina multum, glycyfidæ vel pentorobæ, vel pœoniæ
 radix, dictamnium, dracontij radix magis, quâ radix ari: ebe-
 nus, oleum vetus, oleum ricininum, oleum quod è * squali-
 dis oliuis fit, sabinum, elaphoboscus, eupatorium herba: eu-
 phorbium, fermentum, heryngium, salicis liquor. nepita, ca-
 lamus aromaticus, arundinis vallis cortex vstus, casia egre-
 gie. ex nucibus vesca pars. nucis putamen aridum, & combu-
 stum, egregie: carpesium, milium, cedrinum oleum, cinnamo-
 mum in summo: cinnamomis, quæ pseudocinnamomum di-
 citur, pseudodictamnium, minus: ladanum modice: clinopo-
 dium, pruni gummi, fuligo omnis, lotus arbor, mastiche, me-
 lanthium, medij semen, myrrhis, ab aliquibus myrrha dici-
 tur: moly quod rutam agrestem quidam nominant: xyreos
 aut xyridos radix, & magis fructus, oxyacathæ fructus, opo-
 balsamum, liquor Cyrenaicus magis, quam alius omnis. pa-
 ronychis, paucedani liquor, ruta, pix, pisselæon vero magis,
 pistacij fructus, polemonium, quod aliqui philetærium vo-
 cant: propolis, resina terebinthina magis ceteris resinis, la-
 rinx quoque magis. inter liquidas resinas, quæ capnelæos di-
 citur, rosaceum oleum, rosa, sagapenum, sampsuchus, seseli,
 cucumeris semen, sisimbrium, eiusque semen, ficus sicca, mo-
 dice: ficus arbor: iunci odorati flos, modice: teucrium, cinis,
 eoque magis calx. tribuli terrestris fructus, tubera modice: hy-
 pericon, hyssopum, phaleris, phalangitis, phorbion, ocimo-
 deos semen, sal laxum. præterea in salis genere magis facit sal
 combustus: sed flos salis magis etiam facit. Spuma salis mul-
 tum: nitrum, magis vero eiusdem spuma. inter alcyonia, ter-
 tium, multum: minus quam hoc, quartum. arsenicum vstum:
 gypsum combustum, sulfur, cadmia, quæ botrytis dicitur,
 magis. pumex crematus, lixiuium, squama æris præ cæteris.
 Assij lapidis flos, lapis vero ipse, minus: melantheria, misy, flos
 æris, & æris ignem experti, eiusque squamæ magis: chryso-
 colla magis facit ea, quæ in pila fuerit confecta, quam quæ
 in fodinis inuenitur, eam quoque cremando tenuiorum par-
 tium reddes. sandyx, qui ex cerussa cremata fit. alga, adeps
 leonis, pardi, hyenæque multum: taurinus vero minus. calto-
 reum, sepix testa, lanæ combustæ.

Que

Quæ res sunt crassarum partium. Cap. 34.

Plantaginis radix, balauſtium, acinus, oleum balaninum, zinziberis radix, cancani radix. capæ, cucumis. squamæ omnes, minus vero eris: fori, alumen egregie, tum liquidum, tum crustosum, tum plinthite, tenuiorum vero partium quæ hæc, est quod scissile dicitur, & postea rotundum,

Quæ corroborant. Cap. 35.

Casia, galla immatura, stæchas, corroborat viscera omnia, & totum quoque animantis habitum. palmæ fructus, tum foris impositus, tum intro assumptus, absinthium.

Quæ res concoquunt. Cap. 36.

Amomum magis, quam acorus, & radix assari. vua culta, cera, ladanum, colla, ex qua libri conglutinantur, crocus, thus, pix, mastiche Aegyptia, rosaceum oleum, myrrha, styrax, galbanum, alica, ocimum illitum, butyrum, esypus, adeps suillus magis, quam oleum.

De medicamentis pus mouentibus. Cap. 37.

Quæ pus mouent, cum similem temperaturam habeant iis temperaturis, quæ naturales sunt, earum substantiam tueri potius, quam immutare possunt. ergo in suppurationibus humiditas alteratur illa quidem, itemque si qua caro contusa est: sed alia omnia, quæ secundum naturam sunt, substantiam suam conseruant. tale igitur esse debet inedicamentum, quod ad pus mouendum adhibetur, qualis est in naturis temperatis natius calor. quemadmodum enim alterationes quæ secundum naturam ab innato calore fiunt, à simili calore externo iuuantur, ita etiam in suppurationibus vsu venit. Nouimus autem nihil eque adiuuare concoctionem, quam ventriculus obit, ac corpus humanum ipsum contingens: quam ob rem nonnulli pueros noctu in sinu tenent, & summum inde commodum sentiunt. propius enim ad naturalem calorem accedit, estque magis proprius & cognatus hic, quam qui fomentis adhibetur. quidam vero catulos paruos huius rei causa alunt, qui dum quiescunt,

eosdem ventericulo admotos tenent: qui quidem calorem cibos concoquentem, non item qualitatem adaugent. Hæc autem medicamenta humida, & calida dicimus, non quod humidiora calidioraque nostra substantia sint, sed quia eorum temperies similis sit nobis, qui calida, humidaque temperie fumus, vt sermo vetus prodidit. Quinetiam emplasticum esse debere hoc medicamentum, vt ad summum pus moueat, planum iam esse mihi videtur, nam si natiui caloris substantiam augere & non intendere qualitatem conueniat, corporis meatus obstructos esse necesse est: vt transpirationes halituosas intus includant: quandoquidẽ ea cataplasmata, quæ aut detergunt, aut vehementius calefaciunt, & halitus diffilari sinūt, siccant quidem, sed tamen pus non vtique mouent. porro ad pus gignendum aptissima erit ex omnibus quæ perfunduntur, aqua temperata, aut hydrelæum: ex iis quæ irrigantur, oleum tẽperatum: ex iis quæ illinuntur, farina triticea ex hydrelæo, ipsæque panis. is vero modice coctus esse debet. nam qui plurimum coctus est, is est quodammodo siccior, & ad inflammationes, quæ ægrius concoquuntur, est accommodatus: qui vero minus, iis quæ admodum calidæ sunt, atque feruent. cui plus additum olei fuerit, iis conuenit, quæ difficiliter concoctionẽ admittunt: cui vero minus, iis quæ feruent. Quod vero ex pane cataplasma conficitur, inflammationibus, quæ egre concoquuntur, aptum est: siquidem & sal, & fermentum admissũ habet: quod vero ex triticea farina sit, calidioribus. Alica vero magis siccatur, quam farina triticea, quam ob rem in moderatis inflammationibus puri mouendo est ineptior. in humidioribus vero quam farina tritici præstantior. ex ipsa præterea tritici farina, atque pane, qui purus est, ad pus mouendũ est accommodatior: quippe cum furfur minus sit calidũ, magisque siccum. Farina autem pura, & quæ alendo est, humida est, & calida. qualia sane ad pus gignendum apta esse docuimus. Igitur medicamenta quæ vlcerebus inflammatis imponuntur, si calida & humida sint, ea ad pus mouendum conducent: vt adeps suillus, & vitulinus, butyrum, & thus. quinetiam ad pus perducit pix & resina, ex aliquo videlicet oleo subactæ. ad feruentes vero inflammationes, comburendæ sunt, & ex rosaceo liquandæ: ad alias vero, ex aliquo calefacientium, vt cicino, vt raphanino, vt vetere, vt Sicyonio. Si vero sola cæra interdum vtaris ad pus mouendum, ipsam quoque in aliquo

aliquo o
nastit cal
rim habet
est ex aliq
moderatio
dis, homin
cedunt reli
commoder
ga, et aliq
ne, & ad pu
ter, siquidẽ
is potestum
vel propter
tum inuente
nem nullum
et scurificat
pudbus, me
vi sunt pre
is, quæ gra
dum victio

Medica
bent, quæ
ter calida
duruerunt
non rament
vt secundi
cantio, fac
modum in
magis ad e
us illitu o
is non pa
siquidem e
esse latitau
ceus adp
res hi sunt
nã valent
gaurit

aliquo oleo calfaciente eliquabis: quippe cum ipsa per se minus sit calida, quam ut mouere pus queat. emplasticam enim vim habet. Solis itaque feruentibus inflammationibus apta est ex aliquo ex calidioribus oleis eliquata. verum ut hæc cōmoderatione inferior est, ut ad inflammationes temperie medias, hominūque, ac partium naturas: ita paululū quid excedunt resina, atque pix, ex quo fit, ut hæc omnia simul mista commoderate pus gignant. Nequis vero negligenter intelligat, existimēque me dicere omnia quæ difficulter concoquuntur, & ad pus nullo modo perueniunt, hoc pacto curari oportere: siquidē nonnulla huiusmodi ab emplasticis medicamentis putrescunt, vel propter succorum ea generantium malitiā: vel propter egrotantis imbecillitatem: cuius vires tū exiguæ, tum infirmæ ad succorum in locum irrumpentium cōcoctionem nullum asferre adiumentum possunt. quo casu profundis scarificationibus cutim aperimus in multis affecti loci partibus, medicamentisq; utimur, quæ maiore desiccandi vi sint prædita. imminet enim huiusmodi inflammationibus ea, quæ grangræna vocatur, calore natiuo ab ipsa propemodum victo, & eo ferme redactō, ut plane restinguatur.

De emollientibus.

Cap. 38.

Medicamenta, seirrhos emollientia multo calidiora esse debent, quam temperata natura sit: non tamen tam vehementer calida, nam quæ à lento, crassōsq; humore cōgelato induruerunt, calefacientia, siccantiāque medicamenta poscunt, non tamen quæ valida, violentāque sint: sed satis est interim ut secundi, aut tertij sint ordinis calfacientium, primi exsiccantiū. facultas quoq; emplastica in eis inesse debet, quemadmodum in iis, quæ ad pus mouendum adhibentur. sed quo magis ad euacuandū pertinere debent, eo etiam minus meatus illitu obstruere. cæterum cum in corporibus sic induratis non parua sit maioris, minorisq; duritiæ latitudo, necesse itidem est, medicamentorum ea curantium non paruam esse latitudinem, ut, ne longe abeamus, caprillus & gallinaceus adeps huiusmodi etiam indurata curauit. sed imbecilliores hi sūt, & moderatas duritias molliūt. adipe vero gallinarū valētiōr est anserinus: caprillo vero hircinus. validus quoq; taurinus est: sed minus quā hircinus. magis quā hi digerit,

& nō magis emollit leonis, pardi, hyenæ, atque anseris. Quin etiam medulla ceruina satis emollit, & post eā vitulina. in quo genere, quæ ex ossibus, quā quæ ex spina sumitur, quā spinalē medullam vocant, est præstantior. eodem ex genere, quam validiora, sunt ammoniacum thymiana, magisque tale est, quod pingue est, & recēs, & styrax, & galbanū, & bdellium Scythicum, quod & magis atrum est, & magis resinofum. alterum, quod Arabicum est, quo est dilucidius, eo etiam magis siccatur, quam emollientia. quod igitur recens & humidum est, & cōtūsum facile mollescit, ad eadem, ad quæ Scythicū, est idoneum, quod vero est vetustius, & gustu admodum amarum, acre, & siccum, ab eorum, quæ indurata emolliunt, mediocritate excidit. præstantiora vero, quam reliqua omnia, ad emolliendum sunt recentia, siquidem inueterata plus quam par est, exsiccant. id quod etiam in medulla, & adipe usu venit. quippe quæ se ipsis fiant & acriora, & sicciora vetustate, non secus, quam adeps suillus. Cæterum neque hæc, neque alia, quæ molliunt, habere salem debent: quādoquidem sal vehemēter siccatur. Quin & oleum Sicyonium ex hoc est genere: itēque liliaceti, & hyosciaminum, & dulcissimum, quod ex oliuis, & præsertim drupis fit, atque etiam anthemis, quam chamæmelum vocant, & althææ radix, & cucumeris agrestis radix, ex oleo, vel ex aqua decoctæ: & folia quoque maluæ agrestis, eaque & cruda, & cocta. nam hortensis folia imbecilliora sunt, at althæa, quæ anadendromalache dicitur, validior est: earūque validior est fructus. Libanotis etiam tres: chia mastiche. terebinthina magis, quam lentiscina. colophonia, quæ chiæ mastichæ est similis, & quæ ac ipsa mastiche: Aegyptia mastiche: opopanax, sordes ē statuis, lutum ex palæstra: strigmentum balneorum, butyrum, mirra Bæotica, hippoglossi radix & succus.

De indurantibus, & laxantibus.

Cap. 39.

Emollientium quidem facultas abunde iam exposita est nobis: de indurantibus deinceps loquemur. hæc igitur frigida atque humida esse oportet, velut semperuiuū, portulaca, & psyllium, lenticula palustris, solanum: aut hoc sane nō est humida tēperis, sed mediū absolute humectantis, & siccatis.

siquid

fiquid vero simul refrigeret, & siccet, id etiam omnino indurat: non est tamen ex iis, quæ proprie indurant: siquidem congelatione potius quam euacuatione durum corpus efficitur. at si quid ideo induratum sit, quod nativum humorem non retinet, siccum id potius, quam durum appellamus: eiusque sanatio est irrigatio, & humectatio, non emollitio: ut tensio curatur laxatione, & laxatio tensione. Atque hæc quidem liquido tum in cute, tum sæpe etiam in articulis conspiciuntur. nam laxatio provenit immodice humectatis, quæ circa eos sunt ligamentis, & tendinibus: tensio vero non etiam simpliciter, sed plusculum exsiccatis, aut refrigeratis, aut inflammatis, aut scirrho affectis. atque ita quidem in articulis. in cute vero non ita solum, sed musculis quoque, qui ei subiecti sunt, quoquo modo in tumorem elatis. ut etiam præ carnis copia quibusdam tenditur. id ipsumque in inflammationibus illi accidit. quocirca non una simpliciter, laxantium est species, sed alia humectando laxant, alia calfaciendo, alia molliendo, alia vacuando, alia tumores præter naturam purgando, alia quiddam horum faciendo. Quoniam igitur multis modis unaquæque res durior fit, aut siccata, aut densata, aut quia nimium expleta sit, & ideo vehementer tendatur, aut aliqua coniugatione hæc patitur, singulis quoque propria est emolliendi ratio. quam ob rem de singulis deinceps disseramus. Ergo quod à siccitate induratum est, humectari postulat: quod à congelatione, exalfieri: quod à repletionem, inaniri: quod à siccitate simul, & congelatione, humectari atque exalfieri: quod à concretione simul, & repletionem, calfieri, & euacuari. Siccantur itaque corpora citra concretionem, tum in validis exercitationibus, tum in Sole vehementi, tum inedia ingenti, tum febre ardenti, tum medicamentis quibusdam, quæ non refrigerando siccant. Congelantur à vehementi solum frigore, sicut etiam implentur à largi humoris affluxu. Siccantur vero simul & congelantur, coeuntibus, quæ simul convenire possunt, causis: ut si quis supra modum laborat in frigore, aut famem patiatur. Sic quoque replentur simul, & cōgelantur ab influxu frigido, aut partis alicuius perfriktione, ac tot quidem modis dura fiunt corpora. ad medicamentū emolliēs non de omnibus his modis efferre videtur,

& non magis, sed peculiariter de iis, quæ ob congelationem induruerunt, magisque etiam si in eis cōtentus sit humor præter naturam, ut in scirrho affectis usu venit.

De emplasticis.

Cap. 40.

Si qualem tibi sensum præbet aqua omnis plane qualitatis expers, talem in re sicca inuenias, ea profecto extra omnem in signem est caliditatem, & frigiditatem, mediam, quoad maxime fieri potest, constitutionem obtinens, aut certe paulo ad frigidius declinans, at si ita cum sit, consistentiam siccam habeat terrestris sit, ac citra morsum deficcet, est necesse, & corporis meatibus illini sic, ut difficulter eluantur. huius generis medicamenta sunt plurima, quæ exquisitè sunt lota, ut amy-lum, pompholyx, cerussa, calx, cadmia, terra Cretensis, & Cimolia, alica, samius aster, terra fullonum, gypsum, lupinus iam commansus, cancani radix, pinearum vesca pars, aqua mace-rata. porro quædam eorum non solum terrea sunt, sed natura etiam aquea: quædam etiam aëris non parum habent: tenacia tamen sunt omnia, & idcirco emplastica. Duplex enim est medicamentorum emplasticorum natura: altera enim est exquisitè terrea, & sicca, altera vero tenax est omnino: mista vero ex aqua atque terra, & plerunque etiam aëre: ut oleū dulce, sine sale paratum. oui quoque album ex eisdem quodammodo est mistum, magis tamen terreum est, quam oleū. quin & caseola lactis pars emplastica est. tenérque, ac recens compactus caseus, & suilla pinguedo: & cæteræ quoque pinguedines, quæ nullam adhuc acrimoniam contraxerunt, emplasticam meatuum facultatem obtinent, & magis etiam, quo sic-ciores, ac magis terreæ fuerint, huiusmodi etiam est elota cera dulcis. éstque ad id accommodata, quæ ex magis aqueo melle & minime acri sit facta. nam amara ab emplasticis clare secluditur. Gluten libris agglutinandis idoneum emplasticum est: gummi, myagri semen, defrutum, valde: triticum, sesamum, & sesaminum oleum, & eiusdem herbæ decoctum: sordes ex palestra: sarcocolla, tragacantha. Atque emplastica quidem medicamenta huiusmodi inter repellentia, & abstergentia medium locum tenent.

De medicamentis purgantibus

Cap. 41.

Quemadmodum in saporibus diximus nullum prope eorū
alienæ

alienæ qualitatis experte esse, ita in medicamentis existiman-
 dum est multas diuersi generis substantias esse mistas. osten-
 sum quoque est, attractiones proprietatibus qualitatum, quæ
 in substantiis sunt, perfici. idcirco purgantia medicamenta
 succis qui attrahuntur, familiaria & propria sint oportet, si-
 cuti magnes ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat, ei-
 que magnopere specie persimilis sit: verum est quodammodo
 fortior, ut attrahat potius, quam attrahatur. Quin ne eni-
 cum quidem à pituitæ natura alienum esse diffidendum est,
 ut eius quoque color indicat, sed tamen calore est pituita va-
 lentior, ut trahat potius quam trahatur. eodémque modo
 granum Cnidium, si quando à corpore nostro vincatur, (id
 quod assidue cnico euenit, rarius autem grano Cnidio pro-
 pter eius robur, atque vim) pro purgatione fit alimentum: ve-
 lut elleborus semper coturnicibus. Idcirco purgantium me-
 dicamentorum, vbi forte purgatione frustrantur, quædã præ-
 terquam quod nullâ corpori noxam afferunt, etiam animâ-
 ti alimentum præbent: alia vero in corruptelam, & tanquam
 venenum conuertuntur.

De nimia purgatione.

Cap. 41.

Nimiæ purgationes euenire solent, cum purgans medica-
 mentum tantas vires sumpsit, ut in vasorum ad ventrem ef-
 ficientium osculis morsum simul, apertionemque multam ef-
 ficiat: continenter irritans, & conuellens corpora, vasorum
 vim dissoluat. Cum autem in initio modica adhuc sit apertio
 & imbecillitas, tum quod tenuissimum est, minimæque natu-
 ræ familiare excernitur. Sed cum utraque aucta est, iam tunc
 familiarissima euacuantur: quam ob rem flaua bilis primo, pi-
 tuita secundo loco, tertio loco atra bilis: post hæc postremus
 omnium in nimis purgationibus sanguis effunditur. est enim
 hic succus naturæ quam familiarissimus. ante hunc vero pri-
 mus quidem qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Si
 igitur medicamentum, quod pituitam educat, dederis, prima
 in nimia purgatione flaua bilis, mox atra, ultimo loco san-
 guis eiicitur. Si vero quod flauam bilē ducat, exhibeas, pitui-
 ta consequetur, tertia atra, quartus demum sanguis, quin & si
 atram bilem purgans medicamentum sit, eam quidem pri-
 mum euacuabit, deinde flauam, tum pituitam, & postremo

omnium sanguinem: tanquam ex inanimis iam vasculis effluat. Cum enim vascula non amplius in se continere alios succos præ imbecillitate possunt, eorum vero ora reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, nec familiarem præterea succum possit attrahere, necesse est reliquos eo ordine, quem diximus, excerni.

De facultate purgante.

Cap. 43.

Purgans facultas duo significat. vnū commune omnium, quæ quouis modo animalis excrementa expurgant: alterum quod per excellentiam de iis dicitur, quæ aut per vomitum, aut per ventris deiectionem purgant. Est autem eiusdem generis cum his purgationibus tum ea quæ per nares, tum ea, quæ per os fit, infusis videlicet in nares medicamentis, aut os colluendo, aut mandendo: quæ omnia vnico nomine comprehendentes, ἀποφλεγματίζοντα, hoc est pituitā euocantia, & eorum facultates aphrophlegmaticas nominant. Eiusdem cum iisdem sunt generis quæ vuluæ ad mota expurgant. nam quæcunque dixi, ea attrahendi vim habent omnia: alia vnū quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: idque est illis cōmune: veluti quæ crassos, lētōsq; humores extenuare, vrinam ciere possūt, aut excreationibus ex pectore, pulmonēq; eiiciendis auxiliari, & quodam modo purgant illa quidem, sed tamen non, vt prædicta, nominantur, verum partim vretica, partim mēses prouocātia, hoc à superioribus differētia, quod non æque vt illa, vim ad familiares succos attrahēdos habent. ex quo fit, vt in his quoque sermo noster alterius distinctionis indigeat. eaque erit huiusmodi: quæ in pēssis, aut fomentis, aut quouis simili modo vtero admouentur, ea duplici ratione agunt. alia nanque solum calfaciendo prouocant, alia facultatibus, quas attractrices, & purgatrices nominant: quas trahendorum familiaritate peragere attractiones demonstraui: quæ bibuntur, vt sanguinem attenuent, & meatus obstructione liberēt, atque aperiant: ea facultate attractrice vacuationem non obeunt. ac priora quidem eiusdem generis sunt cū purgātibus: secunda vero cum his, quæ lac, & semen gignunt: de quibus paulo post verba faciemus.

De medicamentis ad tussim pertinentibus.

Cap.

44.

Bechica

Bechica medicamenta dupliciter sunt nominata, partim quia tussim prouocent, partim quia sedent. maxime vero cōtrariæ sunt eorum facultates. aliorum enim natura extenuās est: aliorum incrassans. attenuandi autem vis in calidis & tenuium partium substantiis est sita: incrassandi vero in frigidis, & quarum crasse sunt partēs. harū vero materiam supra memorauimus.

Ex Zopyro, de medicamentis, que humores ex ore, naribus, & oculis trahunt. Cap. 45.

Humorē ex ore tū trahunt commāsa, tum liquata pyrethrum, pontica radix, itēque polij, lapathi, cappareos, halicacabi, chamæleontis, ficuum pinguiū decoctum, tæda, mel, passum, papauer, absinthium, organum, radícula, vua passa sine acinis, aut alia eodem modo, cachry, napi, elleborus albus, elaterium, thymum, sal, omphacium, anisum, piper, misy, æs vstum, granum Cnidium, atramentum sutorium, chamælea, lauri baccæ, cedria, sulfur, elelisphacus, cinnamomū, acanthi fructus, balsamum, anemone, panaces, nasturtium, ammoniacum, sandaraca, fex arida combusta. E naribus educunt hæc, elaterium, piper, betæ succus & corticis radicis cyclamini, mel passum, thlaspi, granum Cnidium, anagallis, irinum vnguentum, anemona, ranunculus, cedria, expressio nucum amararum, veratrum album, struthium, omphacium, marrubium, hederæ tenera folia. quædam vero horum sternutamētum quoque excitare consueuerunt. Ab oculis vero trahunt humores mel, hyssopum, oleum vetulū, anagallis, id quod salis pinguedinem vocant, quam aliqui salis spumam nuncupant. laurinum vnguen, nardum, casia, cinnamomū, costus. liquor papaueris, & sagapeni, folij succus, itēque dauci, apiij, punicorū, amygdalarum, marrubij, ellebori albi, ponticæ radicis, anemones, rutæ, & magis etiam agrestis: castoreum, lapis hematites, atramentum sutorium, flos æris, adeps anserinus, æs cōbustū, fel, myrrha, chalcitis Aegyptia, sulfur ignē nō expertū, alumen scissile, sepiæ testa cremata. misy, vrina, thuris cortex, scillæ pars, quæ tomētū appellatur, decocta, ammoniacū, nicticoracis cerebrum, sanies hircini iecoris, salicis lachrima, omphaciū, squama stomomatis. Per aures euocare videntur mel, piper, & mustum, libanotis fructifera, metopiū,

I ij

Bechica

L I B E R

oleum ex nucibus, vrina bubula, fel taurinum, mercurialis, be-
te succus, & radicem capparis, & agreſtis rute, & Cnidij gra-
ni: caprifici liquor, bdellium, caſia, galbanum, veratrum al-
bum, ſerpillum, atque omphacium.

*Galenus, de medicamentis obſtructione liberantibus, abſter-
gentibus, & attenuantibus. Cap. 46.*

Quod emplaſtico contrarium eſt, id meatus repurgas, aut
obſtructione liberans appelletur: quemadmodum ipſum em-
plaſticum non ſolum ita vocatur, ſed obſtruens quoque dici-
tur. Fuerit autem id, ſicut actione contrariū, ita & corporis
natura, neque viſcoſum, neq; morſus expers: ſed & nitroſū, &
tenuiū partiū, ratione enim maioris, minorisq; differūt in-
ter ſe genere ſubſtantię non diuerſa, tū emplaſtica ab iis, quę
ſordē nutriūt, tū meatus expurgātia ab abſtergētibus. nā quę
in ſuperficie ſordē auferūt, ſive in cute, ſive in vlceribus, ea
abſtergentia nominantur: quę vero meatus etiā expurgant,
ea tenuiorū ſunt, quam hęc, partiū, & emplaſticis contraria,
& idcirco obſtructione liberantia, & meatuum expurgantia
vocantur: ſuntq; hęc nitroſa, & amara. Quę vero cuti exte-
rius imponuntur, ea ſolam nitroſam qualitatem exquisitam
poſſidere debent ad ea, quę dicta ſunt, peragenda. quę vero
intro in corpus aſſumuntur, ea quamuis aliquid adſtrictio-
nis adiunctum habeant, poſſunt tamen ſic quoque magnos
meatus, cuiusmodi ſunt in viſceribus, purgare, atque abſter-
gere. foris enim meatuum paruitas prius ab adſtrictione oc-
cluſa, quam expurgari probe queat, non etiam inde in altum
abſtergentem ſubſtantiā recipit, neque expurgatur. at vi-
ſcera, quę maximos in ſe meatus habent, maius commodum
ex vaſorum corroboracione capiunt, quā ex oſculorum exi-
guitate damnum ferant. proinde abſinthium intus repurga-
re poſteſt, foris non item: quippe quod ex amara, acerbāque
facultate eſt compoſitum. quęcunque ergo nitroſa, & amara
comperiuntur, ea meatus omnes poſſe expurgare cognoſci-
to. at ſordes vlcerum, aut etiam cutis, non hęc ſolum, ſed &
quę minoribus viribus ſunt, auferre poſſunt: qualia ſunt dul-
cia, quę tenuium ſunt partium, vt puta mel. quęcunque e-
nim obſtructionē tollunt, eadē quoque abſtergent: at quę-
cunque abſtergent: ea non omnino obſtructione liberant.

eadem

D E
eadem vero

Anagris ſemen, am-
pe oprafum, ad
reſ pedoris ra-
nata dicitur, & p-
coradix, erulim-
la nre indigene
apota cultum
ni heronica, cro-
limonides tres
gram, myridis
reſiduum ſit
hous radix, & d-
olique, Cypri-
omedrys, char-
mies amara
mum ipſum, &
truma, & ſal, &
li reliqua huius
m obtinent,
tumores eren-
m crallos, lent-
eſus ac pituite
pne incidend-
eſus, ante h-
um obſtru-
eſus fuerit. ni
damenta deſi-
nos, ſcolopem
pneant.

Qu-
Abſtergent
apudant, cra-

Quæ obstructione liberant, & expurgant.
Cap. 47.

Anagyri sicca folia, eiúsque radicis cortex, agaricum, vrtica semen, amarantum, amygdala amara, ipsaque arbor, ameloprasum, adiantum, radix ari, acanthi vel melamphylli, vel pederotis radix, pulegium, dracūculus, daucus, qui pastinaca dicitur, & potius agrestis: gentianæ radix, multum: ele-nij radix, ervsimi semen, cicer, agreste cicer, eupatorium her-ba citra insignem calorem, thymum, carice pingues, sopyrō, nepita, nasturtij semen & folia valide, casia, prunorum gummi, betonica, crocodilij radix, cyclaminū, spinæ albæ radix, libanotides tres: melanthium, medij semen, papauer cornigerum, myridis radix, ononidis cortex, oxyacanthi fructus, periclymeni fructus, & folia: ruta, prucedani liquor, & radix, filicis radix, & thelyptereos, cucumis, pepo, spondilij fructus radixque, Cypri folia, & summa germina, stæchas, teucrium, chamedrys, chamæpitys, chamæcissi flos: ceteraque omnia in quibus amaram qualitatem excellere dictum est. nam & nitrum ipsum, & aphronitrum, quod nitri est spuma, & salis spuma, & sal, & lapis Aethyopicus, & scriphū, & abrotonū, & reliqua huius generis, cum cibo, potūque assumpta eandē vim obtinent. protinus enim his ineit vt crassos, lentosque humores extenuandi vi prædita sint, sicut emplasticis omni-bus crassos, lentosque corporis succos reddendi. quam ob rē lentis ac pituitosis thoracis, pulmonisque lentę pituitæ, aut puri incidendis & attenuandis, & educendis, aptiora inueni-re alia, ante hæc medicamenta non queas. iisdem quoque ie-coris obstructiones expurgabis, & vero etiā lienis, quæ mo-dicę fuerint. nam quæ maiores sunt, ex vehementiora me-dicamenta desiderant, vt capparis corticem, radices tama-ricis, scolopendrij radices, & item herbæ, quam asplenium nominant.

Quæ abstergent. Cap. 48.

Abstergent autem omnia, quæ meatuum obstructiones expediunt, crassosque humores incidunt: & quæ nunc dicē-

L I B E R

tur, vt ftercus caprillum vsum, & ignem non expertum, testa
omnium dura testa intestorum, sepiæ testa, echini vtriusque
combusti cinis, serum lactis, mel, decoctum vero mel, mirus:
alyssum, vitis agrestis racemi, cultæ vero minus: albæ vitis,
que & bryonia dicitur, radix, nigræ vero est imbecillior, a-
mygdalæ, quibus vescimur, & ipsa arbor: vtraque anagallis,
valde, androsæmi, quod hyperici species est, & quod diony-
siadem vocant, solia, anemonæ, anthillides ambæ, aparine, ar-
gemona, aristolochia longa, arctium verbasco simile. plâta-
ginis solia: & magis sicca, arum, corruda, vua agrestis, aspho-
deli radix, atriplicis fructus, absinthij succus, bulbus illitus,
damasonium, dipsaci spinæ radix, ebenus, veratrum vtrûque,
helxine, que etiam perdicium vocatur: salicis liquor, arundi-
nis vallis, radix cum foliis abunde, & citra acrimoniæ: e-
iusque solia, modice, & eius cortex combustus, modice: cen-
tauriû minus, eiusque succus, ricini fructus, minus vero solia:
brassica agrestis, magis, quâ satiuæ, crethmô, hordeû modice:
lilij solia, & radix trita, modice: fabæ caro modice: lampâna
illita modice: lichê in petris nascens, violæ albæ totus frutex,
& radix, & magis etiâ flores, & inter hos, aridiores: leuce ar-
bor, lotus, siue trifoliû, lotus agrestis, meû, narcissi radix mo-
dice, nimphææ vtriusque, radix, panacis herculei cortex radice
modice, pix, platani cortex vstus, melissophyllû, marrubiû illi-
tû, propolis modice: vlmî solia, cortex vero, atque radices, ma-
gis, puissana: eamque crudâ læuigât, & mancipiorû faciem illi-
nunt ij, qui seruos diuendunt, vt pallorem qui in eorum cute
est, abstergeant: terebinthina vero magis, quam mastiche, sa-
gapenum modice: sesamoides maius: sesamoides albi semen,
sideritis vtraque modice, cucumis, pepo, magis vero quâ ca-
ro, semen, & radix arida: cucumeris agrestis radix, myrrha,
struthij radix, beta, tithimali, & eorum liquor magis. tragij
Cretæ solia, & fructus, & lachryma, hyacinthi fructus, ver-
basci solia modice, & presertim cuius flores aureo colore ru-
tilant, phu, chamæpitys, chamæsyce, chelidonium, valde: æru-
go, cum multo vero cerato citra mordicationem absterget.
alcyonia omnia: armeniacum, terra selinusia, chia, samiaque
modice: itemque Cretica, Cadmia, pumex ignem non ex-
pertus, & vstus. spuma argenti modice: lapis Aethiopicus,
lapis Arabicus, Smiris abunde. testa figulorum, & magis cli-
banorum

D E
banorum: co

De

Cum pluri
reditis non a
magisque calti
culi, dauci, smy
ampeloprasum
ipsum, tum cum
pulvis, corve
bicum, huncio
is, chamædopi
de præcipue ar
tius, carus, e
mollis Venet
radix semis, cy
me radices, m
inotus, radice
radix, & fruct
um pepo est
dum, pastina
terebinthi fir
natur: solia
radix, cham
quod in ven
nem per vna
doque sang
molas prout
vinam educti
pro vna e
nam cruenta
radix copiam
duram bil
corporis od
Onobrychi
tum aggre it
mores, meli
tum vna

Cum plurimam ciere vrinam velimus, medicamentis antedictis non admodum vtendum est: sed quæ acriora sunt, magisque calfaciunt. huiusmodi sunt apij, petroselinij, scœniculi, dauci, smyrnij, anisiq̃ue semen, ammiũ, asarum, acorus, ampeloprasum, vitis albæ prima germina, androsaces, tum ipsum, tum eius fructus epotus. radix asari, asparagus regius, palustris, oxymyrſinus, & oxyacanthinus: bdellium Arabicum, bunion, pseudobunium, bryonia, daphne herba, chamædaphne, & quod daphnoides vocatur, cicer, & præcipue arietinum, serpillum, thymum, calamus aromaticus, carus, eiúsque semen, carpesium, caucalis, costus, vmbilici Veneris folia cum radice in cibo assumpta, crocodilij semẽ, cymĩnũ, cyperi radix, libystici radices, & semẽ, mei radices, moly, spica nardi, celticum nardum, xyreos fructus, radices ononidos cortex, ruta, polium, seseleos radix, & fructus. cucumis qui edendo est, & magis qui iam pepo est, & melopepo, sinon, sium, scandix, scordium, pastinaca, eiúsque semen præcipue iunci odorati flos, terebinthi fructus, trifolium, quod etiam asphaltium nominatur: solani halicacabi fructus, hyperici totus fructus, phuradix, chamædrys, chamæpitys, absinthium, & maxime id quod in venis biliosum est, expurgat. herba sabina, sanguinem per vrinās ciēt. rubiæ radix crassā, multāsque, & quandoque sanguinolentas vrinās mouet: capnium biliosas & multas prouocat: eruum largius sumptum, sanguinem per vrinam educit: periclymeni folia & fructus potus in principio vrinam quidem solum mouent, & longo progressu vrinam cruentam reddunt. moderata potio drachma. cardui radix copiam vrinæ graueolentis educit, si quis ex vino elixatam bibat. quam ob rem scœdum alarum, totiúsque corporis odorem huiusmodi succum purgando curat. Onobrychidis folia sicca ex vino pota eos curāt, quibus lectium ægre it. graminis in Parnaso nascentis semen vrinam mouet, melicratum, oxymeli, vinum tenue & aqueum, dilutum vinaceorum, quod fecem vocant. Ab his autē medi-

I in j

camentis sanguis non solum attenuatur, sed funditur etiam, atque secernitur nō secus, quam lac: horūque neutrum absque valido calore fieri potest.

Ex Zopyro, quæ per urinas proprie à liene, iecore, & renibus ducunt. Cap. 50.

Periclymenon, tithymali vallaris semen, melanthium, cyminum, thymum, albæ vitis agrestis radix, clymenon, capparis radix, splenium, panacis semen, allium, serpyllum, cyrtus, alumen Aegyptium, malus, draconium, squama ferri, heliotropium, silybrium, aristolochiæ radix, organum, polium, colocynthis agrestis, bryonia, cyclaminus, ærisamenta vino diluta, asplenium, portulaca, dilutum vini, in quo marinus scorpius fuerit suffocatus. Ex iecore vero per urinas ducunt hæc, viticis semen, dauci folia, & fœniculi, itemque balsami, cœtaurij, & capni, & prœniæ niger fructus, anisum tostum, palmulæ ossa, lauri folia, symphytum, hypericon, hypnicum, absinthium, bunium, pseudobuniū, smyrnium, quod alij hipposelinum vocant, peucedanum, anagallis, menta, cœnanthe, pontica radix, thus, liquor silphij, heryngium, Heracleoticum, nux, hordei dilutum. A renibus vero per urinam trahit elenij semen, & apri, piper, papauer, pastinaca, marrubium, cnicus, libanotidos semen, & gladioli, qui in tritico nascitur, radicem bryoniæ cortex, gramen, defrutum, oua sepiæ, sulfur, album cicer.

Ex Galeno, de iis, quæ pectus, atque pulmonem repurgant. Cap. 51.

Quoniam vero hæc calida sunt, ideo puris ex thorace excretioni ea omnia sunt aduersa, quod enim serosum est, id ad se trahere renes anticipat: quod vero coactum est, atque exsiccatum, nō ita facile expuitur, quam ob rem eiusmodi medicamentum incidendi vi præditum esse oportet: sed non tamen insigniter calidum, ne vehementer exsiccet: atque eiusdem utilitatis causa cum sorbitionibus, & potionibus humestantibus dari postulat. huius generis sunt ea omnia, quæ obstructionem liberare ante descripsimus: & præterea, tota nux pinea viridis, nuxes picæ, butyrū, chrysocomes radix ex melicrato, castorium super carbonibus suffimigatum, & per insp

DECIMVS QVARTVS. 253
inspirationem attractum. id enim affectiones frigidas, & hu-
midas, quibus pulmo, & cerebrum obsidentur, iuuat vel ma-
xime: spica nardi fluxiones capitis, & thoracis exsiccat.

Ex Zopyro, quæ ex pulmone educunt.

Cap. 52.

Educunt etiam è pulmone eclegmata, quæ dari solent, &
catapotia, & semen vrticæ, lini, dauci, papaueris nigri, thy-
mi, hederæ albæ: succus raphani, sinapis, anisi, sesami, nastur-
tij, erisymi, scillæ, crui, cucumeris, melanthij, piperis, rutæ, po-
lij, cinnamomum, arum, dracontium, costus, nardum, sulfur,
myrrha, lauri baccarum pars interna, cortex radice capp-
aris, amygdalæ amaræ, pæonia, castorium, abrotonum, lactu-
cæ liquor, thapsia, styrax, bdellium, silphium, vua sine acinis,
pinæ nuces parvæ, omphacium, aristolochia, galbanû, mar-
rubium, heryngij radix, centaurium. eiusdem vsus causa bi-
tumen in suffitu adhibetur: sandaracha, hordeacea farina, re-
sina, scilla arida, erysimum, oleum cedrinum, elaterium,
cucumeris, centaurij, & fœniculi semen. faciuntque accô-
modata ratione fomenta leporis pili, myrrha, cucumeris
succus, serum lactis capræ, pecudisque in testis igni can-
dentibus.

Ex Galeno, de iis, quæ renes expurgant.

Cap. 53.

Quæ renes expurgant, ipsa quoque incidentia sunt, verum
larga humiditate non indigêt, apta vero ad id sunt tum in-
cidentia omnia, quæ prædiximus, tum vero etiam siccæ plan-
taginis radices, & folia, & magis etiam fructus: asparagus
myacanthinus, & maxime radices, & semē. glycyssides radix,
cicer, & amygdalæ.

*De rarefacientibus, aperientibus, condensantibus, &
stipantibus.*

Cap. 54.

Rarefacientia, aque aperientia videntur illa quidem vicî-
na esse prædictis, quæ extergere, incidere, obstructions tol-
lere, & diuidere diximus, sed tamen non omnino similia. ho-
rum igitur ante omnia distinguenda notio est, tum eorum

sic inquirenda substantia. Quæ cutis meatus referant, rarefacientia vocant: quæ vasorum oscula, aperientia. quin & ex iis quæ illis sunt contraria, quæ meatus contrahunt, condensantia nominant: quod vero oscula occludit, id non iam proprio ullo nomine appellant, sed magis generalibus, vt contrahens, claudens, stringēs, & obstruens. Porro talis est vtriusque natura: rarefacientium quidem modice calida, & minime desiccans, & crassarum partium: aperientium vero, crassarum partium & acris. his autem contrariorum, condensantium quidem frigida, at non terrena, nec aërea, sed potius aquea: eorum vero quæ osculorū apertiones occludunt, crassarum partium & frigida. Exempla horū sunt, rarefacientis quidē naturæ chamæmelum, & althæa, & oleū, quod ex iis paratur: nec minus quod ex agrestibus cucumeribus conficitur, atque etiam vetus. eiusdem etiam notæ est abrotonum vstū, & onobrychis. Aperientis facultatis sunt, quæ acris & terrea sunt omnia, vt cyclaminus, anemone omnes: sesamoides albi semen: allium, cēpa, fel taurinum, vnguentorum omnium crassarum partium, & calidorū subsidentia: quale est irinum, & amaracinum: quæ utique obcæcatas hæmorrhoidas aperiunt. Porro quæ vteri os ab inflammatione, aut scirrho, aut ariditate occlusum aperire dicuntur, ex accidenti, non autem primo & per se hanc habere vim censentur. eorum vero quæ iis sunt contraria, condensantia quidem constant ex aqua frigida, semperuiuo, portulaca, tribulo viridi, psyllio, herba, quam muris auriculam vocant, lenticula palustri, & vno verbo, quæcunque refrigerant, nec exsiccant. proinde & mandragora, & cicuta, & altercum, & papauer, ipsas nunc herbas dico, si quis modice eis vtatur, condensandi vim habent: si liberalius, non modo condensandi, sed & obstupefaciendi: si vero etiam plurimum, non solum obstupefaciendi, sed etiam necandi. at eorum, quæ aperientibus aduersantur, substantia, cū crassarū sit partium, & frigida, est omnium adstringentiū, quibus non sit acrimonia coniuncta. horum materiæ, quæ terrena, frigidæque est, exempla prius dicta sunt nobis. Quæ vero medicamenta frigida sunt, aut æque aut amplius, sed substantiam aqueā sortita sunt, ea debiliter & contrahunt, & constringunt: id quod eis propter mollitiem usu venit: quocirca tenues meatus in vnoquoque corpore contrahunt.

hant. & cor
queque con
to sunt con
tem me nunc
libent. atque
colat: rat
faciunt.

Nepita per
numque cor

Medicamen
tus narcifcu
pentum irine
numque. sal. fa
uolum, serpy
damzleo. co
cia galbari
fionum. alc
kchia tener

Si non se
tenta crassi
corpus instat
leus, quæ d
pa. & nasturt
pretiari rad
li igem ne
radia, calx v
E inueterari
& colliquat
quæ vero m
facultatis: v
igneæ usque
menter sit e

hant, & condensant: ceterum totum instrumentum vnde-
quaque constringere non possunt. quam ob rem talia meri-
to sunt condensantia, stipantia tamen non sunt. Intellige au-
tem me nunc stipantia dicere, quæ sensibiles excretiones co-
hibent. atque hæc quidem huiusce sunt temperaturæ & fa-
cultatis: at rarefacientia & modice, & citra molestiam calc-
faciunt.

Que sudorem mouent.

Cap. 55.

Nepita per se arida sumpta, & ex melicrato sudores ciēt,
totumque corpus siccāt. onobrychisque cum oleo iuncta.

Ex Zopyro, de eisdem.

Cap. 56.

Medicamenta sudorem mouendi vim ab acris aroma-
tibus nanciscuntur: huiusmodi quoque est piper, nitrum, vn-
guentum irinum, bubulus adeps, vnguen laurinum, cyprī-
nūque. sal, sampsuchinum, mustum, vua agrestis, cuminum,
anisum, serpyllum, polium, granum cnidium, sisymbrium,
chamæleo, conyza, dauci semen, ammoniacum, marrubium,
casia, galbanum, sulfur ignem non expertum, atramentum
futorium, alcyonium, bdellium, struthium, pyrethrum, aristo-
lochia tenera, lupinus, balsamum, & squama æris.

*Ex Galeno, de vrentibus, putrescentibus, detra-
hentibus, & cicatrices inducentibus me-
dicamentis.*

Cap. 57.

Si non solum calefaciant medicamenta, sed etiam confi-
stentia crassa fuerint, siquidem vehementia sint, & vrentia;
corpus instar ignis colliquant, & crustas sæpenumero simi-
les iis, quæ à cauteriis fiunt, excitant: cuiusmodi faciunt sina-
pi, & nasturtii semen, & arefacta herba, granum Cnidium,
pyrethri radix, quintū alcyonii genus: auripigmētum vsum,
& ignem non expertum, lixiuium, misy, fori, chalcitis, sanda-
racha, calx viua, vehemēter: extincta vero crustas inducit, ni-
si inueterarit: nam si inueterarit, id non facit. calfacit tamen,
& colliquat etiam carnes. hederæ lachryma obscure adurit.
quæ vero minus calida sunt, quā vt vrant, ea sunt aperientis
facultatis: vt aperientis medicamenti substantia terrena sit, &
igneæ vsque adeo calida, vt nondum adurat. Si vero vehe-
menter sit calidum, & præterea tenuium partium, id plane

ab omni mordacitate aberit : aut cum exiguo dolore car-
 nosas partes eliquabit. nam quod non confertim alterat , vt
 faciunt vehementia , quôdque non ægre penetrat , vt quæ
 crassarum sunt partium, ea latentem actionem obtinent : si-
 quidem alterationes subitæ maxime sensibiles sunt, itémque
 penetrationes, quæ vi fiunt. nam quod crassa essentia est , &
 vrens, id cuicunque parti inhæserit, furculi ritu infixum ex-
 cruciat. verum illud crustas inducit , perinde ac cauteria . at
 de quibus nunc instituta oratio est , ea crustas non faciunt:
 & putrefacientia nominantur appellatione minus propria:
 nam quæ vere putrefaciunt, simul humectant, & calfaciunt,
 sed ob symptomatis similitudinem hoc eis tributum est no-
 men: quippe cum ab utrisque citra dolorem fiat corruptela.
 cæterum putrefacientia medicaméta sunt auripigmentum,
 sandaracha, chryfocolla, dryopteris, pityocampe, aconitum.
 Cedrea vero teneras carnes & celeriter , & sine dolore pu-
 trefacit: duras vero longiore temporis spatio. Sed sunt inter
 ea quædam, quæ propriè detrahentia nominant, eisque vtû-
 tur ad inducendam vlceribus excrecentibus cicatricē. Sunt
 tamen & ipsa eiusdem genere facultatis cum iis, quæ putre-
 facientia nuncupantur : verum vsque imbecilliora sunt , vt
 extimam tantūmodo superficiem, quam attigerint, detrahāt,
 non tamen intimas subire partes queant . veluti assæ petræ
 flos, & testacea omnia combusta, modice detrahunt, & re-
 primum, quæ excrescunt. eiusmodi quoque sunt echini vtri-
 que cum toto corpore combusti : & lapis hæmatites aridus
 leuigatus, & in pollinem redactus, itémque ærugo, & cœru-
 leum, & squama æris, & chryfocolla. quanquam nec talia
 sunt ipsius facultatis re vera cicatricem inducentis . siquidē
 quæ sunt huius facultatis, neque detrahunt carnem , neque
 eliquant, sed indurare, & siccare sunt apta, vt alumen, vt gal-
 la immatura, vt æs combustum, & maxime lotū. nam quod
 lotum non est, quidpiam detrahens obtinet , quemadmodū
 etiam squama græcis. quod autem lotum est , omnibus medi-
 camentis cicatricem inducētibus longe præstat. debet enim
 id quod probe cicatricem inducturū sit , modice adstringe-
 re, atque siccare. quā ob rem spinæ Aegyptiæ fructus, & ma-
 h granati putamina sicca , & cætera omnia quæ sunt gene-
 ris eiusdem, medicamenta sunt ad cicatricem inducendam
 accommodata.

Zopyri,

Vlcus in summa cute inducunt rubi canini folia, betæque, & ranunculi, allium, pulegium, hyssopū, origanum, sepia testa, asphodeli radices, & capparis, & veneris vmbilici. itēque hippocampus vltus, apij semen, cæteraque salsa, acria, & amara quæcunque possunt, vbi admota, aut illita fuerint, similia permanere diutius. Inter adurentia vero numerari videtur cantharis, pityocampe, buprestis, calx viua, diphryges, fex combusta, acetum, anemone, quæ puniceo flore est, allium, ranunculus, cinis, & magis ficulnus, nitrum tostum, æs vltum, alumen, combusta buccinarum testa, mœnularum caput, chamæleon animal, auripigmētum, cachry, vua agrestis, sesamoides. Putrescentibus adnumerantur quædam horum, & præterea veratrum nigrum, elaterium, cucumerum agrestium radix, vua, liquor, squama eris, ochra, portulaca, papaueris liquor, mandragora. eadem quoque nomas in vlceribus, & crustas, quas vocant, sistunt.

Galen, de attrahentibus, & repercutientibus.
Cap. 59.

Attrahentes facultates sunt, quæ ex alto vehementius extrahunt: repercutientes vero, quæ in altum vicinos eisdem succos repellunt. essentia illis calida, tenuiūque partium est: his contra, frigida, & partium crassarum: siquidem calor perpetuo attrahit, frigus vero repellit. verum quod partium tenuitatem habet cum calore coniunctam, trahit vehementius: quod vero cum frigore crassas habet partes, cuius modi est adstringens, id violentius propellit. quam ob rem ex vehementia actionis vtriusque est impositum nomen. ac materia quidem adstringentiū est plane perspicua: attrahentium vero est huiusmodi: anemonæ omnes, vtraque anagallis, diſtamnum, cicer, agreste cicer, thapsia violente, cyclaminus, narcissi radix, xyreos, aut xyridis radix, & magis fructus, gladioli radix, & præsertim superior, propolis valide. pycnocomi radix, & fructus, & folia, fermentum, stercus omne attrahentis quidem est facultatis, sed nō exigua inest differentia. nam columbinum abunde trahit: ex quo autem vtrinque ab hoc receſſerunt, ad calidius quidem anserinum, ad frigidius vero gallinaceum. ab hoc etiam magis superantur hu-

manum & suillum. caninū vero simile est medicamentis ex-
tergentibus, & præcipue si ossibus vescantur. crocodilorum
quoque terrestrium stercus id etiam exquisitius facit. Iam &
sagapenum attrahendi vim habet, cyrenaicusque, ac Medi-
cus liquor, & si quis alius est qui sit his similis: sulphij item li-
quor & radix, spartum, quo vites ligant, eiusque fructus, &
virgarum succus egregie trahit: terebinthina præ ceteris re-
sinis: tragij cretenlis folia, fructus, & lachryma: phorbiū, sul-
fur, stercus boum, & præsertim eorum, qui eruum comede-
runt. Quædam autem qualitatis proprietate attrahunt, hoc
est totius essentię similitudine: hæcque calida esse omnia ne-
cesse est. nam inter ea, quæ similis essentię sunt, quod cali-
dus est, id trahit potentius: utpote quod similitudini calo-
rem auxiliarium assumpsit. nepita quoque attrahit illita, &
costus cum eo confricatus humores ex imis partibus trahit.
viscum valide trahit, nec tenues solum humiditates, sed etiā
crassiores: easque diffundit, & per halitum digerit.

De iis, quæ per halitum digerunt. Cap. 60.

Vicinæ inter se sunt facultates, quæ ea quæ in alto sunt at-
trahunt, & quæ attracta discutunt, quæ nanque trahunt
eæ etiam omnino discutunt: quæque discutunt, eadem
etiam trahunt: sed in medicamentis attrahentibus vis at-
trahens excellit, in discutientibus vero discutiens. Cæte-
rum materia discutientium est hæc, abrotonum, agaricum,
ageratum, adiantum, ægilops, vrticę semen & folia abunde.
acanthi folia, sambucus & ebulus, alyssum, amnium, anagyri
folia, & magis sicca, & radices cortex, androsaces, anthemis,
vel chamæmelū, anisi semen. canina brassica, illita valide: ar-
gemone, aristolochiæ radix, & magis rotundę. hastulæ regiæ
radix, & magis eius vstæ cinis: atriplex leniter: bulbus, bu-
phthalamum potius, quam chamæmelum, herba sabina, quam
pro cinnamomo quidam duplicem imponunt: muscus, cui
splanchno etiam est nomen: daucus herba foris imposita, e-
iusque semen magis: ibiscus, vel althęa, (est autem agrestis
malua) eius etiam radix & semen eodem modo faciunt: o-
leum dulce peructus, oleum ex lychno, cicinum, sabinum, ra-
phaninum, & quod ex liquida pice conficitur. his omnibus
cedrinū præstat, helxine, thapsia, canne vallaris cortex vstus,
abun-

abunde: casia, ricini fructus, folia, radix læuigata, & oleum, quod ex eo fit. crocodilij semen & radix, cyclaminus, cytisi folia, ladanum, lampfana illita, lapatium modice, leontopetali radix, leuces fructus, libanotidines tres: mercurialis, malua agrestis, hortensis vero est imbecillior: earumque validius est semen. est etiam validior quæ anadendromalache vocatur: mastiche Chia, magis vero Aegyptia, mel, persica germina, & folia. citrii semen & folia, nereum, aut rhododaphne superdata. Xanthii aut phasgani fructus. Xyreos, aut xyridis radix, & magis etiam fructus, gladioli radix, & superior maxime: primæ ficus, onobrychis, opobalsamum citra insignem caliditatem: liquor Cyrenæicus vehementissime: paliuri folia, & radix, opopanax, paronychia abunde: peucedani liquor, ruta, pix, melissophyllon, marrubium illita: ptarmice frutex: pycnocomi radix, fructus, & folia, cataplasma ex pane, magis quam quod ex tritico fit: fermentum, radícula, eiusque semen, agrestis radícula: terebinthina magis, quam mastiche: & magis quam hæc, larynx: mastiche Aegyptia, oleum rosaceum. rhodia radix, sordes è statuis, sordes ex gymnasio, lampsuchus, cucumeris agrestis radix, & elaterium: sium, sisymbrium, myrrha, ex caricis aciores. ficus caprificorum, fici domesticæ, prima ficus: beta sine caliditate: alba autem est validior: Cretensis tragii folia, fructus, lachryma: galbanum, ocimum superdatum: sal vltus magis, quam non vltus: & magis etiam salis flos, salis spuma, nitrum, nitri spuma, omnia alcyonia, terra Samia, faba modice: altercum, cinnabaris, chryfocolla, caseus ex acido lacte modice, butyrum modice, coagulum, stercus omne, multum: æsypus modice, carnes viperarum valide. quoniam vero ad cutim excrementa exigunt, efficitur, vt in quibus mali succi redundant in corpore, ingens vis pediculorum exoriat. adeps leoninus magis digerit, quam alii qui in quadrupedibus insunt: taurinus vero minus: suillus adeps citra morsum: vitulinus vero minus: hoc quoque magis bubulus. adeps porro qui inueterarit, magis quam ipsemet recens: ossa combusta, abunde: lanæ crematæ, echini vtriusque cinis.

Zopyri, quæ adstringunt.

Cap. 61.

Adstringunt vero myrti folia, itemque oxymyrhines, ma-

lus, rubus, oleaster, oliuæ cultę rami, rosæ, vitis, lentiscus, verbascum, cupressus, semperuiuum, papauer, sempermanens, puni-
corum flores, balauſtium, aloë, Cypriū spodiū, vrtica, hy-
pocistis agrestis, achrades, acini, pira, mala, crocus, althæa, a-
stragali radix, & verbasci: clauiculi vitis: myrti baccæ, mespi-
la, terebinthi fructus, dryopteris, corna, ephemerū, glās quer-
cina, agrestis lapatij fructus, altercum, & pęoniæ ruffa grana,
castanæ, hederæ, nymphæa, palmulę crudę melius, earumque
flos, & caulis: papaueris radix, oui vitellus assus: acaciæ ex-
pressio, faba Aegyptia, pastinaca, ferulę pollen, paliurus, cau-
dæ equinæ radix, lysimachia herba, alumen, sanguis concre-
tus, cyperis, cęnanthe, brassica percocta, leporis coagulum,
spongia combusta, ononis, suber, rhamnus, piceæ cortex, pi-
niquę, & fructus, myrica, rhus, quo vescimur, vinum austerū,
mari non mistum, vinacea. Adstringunt quoque nonnulla
eorum, quę crustas inducunt, vt diphryges, chalcitis, misy,
cadmia, vltum æs, à quibus defluxio omnis, præter vrinæ de-
fluxum, cohibetur, & comprimitur.

Quę res per halitum digerunt. Cap. 62.

Ad digerendum vero illita, aut perfusa valent asphodeli
radices, & vitis Chironiæ nigra, & archezostis, quam ampe-
lin quidam, alii madonium viscum vocant, & viticis, & cu-
cumeris, & magis etiam agrestis, & capparis, & anemones
puniceum florē habentis, & chamęleontis, & fęniculi. itē-
que thapsia, anthericum, cyperus, apium, hederæ alba, la-
patium agreste, altercum, asparagus brassicæ, & folia, & se-
men, pastinaca, trichomenes, amomum, nasturtiū, iuncus o-
doratus, gladiolus, nardus, ocimoides, echion, ammoniacum,
costus, piper, pulegium, arum, farina triticea, hordeacea, lo-
liaceæque. Sulfur quoque, nitrum, eruum, pæderos, testiculus
herba, omphacium, omnis cinis, recrementum, balsamum, le-
pus marinus, lapis Assius, elichrysum, absinthiū lęuigatum,
serpyllum, sinapi, sisymbrium aquatile, menta, conyza, nepi-
ra, glans vnguentaria, vua taminia, pumex, squama æris, sty-
rax, cucumis agrestis, ranunculus, rhinæ marinæ combustum
corium, struthion, balsamū, lactuca agrestis, propolis, alcyo-
nium, marina aqua, thuris cortex, raphanus, mel passum, pa-
naces heraclium, strigmentum, sordes ex palæstra, aristolo-
chia, fimus muris, cuminum, cochlea cum testa lęuigata,
abro-

abrotonum, cācorum integumentum, arisarum, lupini pol-
len: gluten taurinum, verbasum, sesamum, melanthium, me-
liloti semen. capa, polium, crysimum, bulbus, & magis etiam
in aqua elixatus, nasturtium, oleæ Aethiopicæ lachryma,
chrysocolla, veratrum album, & nigrum, sesamoides, marru-
bium, thymum, absinthium, rubus caninus, asphodelus, hy-
pericon, resina, lichen in petris nascens, piper, faba Græca,
fœnugræcum, atriplex, albæ violæ folia, origanum, herâthe-
mon, salis spuma, sal, myrrha, terra halmyritis & ampelitis,
cœnugræcum, betula alba, excrementitia pars silphii, bal-
sami, sagapeni, & panacis, pissileum, eboris deraasio, itémque
argenti, auri, æris, aluminis Aegyptii, pōtica radix, pinguium
ficuum decoctum, & dilutum, fel bubulum, defrutū, lycium,
malus, porrum, anthemion, gypsum, sauridion, quam carda-
mida vocant: lingua canis herba, quam plantaginem appel-
lant, caro bubula, caprillaque: hordeum, & olyra combusta:
alga, oleum, lana, pinarium vstum, acetū, tēdinum, ladanum,
orminum, anthile, cortex fabæ, plumbago, granū Cnidium,
elenium, artemisia, narcissus, adiantum, squama ferri, cycla-
minus, bubulus sanguis, & suillus eodem modo: rubrica si-
nopica, sandaracha nō laugata, ochra, sex aceti, & vini com-
busta: furfuris decoctum, & dilutum: & ipsum quoque fursur-
calx, atramentum sutorium, smyrnium, fori, fimus columba-
rum, hirundinis, gallorum, murium, lapis pyrites, combusta
vngula equi, bouis, aselli: libanotis quæ fructum non fert:
umbilicus veneris, chamæsyce, & micæ, quibus vestes tingun-
tur, orobanche, coracini marini caro, & siluri quoque sale
conditi: colocynthis agrestis, parthenium vel perdicū. At-
que hæc quidem omnia quo ordine descripta sunt, ad discu-
tiendum valent: sed simul etiam concoquunt aliquid, quod
alio in loco sit: & quæ in locis ipsis habentur, accommoda-
te pertractant. quam ob rem & concoquunt, & discutunt. &
eorum nonnulla attrahunt. & sudores mouent, & aperiunt.
quocirca diuidere etiam possunt. Squamas vero maxime edu-
cunt aristolochia, atramentum sutorium, silphium, siluri ca-
ro, & leporis coagulum.

*Galenus, de facultatibus lac gignentibus, & mensuris
purgationes pronocantibus. Cap. 63.*

Facultates, quæ lac efficiunt, partim in medicamentis tan-

K

tum, partim etiam in alimentis sunt, in medicamentis, ubi suc-
cos pituitosos calfacientes in sanguinem commutamus: in
alimentis autem ex totius substantiæ similitudine: cum vide-
licet boni sunt succi, & modice humida, & tepida caliditate,
quali est etiam lac: siquidem sanguis particeps est caloris, qui
animali commoderatus: magis vero, quā moderati, flaua bi-
lis: ut frigoris particeps est pituita. in medio vero pituitæ ac
sanguinis est lac, quantum ad calorem attinet: non tamen
pari interuallo ab utroque recedit, sed longius abest à pitui-
ta, propius accedit ad sanguinem, cum ergo minus, quā ex-
pedit, lac ad vbera peruenit, velis autem copiosorem veni-
re, tum sanguinem contemplator. aut enim minor est, quam
par sit, aut certe peior. itaque is qui parcior sit, vniuersam vi-
ctus rationem humectantem, calfacientemque exposcit. qui
vero est peior, si biliosus fuerit, in primis purgationem, mox
cum victum, quē modo diximus: si pituitosus, medicamen-
ta exigit excalfacientia aut primo aut secundo ordine, non
tamen exsiccantia. sed potiora sunt ea, quę non tantum sunt
medicamenta, sed & alimenta, ut eruca, ut sceniculū, ut ane-
thum: ipsas inquam herbas adhuc virentes, & humidas. nam
siccæ magis, quam oportet, excalfaciunt, & exsiccant. Huius
quoque generis est saryrnium, apium, & sium, herbæ etiam
num virentes: quippe cum exsiccantia omnia sanguinis hu-
miditatem depascentia ipsum & crassiores, & pauciores
reddunt: siquē calida sint natura, iusto calidiorem, si frigida,
frigidiores. Debet enim sanguis modice calidus esse & nō
crassus, ut ex eo lac gignatur. quocirca quę sunt eiusmodi,
extinguūt potius lac, quam procreent. quę vero ita, ut di-
ctum est, calfaciunt, neque vllam insignem siccitatem adiun-
ctam habent, merito vim procreandi lactis habere dicta sunt.
verum hæc sunt perpauca: neque enim facile comperias quę
prædictā temperiei mediocritatem sint sortita: cæterum in-
finita propemodum sunt, quę lac laedunt. nam & quę plus,
quam expediat, calfaciunt, quęque siccant, aut refrigerant,
partim sanguinis qualitatem vitiantia, partim eius substan-
tiam minorem reddentia, ne lac gignatur, impediunt. si-
milem porro his quę dicta sunt, vim obtinent, quęcunque
prouocare, aut sistere menstruas purgationes possunt. v-
trorūque enim communis est materia, sanguis, qui venis
continetur. Is ergo ubi fluxilis fuerit, & æqua litate con-
tem-

temperatus, abundantem vtrique copiam suppeditat. quin etiam venas non exiguas mammis & vtero communes esse, alibi dictum est. ergo cum ad alterutram partem sanguis fertur, altera siccescit. itaque haud mirabile est, si & victus, & medicamenta similia sint, nimirum quæ generant, sedant singulorum mensium ex vtero purgationem, & quæ lac in vberibus gignunt. quanquam hæc differunt, quod & calidioribus & magis incidentibus purgatio menstrua nonnunquam indigeat: quippe cum venæ in ea parte sitæ magis debeant aperiri, quam quæ in mammas pertinent, & sanguinem magis fluxilem requirant: cum nimirum vterus ad eius lationem nihil conferat, nam menses in venas, quæ illic sunt, mittuntur, non autem attrahuntur: at in vbera sanguis non mittitur modo, sed etiam trahitur. ac proinde leuiore medicamentorum auxilio eidem est opus, cum non quod satis est in mamas confluit. Et medicinæ, quæ faciunt, ut sanguis mamillas ingrediatur, imperfectas quoque purgationes adiuuant. sin autem multum oblatæ sint, aut plane retetæ, nihil huiusmodi sanare eas potest: sed sabina, & meû, & iris, & nepita, & pulegium, & dictamnium, & costus, & cassia, & cinnamomum, & aristolochia, & bunium, & cætera huius generis absolutas vteri purgationum retentiones sanant.

Zopyri, de eisdem.

Cap. 64.

Lac prouocare consuevit sesamum potui datum, cucumeris semen. terræ lumbrici, cachry, myrrha, polypodium, heryngium, cyrcæ fructus & folia, noctuæ cerebrum: ipsæque noctua elixa, & glaux herba. trimestre triticum, hordeum, scæniculum virens, eiusque radix, & fructus, libanotides, anisum, hippomarathrum, lini fructus, cuminû, eruum, polygonum. humor vero vnicuique facultati accommodatus miscendus est: ut tritici decoctû, scæniculi elixati aqua, ptissanæ cremor, & triticeæ ptissanæ eodem modo. illinitur vero scæniculum, melanthium, myrrha, expressio ex hordeo macerato, murisimus, portulaca, adeps anserinus, vlmî folia, cera, sulfur, recrementum, fel taurinum.

Quæ res menstruas purgationes ducunt, ex eodem.

Cap. 65.

Ducunt autem menstruas purgationes admota hæc, adeps

K ij

Graduatum A

*Quemad-
modum, q
na, religio
putare, ac g
ut non cre
rem quia i
la, & his co
miqui preb
des familiar
pote autem
fuit contrari
solus, &
natoria. Eu
dique id na
ne possunt
ne bulbi, c
d dicitur, t
cibi vero
Ceterum q
in crassitie
rimendi ne
tubilitate, ta
tu maturi, si
for ne esse q
pe natura, v
graphica, at
metat effe
poro tum e
tum in laffe
rum alia r
resistanti
queque cie
fuit contra*

FINI

sita educunt, lini fructus, granum Cnidium, ocimi semen, cuminum Aethiopicum, salvia, sesamum * crudum, & anisum.

Galenus, quæ semen gignunt, & extinguunt.

Cap. 66.

Quemadmodum in lacte, ita etiam in semine dicere consueverunt, quædam semen generare, & quæ his sunt contraria, restinguere: quædam prouocare, & eisdem contraria, suppressere, ac generare quidem volunt ea, quæ procreant quod ante non erat: extinguere vero, quæ corrumpunt: prouocare autem quæ in apertum proferunt id, quod in alto delitescerebat, & his contraria, quæ supprimunt. Semen ergo gignunt cibi, qui probe nutriunt, & flatuosi sunt: & totis substantiis sunt familiares: medicamenta vero, flatuosa & calida. extinguunt autem siccantia omnia, refrigerantiaque, & quæ totis sunt contraria substantiis. porro prouocant quæcunque calida sunt, & flatuosa citra desiccationem: supprimunt vero contraria. Etenim cum semen ex utili excremento gignatur, sitque id flatuosum, quæcunque semen procreare, prouocare possunt, bene nutriant, flatuosaque sint necesse est, itaque bulbi, cicer, fabæ, polypodes, coni, edulia multi seminis & dicuntur, & sunt: scincus vero & satyrius sunt medicamenta. cibi vero, & medicamenta simul, viticis semen, & eruca. Ceterum quæ edulia, medicamentaque refrigerare possunt, incrassantia, & cogentia, & stabile semen reddentia, eius suppressendi non autem corrumpendi vim obtinent: ut lactuca, blitum, triplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres seu maturi, seu non maturi fuerint. Quæ vero siccant, ea prorsus ne esse quidem semen permittunt: etiam si calida sint suapte natura, ut ruta: si autem non calfaciant, multo minus, ut nymphæa, atque hanc sane consentaneum est, substantiæ proprietate esse eiusmodi, ut contra, quâ semine affecta sit. eadem porro tum esculentorum, tum medicamentorum proportionem in lacte & mensuris purgationibus licet inuenire. Ceterum alia ratione sub idem genus cadunt, quæ reiciendis respirantium instrumentorum excreationibus auxiliantur: quæque ciere urinam possunt. hæc enim omnia attenuandi, sicut contraria incrassandi vi sunt prædita.

FINIS LIBRI DECIMI QVARTI.

K ij

LIBER
ORIBASII MEDICI-
NALIVM COLLE-
CTORVM,

LIBER DECIMVSQVINTVS.

Ex Galeno, vniuersa cuiusque medicamenti
facultates. Cap. I.



Implicium medicamentorum, & facultatum, quæ in eis insunt, cognitio ita necessaria est, vt sine ea nemo rite medicari queat. ita enim magna nobis suppetit copia, & nos in quacunque temporis opportunitate medicamēta facile comperimus, valet etiam eadem notitia ad composita remedia conficienda. præterea vero ad eorum vires vniuersales inueniendas pertinet, & quod artis est, apud omnes patefacit. quam ob rem dabo operam, vt rem à capite arcessam, & ducto ab elementis initio sic progrediar, vt simplicium medicamentorum facultates percurram. ita enim fiet, vt qui eas norint, ad memoriam reuocent, qui vero eas ignorant, nunc perdiscant. Et vero vniuersalis de iis sermo totus iam finem videtur consequutus, tempusque est, vt ad res singulas nostra se conuertat oratio: quæ quidem priuatim in vnoquoque medicamento perficietur. Nunc vero particulares actiones non scribam: sed hoc persequar cum de curandi ratione disseram, cum vixus exposcet. hoc vero loco vniuersales simplicium medicamentorum facultates tantum recensebo.

A

Abrotonum calidum est & siccum facultate, in tertio ordine constitutum. cumque amarum sit, vi quadam digerendi, atque incidendi est præditum. & quoniam pauca acerbitalis est particeps, idcirco stomacho inimicum est. ostensum enim est amarum per se omnino stomacho alienum esse: auferum vero, aut acerbum, aut ad summum adstringens, esse stomacho

Stomacho idoneum: mistis porro inter se qualitatibus, præstare vehementiorem. Idem quoque abrotonum vstum calidum, siccūque est: valétque ad rarefaciendum, & tenuium est partium, & mordax.

Agni, hoc est viticis folia & fructus, & flos calidæ, siccæq; facultatis in tertio ordine in recessu sunt. verum multum tenuium partium est eorum substantia, & nescio quid exigue adstrictionis ex eis percipitur.

Agrosteos, hoc est graminis radix sicca & frigida est. ipsa vero herba refrigerat, sed non valide, estque in medio humiditatis & siccitatis constituta. at radix mordacitatem, & partium tenuitatem exiguam obtinet: interdum tamen lapides frangere consuevit. Semen autem alterius imbecillum est, cuius vero, quod in parnaso nascitur, vis est exsicicans, tenuiumque partium, & subacerba.

Anchusæ quatuor sunt, non omnium tamen eadem facultas est. quæ nanque onoclea dicitur, adstringentem & subamarā radicem habet: quæ etiam condensandis corporibus & modice attenuandis, & abstergendis, & abluendis biliosis salisq; succis non pota solum, sed etiam foris admota sufficiat: quæque ex pollenta illita possit refrigerare. herbæ autē folia sunt radice imbecilliora. ab eis tamē siccandi & adstringendis vis non abest. Quæ vero Lycopsis nominatur, radicē habet magis quam superior, adstringentē. eius autem quā onochilon, & alcibiadion vocāt, facultas est magis medicata, & acris: ut eos, qui à viperis morfi sunt, tum illita, tum suspensa, tum esca valde iuuet. quarta denique quæ restat, parua est, & alcibiadio persimilis: sed & magis amara, & magis medicata.

Agarici radix primo quidē gustu dulcis quodā modo, sed paulo post apparet amara: & quādā acrimoniæ, levisque adstrictionis speciē spatio tēporis inducit. quā ob rē perspicuū est, hoc medicamentum esse compositum ex aëria, & terrea substantia, quæ à calore extenuata est: aqueæ vero essētiæ minime est particeps. hac ratione vim habet digerendi, & crassitudinem incidendi, & viscerum obstructions expurgandi.

Ageratum facultatis est digerentis, & leniter quodam modo inflammatione liberandi.

Adiantum exsiccat, extenuat, digerit: nullum tamen perspicuum calorem, aut frigus inducit. sed propter

K iij

oppositionem, quam in his facultatibus habet, rite in medio constituetur.

Aizoon, hoc est semperuium vtrunque siccatur leniter, mediocriter adstringit, omnis alterius validæ qualitatis expers, ut aquea essentia in eo cæteris antecellat. non modice autem, sed in tertio ordine refrigerat.

Aegilops leniter acris est: ideoque vim habet per halitum digerendi.

Aera, hoc est lolium, desiccatur & calfacit efficaciter, ut proxime ad acria accedat: quocirca ponet hoc quispiam in tertio ordine calfacientium, & in secundo extremo siccantium.

Aegyri flores calidi sunt in tertio recessu. in differentia vero, quæ in siccando, atque humectando est: paululum à temperato ad siccus deflexerunt: & subtiliorum potius, quàm crassiorum sunt partium. ipsius quoque folia sunt floribus quodammodo similia: nisi quod ad omnia imbecilliora, minusque efficacia sunt. quin etiam resina similem floribus facultatem habet, atque etiam calidiorem. semen vero subtiliorum est partium, magisque exsiccatur, quam resina, & flores: non tamen est admodum efficax.

Acaciæ & planta acerba est, & fructus, & succus, qui lotus, imbecillior, & minus mordax redditur: ut pote acrimoniam lauando deponat. ex quo planum est, medicamentum hoc frigidum esse, atque terreum, quadam etiam aquea assentia immista. Coniectura quoque est, non ex similibus inter se particulis constare: sed quasdam in se dispersas tenues, calidasque habere partes, quæ abluendo segregantur. loceturque hoc in tertio siccantium ordine, & secundo refrigerantium, ubi fuerit elotum. non lotum vero in primo.

Acalephes, hoc est vrticæ fructus, & folia valde digerentis sunt facultatis. sed & quiddam flatuosum habent. temperies eius est tenuium partium & sicca: non tamen usque adeo calida, ut iam mordeat. porro status, cuius esse participem eam diximus, nascitur, dum concoquitur. alium autem magnopere subducit ipsa duntaxat abstersione, & veluti titillatione.

Acanthus folia habet facultatis modice digerentis: radicem vero siccantem, leuiter incidentem: & tenuium partium.

Acanthii radix & folia tenuium partium, & calidæ sunt facultatis.

Acanthæ leucæ, hoc est spinæ albæ radix sicca, & modice adstringit,

adstringit, semen vero tenuium partium est, & calidum.

Acátha Aegyptia magis adstringentem siccantemque facultatem habet, quam spina alba.

Acori radix acris, & modice gustu subamara est. itaque calidæ est facultatis, & tenuis consistentiæ. deterget ergo & extenuat ceratoidis crassitiem. ad quod etiam eius succus est accommodatior. esto autem tertij ordinis & in calfaciendo & in siccando.

Aconitū, siue pardalianches putrefacientis, venenosæque facultatis est. ad putrefaciendum tamen quedam extra corpus herbæ radix est utilis.

Aconitum, seu lycoctonum similis superiori facultatis est: sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos.

Acte tum arborea, tum chamæacte, hoc est ebulus, & sambuchus, utraque potentiam habet siccandi, conglutinandi, & modice digerendi.

Allium, cum ex dissimilibus inter se particulis constet, salsum quidpiam, subadstringens gustu habet. maior autem eius substantiæ pars est moderate calida, cum humiditate, quæ non conficitur, & leniter flatum excitat.

Aloë adstringit quidē modice, sed egregie amara est: subducitque aluum: siccātque citra mordicationem in tertio gradu, & calfacit in primo intenso. potest etiam simul repellere, & digerere, & paulum etiam extergere.

Alyssum solum datum sæpenumero à cane rabioso morfos sanauit. id quod ex totius substantiæ similitudine potest efficere. Facultatem habet modice siccantem, & digerentem, & nonihil etiam abstergentem.

Alsiue, vel auricula muris essentiæ est aqueæ & frigide, quare citra adstrictionem refrigerat.

Amaracus in calore tertij est ordinis: in siccitate vero secundi.

Ambrosia illita vim habet adstringendi, & repellendi.

Ami semen vim habet exsiccandi & calfaciendi in tertio ordine intenso. est etiam tenuium partium, & digerens, gustūque acre, & subamarum. ideoque urinam mouet.

Amaranthum attenuantis est facultatis, stomachoque infestum est.

Amurea terrestris est substantiæ, calidæ, non tamē ut perspicue mordeat. si coquatur, multo crassiorum partium red-

Anemonæ omnes acris, abstergentis, attrahentis, & ora-
vasorum aperientis sunt facultatis.

Anethum ita calefacit, vt in secundo ordine intenso, aut
in tertio remisso statuendum esse videatur. exiccantium ve-
ro secundi ordinis est. itaque merito in oleo decoctum di-
gerit, dolorem sedat, somnum conciliat, crudos, & incoctos
tumores concoquit. fit ex eo oleum, cuius temperies propin-
qua est pus mouētibus, & cōcoquētibz appellatis medica-
mentis: nisi quod paulo illis est calidius, subtilius, & dige-
rens. vltimum vero fit tertij ordinis calfacientium, & siccant-
ium. cæterum viride adhuc & succi plenum, humidius est,
& minus calidum. itaque magis concoquit, & somnum ma-
gis, quam siccum, conciliat: sed minus digerit.

Anthillis vtraq; mediocriter siccatur. altera vero, quæ cha-
mæpityi est similis, est subtiliorum partium, quam altera: &
magis absterget.

Anisi semen acre est, & subamarum, vt prope ad vrētium
facultatem accedat. est tertij ordinis exsiccantium, vt etiam
calfacientium: atque etiam digerit.

Aparine modice extergit, & siccatur. habet etiam quandam
partium tenuitatem.

Apij, hoc est piri, folia, & summa germina austera sunt:
fructus vero aliquid etiam aquæ dulcedinis habet. proin-
de piri, si edatur, stomacho conuenit, sitimque prohibet: si
illinatur, exsiccatur, modicęque refrigerat.

Achrades magis quam alia pira & adstringunt, & exsic-
cant.

Apocynum, aut bralsica canina est venenum. mirū in mo-
dum grauiter olens herba est. proinde omnino non ignauiter
calida est: non tamen proportionē desiccatur. quāmobrem
illita digerentis est facultatis.

Argemona abstergens, digerensque est.

Arisarum acrius multo est, quam arum.

Aristolochiæ radix amara, & subacris est. tenuiorum par-
tium est rotunda, & ad omnia efficacior, quam duæ reliquæ.
quæ clematidis dicitur, odoratior est. itaque vnguentarij ea
ad vnguenta vtuntur: sed ad medicinas est imbecillior. At
longa minus est tenuium partium, quā rotunda, veruntamē
nō est inefficax, sed & abstergēdi & calfaciēdi vi prædita est;
minus quidem quā rotunda abstergens, ac digerens: sed non

minus calfaciens, imo vero æque, aut fortasse magis.

Arceuthus, hoc est iuniperus, calida & sicca vtrinque tertij ordinis. eius fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus: verum primi in siccando ordinis.

Arction, quod est verbasco simile, facultatis est partium valde tenuium, & siccantis, modice tamen abstergit. Alterum vero, quod prosopitida vocant, digerit ipsum quoque, & siccatur, sed modice itidem adstringit.

Arnoglossum, hoc est plantago, mistæ temperaturæ est. habet enim quiddam aqueum frigidum. habet vero & austrium quiddam, quod est terrenum frigidum. quocirca refrigerat & siccatur in secundo ordine. siccitatem autem obtinet morsus expertem, frigiditatem vero, quæ nondum stupefaciat. eius quoque fructus & radix parem vim habent: præter quæ quod sicciores, & minus frigide sunt, at enim fructus est tenuiorum partium, radices vero crassiorum. quinetiam herbarum ipsius folia siccata, tenuioris substantiæ, & minus frigide facultatis redduntur: cum aqueum eorum excrementum per halitum sit digestum.

Aron terrena & ipsum essentia constat, & calida. itaque extergentis facultatis est. non tamen validæ, ut draconitum. est igitur in exsiccando, & calfaciendo primi ordinis. radices eius utiles sunt vel maxime.

Artemisia vtrique in calfaciendo secundi est ordinis, in siccando primi intensi, est etiam modice tenuium partium.

Asari radices vim habent acori radicibus similem, magis tamen intensæ sunt.

Aspalathus gustu acer est, & astringens. ex facultatibus vero quæ ex dissimilibus inter se particulis constant, est conflatus: ut sui partibus acris calefaciat: austeris refrigeret: vtrarumque autem ratione desiccat.

Asparagus myacanthinus abstergentis facultatis est. non tamen perspicue calfacit, nec refrigerat.

Asplenium tenuium partium est, non tamen est calida facultate præditum.

Astragalus radices habet adstringentes, quocirca ex numero non debilitate exsiccantium est.

Aster Atticus, alij bubonion vocant, habet quiddam digerens: habet vero non minime & refrigerans quippiam, & repellens, ut mistæ sit potentia, ut etiam rosa. verum id
non

non adstringit.

Astaphis, hoc est vua, culta quidem concoquendi, adstringendi, & leniter digerendi vim habet: at agrestis acrem vehementer. ex quo fit, vt valenter abstergeat, & quadam etiā vrendi facultate sit prædita.

Asphodeli radix digerentis, abstergentisque facultatis est: eius vstæ cinis acrior, sicciorque efficitur.

Atractylis siccantis, & modice calidæ facultatis est.

Atriplex humida & frigida tēperie est. atque humida quidem in secundo ordine, frigida vero in primo. adstrictionis vero non est particeps: sed aquea est, & minime terrena non secus, quam malua. quin & ventrem celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatem. parum præterea in ea est, quod digerat. hortenses autem humidiores multo, & frigidiores agrestibus sunt, fructus vero atriplicis abstergerendi vim habet.

Aphace vim habet adstringentem, sicut lenticula. hæc tamen ægrius concoquitur, & validius siccatur. particeps vero est moderati caloris.

Absinthium adstringētē, amaram, acremque habet qualitatem: calefacitque, & absterget, & roborat, & siccatur. at si oporteat generatim comprehensam eius temperiem conuenienter primis facultatibus determinare, & si cōstat ex partibus inter se dissimilibus, tamen calidum primi excessus, siccūque tertij dixerim. succus vero eius multo est, quam herba calidior.

B

Balani, hoc est glandis, quæ vnguentaria dicitur, reliquæ vnde expressus succus est, qualitatem amaram in eis cæteris præstantem habent: sed & quædam admista est adstrictio. quocirca extergentem simul, & incidentem, contrahentēque, & stipantem vim habent. cortex vero admodum adstringens est.

Balsamum secundi ordinis est exsiccantium, & calfacientium. estque subtilioris facultatis. non tamen tanta in eo caliditas inest, quantam nonnulli arbitrantur, partium tenuitate decepti. Eius fructus persimilis facultatis est: cæterum multo in subtilitate partium inferior.

Balaustium valide gustum adstringit. aliarum vero qualitatum nullius indicium præ se fert. quā ob rem statuat quispian, siccare ipsum, & non instrenue refrigerare.

L I B E R

Bati, hoc est rubi folia, & germina, & flos, & fructus, & radix, non obscure adstringentis qualitatibus sunt participes: sed inter se differunt, quod folia & præsertim mollia, & recens nata plurimum in se habeant aqueæ substantiæ, parum vero adstrictionis. eadem de germinibus habenda ratio est. fructus vero si maturus sit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, cum moderata adstrictione cōiunctus. at immaturus à frigida substantia terrea vincitur, & proinde acerbus est, & valde exsiccatur. & sane uterque exsiccatus magis exsiccatur, quam recens. flos vero eiusdem est facultatis, cuius est immaturus fructus, at radix præterquàm quod adstringit, non mediocris substantiæ quæ tenuium partiū sit, participes est.

Batrachia quatuor omnia vehemēter acris facultatis sunt, & cum dolore exulcerāt. calida igitur, siccaque est vehemēter radix, & tota herba.

Bdellium, quod Scythicum nominant, emollientis admodum & efficacis virtutis est. at Arabicū magis desiccatur, quàm emollientia. quod autem recens, humidūque est, & contusum facile mollescit, ad omnia, ad quæ Scythicum, est accommodatum. quod vetustius est, & gustu perquam amarum, & acre, & siccum, id excidit ab eorum mediocritate, quæ indurata molliunt.

Bechij, hoc est, ruffilaginis herbe vis est modice acris.

Blitum humidum, frigidūque secundo ordine censetur.

Bulbus illitus, quia amaroris & adstrictionis est participes, ideo absterget, glutinat, & siccatur.

Bulbus vomitum proritans multo est calidioris temperaturæ, quam superior.

Buglossum humidæ, calidæque temperiei est.

Bupthalmus acrior est quam anthemis: idcirco magis etiam digerit.

Brathy, hoc est herba sabina, participes est acrimoniæ, amaritiei, & adstrictionis. idque medicamentum in tertio excessu statuatur exsiccantium & exsiccantium, & in eorum numero quæ vel maxime tenuium partium sunt. quidam pro cinnamomo duplum eius subiiciunt. attenuantis enim, digerentisque facultatis est.

Bretanica folia adstringentia sunt, eiusque succus pariter adstringit. itaque coctum nonnulli reponunt, ut inter stomachica

D E
matica medi
tafaciat.
Bromus ill
dationem.
ad habet ad
Bromus thal
in & aqua fi
gulum adstrin
Bromus, quid
gatem, non v
idum, sed ferm
hodi facultati
miquis reper

Gallium vicia
Gentiana ra
regatione, ab
amara enam
Gentiana, hoc
ne sunt, frigi
num, & tem
Gingidiū an
ne autem qu
torem vero
ne secundo
Glaucium
mota est tem
ne frigida: se
Glaux herba
Glechon, ho
faciens, vehe
Glezos, hoc
Glycyrrhizæ
ne dulcis cum
ne eius natura
sim est, & qu
arctimimur
frigidius.
Glycyfides
quidam, & G

DECIMVS QVINTVS. 264
matica medicamenta, efficacissimū: & quod ad putrefacien-
tia faciat.

Bromus illitus exsiccat, modicēque digerit, & citra mor-
dicationem. est etiam leniter frigidior temperie: & nonni-
hil habet adstrictionis.

Bryon thalassion, hoc est alga, compositum est ex terre-
stri, & aquea substantia, quarum vtraque est frigida. nam &
gustum adstringit, & illitum refrigerat.

Bryon, quidam splanchnon, hoc est muscus, vim adstrin-
gentem, non validam habet. neque enim est admodum fri-
gidum, sed ferme mediis proximum, cum & digerēdi & mol-
liendi facultatis sit particeps. præsertim vero, quod in cedri-
nis lignis reperitur.

Γ

Gallium vim habet exsiccantem, & subacrem,

Gentianæ radix multum est efficax, cum attenuazione,
purgatione, absterfione, & obstructionis liberatione opus
est. amara enim est vehementer.

Gigarta, hoc est acinorum vix nuclei sicci in secundo or-
dine sunt, frigidi vero in primo. eorū essentia crassarum est
partium, & terrestris: siquidem acerbi sunt.

Gingidiū amaritiei, adstrictionisque particeps est. ex vtra-
que autem qualitate desiccatur. & tamē est aptum stomacho.
calorem vero non admodum perspicuum est natum. cæte-
rum secundo ordini desiccantium adscribitur.

Glaucium adstringit, & refrigerat euidenter: eiūsque com-
posita est temperies ex aquea, terrenaque substantia, vtraque
sane frigida: sed non summe, verum vt aqua fontana.

Glaux herba calidæ, humidæque temperaturæ est.

Glechon, hoc est pulegiū herba est acris, subamaræque, ca-
lesfaciens, vehementerque extenuans.

Glæos, hoc est strigmentum balneorum, modice emollit.

Glycyrrhizæ succus est maxime utilis, æque ac eius radi-
ces, dulcis cum leui adstrictione quadam. quocirca fuerit sa-
ne eius natura nostræ familiaris. tale enim esse dulce, ostē-
sum est. & quoniam temperie humida est, iure etiam sitim
arceat: nimirum modice humidum, & hominis temperatura
frigidius.

Glycyfides, hoc est pœoniæ radix, leniter cum dulcedine
quadam, & subamara acrimonia adstringit; eius vero tem-

periem tenuium esse partium, & exsiccantem censendū est, non tamen insigniter calidam.

Gnaphalium modice adstringit.

Gongilidos, hoc est rapisemen & radix spiritum flatus plenum gignit.

Δ

Damasonium abstergerendi vi præditum est,

Daucus, qui pastinaca etiam nominatur, agrestis est, satiuo in omnibus vehementior, acrem vero, calfacientemque, & attenuantem vim habet,

Dauci herbæ semen validam calefaciēdi vim habet. & in iis, quæ præcipua sunt, numeratur. & foris admotum valide digerit. eius herba eiusdem facultatis est: sed humiditas admista imbecilliores eam facit. est tamen ipsa quoque calidæ temperiei.

Daphnæ hoc est lauri arboris folia, & bacce siccant, & calfaciunt vehementer: & bacce magis etiam, quam folia. Cortex vero radices minus est acer, & calidus: sed amarus magis, & quidpiam adstrictionis habet.

Daphnes herbæ temperies est euidenter calida, acrisque ac subamara. similem quoque vim habet chamædaphne, sicut etiam daphnoides.

Dictamnū subtilioris essentia est, quam pulegiū, in cæteris rebus ei similis. quod vero falsodictamnū vocant, ad omnia est dictamno imbecillius.

Dipsaci radix secundi ordinis siccantium est, absterisionis quoque cuiusdam est particeps.

Dorycnium temperie est simili papaueri, & mandragoræ. & quæcunque talem habent refrigerandi vim. excellit in eo frigiditas aquea valde efficax. si parum sumatur, soporē inducit. si largius, interimit.

Dracontium habet aliquid aro per simile: est tamen eo acrius, & amarius. ideoque magis calfacit, & tenuiorum est partium. habet etiam leuiculam adstrictionem, quæ cū duabus prædictis qualitatibus amara, & acri coniuncta, medicamentum efficax est effectum. fructus vero non solū foliis, sed & radice est valentior.

Dryopteris, id est filicula, qualitatis dulcis est, acris, subamara: in radice vero, etiam acerbæ. ei vero putrefaciendi facultas inest.

Elææ,

Elææ, hoc est oliuæ rami quantum adstrictionis, tantum etiam refrigerationis obtinent. fructus vero, siquidem exquisitus maturus sit, moderate calidus est. at immaturus magis adstringit, magisque refrigerat.

Elæon, hoc est oleum, quod ex oliuis conficitur, humectandi, & moderate calfaciendi vim habet. eiusmodi est quod dulcissimum est, & ex oliuis maxime drupis. quod vero omotribes, & omphacinum vocatur, quantæ adstrictionis, tantæ quoque frigesactionis est particeps. Vetus autem oleum, quod ex dulci inueterato conficitur, calidius est, & magis digerit. quod ex crudo, id vsquedum quippiam adstrictionis seruari, mistæ facultatis est: ubi eam plane abiecerit, reliquo simile redditur. Dulce vero si tenuium partium appareat, (tale autem est quod purum, pellucidum est) ac modicum eius inunctum, latissimèque per corpus extensum sibi ipsum cōtinuum manet, & à cute combibatur, hoc pro optimo habendum est, & olei virtute præstare, vel maxime: quale est Sabinum. oleum porro lotum minime omnium mordax est. cætera olei genera iis differentiis varia inter se sunt, quæ in fructibus, ex quibus oleum exprimitur, comperiuntur. Cicinum enim tenuius est, & ad discutiendum valētius, vetusto oleo ex oliua confecto maxime simile. Raphaninū in cæteris huic simile, sed calidius. hoc etiā calidius est sinapinum. cui simile est, quod ex melanthio fit. contraria sunt his myrtinum, sesaminum, & balaninum, tum quod ea adstringunt, tum quod crassas partes habent. mistæ facultatis sunt lentiscinum, & terebinthinum, & mastichinum. non enim emolliunt modo, sed etiam adstringunt. Amygdalinū vero amaritiem habet exuperantem: estque adstrictionis cuiusdam particeps. non tamen caryinum, sed hoc maxime simplicis digerendi facultatis est. calidius eo est laurinum, & ad digerendum potentius. hoc etiam magis cedrinum. proximum ei est, quod ex liquida pice fit: tadinum est minus calidum laurino: sed magis exsiccat. hyoscyaminum vero mistæ potestatis est emollientis & refrigerantis. quod ex cnico fit, ventrem subducit: eoque magis, quod ex grano Cnidio conficitur. Iam quod ex agresti oliua exprimitur, non simplicis temperaturæ est: sed abster-

L

gentis, vnâque adstringētis. squalidissimum est id inter omnia olei genera. post hoc, Istricum: deinceps Hispanum. pinguiissimum est Libycum, & Cilicium. simul vero pingue & tenue est Sabinum. in medio horum omnium est, quod in Cycladibus insulis nascitur, quôdque in Græcia, atque Asia conficitur. Cæterum pingue oleum lentore æstimatur: tenue, si pellucidum, purumque sit: siquæ minima eius portione corpus plurimum vngatur, si denique à cute facile ebibatur. Ex his quæ dicta sunt, licebit tibi de aliis oleis iudicare, quæ eodem, quo vnguenta nomine appellantur: quale est rosaceum, liliaceum, & quæcunque sunt huius generis, quæ ex fructibus, germinibus, foliis, floribusque oleo maceratis sunt. oleum enim pro cuiusque iniectione rei natura variabitur. Ex iis ergo, quæ toto hoc opere de quacunque re iniicienda perdiscis, singillatim quoque confectum ex eadem re oleum, quale sit, poteris cognoscere.

Elatine moderate refrigerat, & adstringit.

Elaphoboscus calidæ, subtilisque facultatis est. itaque etiâ exsiccatur, secundo maxime ordine excessuum.

Elenium. huius herbe radix non primo statim appulsu calefacit, quam ob rem non est dicenda calida, & sicca exquirite, ut piper: sed cum excrementitio humore.

Elehsphacus, id est salvia, euidenter excalfacit, & leniter subadstringit.

Elleborus vterque abstergentis, calidæque facultatis est. esto autem tertij ordinis calfacientium, & siccantium. ceterum niger est gustanti calidior, albus vero subamarus.

Elxine, alij perdicium nominant, facultatem habet extergentem, & leniter adstringentem cum modice frigida humiditate.

Elimos aut meline, id est panicum, emplastri modo impostum siccatur, atque refrigerat.

Epithymum habet thymi facultatem, ad omnia efficacius: tertio gradu exsiccatur, & calefacit.

Epimedium vim habet modice refrigerantem cum aquea humiditate: quare nulla ei qualitas insignis inest.

Epimelium plâta acerba est, utque dixerit quispiam, malus agrestis. fructus eius acerbus est, & stomacho insensus.

Erebinthus, hoc est cicer, vi attrahendi, digerendi, incidendique pollet. calidum enim & modice humidum est: & amaritiei est particeps.

Erebin-

Erebinthus vero agrestis ad omnia valentior est satiuo:
hoc est, calidior, & siccior, quanto & acrior est, & amarior.

Erice facultatis est digerentis citra morsum, flore eius potissimum, ac foliis vtendum.

Eryllum, hoc est serpyllum calfacientis facultatis, & gustu multum acre.

Erylimi semen sicut gustu nasturtio simile apparet, ita facultate igneum est, & calfaciens.

Erythrodanū, hoc est rubia, radice acerba, amarāque est, itaque quæcūque agere dicta sunt, vbi eiusmodi qualitates coiuerint, ea omnia in hac radice euidenter conspicias.

Eupatoriū herba est subtili, incidente, & abstergente qualitate citra insignem calorem prædita. modicæ quoque adstrictionis est particeps.

Euphorbium vrentis & tenuium partium est facultatis.

Ephemerum non letale, quod colchicum vocant, sed alterum, quod irin agrestem nominant, radicem habet adstringentē, odoratāque, ex quo planum est, temperaturæ mistæ esse, repellentis, & digerentis.

Echini herbę fructus acerbus est: ac proinde repellit, & exsiccatur.

Z

Zinziberis radix valide excalfacit, sed non primo occurso, vt piper: quam ob rem minus tenuium partium, quā piper, eam esse censendum est. videtur autem illaborata quædam, & crassior substantia ei inesse: eaque humida potius & aquea. quocirca facile perforatur, cum scilicet excrementitia humiditas insit. neque quicquam eorum, quæ aut exquisitè sicca sunt, aut humida, sed quæ elaboratā humiditatē continent, hoc patiuntur. idē vero piperi longo cōtingit, inde fit, vt calor qui à Zinzibere, & pipere lōgo manat, diutius, quam qui ab albo aut nigro, perseueret. hincq; est, vt vtriusq; medicamenti vsus sit diuersus. nam cum totum corpus excalfacere celeriter volumus, ea tum sunt offerenda, quæ celerissime à caloris nostri contactu incallescant, & in omnes partes cito ferantur: cum vero particulam aliquam refrigeratā calfacere oporteat, contra est agendum: vt quæ tarde calfacientia plurimum temporis perdurant, adhibeamus.

L ij

L I B E R

Zythus acrior est non parum quā hordeum , & prauī succi, vtpote qui ex corruptela proueniens , flatus quoque excitat: estque partim acer, & calidus: parte vero plurima frigidus, aqueus, & acidus.

Zyme, hoc est fermentum tenuium est partium, & medio-criter calidum . ob eam causam & sine morſu quæ in profundo sunt extrahit, & digerit . ex contrariis autem facultatibus est temperatum. nam & aciditatis est particeps , & caliditatis ex putredine contractæ: cui accedit ea quæ ex salis, farinæque natura existit.

H

Hedyosmon, mentam odoratam quidam vocant: est enim alia quædā non odorata, quā calamintham appellant. vtraque gustu acri, & facultate calida ex tertio ordine, sed quæ odorata est, imbecillior est quam calamintha, vt autem vno verbo complectar, hæc ceu syluestris quædam est, illa satiuā. cæterum menta quid habet amarum, & acerbum.

Hedysarum, aut pelecinus, semen habet quod amarū, subadstringensque videtur, quam ob rem epotum est stomacho idoneum, viscerum obstructions expurgat. id quod etiam fruticis virgulta præstant.

Hemerocalles radicem habet lilij radici similem, & figura & viribus: leniter autem digerentem facultatem habet, & non nihil etiam repellentem.

Hemionitis adstrictionis, amarorisque est particeps.

Herigeron vim habet refrigerandi , & modice digerendi.

Heryngium calore, aut nihil , aut certe parum superat ea, quæ temperata sunt : siccitatem tamen & partium tenuitatē non paruam habet.

Θ

Thalietri facultas est exsiccans sine mordicatione.

Thapsia acris est, & valide siccantis cum humiditate facultatis est. trahit proinde ex alto violente, idque quod traxit, digerit. longiore autem tempore id facit: vtpote quæ larga humiditate excrementitia sit expleta.

Thermus, hoc est lupinus, qui estur, medicamentum est ex genere emplasticorum . qui vero innatam adhuc amaritiem habet, absterget, & digerit, & citra morsum siccatur.

Lupi-

Lupinus vero agrestis, & magis amarus, & ad omnia valentior, quam domesticus. eiusdemque est genere cum ipso facultatis.

Thlaspi semen acrem facultatem obtinet.

Thridax, id est lactuca humidū, frigidūque olus est, non tamen ad summum: sed maxime ad aquę fontanę, vt ita dicam, frigiditatem.

Thymum euidēter incidit, calfacitque & siccatur tertio ordine.

I

Idra radix gustanti vehementer acerbata est, & re ipsa experto idem prę se fert.

Ixos, hoc est viscum, ex multa aërea & aquea substantia calida, paucissimaque terrena constat. acrimonięque in eo amaritiei excellit. itaque vehementer humores ex alto attrahit, eosque non tenues tantū, sed & crassiores, eosque diffundit, ac digerit.

Ios, hoc est viola folia habet, quorum substantia aquea est, & subfrigida exuperans.

Hippuris, hoc est cauda equina qualitatem adstringentem habet cum amaritie: proinde valenter simul, ac citra morsum exsiccantem.

Ifatis satiua facultatis est, quę valenter siccatur, & neutiquā mordet. est enim simul amara, atque adstringēs. agrestis vero manifeste iam acre quippiam tum gustu, tum actione præfert: quocirca magis, quam satiua, siccatur.

Isopyron, aut phasiolum semen habet amarum, & subadstringens. extergit itaque, & crassos humores incidit: corporaque contrahit, & constringit.

Itea, hoc est salicis foliorum vis est citra morsum exsiccās. habent etiam aliquid adstrictionis, sunt etiam qui succum ex eis exprimant, medicamentūque mordacitate vacās, & exsiccans ad multas res utile seruent. nihil enim est ad plures res vtilius, quam medicamentum citra mordacitatem exsiccans, quod parum etiam adstringat. Iam vero cortex quoque arboris similem foliis, & floribus facultatem obtinet: nisi quod siccioris temperaturę est: velut omnes nimirum sunt cortices. sed eum quidam comburunt, cineręque vtuntur ad ea omnia, quę siccare valenter oporteat, quidam etiam, dum salix floret, corticem eius incidunt, liquoręque colligunt.

L. iij.

LIBER

extergentem, & tenuium partium.

K

Calamintha, hoc est nepita substantiam habet tenuiū partium, & calidam, siccāque temperiem ex tertio quodammodo ordine. acris enim est gustu, & paululum omnino habet amaritudinis, attenuat, incidit, & discutit.

Calamus aromaticus tum adstrictionis levis, tum minimæ acrimoniæ est particeps. plurima eius pars ex terrena substantia, atque aëria constat, in caliditatis frigiditatisque coniugatione temperata, statuatur ergo secundi ordinis calfacientium, & exsiccantium: quæ tamen vehementius desiccant, quā calfaciunt. habet quinetiam tenuium partium aliquid, ut alia aromata omnia: sed illorum copulibus tenuitatis partium plurimum, calamo vero non multum inest.

Calami vallis radix non mediocris abstergentis facultatis, minime vero acris est particeps. virentia vero folia modice refrigerant: in quibus etiam vis abstergens inest. eius cortex vltus valde tenuis, digerentisque facultatis redditur: qui etiam aliquid habet abstergens, ut calfaciat atque exsiccet in tertio fere ordine: magisque siccet, quam calfaciat. Vitandus eius flos est, nam si in aures incidat, ita tenaciter adhæret, ut auelli non possit, & auditum vitiet, quam ob rem sæpenumero surdos homines facit.

Cancani radix facultatem non mordentem habet, & modice siccantem. essentia vero crassarum partium ei inest, atque emplastica.

Canabis semen flatu vacat, & exsiccans est.

Capnios, hoc est fumus, acris simul & amaræ qualitatis est particeps: nec omnino est ab acerbitate alienus.

Capparis radice cortex vincentem habet amaram qualitatem: proximam acrem: deinde acerbam. ex quo liquet, eū ex diuersis pugnantibusque nonnihil qualitatibus constare. potest enim extergere, purgare, incidere, & digerere sua amaritie: calfacere vero, incidere, & digerere acrimonia: contrahere, densare, constringere acerbitate. similem cortici radice vim fructus habet: nisi quod est ad omnia imbecillior. quinetiam folia, eorumque caules similis sunt facultatis. Capparis vero, quæ in admodū calidis regionibus provenit,

uenit, vt in Arabia, multo est noſtrate acrior: adeo vt plurimum etiam adurentis facultatis habeat.

Cardami, hoc eſt naſturtij ſemen adurentis facultatis eſt particeps: velut napy. herba quoque ſiccata vim eandē, quā ſemen, obtinet. at humida adhuc & virēs, propter aqueæ humiditatis miſtionem, eſt ſemine multo inferior. vt cum pane ea, tanquam obſonio vti liceat.

Cardamomum & ipſum ſane facultatis eſt valde calidæ, non tamen ita validæ, vt naſturtium. poteſt tamen & ipſum exulcerare. habet autem quiddam etiam amaritudinis adiunctum.

Caron calefacit, & ſiccet tertio ferme ordine, habetque modice acrem qualitatem.

Casia tertii ordinis eſt calfacientium & exſiccantium: eſtque valde tenuium partium. guſtu vero multum acrimoniæ præfert, & parum quid adſtrictionis: ac proinde incidit, digerit, & robur inſtrumentis indit.

Corya arbor, hoc eſt nux, habet in ſoliis & germinibus adſtrictionem quandam, cæterum euidentem, multamque in nucis putamine recenti, & ſicco. In nuce præterea id quod edendo eſt, oleoſum eſt, & tenuium partium: & quo diutius reconditum fuerit, eo maiorem vim habet. tumque per halitum valde digerit. cum vero recens eſt, qualitatem quandam adſtringentem habet. quod vero imperfectum eſt, & nodum ſiccum, ſimile eſt cæteris fructibus, qui cum virides ſunt, pleni ſunt ſemicoctæ humiditatis. at eius putamē ſiccum vltimum tenuium partium, ſiccansque, & morſus expers medicamentum efficitur. at leptocaryon, quæ pontica nux nominatur, plus terreſtris eſſentiæ frigidæ habet. ideoque guſtanti magis auſtera & planta, & fructus, & cortex apparet. cætera nuci, quæ regia dicitur, ſunt ſimilia.

Carpesium ſimile eſt ei, quod phu vocatur, & guſtu, & facultate: ſed plus tenuitatis habet. non tamen ita eſt tenue, vt pro cinnamomo vti eo poſſimus, vt Quintus faciebat. præſtantius autem eſt Ponticum Carpeſium, quam Laërtium. eorum magna copia in Syria tibi ſuppetet.

Caucalis calefacit, & exſiccet.

Cenchros, hoc eſt milium, primo ordine refrigerat, exſiccet autem in tertio exoluto. habet etiam paululum tenuitatis.

L. iij

L I B E R

Cedrus vtraque tēperatura est calida & sicca ex tertio ordine. cedrea vero quartum etiam ordinem videtur attingere, eaque & egregie calida est. & simul tenuium partium, ceterum quod eius est pinguiſſimum. & plane oleoſum, tenuiorum est, quam tota cedria, partium, minus tamē acre, at non minus calfaciens. porro cedri fructus moderatiore vi sunt præditi vſque adeo, vt comedi quoque poſſint.

Centaurij maioris radix acris ſimul & adſtringens cum leuicula dulcedine guſtui apparet. calfacit igitur craſſe & terree frigiditatis particeps: digeritque, & robur particulis indit. eadem facit ſuccus, quæ radix. ac quidam ſunt, qui hoc medicamento pro lycio vtuntur. qui vero aiunt rheum eſſe magnum centaurium, ij mihi ſentire melius videntur.

Centaurij minoris virgulta, ac magis etiam folia, & flores maximo vſui ſunt. ſuperat reliquas in eis amara qualitas: eaque eſt etiam adſtrictionis cuiuſdam particeps. ac proinde medicamentum egregie citra morſum exſiccet. eius quoque ſuccus ſimilem habet ſiccandi & abſtergendi facultatem.

Ceraſi arboris fructus dulcis potius per inteſtinū ſecedit: ſed ſtomacho minus accommodatus eſt: auſterus contra. ac idus vero pituitoliſ ſtomachis, & in quibus excrementa redundant, conuenit: magis enim, quam auſterus deſiccet: & non nihil etiam incidit.

Ceratonia exſiccantis & adſtringentis facultatis eſt, ſicut ceratia quoque eius fructus, qui dulcedinis cuiuſdā eſt etiam particeps.

Ceſtrum, aut psychrotrophon, Romani vero betonicam vocant, vim habet incidendi. amara enim eſt, & ſubacris.

Cecis, id eſt galla, quæ omphacitis dicitur, medicamentū eſt admodum acerbum: plurima ſui parte terrenæ frigida ſubſtantia particeps: cuius beneficio ſiccet, repercutit, contrahit, conſtringit. & particulas inſirmas roborat. ſtatuatur hæc in tertio ſiccantium, in ſecundo vero refrigerantiū ordine. Altera autē galla flaua, laxa, magnaſque ſiccet ipſa quoque, ſed tanto minus, quāto minus acerbæ qualitatſ eſt particeps. Gallæ autem combuſtæ vim ſupprimendi ſanguinis acquirunt. & calorem etiam, atque acrimoniam vrendo contrahunt: & maiore ſiccandi vi redduntur.

Cera medium quodammodo inter vtranque coniugationem locum tenet. habet quiddam etiam craſſarum partium, &

& emplasticum. quam ob rem aliorum medicamentorum ex-
calfacientium, & refrigerantium materia est. at ipsa per se
ex genere utique sit, debiliter concoquentium, quæ foris im-
ponuntur. habet etiam paulum quid digerentis, calidæque
potentiæ: quæ in melle inerat plurima.

Ciceos, hoc est ricini fructus vim habet extergendi, & per
halitum euaporandi. ita quoque eius folium, sed imbecillius.

Cinnamomum summe tenuium partium est, non tamen
summe calidum: sed ex tertio quodammodo ordine. nam pro-
pter essentia tenuitatem nihil est eorū quæ æque calfaciunt,
quod ita, ut cinnamomum, exsiccet.

Cinnamomis vero est velut cinnamomum imbecillum.
nonnulli vero pseudocinnamomum ipsam nominant.

Circeæ radix odorata est, & excalfacit.

Cisthus, aut citharus frutex est adstringens. folia vero, &
parua germina trita adeo desiccant, atque adstringunt, ut vl-
cera glutinent. flores efficaciores sunt. desiccant fere in se-
cundo excessu absoluto, frutex vero ipse adeo est frigidus, ut
tepidi caloris sit particeps. Ceterū hypocistis aut hyposcis-
sthis magis adstringit quam folia.

Cisthus aut ladanū. In calidis regionibus hic cisthus pro-
ueniens in utroque à nostrate differt, tum quod adstrictio-
nem deposuit, tum quod caliditatem acquisit, quod vero
ladanum vocant, ex eodem provenit, medicamentum cali-
dum primo excessu iam completo, habens etiam parum ad-
strictionis. est etiam tenuium partium essentia. quibus qui-
dem sit rebus, ut modice molliat, & digerat, ac nimirum etiā
concoquat.

Cissos, hoc est hedera ex contrariis facultatibus constat.
habet enim quippiam substantiæ adstringentis, quam esse
terrenam frigidamque ostendimus. habet etiam nonnihil a-
cris, quam calidā esse vel gustus ipse comprobat. tertia quo-
que ei virenti inest aquea substantia tepida quædam.

Clinopodium tertii est ordinis calfacientium & exsiccantium.

Comarus, hoc est arbutus, arbor acerba est una cum fru-
ctu: quem memecylum vocant.

Commī, hoc est gummi, siccantem, emplasticamque vim
habet: quæque asperitatibus medeatur.

Coma, hoc est lixiuium. omnium maxime absterget & ex-

siccet id lixiuium, quod ex cinere ficulno, & tithymalorum conficitur: feréque putrefaciéntis est facultatis.

Conyza & maior & minor cum acris, amaréque sit temperaturæ, in calfaciendo & siccando terciæ temperiei censetur. Est etiam tertium conyzæ genus in locis humidioribus proueniens, vtrisque superioribus graueolentius, & imbecillius.

Coriannum, aut corion, hoc est coriandrum, ex contrariis constat facultatibus: habétque multum amaræ substantiæ, quam tenuium partium, & terrenam calidam esse ostendimus: nec parum etiam aqueæ humiditatis, quæ tepentis facultatis est. habet etiam parum adstrictionis.

Costus leuiculam plane amaram, plurimam autem acrem, & calidam in se qualitatem habet, adeo vt etiam vlcus excitet. ei quoque flatuosa humiditas inest.

Cotyledon, hoc est vmbilicus veneris facultatis est humidæ subfrigidæ, & cuiusdâ obscure adstringétis, & cum ea leuiter amaræ. vnde refrigerat, repercutit, absterget, ac digerit.

Crania hoc est cornus arbor fructû fert egregie acerbum. folia quoque & germina eiusdem acerba sunt, & mirum in modum exsiccant.

Crambe, hoc est brassica exsiccantis facultatis est, non tamen etiam euidenter acris. caules brassicæ combusti cinerem faciunt valde exsiccantem: vt iam adurentis quoque facultatis sit particeps.

Crambe vero agrestis siccior, calidiôrque est, quam satiuâ. proinde intra corpus citra noxam nō assumitur. eadem vehementius quam satiuâ exterget, ac digerit.

Crambe marina præter quam quod aluum lenit, est etiam subsalsa, & subamara.

Cratægoni herbæ fructus acer est, & vehemens.

Crethmon falsum quodâmodo est cum leui amaritiæ coniunctum. quam ob rem ius est eius abstergens, & siccans.

Crithe, hoc est hordeum primi est ordinis in exsiccando, & refrigerâdo: habétque paucillum absterfionis. polenta vero multo magis, quam hordeum desiccet.

Crini, hoc est lilii, flos ex mista temperie constat, quæ partim ex tenui quadam terrena essentia conflata est, ex qua gustui amaritiem præfert: partim ex aquea temperata, ex qua oleum quod ex eo conficitur, itémque vnguentum facultatis

red.

redditur morsus expertis, digerentis, & molliētis. radices autem, & folia per se læuigata siccant, abstergent, digeruntque modice.

Crocodilij semen acre est: calidēque, & digerentis, ac siccantis facultatis est. Succus caulis, & seminis eadem vi est præditus.

Crocus parum etiam quid adstringens habet: quod terrenum frigidū esse docuimus: sed superat in eo calfaciens qualitas, ex quo fit, vt tota eius substantia secūdi sit ordinis calfacientium: primi vero exsiccantium, quam ob rem habet etiam vim quandam concoquendi.

Crommyon, hoc est cēpa, est ex quarto calfacientium ordine. essentia vero eius crassarum est partium.

Cyamos, hoc est faba, mediæ est temperaturæ, proxime ad vtranque partem accedens in exsiccādo, & refrigerādo. Caro eius paulum quoque abstergentis facultatis est particeps, si cut putamen nonnihil adstringentis.

Cyclaminus varias habet vires, nam & absterget, & incidit, & aperit, & attrahit, & digerit. radix est succo imbecillior: est tamen vehementior. Altera vero cyclaminus, quam etiam cissanthemum vocant, quæque radicem habet inutilem, fructum habet egregie efficacem: eiusque amarities acris est, & modice lenta.

Cymini semen tertii est ordinis calfacientium, statūque extinguit.

Cynos batos, hoc est rubus caninus. huius fructus nō ignauiter adstringit, folia vero moderate. cauendum ab eo, quod in eius fructu lanæ speciem gerit, quippe quod arteriam vitiet.

Cyparissi folia, germina, & pilulæ recentes, ac molles siccandi vim habent, absque insigni acrimonia, & calore, sicut etiam gustus ostendit, apparet enim in ea levis quidem acrimonia, sed amarities plurima, multoque etiam maior in tota planta acerbitas. tanta autem ei inest acrimonia, tantusque calor, quanta satis sit ad acerbicatem in altum deducendam: nullum tamen calorem & morsum excitet.

Cyperi radices absque morfu calfaciunt, & exsiccāt. inestque eis adstringendi, & incidendi vis quædam.

Cypri folia, & summa germina mistæ facultatis sunt. habēt enim quiddam digerens ex aquea substantia modice calida.

L I B E R

habet etiam aliquid adstrictionis ex frigida terrestri. quā ob rem citra molestiam & morsum siccatur, & incidit.

Cytisi folia digerunt, vimque mistam, & aqueā possident.

Conion, hoc est cicutam extremæ refrigerantis facultatis esse norunt omnes.

Coni fructus totus viridis habet cum humiditate amaritudinem quampiam, & acrimoniam. esculētus vero maceratus minime mordax, & maxime emplasticus redditur. & in medio calidæ, & frigidæ qualitatis consistens, ex aquea, & terrea substantia temperatus, aëriæ minimum est particeps.

Δ

Lagopus siccantis facultatis est.

Lampsana illita quandam abstergerendi, & digerendi vim habet.

Lapatium modice digerentem habet vim. Oxylapathum vero præterquam quod digerit, habet etiam quid reperiuntur. eorum semen est euidenter adstringens Porro hippolapathum cum eo, quod digerit, ipsam quoque etiam reperiuntur, sed imbecillius.

Limonij fructus austerus est.

Lichen in petris nascens abstergentis & modice refrigerantis facultatis est: & vtriusque exsiccantis.

Leontopetaliradix digerit, siccatur, calfacitq; tertio ordine.

Lepidium ex quarto calfacientium est ordine.

Leucas acris qualitatis est: calfacit autem & siccatur tertio ordine.

Leucacanthi radix amara est, ideoque incidit, & siccatur tertio ordine. at in calfaciendo primi est ordinis.

Leucoij frutex vniuersus abstergentis & tenuium partium est facultatis: magis tamen flores. & inter eos qui sicciores sunt, magis quam virentes. est hoc, si quid aliud, amarum. fructus quoque eiusdem facultatis est, itemque radices: nisi quod crassiorum sunt partium, & magis terrea.

Leuce arbor, hoc est populus alba, mixte quodammodo temperaturæ est ex aquea tepida, & terrena extenuata essentia: quam ob rem abstergentis facultatis est particeps.

Libanotus, hoc est thus, calfacit secundo ordine, siccatur vero in primo. habet quoque parum adstrictionis, eius cortex vim habet euidenter adstringentem: ac proinde quoque exsiccatur adeo, ut in secundo ordine completo collocetur.

tur.

tur. constat etiam ex crassioribus, quam thus, partibus, minimeque acrimonię particeps. ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quam thus: vt ad tertium vsque excessum perueniat. habet etiam quidpiam abstergentis.

Libanotides tres mollientis sunt digerentisq̃ facultatis. habent etiam aliquid abstergentis, atque incidentis.

Lignys, hoc est fuligo, omnis exsiccans est. ideoque terrestris est essentia: habens quasdam etiam ignis, qui materiam combussit, reliquias, easque pusillas. tota autem eius natura terrena est, tenuium partium. speciales vero in ea differentię sunt, quę ex materia combusta eueniunt: cum ex acriore & calidioris talis etiam fuligo proueniat, ex acriore vero & nõ mordente similis quoque fuligo conficiatur.

Libystici radix & semen ex genere calfacientium sunt, & flatus discutientium.

Linifemen calidum est in primo ordine quodammodo: estque in medio ferme humiditatis & siccitatis constitutũ.

Lycium egregie discutit, siccatur vero in secundo excessu. in calore vero mediis quodammodo est proximum. habet etiam quidpiam adstringentis. quocirca abstergit, & cõtrahit.

Lysimachios adstringentem qualitatem superatẽ habet. herbam hanc Lysimachus rex ad sanguinis eruptiones cõhibendas facere casu quodam comperit. cum enim equus eius vulnus accepisset, sanguisq̃ erumperet, hanc herbam, quę erat ad manus, quãque rex ignorabat, vulneri admouit. ea eruptione sedata, omnes postea ad sanguinis eruptiones ea vsi sunt: & ab inuentore Lysimachia herbam appellauerunt.

Lychnidis, quę ad coronamenta adhibetur, semen calidũ est in secundo ordine, aut iam etiam in tertio: & eodẽ quoquoque modo siccum.

Lotos domestica, quam trifolium quidam vocant, abstergentis modice qualitatis est particeps: itẽque siccantis. in calidi, frigidisq̃ coniugatione media quodammodo est. Lotus autem agrestis plurimum in Libya prouenit. eius semen secundo ordini calfacientium adscribitur. abstergit etiã nonnihil: ex Aegyptiæ vero loti semine panes etiam conficiuntur.

Lotus vero arbor adstringentis pauculae qualitatis est particeps: est etiam partium tenuium, & exsiccans.

Macer cortex est multum acerbus cum leui quadam acrimonia. videtur itaque ex mista essentia constare, plurima terrena frigida, paucula vero calida & tenuium partium. quam obrem in tertio ordine siccantium est; in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens.

Malabathri folium similem habet vim spicæ nardi.

Malua, agrestis quidem parum digerentis qualitatis est, & leniter mollientis: hortēsis vero imbecillior est. earū fructus eo est valentior, quo etiam sicciora. madendromalache vero quæ etiam althæa dicitur, magis digerit quam superiores.

Mandragora ex tertio ordine refrigerantium est. & tamen cuiusdam caloris est particeps. & in pomis inest quippiā humiditatis: proinde grauem soporem inducunt. radicis vero cortex, qui est valentior, non refrigerat modo, sed etiam siccatur. reliqua interna pars imbecilla est.

Marathon, hoc est fœniculum, calfacit in tertio, siccatur in primo. Agrestis vero, quod hippomarathum vocant, radix & semen siccioris est facultatis quam satiui. alterum hippomarathum est, cuius semen rotundum est, & acre, cuius facultas est hippomarathum similis, sed imbecillior.

Maltiche alba, & Chia adstringit, mollit secundo ordine, calfaciens & exsiccans. nigra vero & Aegyptia magis quam superior siccatur, sed minus adstringit.

Melanthium calfacit, & siccatur in tertio. videtur etiam tenuium esse partium, inciditque & absterget, cum amaritiam contineat.

Melilotum habet partem adstringentem, sed & digerit, & concoquit. copiosior enim in eo est substantia calida, quā frigida.

Mel calfacit, & siccatur in secundo ordine. est autem simplicis, quoad maxime fieri potest, facultatis extergentis. coctum minus acre, & abstergens redditur. Cæterum si quod mel amarum est, clarum est id esse mistæ facultatis, tanquam si nostrum quispiam ei absinthii miscuisset. Sed & sacchar, quod vocant, mellis est species sed minus est dulce, quam nostrate: in cæteris ei simile. quatenus vero non est insensum, nec sitim affert, eatenus ab eo differt.

Melissophyllō vim habet marrubio similē, sed est illo multo inferius. ex quo fit, ut cū magna ybique marrubij suppetat copia,

copia, melissophyllo vti sit plane superuacaneum.

Mespili arboris fructus multum acerbus est. in germinibus quoque eiusdem & foliis acerba qualitas inest non exigua.

Medij radix austera est, & fluxiones cohibet. semen tenuium partium, incidentisque est facultatis.

Meconis, hoc est papaueris omnis est vis refrigerans. satiuum semen mediocriter somnum conciliat. aspectu candidum. eius, cuius flos celeriter defluit, semine valentius refrigerat. quo circa eo solo nemo innoxie vteretur.

Ex agrestibus vero quod velut sedens caput habet, id medicamentum iam semen habet, valde frigidum, & nigrum. Alterum quod oblongius caput gerit, maxime omnium est medicamentum in semine, tum in capitibus, tum in foliis, tum in liquore. valenter enim refrigerat, & usque ad stuporem, & mortem perducit, Cornutum vero papauer abstergentem, & incidentem vim habet.

Malus non omnis est vna natura, veluti nec etiam fructus. quaedam enim mala dulcia sunt, quaedam austera, quaedam acerba, quaedam acida, quaedam plene exoluta, & aquea: & sane in eis aqueum exuperat, ut eorum magis aquea, magisque frigida sit temperatura: in acerbis autem terrenum frigidum: in austervis vero tum hoc, tum aqueum dulce: in acidis aqueum frigidum, ut in dulcibus aqueum temperatum. Eadem ratio est foliorum succi, corticis arborum, quae omnia inter se differunt.

Malus persica in fructu, foliis, & germinibus superantem habet amaritiam. est etiam medicamentum digerens. eius fructus frigidior humidiorque temperatura est.

Malus armeniaca fructum fert secundi ordinis humidorum & frigidorum.

Malus medica est, cuius fructum citrium vocant: quod in semine exuperantem habet qualitatem acidam & siccam, ut tertij sit ordinis siccantium & refrigerantium: in cortice vero itidem exsiccantem temperaturam habuit, non parum tamen acrimoniam habentem, idcirco in secundo ordine exsiccatur, non tamen refrigerat, sed vel temperatus est, vel paulo inferior. Eius caro crassi est succi, pituitosa, & frigida. nucleus vero, qui re vera est semine, amarus est, ideoque digerit, siccaturque in secundo, folia quoque facultatis sunt digerentis & exsiccantis.

Mei radices calidae in tertio excessu sunt: siccae vero in secundo.

L I B E R

Milacis asperę folia acris quidpiam obtinēt, & calfaciūt. Milax vero levis similem vim superiori possidet.

Mori fructus cuiusdam adstrictionis est particeps. at immaturus præter acerbitatem est etiam aciditatis particeps. tota arbor in omnibus eius partibus mistam habere facultatem videtur ex cohibente, & repurgante cōpositam. in radicis cortice exuperat purgans cum amaritie quadam. in moris vero immaturis cohibens. in foliis & germinibus media quodammodo temperatura est.

Myagri semen oleum effundit, quod emplasticę facultatis est.

Mycetes, hoc est fungi, frigida, humidęque admodum temperatura sunt, & proxime ad veneni naturam accedunt.

Myles radix contrahentis est facultatis.

Myos ota, hoc est auricula muris siccatur in secundo, calore vero nullum insignem possidet.

Myrice, incidentis est, abstergetisq; facultatis absque insigni siccitate. habet vero etiam quid adstrictionis. at fructus & cortex non paucam adstrictionem obtinent, cum partium tenuitate & vi abstergēdi. porro myricę combustę cinis facultatis egregie exsiccantis sit: habetque plurimam incidendi & abstergēdi vim, at adstringendi perexiguam.

Myriophyllon exsiccantis est facultatis,

Myrrhis dulcem radicem habet, quę ex secundo calfacientium est ordine, adiuncta quadam partium tenuitate.

Myrrhine, hoc est myrtus ex contrariis substantiis cōstat. in ea tamen terrestre frigidum exuperat. habet quoque aliquid tenuium partium calidum: ex quo valenter exsiccatur. Iam vero & folia & fructus, & germina, & succus non admodum inter se differunt. Cæterum quod ramis & trunco adnascitur tuberosum, quod myrtada nominant, quo siccus est prædictis, eo etiam adstringit & siccatur vehementius. præterea vero folia sicca maiorem exsiccandi vim habent, quā viridia.

Moly, huius radicis tenuium partium est, & in tertio excessu calida. quam ob rem & incidit, & digerit.

N.

Nardi spuma calfacit excessu primo, siccatur vero secundo completo. constat autem ex adstringente satis substantia, & acris calida non multa, & quadam leniter amara.

Nardus Celtica similis est quodammodo in genere facultatis ei,

tatis ei, quæ prædicta est: sed est ad omnia imbecillior, præter quam ad urinam prouocandâ. calidior enim ceteris est, sed minus adstringit.

Nardus montana est superioribus infirmior.

Narthex, id est ferula. eius semen excalfacit, & attenuat. quod intus est, medullâque vocant, cum adhuc virens est, adstringentis qualitatibus est particeps.

Napy calfacit, & siccatur quarto ordine.

Narcissi radix siccante facultate prædita est. habet etiam quid abstergentis, atque attrahentis.

Neuras siccantis absque morfu facultatis est.

Nerium foris illitum digerendi vim habet, intra corpus assumptum, perniciosum est.

Nymphææ radix, & semen vim habet siccantem absque morfu. quæ vero candidam radicem habet, vehemētiore vi prædita est: eaque nonnihil etiam exterget.

≡

Xanthij fructus digerendi vim obtinet.

Xiris tenuium est partium, attrahentis, digerentis, siccantisque facultatis, cum radix, tum multum etiam magis fructus.

Xiphij, hoc est gladioli radix, & maxime altera, quæ superior est, attrahendi, digerendi, & siccandi vim habet.

O

Oë, hoc est sorbum arbor adstringentis qualitatibus est particeps.

Oënos, hoc est vinum in secundo calfacientium est ordine. quod valde vetus est, in tertio, ut mustum ex primo, siccitas vero caliditati eius proportionem respondet.

Olostium desiccandi vim habet.

Olynthi, hoc est grossi, acrem, digerentemque cum adstrictione vim habent.

Onagrum, aut onothera, aut onothuris facultatis vini est maxime.

Onoma, aut Sinonis ex acri & amara substantia constat.

Onobrychis rarefacientis, digerentisque facultatis est.

Ononis radicem habet quodammodo tertio ordine calfacientem. eius cortici nescio quid etiam abstergentis inest.

Oxos, id est acetum, ex mista substantia frigida & calida & utraque tenuium partium constat. sed calidæ præstat frigidæ. Siccatur in tertio completo, cum utriusque validum fuerit.

M

Oxyacanthi fructus acerbus est: habetque partium tenuitatem, & parum etiam incidit.

Opos, id est liquor, Cyrenaicus est omnium calidissimus, & tenuissimarum partium est, maximèque digerit, quam & alij quoque abunde calidi sunt, & spirituosi.

Origani genus omne incidentis, attenuantis, exsiccantis, & calfacientis est facultatis in tertio, tragorigano vero quipiam etiam adstrictionis inest.

Orobus, hoc est eruum in secundo excessu intenso desiccatur: calfacit in primo, incidit, & absterget, & obstructione liberat.

Orobanche sicce, frigidæque facultatis est primo ordine.

Orchis, aut Cynorchis, hoc est testiculus canis, huius radix calida, humida, dulcisque est. maior vero radix multâ habere humiditatem excrementitiam & flatuosam videtur: quæ minor est, contra, valde elaboratam.

Orchis, quam etiam serapiada vocant siccioris est facultatis, quam primi ordinis censeatur. Siccatus is multo magis exsiccatur, habetque aliquid adstringentis.

Osiridis herbæ amara qualitas est, & obstructione liberandi facultas.

II

Pancratij radix gustum & vim habet scillæ persimile, sed est multo inferior.

Paliuri radix & folia non obscuram adstringendi facultatem obtinet: nonnihil etiam digerunt. fructus vero incidentis facultatis particeps est.

Papyrus combusta medicamentum siccans efficitur, ut charta combusta. sed papyri cinis est imbecillior.

Panaces heracleum. ex hoc fit opopanax, quem vocant: qui excalfacit, emollit, ac digerit. in calfaciendo vero ex tertio ordine est: in siccando, ex secundo. Cortex vero radice desiccans simul & calfaciens medicamentum est: sed minus, quam liquor. quin etiam abstergentis quid habet. eius etiam fructus calidus est.

Panaces asclepium minus calidum superiore.

Panaces Chironium & ipsum similem habet prædicto facultatem.

Paronychia tenuium partium est, & siccatis absque mor-
su facul-

su facultatis in tertio ordine, itemque calfacientis.

Pentaphylli radix desiccat in tertio, perspicue tamen calditatis non est particeps. cæterum tenuium partium est, & morfu vocat.

Piperis radix vires habet costo maxime similes. fructus nuper eius germinatis longum piper est, ideo fit, ut maturo sit humidius. quare facile perforatur. fructus qui velut omphax est, albū est piper, idque est acrius nigro. nam illud est quasi superassatum iam, & super siccatum. vtrunque autem exsiccat, calfacitque valenter. Cæterū si longū vitiatum fuerit, deprehendes aqua macerans. nam in quo vitium est, soluitur: non soluitur autem id, quod naturā habet suam. id vero quo piper adulteratur, herba quædam flaua est, ab externis aduecta regionibus, quæ piperi longo aspectu quidē est similis, sed gustu discrepat: quo etiā ab eo facillime discernitur.

Perseæ folia adstringentem vim sortita sunt.

Periclymeni fructus & folia incidunt, & calfaciunt.

Peristereon vim habet exsiccandi.

Petalites ex tertio ordine exsiccantium est.

Petroselinī semen quemadmodum gustu acre est adiuncta amaritie, ita & actione flatus extinguit. tertio ordine calfacientium, & siccantium continetur.

Peucedani radix, & liquor, & succus eiusdem specie facultatis sunt. Valentior tamen est liquor, egregie calfaciēs, digerens, attenuans, & incidens.

Peganū, id est ruta, sylvestris ex quarto iam ordine est ex calfacientium & siccantium, satiuā ex tertio. estque non solū acris gustui, sed etiam amara. ex quo incidit, digerit, tenuiū que est partium, & flatus restinguit.

Pix sicca quidē siccatur, calfacitque, secūdo excessu. cæterū siccare potest magis quam calfacere. Liquida vero contra, calfacere magis, quam siccare. habet etiam partium tenuitatem quandam. Sed & abstergerendi vim quandam, & concoquendi, & digerendi: veluti etiam leuem amaritiem, & acrimoniam obtinet.

Pisselæum genere quidem est pici simile, sed ex subtilioribus partibus constat.

Pistacij fructus tenuium est partium, subamarus, aromaticus. ex quo obstructione liberat, & expurgat.

Pityides, hoc est fructus pini, mistæ sūt facultatis, ut adstrin-

M ij

gant, & acrimoniā quandā, cum amaritie cōiunctā habeāt.

Pini cortex exuperantem habet facultatem adstringētem. piceæ vero cortex est huic similis : sed moderatiore vi præditus est. in cono vero maior vis est, & in cortice, & in foliis

Platanus humidioris frigidiorisque essentiæ est non ita multo, quam moderata. eius cortex & pilulæ magis exsiccant. sunt qui combusto cortice medicamentum conficiant. cauenda est lanugo foliis arboris insidens : siquidem spiritu attracta, lædit arteriam, & vocem: aspectūque & auditum vitiat, si in oculos, aut aures incidat.

Polygonon, hoc est herba sanguinalis, adstrictionem quandam habet, vincitque in eo aqueum frigidum, vt ad secundum gradum completum perueniat. cumque refrigeret ac repercutiat, videtur etiā exsiccare. mas vero est ad omnia efficacior, quam fœmina.

Polygalum folia habet modice austera. superare autem in eo calidum, & humidum videntur.

Polygonatū mistæ facultatis est. habet enim quid etiā adstrictionis, acrimoniæ, amaroris, & insuauitatis cuiusdā, quæ explicari satis verbis nō potest. itaque vsui admodū non est.

Polemonium, quidam phileterium vocant, tenuiū partiū, & siccantis facultatis est.

Poliū gustatibus amarū est, & modice acre. obstrictiones itaque adimit. Polium vero, quo in antidotis vtimur, magis amarum est, magisque acre, quam maius : vt ex tertio sit ordine exsiccantium: ex secundo vero, eoque completo calfacientium.

Polycnemon calfacit & siccant secundo ordine.

Potamogiton adstringit, & refrigerat æque ac polygonū. hoc tamen crassiorum est partium.

Polypodion dulcem, simulque austeram qualitatem exuperantem habet adeo, vt facultate sit valenter exsiccante, & morsu vacante.

Prasiū, hoc est marrubium, amarum est. idcirco tollit obstrukciones, absterget, digeritque. hoc statui potest in calfaciendo in secundo fere ordine iam completo: in siccando vero, in tertio.

Propolis facultatis est non valenter abstergentis: satis tamen valide attrahentis. eius nanque essentia tenuium est partium. calfacit autem secundo excellū iam completo.

Parmices

Ptarmices flores vim sternutamenti ciendi habent: totus vero frutex digerit, eiusque calida, & sicca temperatura est, cum virescit, secundi fere ordinis: cum aruerit, tertij.

Ptelex, hoc est ulmi, folia adstringentem, & abstergentem habere facultatem præ se ferunt. Cortex vero est magis amarus, & adstringens. radices quoque eiusdem sunt facultatis.

Pteris, hoc est filix, amara est, parùmque habet adstrictio- nis, ac proinde facultatis est valenter exsiccantis, non tamen mordacis. thelypteris vero ei similem vim habet.

Pycnocomi & radix, & fructus, & folia, quæ acria sunt, di- gerendi, atque attrahendi vim habent.

Pyrethri radix adurentis facultatis.

Pyros, hoc est triticum, in primo calfacientium ordine celsetur: non tamen siccare, aut humectare insigniter potest. habet vero etiam quidpiam lëtoris, obstruentisque nature. Quod vero ex eo conficitur amyllum tritico frigidius, & sic- cius redditur, quòdque ex pane cataplasma fit, maiore habet vim digerendi, quam quod ex tritico constat, cum panis & fïlem & fermentum adiunctum habeat: siquidem fermento vis inest attrahendi, euocandi quæ ea, quæ in imis corporis partibus delitescunt.

P

Rhamnus desiccat secundo excessu: refrigerat vero in pri- mo completo.

Raphanis, hoc est radícula, in primo excessu calfacit, in se- cundo siccatur. agrestis est efficacior in vtraque facultate. iam & semen efficacius est, quam planta, facultas porro digerendi in eis inest.

Rheum mistæ facultatis est, habet enim quid terrenum fri- gidum, ut eius declarat adstrictio: ei quoque acrimonia quæ- dam inest: si quæ plusculum mandatur, leniter calida conspi- citur. est etiam substantiæ cuiusdam aëreæ, tenuiumque par- tium particeps.

Resinæ omnes siccant, & calfaciunt, inter se vero discrepant quod plus, minusve in gustu acrimoniæ, in facultate caloris sint nactæ: quòdque aliæ plus, aliæ minus tenuium sint par- tium: quod denique aliæ adstrictiones sortitæ sint, aliæ nõ item. Iure autem in omnibus sibi prima vindicavit lentiscia- na, quam masfichen vocant. nam præter quam quod pauca

M iij

Sagapeni
quam alij li
Samplic
ficetique &
Sarcocoll
emplastica su
m sine mor
Savaria huc
m dulce vid
dus inest, ea
Selimon, hi
b fimen mag
fimo hippo
latus.

Sens subam
tineatque ve
perire in p
hingerat,
finitis restit
dus, velut c
Sempiternu
quod non q
nitorem que
mifum, qui
mo vero ei
Seseleos &
frumentum e
Sesamum
dum, et fides
Ecor.

Sesamoid
appellatur,
purer, cui
roin ablie
res habet.

Sesamoi
habet, m
git, & rum

Sens subam
cunctisq; ve
terum in pa
lustringerat.
finitis refu
tis, velut c
Sensum fi
quod non zc
norem que
ntem. qui
tuo vero e
Seseles &
mentum e
Sesamum
dum, eiusde
horur.
Sesamoid
appellatur,
purget, cur
roin abbe
res habet.
Sesamoi
habet, mi
git, & rum

Sesamum
 appellatur,
 purget, cum
 roin abile
 res habet.
 Sesamon
 habet, mi
 git, & rum

Sefaleos &
 Sefamum
 Sefamoid
 appellatur,
 purget, cur
 ro in abbe
 res habet.
 Sefamos
 habet, mi
 git, & rum

Sesamum fi
quod non zo
nitorem que
nitulum. qui
nitro vero e
Sesleios &
nitendum e
Sesamum
dum. eiusde
nitur.
Sesamoid
appellatur,
pungit, cui
ro in abste
res habet.
Sesamoi
habet. ma
git, & rum

Sesamoid
dem. eiusdem
nomen.
Sesamoid
appellatur, i
purget, cur
rom abste
res habet.
Sesamoi
habet. ma
git, & rum

appellatur, &
purgat, cum
roin abbe
res habet.
Sesamon
habet. ma
git, & rum

St. & run

Sagapenum liquor est calidus, tenuiū partium, non secus quam alij liquores. sed & abstergerendi vim quandam habet.

Sampsuchus facultatis est tenuium partium, & digerentis, siccatque & exalfacit tertio ordine.

Sarcocolla lachryma est quæ mistam facultatem habet ex emplastica substantia quadam, & paucula amara. quam ob rem sine morfu exsiccat.

Satyrîū humidū est & calidū sua tēperie: ideoq; gustanti- bus dulce videtur. ei tamen excrementitia, flatuosaque humi- ditas inest. eadem quoque facere potest herbæ ipsius radix.

Selinon, hoc est apium, calidum est, & flatus discutit, & semen magis, quam herba. similis facultas est in oreo- selino. hipposelinon vero imbecillius est, vt oreoselinon va- lentius.

Seris subamara est, idque magis agrestis, quam picrida vo- cant, aliqui vero etiam cichorium: estque frigida, & sicca tē- peraturæ in primo excessu. Satiua autem magis, quam agre- stis refrigerat, sed humiditatis externæ multa copia admista siccitatē restinguit. vtraque adstringentis facultatis est par- ticeps, velut chondrila.

Seriphum simile est absinthio. ab eo tamen diuersum est, quod non æque, vt illud, adstringit, magisque calfacit, & a- marorem quandam cum falsedine recipit, & stomacho est infensum. quin calfacit etiam in secundo ordine intenso, in tertio vero exsiccat.

Seseleos & radix, & multo magis fructus de numero cal- facientium est, & tenuium itidem est partium.

Sesamum emplasticum est, & molliens, & modice cali- dum. eiusdem quoque facultatis est oleum, quod ex ipso cō- ficitur.

Sesamoides magnum, quod etiam Anticyricum veratrum appellatur, propterea quod eius semen perinde, vt veratrū, purget, cum in aliis facultatibus est veratro simile, tum ve- ro in abstergerendo, calfaciendo, & siccando, similes illi vi- res habet.

Sesamoideos albi semen quandam etiam qualitatem acré habet. multum nanque amarum est. calfacit igitur, exten- git, & rumpit.

M iij

Sideritis habet etiam quiddam abstergentis : sed plurima eius pars est humida & frigida modice . pauce quoque adstrictionis est particeps . quidam hanc vocant Achillion sideritim : in hacque maior adstringendi vis, quam in superiore inest.

Sycios, hoc est cucumis, esculētus, qui iam est maturus , tenuiorum partium substantiæ est . qui vero non est eiusmodi, crassiorum : non est tamen abstergentis , & incidentis facultatis particeps . in eis vero superat humida, frigidæque temperatura : ut in secundo ordine collocentur . attamen si quis semen, aut radicem arefaciat, iam primi ordinis cōpleti siccantium reddentur . in his quoque maior abstergenti vis, quam in carne fructus inest.

Syciu vero, hoc est cucumeris agrestis succus qui ex fructu exprimitur, quem elaterium vocant, extreme est amarus , & tenuium partium, & leuiter calidus, ut ex secundo ordine censeatur : est etiam digerens . radicis vero succus , atque is qui ex foliis colligitur, licet similem elaterio vim habeat . imbecillior tamen est, radix quoque similem facultatem possidet : siquidem extergit , digerit, emollit, cortex tamen magis exsiccat.

Silphij liquor calidissimus est, quinetiā folia, fructus, caulis, & radix egregie calfaciunt . sed omnia sunt magis flatuosa substantiæ, & foris imposita sunt efficaciora : & præcipue liquor, in quo valde trahendi facultas inest . attamen & excrecentia amoliendi, & liquandi vim quandam habet.

Sinon calidus est, subamarusque, & obstructions difficiliter.

Sion calfacit, & digerit.

Sisari radix calfacit secundo ordine, habetque amaroris & adstrictionis quidpiam.

Sisymbrium tenuium partium, digerentis, calfacientis, & siccantis in tertio ordine facultatis est . eius semen est partium tenuium, & calidæ facultatis.

Sisymbrium , quod cardaminem etiam vocant , cum aridum est, tertij ordinis est calfacientium & siccantium : cum viride, secundi.

Scandix subacre, & subamarum est : & secundi ordinis intensi est calfacientium & siccantium.

Scilla valde incidentis est facultatis, & secundo ordine calfacit.

Scolymi,

Scolymi, hoc est cardui radix calida est in secundo ordine iam completo, aut initio tertij. sicca vero in secundo.

Scordium habet quid amaroris, acerbitatísque, & acrimoniæ, ideóque viscera expurgat, & exsiccacit.

Scorodon, hoc est allium calefacit & exsiccac in quarto excessu. quod vero ophioscorodon dicitur, agreste alliu est, ac domestico valentius.

Scordoprasum vero sicut gustu, & odore mistam ex scorodo, & praso, hoc est ex allio & porro qualitatem obtinet, ita etiam viribus.

Scorpioides calfacit in tertio ordine: siccac in secundo.

Smilax perniciosæ facultatis est planta.

Smyrna, hoc est myrrha, secundi gradus est calfaciétium, & siccantium. est etiam non exiguæ amaritiei particeps. eiq; abstergerendi vis inest.

Myrrha vero Bœotica vim habet calfaciendi, molliendi, & diffundendi.

Smyrnium calidum, siccumque est in tertio ordine.

Sonchus ex aquea & terrestri essentia, vtraque leniter frigida constat: est etiã cuiusdam particeps adstrictionis, & cui denter refrigerat. cum vero plane exaruerit, eius temperatura terrestris redditur cum mediocri calore coniuncto.

Sparganium exsiccantis facultatis est.

Sparti, hoc est genistæ, quo etiam vites alligant, tum fructus, tum virgarum succus non instrenue attrahentis facultatis est.

Stachys frutex marrubio similis, acer est & amarus, tertioque ordini calfacientium attribuitur.

Stœbes fructus & folia adstringentem sine morfu vim habent, in siccando vero tertij quodammodo ordinis principium attingit.

Stœchadis amara qualitas est, & modice subadstringens: temperatura vero composita ex frigida terrena essentia exigua, vnde adstringit, & extenuat altera terrena copiosiore: ex qua amara est. ex vtriusque congressu tollit obstructionem, attenuat, extergit, & roborat.

Stratiotes aquatilis humidus & frigidus est: terrestris vero nonnihil adstrictionis habet.

Struthij radix acris gustu est, ex quarto quodammodo ordine, atque etiam absterget.

L I B E R

Styrax calfacit, siccatur, mollior, concoquit. fuligo eius combusta est thuris fuligini quodammodo similis.

Syca, id est ficus arida vim habent ex calfaciendi in secundo fere ordine iam completo. habent etiam quid partium tenuitatis. ex caricis quæ pinguioribus sunt, magis concoquere possunt: quæ acriores, magis abstergere, & digerere. quod vero ex iis plurimum in aqua coctis conficitur, simile est melli non solum consistentia, sed etiam facultate. Caprifici autem ficus acris & digerentis sunt facultatis. sic quoque domesticarum plantarum primæ ficus.

Syce, hoc est ficus arbor, temperaturæ est calidæ, & tenuium partium. ut & eius liquor, & succus, qui ex foliis exprimitur, attestantur. agrestis vero fici liquor, & succus valentior est. coliculi vero eius adeo sunt calidi, ac tenuium partium, ut carnibus bubulis duris adiecti teneras eas faciant.

Symphytum petrum habet secandi vim quampiam, habetque etiam quampiam contrahendi. & tertio præterea loco humiditatem quandam non immodice calidam: ex qua dulce videtur, & odoratu iucundum. Commansum vero sitim extinguit. potest ergo digerere, & contrahere, & constringere. Symphytum vero alterum magnum similem prædicto vim habet. gustantibus tamen non dulce est, nec odoratum. quatenus vero lentum est, & pruritus excitat, scillæ est simile. utuntur eo ad omnia, ad quæ superiore.

Spondylii fructus & radix acris, incidentisque facultatis est.

Schinos, id est lentiscus ex aquea substantia leniter calida, & terrena frigida non multa compositus est: ob quam etiam modice adstringit. siccatur igitur in tertio ordine iam completo. in differentia vero caloris, & frigoris est quodam modo medius. similem porro habet adstrictionem in omnibus eius partibus, in radicibus, in ramis, in extremis turionibus, in germinibus, in foliis, in fructu, & cortice denique. succus vero qui ex foliis exprimitur, similis quodammodo temperaturæ est, ut modice adstringat.

Schinu anthos calfacit moderate, & adstringit moderatius, nec plane à tenuitatis abest natura. eo magis adstringit radix, quem vero florem vocant, calidior est.

Schœnos leia, id est iuncus lævis. huius quædam oxyshœnos, quædam holoshœnos. fructus autem holoshœni somnum

num inducit: oxyſchœni vero fructum ferentis, ſomnum ipſe quoque, ſed minus affert. conſtant autem ex terrena ſubſtantia leniter frigida, & aquea leniter calida.

T

Terebinthi cortex, folia, & fructus quiddam habent adſtringentis: ſed & ſecundo ordine calfaciūt. ex quo iam plannum eſt, ea ſiccare. recentia vero hæc, humidæque adhuc modice, ſiccata vero, ſecundo ordine. fructus vero ſiccus eſt, vt prope ad tertium ordinem ſiccantium accedat.

Teulon, hoc eſt bera nitroſæ cuiuſdam facultatis eſt particeps: qua abſterget, & digerit. ad hæc tamé valentior eſt berta alba. nam nigræ adſtrictionis quidpiâ accedit. idque potius in radice eſt.

Teucrium incidendi, tenuiūque partium facultatis eſt. ponâtque ipſum quiſpiam in ſecundo ordine calfacientium, & tertio exſiccantium.

Tephra cinis habet in ſe partim terrenum, partim velut fuliginofum. hæque partes tenues ſunt, & maceratis aqua cineribus & colo traiectis ſimul abeunt: quod vero reſtat, terrenum, & infirmum, & morſu vacans efficitur, calida vi in lixiuo depoſita. Non omnis tamen cinis eiſdem exquiſite temperaturæ cenſetur: ſed pro materiæ combuſtæ differentia variatur. ergo ex lignis acerbis cinis non parum contrahit adſtrictionis. ex iis vero, quæ talia non ſunt, vt ex ficulnis, cinis abſtergentis facultatis efficitur.

Titanoſ, hoc eſt calx, eſt etiam cineris ſpecies quædam, qui tenuiorum partium eſt, quam qui ex lignis conficitur. calx lota medicamentum ſiccans ſine morſu facit. magiſque ſi bis, terve lauetur. ſit autem valde digerens, ſi marina abluatur.

Telephium abſtergentis eſt facultatis, calidæque in primo ordine: ſiccæ vero in ſecundo intenſo.

Telis, hoc eſt ſœnum græcum calfacit ſecundo ordine, & primo exſiccatur.

Tithyrali omnes acrem qualitatem vincentem habent: ſuntque ex quarto calfacientium ordine. in eſt eiſdem amarities, eorū vero liquor eſt validiſſimus: deinde fructus & folia. ſed & radix earundē facultatum eſt particeps: non tamen

L I B E R

æque. Cùmque septem numero sint, validissimus omnium est, qui caracias dicitur, & qui myrsinites, & qui in petris arboris instar nascitur. deinde is, qui verbasco est similis, & cyparissias: tum qui paralios, post eos, qui helioscopius nominatur. prædictæ vero horum facultatis proportioni cineris, ac lixiuij ab eis confecti facultas respondebit.

Tragacantha similem gummi vim habet emplasticâ quâdam, & quæ acrimoniam obtundit: atque etiam æque ac illud, exsiccat.

Tragij folia, fructus, & lachryma trahentis, digerentisque facultatis sunt, ac tenuium partium & calidum tragium est in tertio quodammodo ordine. alterum vero quod est minus, non parum habet facultatis adstringentis.

Tribulus ex substantia humida modice, eaque frigida constat. in terrestri vero excellit terrestre frigidum, quod adstringens esse comprobauimus. in aquatili vero, aqueum. cæterum terrestris fructus tenuium est partium.

Tripolij radix acris, calidæque in tertio excessu est.

Trifolium, aut asphaltion in calfaciendo, & exsiccando tertij est ordinis.

Trichomanes eadem potest omnia, quæ adiantum.

Trychnon, hoc est solanum, esculentum adstringit ac refrigerat in secundo excessu. Ex cæteris quæ vesca non sunt, vnum halicacabum nominatur, quod rufum habet fructum, acino vix tum figura, tum magnitudine similem. idque in facultate foliorum est hortensi persimile, fructum ferens, qui ad ciendam vrinam valet. Alterum vero fruticosum, & soporiferum simile est papaueris liquori, sed imbecillius. tertium præterea est furiosum, quod ad medicinas, quæ intra corpus sumuntur, est inutile. nam si quis drachmas eius quatuor sumat, mortem afferent: si pauciores, furorem. vna certe innoxie sumitur. & tamen nec ipsa vtilitatis quidpiam obtinet. radicis cortex foris admotus siccatur secundo ordine completo, & incipiente secundo refrigerat.

Y

Hyacinthi radix in primo siccantium, in secundo iam completo refrigerantium ordine constituitur. fructus leniter extergit, & adstringit, tertio ordine desiccans: & in medio caloris & frigoris positus.

Hydna,

Hydna, hoc est tubera, vincentem habent terrenam essen-
tiam, exigua quadam tenuium partium adiuncta portione.

Hydropiper calidum est illud quidem, sed non æque, ut
piper. itémque digerit.

Hyoscyamus, hoc est altercum, qui nigrum semen fert,
insaniam, soporémque affert. proximam ei facultatem obti-
net is, qui semen modice flauum gerit, vterque autem vitan-
dus est, ut inutilis, & perniciosus. Cæterum cuius semen &
flos candidus est, qui ex tertio est ordine refrigerantium, ad
medicinam est maxime accommodatus.

Hypericon calfacit, & siccatur, estque essentia tenuium par-
tium.

Hypecoon ex tertio est refrigerantium ordine, ut à papa-
uere parum absit.

Hypoglossum & radicem & succum mollientis faculta-
tis habet.

Hyssopum calfacit, siccaturque in tertio ordine: est item
tenuium partium.

✠

Phaci, hoc est lentes, non valenter adstringunt. medium
vero caliditatis, & frigiditatis tenent: atque etiam in secun-
do ordine siccant.

Lens vero palustris humidæ, frigideque temperaturæ ex
secundo gradu est.

Phaleridis succus, & semen, & folia aliquid tenuium par-
tium, & calidi possident.

Phalangites facultatem habet tenuium partium, & siccatur
tem.

Phlomi, hoc est verbasco, cuius alba, & cuius nigra sunt fo-
lia, radix acerbior est: folia vero digerunt. Sic & aliorum folia
siccandi, & modice extergendi vim habent.

Phoenix, hoc est palma arbor, in omnibus eius partibus
adstringentis facultatis est particeps, ac ramorum quidem suc-
cus austerior est ex aquea essentia tepida, & terrestri frigida
compositus. Similis quoque naturæ est medulla, quam cere-
bri nomine appellant. eius fructus, ac præcipue dulcis non
exiguæ caliditatis particeps est. isque foris admotus roborat,
siccatur, contrahit, stipat, & densatur. quod vero elaten vocant,
hoc est tenerum palmæ germen, eandem vim habet, quam

L I B E R

cerebrum : quod denique velut proprium eius est tegmen ,
adstringentem ipsum quoque facultatem obtinet , cæterum
magis quam omnia antedicta exsiccat. est etiamnum plantæ
radix siccantis sine morfu facultatis, eique aliquid adstrictio-
nis inest.

Phorbion vim habet tenuium partium, trahentem, atque
extergentem.

Phu radix vires habet nardo similes, sed in plerisque infe-
rior est. urinas autem ciet magis, quam Indica, aut Syriaca
nardus: eque vero ac Gallica.

Phycos, id est alga, humens adhuc alga, & viridis in secun-
do ordine siccatur & refrigeratur. aliquid etiam modice adstrin-
gentis obtinet.

Phyllitis acerbæ qualitatis est.

Phyllon hoc est folium malabathri iure prætermisit: ait e-
nim ipsum vim nardo similem obtinere: qua de iam prius
est dictum.

x

Chalbane. Galbanum mollientis, digerentisque facultatis
est. in calfaciendo fuerit sane ex tertio ordine incipiente: in
siccando vero in principio secundi statuatur.

Chamædrys amaram qualitatem cæteras superantem ha-
bet. est & quodammodo acris, inciditque, & obstructions
pellit. ponat eam quis in tertio siccantium, & calfacientium
ordine. magis tamen calfacit, quam siccatur.

Chamæcissi flos cum valde amarus sit, obstructione iecur
liberat.

Chamælea amaram qualitatem cæteris excellentem habet.

Chamæleuces calida facultas in tertio ferme ordine est:
sicca vero in primo.

Chamæleontis radix, nigri quidem letale quiddam possi-
det, quâ ob rem ea foris utimur: est enim sicca in tertio iam
gradu ferme. calfacit vero in secundo completo. albi vero
radix valet etiam ad partes internas, eandemque temperatu-
ram, quam nigri habet: nisi quod hæc est magis amara, quam
illa sit.

Chamæmelum partium tenuitate est rosæ simile: calore
vero ad olei vires animanti familiares & temperatas magis
accedit. proinde lassitudini, siquid aliud, in primis confert:
do.

dolorésq; mitigat, téſa remittit, & laxat: modice dura emol-
lit, conſtipata rarefacit, & febres, quæ citra viſceris alicuius
inflammationem mortales vexant, diſcutit, ac præſertim quæ
ex humoribus bilioſis, aut cutis denſitate exoriuntur. has er-
go febres ſanare chamæmelum poteſt: eâſque cum iam con-
coctæ fuerint. & tamé ceteris omnibus egregie prodeſt, quæ
melancholicæ ſunt, aut pituitosæ, & ex inflammatione viſce-
ris exortæ. nam & harum remedium præſtantiffimum eſt,
cum iam concoctis adhibetur. ideo fit, vt hypochondriis, ſi
quid aliud, pergratum ſit. ſed & lini ſemen viſceribus, quæ in
hypochondriis ſunt, gratum eſt, ſed tamen minus, quam cha-
mæmelum: ſiquidem & minus eſt calidum, & eſt etiam par-
tium craſſarum. attamen in aſcenſu, atque incrementis in-
flammationis, & præſertim earum, quæ in externis ſunt par-
tibus, roſaceum chamæmelo præſtat: quippe cum tepida ca-
liditate, & leui adſtrictione eiufmodi indigeant.

Chamæpitys amarû ſaporé habet acri validiorem. quam
ob rem expurgat, abſtergétque viſcera magis, quâ calfaciat.
præterea ſiccatur in tertio, calfacit in ſecundo.

Chamæſyce abſtergentem, acrémque vim poſſidet.

Chelidonium, valide abſtergentis, & calidæ facultatis eſt
ordine tertio, ſimilitérque ſiccantis. Minus vero chelidoniû,
cum acrius maiore ſit, cutim ſtatim exulcerat. itaque quarto
iam ordini incipienti calfacientium aſſignabitur.

Chondrila, hanc etiam ſerin quidam nominant. eſt enim
eiufdem fere cum illa facultatis: niſi quod guſtu amariuſcu-
la eſt: quam etiam ob rem magis ſiccatur.

Chondrus, alica emplaſticæ, concoquentiſque naturæ eſt,
æquæ ac triticum: eſtque ceu materia quædam ad vehemen-
tiora medicamenta excipienda accommodata.

Chryſocomes, aut chryſtidis radix acrem ſimul, atque ad-
ſtringentem qualitates vincentes habet. quam ob rem non
eſt ad multas res utilis.



Pſyllij ſemen ſecundi ordinis eſt refrigerantium. inter ſic-
cantia & humectantia medium tenet locum.

Pſeudodiſtamnum iure pertranſiit, quoniam diſtamni
vim obtinet, de quo iam diſſeruimus.

Ocimum ex secundo ordine calfacientium est. ei quoque excrementitia humiditas inest. quocirca nec etiam commodum est, ut intra corpus assumatur. extrinsecus vero illitum ad digerendum, & concoquendum valet.

Ocimoides. huius semen tenuium partium, & siccantem sine morfu facultatem habet.

DE TERRAE DIFFERENTIIS, & facultatibus.

Terra omnis siccandi vim habet. cumque nulla penitus ignea substantia eidem sit admista, tum citra vllū omnino morsum siccatur. ad quā etiam rem ei adiumento est lotio.

Samia refrigerandi modice vim habet. abstergendi vero valde moderate, Selinusia, & Chia: itēque sine calfactione, & refrigeratione insigni.

Cimolia cum miste facultatis sit, & refrigerās habet quipiam, & nonnihil etiam digerens. quocirca lota hoc abicit. non lota vero vtrisque his facultatibus agit. vtrāque vero facultatem facile indicat, cum illi humores naturae contrariae miscentur. nam repercutientibus, ac refrigerantibus mista, lutum quod ex ea, atque illis fit, repercutit, & refrigerat. si digerentibus misceatur, digerit.

Ampelitis terra magis medicata est: siccaturque & digerit. non est autem ita morsus expers, nec ita mitigandi vim habet, ut Samia, Chia, & Selinusia. at Cimolia, quae his est paulo valentior, est etiam morsus expers, ac praesertim elota.

Cretica vero est his quodam modo similis: verum satis imbecilla, multumque habet aëriæ substantiae. abstergendi tamen ei vis inest.

Lemnia valentissimas harum omnium vires habet: estque adstrictionis particeps.

Eretienis hac etiam valentior est: non tamē vsque adeo ut mordeat. si lauetur, valde moderata efficitur. non secus, quam supradictae. sunt qui eam comburunt, & tenuiorū partium faciunt: ut & ad vim digerendi transeat. si vsta lauetur, acrimoniam in aqua deponet: subtilitatem vero, quam ex vstione acquisivit, retinet, magisque desiccatur.

Est alia quoque terra, quae pnygitis vocatur, tota quidem facultate

DECIMVS QVINTVS. 281
facultate Cimolix similis, sed colore nigra, qualis est ampe-
litis.

Alia quoque terra ex Armenia, quę Cappadocię finitima
est, assertur, maxime siccans, colore pallido, facillimęque in
leuorem soluitur, vt calx. vocatur autem eorum lingua, za-
rina: in Syria vero zarnacha nominatur. mons in quo pro-
uenit, est ciuitatis, quę Bagauona appellatur: ager vero in
quo est mons, Agarra dicitur. Caterum terram ipsam exper-
tem mistionis substantiæ, quę sit alterius generis, vim habe-
re citra morsum exsiccandi censendum est. Sed cum nullum
corpus mistionis exquisitę expers reperire non queas, inspi-
cienda commistio est eorum, quę illi accidunt: idque & in
leuitatis, & in grauitatis differentiis, & iis, quas gustus affert.
nam si qua adstrictio appareat, tantum assumpsit frigidita-
tis, quantum habet adstrictionis: sin etiam acrimonia quę-
dam appareat, tantum consequitur caloris, quantum ei inest
acrimonię. in leuitate & grauitate idem considerandum est:
cum leuitas inde oriatur, quod in tota eius temperatura co-
piosa sit aërea substantia: grauitas vero quo maior sit, eo e-
tiam magis sincera terra habeatur. terrę autę proprium est,
vt igni admota non fundatur, & vt aqua irrigata in lutum
facile soluatur.

DE LAPIDIBVS.

Lapis hæmatites tantum frigiditatis, quantum etiam ad-
strictionis possidet.

Melites vero calorem temperatum habet propter dulce-
dinem temperatam.

Galaçites mediam inter hos vtrosque temperię obtinet.

Schistos vero hæmatiti persimilem vim habet: sed imbe-
cilliozem. Porro cum lapidibus omnibus cõmune sit, vt ex-
siccent, quotquot ex eis in succum soluti nullam euidentem
qualitatem gustui afferunt, hos esse infirmissimos, & minime
mordaces putandum est: at qui perspicuam gustui qualita-
tem offerunt, hos pro qualitatis proportionē vim habere: vt
si adstringant, ad comprimendum, constringendum, conden-
sandum, & contrahendum: si mordeant, ad calfaciendum, ad
digerendum, & ad liquandum valeant. medij vero sint, qui
citra morsum & adstrictionem solum abstergeant. Ergo hæ-
matites, schistos, galaçites, & melites in succum soluuntur

N

• ad mortarium, aut cotem attriti: cum sint etiam alij lapides, qui in succum soluantur: vt qui in Aegypto nascitur, quo vtuntur ad splendorem linteis indendum, est autem minime omnium prædictorum qualitatis particeps, neque adstricti- nem, neque morsum, neque absterfionem vllam ostendit. idcirco id solum huic lapidi inest, vt exsiccet.

Omnium autem prædictorum lapidum valentissimã vim habet, qui ex Aethiopia affertur, quodammodo subuiridis iaspis. soluitur hic lapis in succum lactei coloris: mordaci tamen gustu est.

Est & alius lapis, cuius valentes vires sunt, qui in Palesti- na Syria nascitur, & Iudaicus appellatur.

Pyrites quoque ex iis est, qui valentẽ vim habent, ad sum- mam vero acres accommodati sunt ad abstergendum, de- tergendum, detrahendum, extenuandum, digerendum, vehẽ- menter siccandum, & colliquandum.

Huius facultatis habetur etiam Phrygius. nam valenter siccatur, habetque nonnihil adstrictionis, & mordicationis.

Ageratus quoque lapis ex mista facultate abstergente, & digerente constat.

Asiæ petrae flos tenuium est partium, vt fluidas carnes si- ne morfu eliquet. petra vero, in qua nascitur, quamuis illi si- milem vim habeat, actionis tamen vehemẽtia illi cedit. flos enim est petra multo potior, non solum quod magis colli- quet, & digerat, & velut sale condiat: sed etiã quod hæc abs- que vehementi morfu faciat. præterea hic asiæ petrae flos ne- scio quid salis habet in gustu, vt possimus facere cõiecturam, ipsum nasci ex rore quodam ex mari in petra residenti, qui postea solis radiis tactus inarescat.

In lapidibus continetur etiam magnes, quem herculeum vocant: habetque vim hæmatitæ similem.

At Arabius quem vocant, elephanti similis, siccandi & ab- stergerendi vi præditus est.

Itẽque is, qui Alabastrites appellatur, vltus in medicinẽ vsum venit.

Smiris quoque valenter abstergerendi vim habet.

Pumex etiam inter lapides numeratur: estque eiusdem fa- cultatis, quatenus ad abstergendũ pertinet: quemadmodum etiam testa figulina: & multo magis clibanorum: sed smiris habet etiam aliquid acrimoniæ: ideo fit, vt nõnulli eundem medi-

adamentis a-
nifed si pume
inferior.
lapides quoque
non tamen it
atur: quos in
lactei color
habere, nec
lactem vero
valenter
temperata
que.
vire vero colu
lapis abster
ipsum e
virescit
mentem vero
qualam in
ob os venter
que pericul
lapis confeci
mangerent. p
virescit vero lap
que vera affueri
adstent.

lapides siue for
lactem obster
que & adstingu
peripicue de
terra fodiantu
sunt par
magis digerunt
corpes tenuiori
non vlti, con
posiunt.
moniacum vim
ta & adstingu

medicamentis addant, quæ adurendi & exsiccandi vi præstant. sed si pumex comburatur, nulla re erit ad eisdem vsus fmiri inferior.

Lapides quoque in spongiis reperti frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, vt ii, qui ex Cappadocia conuehantur: quos in Argæo nasci perhibent. soluuntur hi in succum lactei coloris. ex quo perspicuum est, eos extenuandi vim habere, nec insigniter calefacere.

Ostracitem vero lapidem laudari à quibusdā audio, quasi desiccandi valenter facultatem habeat, ex adstrictione & acrimonia temperatam: vt etiam eum, qui Geodes vocatur, abstergere.

Naxiæ vero cotis ramentum refrigerantis est facultatis.

Ophites lapis abstergendi, & frangendi vim habet: ceu etiam vitrum. ipsum enim ex vino albo & tenui epotum lapides, qui in vesica sunt, valenter confringit.

Proprietatem vero quibusdam lapidibus nonnulli inesse attestantur: qualam re vera viridis Iaspis habet: qui stomachum, & os ventriculi suo adhæsu iuuat. huius etiam lapidis ego quoque periculum abūde feci. torquem enim ex huiusmodi lapillis confeci, & collo suspendi ita, vt lapides ventriculi os attingerent. perspicue nanque prodesse videbantur.

Ophitem vero lapidem vir quidam, cui adhiberi fides potest, re vera asseuerauit, appositum iuuare eos, qui à serpentibus icti fuissent.

DE METALLICIS.

A

Ales. sales siue fossiles sint, siue ex mari oriātur, similem facultatem obtinent. eaque ex duabus qualitatibus abstergentē, & adstringente mista est. vtrunque vero siccare, supra fuit perspicue declaratum. differunt autem quod sales, qui ex terra fodiuntur, sunt densioris essentie: ex quo fit, vt crassiorum sint partium, magisque adstringant. sales vero vsti magis digerunt, quam ignem non experti: quatenus eorum corpus tenuiorum partium est redditum. non tamen æque ac non vsti, contrahere, densareque etiam firmam substantiam possunt.

Armeniacum vim habet abstergentem adiuncta leui acrimonia, & adstrictione leuissima.

N ij

L I B E R

Arsenicum tam combustum, quam non combustum adurentis facultatis est. id vero vltione reddi tenuiorū partium plane constat.

Aphronitrum à spuma nitri differt. nitri enim spuma exsiccans medicamentum est, aspectu triticeæ farinæ similis: aphronitrum vero farinæ speciem non habet: neque solutum est, sed est concretum, & coactum. quo omnes, qui in balneis sordes detergunt, vtuntur: habetque abstergerendi, ac digerendi facultatem. at spuma nitri eiusdem quidem est naturæ, sed tamen essentię tenuioris est. nitrū vero mediam habet vim inter aphronitrū, & salem. aphronitro enim sola abstergerendi vis inest: soli vero etiā adstringendi: nitro insunt vtræque: sed minima adstringens, multo vero maior abstergens.

Γ

Gypsum præter communem omnium terrenorum, lapidosorumque corporum facultatem, per quam siccare dicta sunt, hoc etiam est consequutum, vt sit emplasticæ facultatis. at combustum non eque est emplasticū, cæterum tenuiorum partium, & magis siccans redditur. quinetiam repercutiendi vim habet, & præsertim oxycrato maceratum.

Δ

Diphryges ex mista qualitate, & facultate constat. habet enim in se quiddam adstringens, & acre mediocriter.

Θ

Theon. sulfur omne trahendi vim habet. temperatura calidum, essentię vero tenuis est.

Ι

Ios. ærugo gustantibus acrem qualitatem offert. digerens vero, & detrahēs est, & liquans non teneram modo, sed duram etiam carnem.

Κ

Cadmia siccantis & leuiter abstergentis facultatis est. in caliditatis autem & frigiditatis differentia est quodam modo temperata. tenuior autem est, quæ botryitis, crassior vero quæ placitis appellatur.

Cinnabaris acris modice facultatis est. habet vero etiam quidpiam adstrictionis.

Cisse-

Cissaris. pumex quid habet abstergens. si comburatur, tenuiorum fit partium: sed vrendo parum acrimonię contrahit: eamque lauando deponit.

Ceruleus acris est facultatis, detrahentisque, ac digerētis potioris, quam cinnabaris. est etiam adstrictionis particeps.

A

Lepis. squama quædam ferri est, quædam æris, & stomomatis. quidam etiam helitim squamam nomināt. omnes autem valenter siccant, sed differunt inter se, & quod magis, minusve siccant: & quod tenuioris, aut crassioris sint essentię: & denique quod maioris, minorisve adstrictionis sint participes. A Eris ergo squama in siccando primas tenet, constat enim ex partibus subtilioribus: utpote quę non nihil æruginis assumpsit. maiorem vero adstrictionem squama ferri obtinet, maioremque quam hæc, squama stomomatis. detrahunt autem & liquat carnem magis, quam squama æris: & hac etiam valentius helitis. omnes autem squamę non in strepente sunt mordaces. estque perspicuum, ipsarum consistentię substantiam non tenuium, sed crassarum potius esse partium. nam inter ea, quę eandem vim habent, id quod partium tenuiorum est, minus est mordax.

Lithargyrus desiccatur, ut cætera metallica omnia: sed hoc efficit moderatissime. in cæteris vero qualitatibus, ac facultatibus quodammodo in medio est, neque manifesto calfaciens, neque refrigerans. modicę quoque absterfionis & adstrictionis est particeps. quam ob rem medię ordinis in metallicis iure nominatur. proinde usus eius est frequens ceu materię, ut misceamus iis, quę valentem vim, aut mordentem, aut adstringentem, aut tale quippiam facientem habent.

Litrum. nitrum siccatur & digerit: si quę intra corpus assumatur, crassos humores magis quam aphronitrum incidit, atque attenuat. Aphronitrum vero, nisi magna urgeat necessitas, deglutendum non est: nimirum stomacho infensum: siquidem plus etiam quam nitrum incidit.

M

Melanteria est de numero medicamentorum valde adstringentium: ut etiam omnia propemodum adstringentia tenuitate partium exuperet.

N iij

L I B E R

Melan. atramentum scriptorium desiccatur ipsum quoque mirum in modum.

Misy, fori, & chalcitis sunt facultatis eiusdem generis. differuntque partium tenuitate, & crassitudine. omnium eorum crassissimum est fori: tenuissimum misy. mediâ inter ea vim chalcitis tenet. adurunt hæc tria omnia, & crustas inducunt, & quanquam vrunt, tamen etiam adstringunt. Ceterum misy nudis corporibus admotum minus, quam chalcitis mordet: quamvis non sit chalcitide minus calidum. sed hoc ex tenuitate suæ substantiæ eidem inest.

Molybdæna vim habet lithargyro persimilem: à media tamen temperatura paulum quid ad frigidius vergens. sed nec abstergentis facultatis est.

Molybdos. Plumbum vim habet adstringentem, & refrigerantem. eique inest non solum humida essentia copiosa à frigore concreta, sed æria quoque, & pauca terrea. humidæ igitur essentiæ plurimum in eo esse, id signo est. Plumbum autem solum omnium eorum, quæ nouimus, tum mole, tum pondere augetur, si in ædibus subterraneis condatur, quæ ærem turbidum habeant: ut quæcunque illic ponantur, situ celeriter impleantur. Vltimum vero plumbum, ubi lotum fuerit, facultatis refrigerantis est. antequam vero abluatur, mistam vim habet.

O

Ostracon. testa vim abstergentem, & exsiccantem obtinet: præcipue vero quæ caminorum est, eo quod tosta fuerit.

II

Pompholyx, si elora fuerit, medicamentum est prope omnium, quæ citra morsum siccant, primum. ubi vero hæc superpetat, nemo est qui spodio uti velit, nedum antispodio.

Σ

Sandaracha facultatis adurentis est. quam ob rem digerentibus, & abstergentibus eam merito indunt.

Scoria omnis medicamentum est valenter siccans, præ cæteris vero ferri. argenti vero recrementum proprie helcysma vocant, siccantemque facultatem habet.

Stimmi ad communem exsiccandi facultatem habet etiam adstrictionem.

Stypteria. alumen vehementissimam adstrictionem habet: cumque crassarum sit partium, tenuiorum partium, quâ alia, crit id,

DE
id, quod
Liquidum
quod placet

Titanos. cal
morta ver
id post vnum
morta exorat
morta omni
morta in aqua
morta ipsa
morta fieri, mort
morta.

Chalcantbor.
morta, q
morta caliditas sit
morta condire, fer
morta humidit
morta, atque c
Chalcitis mortua
morta: vero
morta: & crustam
morta mordet. si
morta non parat
morta omnino sit, q
morta tenuiorum
morta faciunt. N
morta: rora, min
Chalcos. as con
morta: est par
Chalcis anthos
morta: & squama.
Chrysocolle. &
morta: non tam
morta: & exsiccans

Pompholyx
morta: est
morta: medicamen

erit id, quod scissile vocant. deinde rotundum, & astragalote. Liquidum vero est abunde crassarum partium: itémque quod placitem, & quod plinthitem nominant.

T

Titanos. calx viua adeo vehementer vrit, vt crustam excitet: extincta vero non protinus ipsa quoque crustam inducit sed post vnum, aut duos dies. minus quoque vrit, & minus crustas excitat. at vero temporis progressu ne crustam quidém molitur omnino: calfacit tamé, eliquátque carnes. si lauetur, morsum in aqua deponit, efficitque id, quod lixiuiú vocant. ceterum ipsa sine morsu exsiccat. si etiam bis, térve, & sæpius elota fuerit, morsus fit plane expers: & egregie citra morsum exsiccat.

X

Chalcanthos. atramentum sutorium. Mirabile est in hoc medicamento, quomodo valentissime adstrictioni non ignaua caliditas sit admista. planú ergo est, hoc maxime omnium condire, feruaréque carnes humidas posse: siquidem caliditate humiditaté absumit: adstrictione vero substantiam contrahit, atque constipat.

Chalcitis mistam habet adstringentem, acréque facultatem. superat vero acris, vt quæ adeo vehemens est, vt carnem exurat, & crustam gignat. hoc medicamentum vltum minus quidem mordet, sed non minus tamen exsiccat. sed & adstrictionis non parum amittit. proinde fit, vt chalcitis vltá portior omnino sit, quam ignem nó experta, est enim tunc partium tenuiorum facta, nec assumpsit acrimoniá, vt alia permulta faciunt. Nosti præterea omnia vltá, vbi lota fuerint, moderatiora, minúsque mordacia reddi.

Chalcos. æs combustum habet quidpiam acrimoniæ, & adstrictionis est particeps.

Chalcu anthos. Flos æris tenuioris facultatis est, quâ vltú æs, & squama.

Chrysocolla. & hoc medicamentum ex iis est, quæ carné liquant. non tamen valenter mordet. est autem abunde digrens, & exsiccans.

Y

Psimythion. Cerussa emplasticum, refrigeransque medicamentum est, hæc adusta in Sandyca, quem vocant, transit: medicamentum se tenuius, nondum tamen calfaciens.

N iij

Phycos autem seruata cerussæ frigiditate partium tenuitatē assumpsit: vt eius ope in altas partes corporum, quibus ad- mouetur, eius penetrare vis queat.

Pforicum magis siccatur, minúsque mordet, quam chalcitis, & nimirum etiam ex partibus tenuioribus constat.

*Ex Galeno, de utilitate, quæ sumitur ex animali-
bus.* Cap. 2.

Lac saluberrimum est, quod neque amarum est, neque aci- dum, neque salsum, neque acre, neque foetidum: sed quod sua- ue est & parum habet dulcedinis. tale vero ad acres, & mor- daces fluxiones est accommodatissimum, eas non solum ab- luens, sed corpora etiam illinens, ne in ea nuda cadat quod defluit, præterea lac omne ex tribus substantiis est compo- situm, casei, feri, & pinguedinis.

Serū extergendi vim habet. exterget enim, atq; abluit ci- tra morsum acrimonias. pars vero cascosa, & crassa quæ in lacte est, emplastri modo adhæret, & eo nomine acrimonias retundit, totum vero lac, vt vnò verbo complectar, medica- mentum est leniens, cuius tota quidem substantia morfu va- cat, sed multo etiam magis, vbi moderata coctione maior humiditatis serosæ pars fuerit consumpta.

Lactis tractationi caseus annectendus est, quoniam lac concretum est. non tamen tota lactis substantia in caseum concreuit: sed crassa tantum, tenui & serosa excreta & se- jun- cta. mollis autem & recens caseus vim habet reperiendi, & leniter refrigerat, qui vero ex acido lacte conficitur, præ- ter nunc allatam facultatē, leuē etiam digerēdi vim obtinet.

Butyrum fit ex eo, quod in lacte pinguißimum est, quem- admodum scriptum reliquit Dioscorides ex ouillo, atque etiam caprillo lacte. concoquentis facultatis est: habetque leuem digerendi vim in iis corporibus, quæ inter duritiem, & molliem sunt media.

Coagulum omne acris, attenuantis, digerentis que facul- tatis est, & nimirum etiam exsiccantis. hoc enim ex superio- ribus consequitur necessario.

Fel, aut bilis. hunc succum omnium succorum qui sunt in corpore calidissimum esse ostensum est, itaque in calidissimis necesse est fel ceterorum animalium selli antecellere, iis vero quæ non ita sunt calida, hunc etiam succum in illis calidum esse

esse proportionem, ut quatenus in cæteris inferiora sunt, eate-
nus in hoc itidem succo sint inferiora. Quinetiam in animis-
libus, quæ magis sunt calida, flaua bilis apparet: quæ vero mi-
nus, pallida. serosa enim humiditate flauæ bili admixta, palli-
da fit: ubi autem calida animalia aut fame, aut siti vexantur,
ad colorem atrum vergit. interim æruginoso colore, inte-
rim cæruleo interim, isatidis, qui magis suscus est, quam bras-
sicæ color. igitur & tu fellis colori diligenter animum atten-
dito, cum medicamentum quod fel accipiat conficies. Scito
ergo si præparando medicamento fel impense flauum ini-
cias, te illud calidius esse facturum: si pallidum, mediocriter
calidum. Quorundam autem taurorum fel ipse conspexi cæ-
ruleum, flauo nimirum superaffato, quod in id medicamentum,
quod parabatur, iniici prohibui: sed eius loco alterum me-
diocriter flauum accepi. ille enim taurus vinculis vi tractus
supra modum fuerat defatigatus, & calidiorem temperaturam
acquirit. Volatiliū vero animalium biles omnes acio-
res, & sicciores sunt, quā quadrupedum, & inter ipsas quo-
que volucres gallinarum & perdicum biles sunt vsui medi-
cinæ accommodatiores. miluorum vero & aquilarum im-
peditio sunt acres, atque etiam erodunt: ideoque æruginis co-
lorem imitantur: ac nonnunquam atræ sunt. His igitur ea-
rum differentiis perspectis, itémque affectionibus, quæ ma-
gis quæque minus exsiccatione indigent, cognitis, si vnam
modo quam volueris re expertus fueris, inde ad alias via &
ratione transire poteris, ut semper eam quæ affectioni con-
ueniat, accipias.

Sudor eius qualitatis est particeps, quæ salsa, & salsugino-
sa nominatur. & sæpe etiam in eo apparet amarities.

Vrina omnium animalium calida est, minus vero frigidio-
rum. Urina hominis omnium prope aliarum est imbecillima
exceptis porcis domesticis, quibus execti sunt testes. illorum
enim totius corporis temperatura est hominis temperaturæ
per similes: & eque debilis urina. cæterum urina hominum,
ut si quid aliud, extergendi vim habet. quod fullones præci-
pue indicant, qui sordes vestium ea expurgant, atque extergunt.

Saliua imbecillior est eorum qui comederunt, atque bi-
berunt: valida & acris eorum, qui ingenti fame premuntur,
aut siti enecti sunt. Saliua autem tota sui substantia aduersis-
sima est bestiis hominē interficientibus. Vidi ego scorpionē,

in quem saliuam solam homo conspuisset, occisum fuisse. idque protinus à saliuā esurientium & sitientium: tarde autē à saliuā eorum, qui potu, pastūque se expleuerant.

Stercus omne maxime digerentem habet vim. quoddam autem assiduo in vsu habetur, quoddam vero rariore. frequē tissime vero caprillo utimur (σπύραρον proprie nominant) digerentis atque acris facultatis est vsque adeo, ut induratis tumoribus conueniat. hoc autem combustū tenuiorum quidem partium, sed non tamen acrius perspicue apparet. Eiusdem autem tum combusti tum non combusti vis est abstergens, digerens, ac digerens quidem non exigua. Generalis autem & communis facultas eadem omnibus inest. verum pro animalium naturis variatur. quorum enim est temperatura siccior, eorum siccior stercus est: quemadmodum calidiorum calidius. sed nullum est, quod refrigeret, sicut nullum etiam humectat, quin pro natura quoque eorum, quibus animates vescuntur, multa inerit differentia. proinde in hominibus potius, quā ceteris animantibus est etiam maior. quādoquidem ij diuersissimis alimentis utuntur. quid enim simile habeant, qui allium, cæpāque comedant, & qui cucurbitam, si ita fors ferat? Stercus vero bubulum vna cum exsiccante, trahentem quoque facultatem obtinet. crocodilorum vero, & sturnorum, qui solam oryzam comederint, abstergentem, exsiccantēque vim habent vtrāque moderatam: & multo moderatiorem, & hebetiorem stercus sturnorum.

Sordes hominum siccantis facultatis est, habetque caliditatis aliquid. sordes vero, quæ lanis ouium inhæret, ex qua cæsyum, ut vocant, conficiunt, vim habet concoquendi butyro similem. habet vero etiam parum facultatis digerentis.

Carnes viperarum digerentem & siccantem valenter vim habent, simulque moderate calfaciunt. properat enim earum vis, ut videtur, ad cutim, per eam videlicet euacuans excrementa, quæ sunt in corpore. quibus ergo mali succi copiose in corpore redundant, magnus pediculorum numerus exoritur: & à cute squama abscedit, ac decidit extrema cuticula, ad quam retinentur crassi, terreique humores, qui ad cutem protruduntur. à quibus scabies, lepræ, atque elephantiasis exoriuntur.

Cochle-

D
Cochlear
ugata maxi
beatem exco
rium conue
Adeps à pri
animantibus
provenit: quæ
to, proinde p
mura vero nō
b. huius celest
ur. l. ut ergo be
per naturalem
uapz, & ceter
di siccitatem q
animalibus sob
que medici sol
nare tibi sicc
re aliorū humi
si sua possidet
enque causam
diceretur, qui
alio, aut in co
stimus nō que
p. l. ut ob crassi
tutatem nō
llo mordicato
norum partiu
dum mordica
mus que in it
mord. est etia
macorum, &
que est mascul
mus calidus
oris feminæ
m. facultas est
singulorum au
minore sumu
humectare lat
us est calor
rius adeps

Cochlearum caro contusa prius in mortario , deinde la-
uigata maxime exsiccans fit omnium partium , quæ humi-
ditatem excrementitiam habent , atque adeo , vt hydropibus
etiam conueniat.

Adeps à pinguedine differt , quod sit crassior , quã ob rem
animantibus , quorum tota natura magis terrestris est , adeps
prouenit : quemadmodum iis , quorum est humidior , pingue-
do . proinde pinguedo igni admota celeriter liquefcit . eli-
quata vero non facile concrefcit . adeps non facile liquefcit ,
& fusus celerrime coit , multoque pinguedine durior vide-
tur . sus ergo bene habitus multam habet pinguedinẽ , pro-
pter naturalem temperaturẽ humiditatem . Boues autem &
capræ , & cetera huius generis cornigera plurimum adipem
ob siccitatem gignunt . tu vero si vis , oleosam & pingue in
animalibus substantiam omnem adipem appellato , vt ple-
rique medici solent . simili quoque modo pinguedinem no-
minare tibi licebit . Cæterum adeps suillus est omnium fer-
me aliorum humidissimus . ac proinde vicinã oleo vim actio-
ne sua possidet : sed oleo magis emollit , & concoquit : ob
eamque causam cataplasmatibus , quæ ad inflamationes valent ,
comiscetur . qui vero mordicationes sentiunt aut in recto in-
testino , aut in colo , iis potius caprinum adipem , quã suillum in-
iicimus : nõ quod acrimonias magis obtundat , sed quod ca-
prillus ob crassitiem celerius concrefcit . porro ob essentiaẽ
tenuitatem nonnulla acrimonias magis obtundunt : vbi in
alto mordicatorum corporum molestia inhæserit , quod enim
tenuium partium est , tota corpora penetrat : & omni saniei
ipsum mordicanti permiscetur . hacque ratione adeps anse-
rinus quæ in imis corporum partibus mordicant , magis ob-
tundit . est etiam suillo calidior . inter hos medius est gal-
linaceorum , & gallinarum adeps . ac calidior semper , ficior-
que est masculorum animalium . & ex his ipsis , excetorum
minus calidus est , & siccus . mas enim castratus eiusdem ge-
neris foeminae semper est similis . omnis igitur pinguedi-
nis facultas est , vt humana corpora humectet , & calfaciat .
singularum autem pinguedinum differentiæ ex maiore , &
minore sumuntur . suis enim pinguedo , vt ad nos referatur ,
humectare largius potest , sed non eque exalfacere : sed ta-
lis est calor pinguedinis suis , qualis spectatur in nobis . tau-
rinus adeps est suillo multo calidior & siccior . Vitulinus

& calore & siccitate est taurino inferior: & hœdinus, capril-
lo, sed & caprinus hircino: & taurinus leonino. is enim
adeptus omnium prope quadrupedum adipe maxime dige-
rit, nam & calidissimus & partium tenuissimarum est, omnis
vero adeptus ubi inueterarit, se ipso fit calidior, & tenuiorum
partium. atque ita ad euocandum & digerendum est po-
tior.

Medullæ facultas est, ut indurata & scirrhusa corpora e-
molliat: siue musculis, siue ligamentis, siue visceribus id eue-
niat, optimam vero semper expertus sum ceruinam, deinde
vitulinam, taurina vero & hircina acrior, sicciorque est. ex
quo fit, ut duritias scirrhusas dissolvere non queat. non mo-
do autem medulla ex ossibus sumitur, quæ re vera medulla
est, sed etiam ex spina, quam spinalem medullam vocat, quæ
& siccior, & squalidior est, quam reliqua. est enim illa mol-
lior, & pinguior. quam ob rem ego spinalem seorsum per se
absque illa recondo.

Capitum mœnularum vstorum vis esse videtur desiccans,
& non admodum acris. hoc enim alicui ex combustis conue-
nit, quemadmodum omnibus communis est exsiccatio.

Cornu ceruinum & caprinum vstum, & elotum siccantis
facultatis est.

Castorium exsiccatur, calcatur, & digeritur: idque ei cum mul-
tis aliis medicamentis est commune. quoniam vero est abun-
de tenuium partium, idcirco eius vis maior est quam cetero-
rum, quæ eque calcant, & exsiccant. nam quæ tenuium par-
tium sunt medicamenta, efficaciora sunt, quam quæ sunt cras-
sarum: etiâ si parem vim sint sortita: propterea quod ingre-
diantur, & in imas ad motorum corporum partes penetrerit:
ac potissimum ubi densæ illæ fuerint, ut sunt nervæ. est igitur
perspicuum eas à castorio vel ob hanc causam magno-
pere iuvare.

Renes scincorum bibunt quidam, ut qui penem inten-
dant. cuius rei contrarium efficere videtur lactuæ semen ex
aqua potum.

Caprinæ vngulæ cinis attenuandi vim habet: asininæ vero
strumas digerendi, si oleo subigantur: si vero siccus fuerit
inspersus, sanare perniones potest.

Ossa combusta valde digerentem, atque exsiccantem vim
obunt.

Sene.

Senectam serpentis, si aceto ferbuerit, dentium curare dolorem quidam memoriæ prodiderunt.

Ouilla pellis recens detracta, & ijs qui quoquo modo fuerint flagris cæsi, iniecta, maxime omnium adiuuat: adeo, ut vna die & nocte eosdem curet.

Equorum lichenas ex aceto læuigatas ad comitiales & ferarum morsus efficaces esse nonnulli literarum monimentis consignarunt.

Telam araneorum vlcera summæ cutis ab inflammatione tueri, sunt qui scribant.

Veterum coriorum cinis vlcera ambusta, & quæ vocantur intertrigines, curat.

Buccinarum & purpurarum testa combusta vim exsiccandi obtinet.

Ostreorum testa combusta similis facultatis est, testæ buccinarum: sed quæ sit tenuiorum etiam partium, vel, ut dicam verius, minus crassarum, habet etiam contrahendi vim quâdam.

Sepiæ testa absterget & siccat non secus, quam aliæ testæ eorum, quæ testa conteguntur. cæterû in ea est tenuitas partium præ cæteris eximia.

Lanæ combustæ vim acrem, calidamque habent, partium tenuitate adiuncta.

Pili vsti æque ac lanæ combustæ calfaciendi & exsiccandi vim habent egregiam.

Ouorum album & tenue est omni morfu vacans: neque vnquam nos frustratur, ut lac, in animalibus cruditatē perpetentibus, aut fame, siti que enectis, aut quæ cibus pasta sunt prauis. Ovis autem vnicum inest malum, quod eis vetustas affert. quod facillime quis vitabit, si recentibus utatur. vstitissimum vero est, ac facillime nobis suppetit ouum gallinarum. idcirco nihil aliorû ovis indigentes, eo utimur: quâuis eandem cum illo naturam habeant. temperatura vero eius est paulo frigidior quam commodata. Ipse itidem vitellus similis naturæ est. quam ob rem ovis elixis, aut assis morsus expertibus ceratis miscetur. Est tamen perspicuum leuem inde differentiam ovis accedere, ut paulo magis exsiccent assa, quam elixa, & quantum huius facultatis nanciscuntur, tantum etiam eius amittunt, quæ ad mitigandû valet. refrigerat enim modice ouum, & citra morsum exsiccat.

L I B E R

Erinacei vtriusque tam marini, quam terreni corpus totū combustum cinerem efficit, cuius facultas abstergat, euocet, ac detrahat.

Cochlearum combustarum cinis egregie siccantis facultatis est: quæ etiam ex combustione caloris quidpiā acquisiuit. Cæterum hæ non combustæ siccant etiam egregie.

Cancrorum fluuiatilium combustorū cinis æque, ac prædictus, exsiccatur.

Gallarum simplex ius retinendi vim habet: ut veterum gallorum aluum subducendi. coquendi autem sunt cum sale diutissime.

Adarcion acerrimū, calidissimūque est: proinde ipsum per se inutile est. cōmiscetur autē iis, quæ vim eius retundūt: atque ita magni vsus redditur ad eas affectiones, quibus excoactione opus est, foris admotum: nam intra corpus ob nimiatum virium vehementiam sumi nullo modo potest.

Alcyonia extergunt omnia, atque digerunt: habentque acrem qualitatem, & calidam facultatem, sed non paulo maiorem vel minorem, & in his ipsis, quæ diximus, pro totius essentia tenuitate.

Ex Xenocrate, quæ buccina & purpuræ emplastri modo inuant.

Cap. 3.

Huius capituli principium desideratur, medium imperfectum est, & finis non extat.

* * *

illitæ vero maculas, quæ mulierū ora deturpant, detrahūt, & detergūt. malagmatis vero modo impositæ, ad testium tumores tollēdos, & tophos minuēdos sunt accommodatissime. itēq; ad eos, in quibus iam humores sunt, aut futuri sunt. * & ad omne abscessus, & tuberculi genus. ergo si inungantur, scrotum cōtrahunt, abscessūsque ad diuisionē apti, absq; euidēti sensu digerūtur. sed efficacius est id, quod habet hoc modo. Argēti spumæ drach. 106. cineris buccinarum drach. 17. olei veteris ciath. 30. cerussæ drach. 20. resinæ terebinthinæ drach. 13. thuris drach. 8. aquæ cyath. 4. Argēti spumā, cerussam, buccinas, & thus singillatim leuigato in mortario
tuny

tum aqua & oleo affusis diligenter omnia commisceto, & conficato, & in olla noua decoquito continenter rudicula comiscēs, ne aduratur. vbi semicocta hæc videbis. resinā, deinde thus adicito. & ad probā cōsistentiā, non tamē ad multā duritiē coques. postremo loco cinerē iniicies. vbi paululū ferbuerit, ollā ab igni auferes, & medicamētū exceptū ad vsum seruato, & recōdito. Hoc præter omniū opinionē facit tum ad supradicta, tum vel maxime ad maligna vlcera, & depascētia, & quæ egre sanescūt. Egdē buccinæ ex melle ad parotidas faciūt, quæ etiā māmās obsideant. idēque præstant ex aqua illitæ. valent etiam ad capitis vlcuscula dēsa, rubra, paruis mammis similia. quæ faui nominantur. magnæ quoque & duræ purpurę idem, quod buccinę, præstant.

* * *

Si enim solo auxilio simplicium medicamentorum omnes affectiones, quæ præter naturam nobis accidunt, curare possemus, profecto compositis medicinis nunquam indiguissemus. nunc vero non ita res est: sed sæpenumero simplex medicamentum ad nullam rem est vtile: siquæ excalfacere corpus velimus, nullum tale nobis simplex superpetet. Est autem vnus compositorum medicamentorum vsus, cum ex iis, quæ sunt eiusdem generis, vehemens molli comiscemus, vbi nobis medium desit: alius est ex miltione eorum, quæ sunt generis diuersi: quæ apta ratione conficitur. Raro enim affectionem inuenias, quæ vel digerentia, vel repellentia solum postulet, idcirco fit, vt sæpenumero, idque statim inter initia, omnino vero paulo post, aliquid digerens comiscere cogamur. Si vero etiā vehemens dolor adsit, mitigātia indemus. ac medicamenta quidem, quæ ad vsus quāplurimos valent, sunt quæ præstantissima, contrarias facultates in se continēt. at nonnulla ex simplicibus, ne ad vsum quidem perducī sine alterius cuiuspiam admisione possunt: veluti cum medicamentum parandum est, quod agglutinandi vim habeat.

Cætera periere.

FINIS LIBRI DECIMI QVINTI.

ORIBASII MEDICI-
NALIVM COLLE-
CTORVM,
LIBER XXIIII.

In quo habetur totius humani corpo-
ris dissectio.

Ioanne Bap. Rafario Nouariensi medico interprete.

*Ex Galeni commentariis, de cerebro, atque eius
membranis.* Cap. 1.



Cerebrum diligenter, commodéque nudá-
dum in primis est: quod ubi feceris, mem-
branam duram iuxta mediam ipsius lon-
gitudinem multo crassioré videbis, atque
ita ad aliquem locum vsque descendente,
qua potissimum parte media caluariæ su-
turarum habetur. eodémque modo sub sutura Labdoide
crassam membranam duplici plexu firmatam simul, & cere-
brum aliquatenus ingredientem conspicias. venę quoque
per ipsam vtrinque singulæ iuxta suturæ labdoidis latera
excurrunt. ubi vero hæ in idem inter se conuenerint, is lo-
cus est fere altissimus eorum, qui in orbem circũiacent: nec
etiã æqualis ab eo tum anterior, tum posterior cerebri pars
existit, sed anterior est multo maior. verum ad id, quod ha-
betur elatissimum, accedit etiam altera crassæ membranæ
conduplicatio, vt aliarum partium omnium, quæ cerebrum
in orbem comprehendunt, crassitie quadrupla esse videat-
ur. quinetiam tertia alia vena præter duas antedictas, per
longitudinem porrigitur, in anteriora excurrés. quid enim
aliud, quam venam appellabis eiusmodi, quo sanguinem cõ-
tineri appareat? Videbis autem ipsas cauitates non habere
venę tunicam, quæ simul per ossa capitis ascendat: sed cum
primum venæ caluariam attingunt, crassam membranã ibi-
dem duplicari, internámque regionem instar fistulæ sinuatã
in

in vasis formam, sanguinem recipere, & qualem acceperit, conseruare. vbi vero duę venę inuicem congregiuntur, eam regionem Herophilus $\lambda\eta\nu\acute{o}\nu$, hoc est torcular nominauit. ea porro, quā ipse sic vocat, magis profunda, altera vero venarum exiguarū torculari incumbentiū congressio in superficie est sita: quę prope crassam membranā non secus est facta. ceterum hic processus in ea parte oritur, vbi futura labdoides squamatis ossibus cōnectitur. At tenuis membrana stabilit simul, ac tegit cerebrū, & præterea vasa quę in ipso sunt, ligat omnia. Est autē similis secundis fœtuum, & animalis mesaræo: siquidem vtrunque horum ex multis arteriis, atque venis sibi ipsis propinquis, & membrana tenui intermedia spatia contexente factum est. ad eundemque modum membrana omnes cerebri arterias, & venas connectit: eaque non modo cerebrum complectitur, verum etiam in profundum eius sese insinuat, ac in omnes partes peruadit, totūque pertexit, ac quoquo versus se ad internam vsque ventriculorum capacitatem extendit. Est etiam cerebri tegumentum crassa membrana: aut potius non simpliciter tegumentum nominari debet, sed quoddam veluti propugnaculum propulsandis caluarie offensionibus obiectū. at tenuis membrana innatum eius operimentum est. Crassa enim ab eo seiuncta est, tantum vasculis excidentibus cohærens. itaque tenuis mēbrana prius, deinde vero dura, fuit locata: quę quāto ossē est mollior, tanto est tenui durior: quanto vero tenuis est hac mollior, tanto cerebrum est tenui mollius, quibus quidem sit rebus, vt choroides membrana innatum cerebri operimentum sit: vt in animali corium. huius præterea crassa nō est illa quidem innatū operimentum, sed multis tamen locis adherescit. ipsius rursus crassę integumentum est os, extrinsecus circumdatum, quod $\kappa\rho\acute{\alpha}\nu\iota\omicron\nu$ appellant, quod quasi $\kappa\rho\acute{\alpha}\nu\omicron\varsigma$, hoc est galea quædam superiaceat. sed cum natura connatam cranio membranā facere non posset, multa vincula ad eius securitatem est machinata. quęnam in quā hæc sunt vincula? ab ipsa membrana exoriuntur tenues mēbranę quædam. viæ autem, vt foras erūpant, futurę capitis sunt. Hęc enim vincula extenduntur, singula versum cranij partē sibi directam, vnde originē traxerūt, atque inde progressa sibi mutuo concurrunt, & decussantur, & coalescunt, & plene in vnum conducuntur, communemque ex se ipsis

omnibus membranam procreant, quæ *περικράνιος* nominatur. hæcque ipsa crassa membrana craniū succingit, ac cerebrum dilatando tum accedit, tum recedit, in media regione, quæ inanis est. ipsum vero cerebrum substantia est nervis simillimū, quorum erat futurum principium: nisi quod illis est mollius, ac mollius quidem anterius, durius vero posterius, quod *ἐγκράνιον*, καὶ *περιγκεφαλίδα* anatomici nūcupant: quæ dura membrana duplicata dirimuntur, & per solum meatum, qui sub capitis vertice est, ac per corpora meatum ipsum ambientia coniunguntur. Ventriculi autem cerebri duo sunt anteriores inspirationem, expirationemque, & efflationem ex cerebro facientes: quod alibi demonstrauimus. Vbi etiam probatum à nobis est, eosdem prius conficere, ac præparare spiritum animale cerebro, & etiam infernis eius partibus, quæ ad nares spectant, olfaciendi instrumentum esse, & simul veluti ductus & canalis ad excrementorum effluxionem accommodati vicem præstare. vnus autem ventriculus in ceribello est, qui spiritum animale in anterioribus ventriculis confectum transmittit. quam ob rem vnum meatum ab iis ventriculis in hunc pertinere fuit necesse. quocirca meatus, qui ab anterioribus ventriculis in ipsum prorumpit, maximus conspicitur: per quem solum parécephalis est cum cerebro connexa, sic enim vtranque partem appellare Herophilus consuevit: & posteriorem partem *περιγκεφαλίδα* vocat. Cum igitur cerebrum, vt ante diximus, à parécephalide crassæ membranæ duplicatione sit diremptum, ipsumque oporteat aliqua ex parte illi coniungi, vt antedictum meatū generaret, in vnum prius locū vtroque ventriculos terminauit: quem etiā quartū totius cerebri ventriculum aliqui anatomici vocant. ex hac nanque cavitate profectus meatus, spiritumque ea contentum excipiens, parencephalidi transmittit. pars autem cerebri, quæ supra cavitatem est, veluti domus tectum quoddam in cauæ spheræ superficiē circumacta nō immerito videtur appellata *καμάριον* καὶ *ψαλλιδιοειδές*, quod huius generis ædificia architecti *καμάρας*, καὶ *ψαλλίδας*, hoc est restudines, & fornices solent nominare. Corpus vero hoc, quod ad principium meatus est situm, qui ventriculum medium cum posteriore cerebro coniungit, quod ab anatomicis *κωνάριον* appellatur, substantia quidē est glandula: figura autē est cono persimile: vnde ei nomen

nomen est ductū. hancque glandulā cono similē, magnæ venæ diuisionem opplentem, à qua omnes fere, qui in anterioribus ventriculis sunt, plexus choroides conflatur, in eundē vsum, in quem reliquæ glandulæ venarum diuisionem firmantes, factam fuisse arbitror. Epiphysis vero quæ per totū meatum extenditur vermi similis, spiritus transitui præest, ac dominatur: cuius sane positio, & natura, & communio cum vicinis partibus, sic habet. Ex vtraque meatus parte tenues, ac prælongæ sunt cerebri eminentiæ, quæ *γαστήρ*, hoc est paruæ nates appellantur: quarū concursus, hominū femoribus inter se coniunctis præcipue cōparares. sunt etiā qui *Διδυμῶν*, id est testiculis eas assimilent, & didymia nominēt.

Nonnulli vero corpora conario vicina vocant didymia, quæ vero deinceps sequuntur, glutia. sinistræ igitur, dextræque meatus partes, horum ipsorum sunt corpora: superiores vero à tenui quadam membrana, non tamen imbecilla operiantur, quæ vtrinque glutis coniungitur. quæ quidem membrana ad posteriorem vsque ventriculū exporrecta, finis inferior est epiphyscos vermi similis: quæ nihil habet didymis, & glutis simile. etenim ipsa varie articulata est, hæc autem vbique sunt similia: sed non vbique composita. nam præterquam quod varie articulata hæc epiphysis est, videturque ex quamplurimis particulis per tenues membranas connexis composita, id quoque habet præcipuum, vt connexa eius, ac tenuis sit ad ventriculum posteriorem extremitas: quo loco in superiacentem membranam desinere eam diximus. Inde autem aucta paulatim, atque amplificata, dorsum habet glutiorum distantie propemodum æquale. quam ob rem longa secūdum meatum exporrecta, ipsum totum perfecte obstruit: retro autem in orbem reflexa, membranā suis conuexis partibus connatam simul ita abstrahit: totūque meatum tantum aperit, quātum ipsa retro cesserit. Cū enim reflectendo in sphaeræ modum fiat rotunda, & in seipsa cōsistat, quantum minuitur longitudo, tantum latitudo adaugetur. Quocirca consentaneum est, vt ea paululum reflexa, & ideo paulo magis amplificata, fines eius inferiores in solas meatus partes, quæ ad basim sunt, quæ angustissimæ sunt, ingredi nequaquam possint: at si fiat maior refractio, & ob id latitudo augeatur, maior etiā meatus porio aperiat: quoniā semper tantum aperitur, quātū con-

L I B E R

uexitas in ipsum ingressura continuo minuitur. Natura autem eam dorsis glutiorum ligamentis adnexuit: quæ diffractionū periti vocant tendones. à quibus utrinque constricta, & coercita sic continetur, ut errare non possit. Perro natura magnā curam adhibuit, ut excrementa cerebri excremantur. cum enim eorū sit duplex genus, ut alia sint tanquā vaporosa & fumosa, quæ suapte natura in sublime feruntur, alia vero tanquam aquosa, & limosa, quæ suo impetu deorsum feruntur, duplices quoque ipsorū excretioni meatus adhibuit: atque eos quidem, qui leuia excrementa erant vacuaturi, in altum adduxit: qui vero grauia, & deorsum repentia, decliues effecit. Caput enim omnibus corporis partibus veluti testum quoddam calidæ domui est superpositum. idcirco fit, ut cum omnia, quæ à partibus subiectis sursum efferuntur, fuliginosa, ac vaporosa excrementa caput excipiat, ei multas transpirationes natura machinata sit. simul quidē os capitis efficiens fistulosum, simul etiam futuris, quas vocant, varie coarticulatum: per quas vaporosorū, & fumosorum excretiones fierent, quæ nec semper perspicue cerni possunt, nec cum in toto corpore, nec cum in capite fiunt, ut pote quæ præ tenuitate interdum nos lateant. Cæterum decliues cerebri meatus tum per palatum in os, tum per nares conspicuis, magnisque orificiis sensui manifesta, crassaq; excrementa eructant. Ac duorū quidē meatuū, qui in nares pertinent, fabrica est huiusmodi. Ipsa dura membrana quæ cerebrum contegit, instar cribri est perforata: atque etiā magis varie perforata sunt ossa, quæ sunt ei præposita, & quemadmodum spongiæ, neque recta sibi ipsi meatus respondent, neque recti plane sunt omnes: sed plerique sunt tortuosi, atque anfractibus pleni, ut alia quædam longa circuitio, longūque error prius conficiendus sit ei, quod per eos ad cerebrum sit peruenturum. quam ob rem fit, ut neque aliud quidpiā durum corpus extrinsecus cerebro incidat, neque aer trigidus nobis inspirantibus recta in cerebri ventriculos sese sincerus insinuet. Postquā autem scmel hæc propugnacula spongiis similia, quæ ab anatomicis à cribri similitudine *σπογγία* vocatur, tutelę ipsius cerebri causa extiterunt, etiam transpirationem per ipsa perfici necesse fuit. nam per inspirationem odorū sit dignotio, per expirationē

vero

vero excre
petus moti
per se non
bus meatib
medij cerebri
emerge quid
necesse, sed ad
nam vero in
pauis virosq;
peruū est circu
pioratus de
fiterz simile,
nem excipit c
no increment
piorum insiru
ne meatus ex
plum nonnull
remaneat: quæ
aliam rsum per
necesse, infun dū
tūte sensibilem
in hoc cerebro
in m adueni
tūte, ergo pos
tūte constituit
tūte omnium, q
ne complectens
tūtegens. tot
tūtecur: est qu
in plicatorum t
tūteali autē tū
tūteones alterius t
tūteum viliū
tūteconnexa int
tūteconsequant
tūte. sed maxie
tūteferiam ad cr
tūteplexui sub
tūtein colūm, a
tūtealiquam autē

vero excrementorum expulsio. in huiusmodi actionibus im-
petus motionis ipsius spiritus, multa eorum quę pertransire
per se non possunt, vna secum attrahit. Ex aliis vero duo-
bus meatibus, qui ad palatum perueniunt, alter ex profundo
medij cerebri ventriculi profectus, fertur deorsum: alter vero
emergeat quidem à meatu, qui cerebrum parencephalidi con-
nectit, sed ad cerebrum deorsum obliquus fertur. Cum pri-
mum vero in idem inter se conuenerint, locus quidam com-
munis utrosque excipit cauus, ac decliuus, cuius labrum su-
pernū est circulus absolutus. inde autē semper magis ac ma-
gis arctatus descendens in subiectum adenē inseritur amplæ
sphæræ similē, qui manifestā ipse quoque cavitatē habet. hūc
autem excipit os, cribro cuidam simile, per quod via crasso-
rum incrementorum in palatum est facta. Vtilitas vero sin-
gulorum instrumentorum, quę viæ ipsi insunt, est cavitās,
quę meatus excipit: quam nonnulli à figura $\pi\tau\epsilon\lambda\omicron\nu$, hoc est
peluum, nonnulli vero ab usu $\chi\omicron\alpha\upsilon\nu$, hoc est infundibulum
nominant: quę supernis quidem partibus quasi cisternę cu-
iusdam vsum præbet, infernis autem, vt etiam nomen ipsum
indicat, infundibulum imitatur: parte autem decliuū meatum
habet sensibilem vsque ad ventriculum adenis. Quoniā au-
tem hoc cerebro superne coniungi oportebat, inferne au-
tem in adenem inseri, iure factum est, vt membranosum ex-
titerit. ergo portio membranę tenuis protensa hoc corpus
peluis constituit, quem vero plexum retiformem vocāt, ma-
xime omnium, quę illic sunt, admirabilem, ibi est constitu-
tus complectens in orbe adenem ipsum, & retro longissime
pertingens. toti enim propemodum cerebri basi hic plexus
subiicitur: estque non simplex rete, sed eiusmodi, vt si vulga-
ria piscatorum retia plura alia aliis accumulata superiicias.
Naturali autē huic reti hoc ipsum inest, vt alterius replica-
tiones alterius replicationibus sint connexę: neque ex eis se-
iunctum vllum capere queas, cum enim omnia continua se-
rie connexa inter se sint, efficitur, vt id vnum, quod ceperis,
alia consequantur. non est autem ex quauis materia con-
fectum, sed maximam portionem earum arteriarum, quę à cor-
de sursum ad caput feruntur, natura materiam huic admi-
rabili plexui subiecit. nam exiguę propagines quædam ab ip-
sis in collum, ac faciem, partēsque externas capitis abierunt:
reliquum autem omne, vt à principio fuit, recta per thora-

tem & collum sublimē ad caput fertur: excipitque amice, quæ ea parte est, cranij portio: & aperto in se foramine intra caput sine molestia deducit. excepisset autem & crassa membrana, eratque iam perforata recta ad illarum impetū: & opinari ex iis omnibus quispiam potuisset, ipsas ad cerebrum properare, sed non ita erat. nam cranium prætergressæ medio inter hoc, & crassam membranam loco primum quidem in longas admodumque exiles arterias diuiduntur, deinde vero pars earum in capitis anteriora, alię in posteriora, aliæ ad lauam, aliæ ad dextram inter se mutuo complexæ feruntur, vt aliam de se opinionem faciant, quasi itineris ad cerebrum oblitę videantur. veruntamen non ita se res habet, nam rursus ex multis illis arteriis, velut radicibus in truncum coalescentibus, alia coniugatio arteriarum nascitur, ei, quæ initio à corde sursum ferebatur, æqualis: atque eo modo per crassę membranę foramina ad cerebrum subit. Cæterum quoddam tandem hoc miraculum fit, dictum est ante, quam sapissime. Vbi enim natura diligenter materiam conficere vult, diuturnam ei moram in cōfectionis instrumētis parat. quocirca cū spiritus animalis qui in cerebro est magis exquisita indigeret cōfectione, plexum retiformem natura flexuosiorē effecit. Totum enim cerebrum iis arteriis mulsariam diuisis est pertextum: & multę ipsarum diuisiones in eius ventriculos desinunt, vt etiam venarum ex vertice ipsius descendentiū. ex oppositis enim locis arteriis occurrunt, & in omnes eodem modo cerebri partes, atque adeo in ventriculos distribuuntur. ac superuacanea quidem excernunt, sanguinem vero cōtinent: quemadmodum arterię spiritum maxime omnium respirant: qui longo tempore in eis contentus, ac cōfectus in cerebri ventriculos incidit. Atque à corde sursum per thoracem, ac totum collum venas & arterias vsque ad caput natura perduxit, inde arterias ad retiformem plexum, vt diximus: venas autem ad summum capitis verticem intra cranium perduxit: vbi crassa mēbrana duplicata intra se ipsam mediam venas recipit.

De cerebri diminutione.

Cap. 2.

Cerebri imminutio, quemadmodum Hippocrates auctor est, in caluescentibus efficitur. vt ossa sincipitis fistulosa, tenuioraque ceteris, & superadiacētia ob cerebri diminutionem

ctionem exarescant : cum ad ea vsque cerebrum non perti-
neat, neque ea possit attingere. subsidet enim, & depressum
in suam basim concidit. his autem ossibus resiccatis conse-
quitur, vt ipsa quoque prætentæ cutis inarescat: quæ quidem
in caluis vel ipsi sensui mirum in modum sicca apparet. cum
igitur cerebrum valde siccum factum est, vt quibusdam in
extrema senectute cõtigit, tunc etiam neruorum exortus in-
arescere est necesse. quam ob rem, neque perinde vident, ac
prius, neque audiunt, neque aliud quicquam aut sensibus, aut
motibus, qui à voluntate proficiscuntur, valenter perficiunt:
sed omnia earum actionum instrumenta, per quæ prius fie-
bant, exoluta, infirma, debiliâque redduntur.

De spinali medulla. Cap. 3.

Spinalis medulla duas mēbranas habet, crassam & tenuem,
à membranis cerebrum contegentibus exortas. quibus est et-
iam coniuncta. sed his tertium corpus extrinsecus est obdu-
ctum, veluti operimētum quoddam, & propugnaculum me-
dullæ ipsius, quod initium exortus à capitis coronis ducit. e-
ius natura eadem est cum natura ligamentorum: * quate-
nus ex ossē, perinde ac ligamentum, est confectum: quan-
quam hoc colligat quodammodo totam faciem in corpus
pertinens duplicatum intermediis earum regionibus. simile
porro est tum crassitudine, tum colore, tum durtia, crassæ
mēbranæ. sectum vero hoc ligamentum, siue per longitudi-
nem, siue per latitudinem, siue vtroque modo, nihil noxæ a-
nimanti affert: quemadmodum etiam, si dura membrana se-
cetur, nullum detrimentum animal sentiet. quin etiam si me-
dullam ipsam spinalem per longitudinem secueris, nihil
damni inuehis. vterque enim nervus, qui ex coniugatione
oritur ex spinali medulla, obliquus per vertebrarum com-
pages exoritur, vt dexter in dextram, sinister in sinistram
partem vergat. sin autem sectio oblique adhibeatur, tum
animalis partes motu priuantur, quæcunque principium
neruorum in eas pertinentium habent infra spinalis me-
dullæ sectionem. idcirco fit, vt ex neruorum dissectione
facillime possis dignoscere, quanam affectiones ex cuius-
que partis medullæ spinalis sectione consequantur. nunc
vero tantummodo addam, si sectio in ea parte fiat, quæ est
inter caput & primam spinalis medullæ vertebram media,

O iiij

qua membrana finem posterioris cerebri ventriculi contē-
gēs inciditur, animal statim totius corporis vires, & sensum
amittere, quam etiam partem in tauris ab iis, qui boues im-
molant, videmus præcidi. At sectio, quæ post primam verte-
bram fit, eadem inducit symptomata, non quia solum eum
ventriculum contingat, sed etiam quia & artus omnes ani-
mantis dissolvit, & omnem præterea respirationem adimit.
Idem quoque eveniet, si eam quæ est post secundam, tertiam-
que, & quartam vertebra secueris: si modo eam ita diligen-
ter præcidas, ut nervum qui in eius compage est, & ad quin-
tam usque vertebra propagatur, incidas: sed colli initiū ani-
malibus ita dissectis movetur. at sectione quæ in spina post
quintam vertebra fit, cum ceteræ pectoris partes dissolvun-
tur, tum vero septum transversum ferme innocuum servatur.
& excelsi muscoli parum quippiā offenduntur: at quæ post
sextam fit, superiores quidem pectoris musculos pari modo
lædit, septum vero transversum minus, quam ea, quam modo
diximus, quæ deinde post septimam, atque etiam magis quæ
post octavam, nullam omnino fert motioni septi transversi
noxam. & sublimium musculorum, & colli etiam totius mo-
tui nihil fere nocet: at musculorum intercostalium aufertur
motus omnis, facta in omnibus colli vertebra sectione, &
quemadmodū facta spinalis medullæ sectione post primam
colli vertebra, totius thoracis motus amittitur: ita etiam
omnis intercostalium musculorum actio deperditur, omni-
no vero paululum eius servatur, facta in secundo intercosta-
li sectione, atque ita pro portione deinceps semper fit, ut in-
tercostales muscoli qui supra sectionem sunt, actionē suam
obeant, inferiores vero resolvantur.

De oculis. Cap. 4.

In utrumque oculum productiones à cerebro immittun-
tur: quæ dum per ossa transeunt, compactæ quidem sunt, quo
ab iniuriis sint tutiores, sed cum primū ad oculos ipsos per-
venerint, solutæ iterum atque amplificatæ, & in orbem, in-
star tunice, humorem vitreum complexæ, in crystallinum
humorem inseruntur: qui quidem crystallinus humor est pri-
mum videndi instrumentum, isque albus, splendens, clarus,
& purus est factus: siquidem hac solum ratione futurum e-
rat, ut à coloribus immutaretur. at nutriri ab ipso sanguine
pla.

plane non licebat, vt qui multum ab eo qualitibus differ-
ret: sed alimentum quoddam familiarius postulabat. id quod
ei nimirum contigit: cōparatūque ei à natura fuit alimen-
tum accommodatum, humor vitreus, qui quanto crassior est
sanguine, & magis albus, tanto ipse à crySTALLINO tum crassi-
tate perspicuitate superatur. neutri autem horum humo-
rum vena est. ex quo perspicuum est, vtrumque per transsum-
ptionem nutriri, crySTALLINUM à vitreo, & vitreum à corpore
ipsum ambiente, quod ex cerebri portione superne descen-
dente conflatum est: idque nonnulli tunicam retiformem
vocant, quod figura sit reti similis. ceterum tunica non est,
nec colore, nec substantia: sed si exemptum ipsum seposue-
ris, & in vnum aceruum conieceris, tibi plane cerebri por-
tionem quandam exemptā videberis intueri. Est autem eius
utilitas prima quidem ac maxima, propter quā superne fuit
demissa, vt crySTALLINI humoris alterationes sentiat: præterea
vero, vt humori vitreo alimentum aduehat, & afferat: quip-
pe quæ arteriis ac venis multo pluribus, & quam suæ moli
conueniat, maioribus, plena conspicitur. Quinetiam ex ipsa
choroide tunica, quæ corpus hoc retiforme continet, tenues
quædam productiones, & araneis similes ad ipsum extensæ
ligamenta illi simul sunt, simulque alimentum afferunt. nam
& hæc ipsa choroides tunica plurima vasa habere in se to-
ta conspicitur. hanc igitur ipsam utilitatem hæc tunica præ-
bet: estque tunica re vera, & corporibus subiectis operimen-
tum, atque amiculum, & huic etiam tunicæ principium est
membrana tenuis, quæ cerebrum ambit. Cūque insertio
prædicta in medium humorem crySTALLINUM, qui rotundus
est, ex omni parte sit facta, absolutus circulus necessario est
confectus, qui certe maximus in crySTALLINO est, & ipsum in
duo distribuit, ad eundem hunc circulum consentaneum e-
rat, humorem vitreum motu vltiore inhibere. quocirca
medius vehitur in ipso crySTALLINUS, tanquam semisecta quæ-
dam sphaera in aqua. Atque etiam parte alia interna, quæ est
velut ipsius crySTALLINI hemisphaerion, securitatis gratia ea
coniunxit vnus circulus, quem ante diximus maximum esse
eorem, qui in crySTALLINO insunt: estque terminus vtriusque
communis, ligamentūque his ipsis, & præterea corpori re-
tiformi, & quarto choroide tunicæ efficitur. hæc enim tuni-
ca inter ea est robustissima, & quæ ipsa stabilire maxime

queat, & tegere : sed quemadmodum ad illa tuenda satis firma erat, ita ad se ipsam tuendam non erat satis : & circumiacentium ossium duritiam ferre citra noxam non poterat. ut igitur in cerebro, ita hic quoque à crassa membrana circumuehitur, distatque sane hæc tunica ab ea in omnibus partibus, solisque vasorum productionibus ipsi connexa, in eo tamen circulo prædicto, qui in crySTALLINO inest, coniungitur : & quinta præter quatuor antedictas, in vno hoc loco hæc est coniunctio, quæ subiectis omnibus commoditatem non mediocrem affert. dura igitur membrana toti choroidi est applicata, hæcque rursus retiformi, & crySTALLINO : illi quidem per ipsum totum, huic autem per solam iridem. itaque per corpora media humor vitreus tunicæ omnium extimæ coniunctus est, mollissimæ durissimus. huic eidem circulo sexta quædam tunica extrinsecus prope accedit in durâ tunicam inserta, in qua musculorum oculos mouentium aponeuroses sunt. Septima autem præter has alia est periostrij insertio : quæ simul totum oculum cum ossibus colligat, simul autem mouentes ipsum musculos tegit. Quin tibi membranam hanc etiam ante dissectionem licet intueri, albam sane, prout etiam cernitur, desinentem vero in circulo, ubi & aliæ omnes subiectæ sunt, & ubi album nigro coniungitur, qui sane locus iris nominatur, eamque nonnulli coronâ vocant. si hæc probe diuideris, & nihil confundens consideraris, circulos septem videbis, sibi ipsis deinceps insidentes, crassitie tamen, coloræque discrepantes, ut ne, si velis quidē, hunc locum aliter quam irim, queas appellare. Ad mediam igitur usque humoris crySTALLINI regionem septem circulos sibi ipsis illic incumbentes, ac coherentes oratione iam perduximus. quod autem id sequitur, maxime admiraberis. ut enim crySTALLINUS humor propria sensibilia exquisite sentiret, simulque tuto conseruaretur : corneam tunicam valde crassam & minus densam, quam vsus postulabat, densiorem simul, ac tenuiorē natura cœpit producere, tum paulatim promouens, partem eius maxime mediam longe tenuissimam, ac densissimam effecit, ac tibi quidem cornibus in tenues partes dissectis similis apte videbitur. vnde etiam ei nomen à cornu similitudine conuenire existimantes, corneam tunicam appellauerunt. hæc igitur cornea tunica tenuis, dura, & valde densa facta, protinus utique splendida erat futura : cuius-

iufmodi ad splendorem transmittendum effe poffet oppor-
 tuniffima non fecus, quam cornua accurate derafa, atque ex-
 tenuata. Choroidem vero tunicam, quæ à tenui membrana
 producitur, natura multis partibus nigram, multis fufcam,
 multisque cœruleam effecit. eamque ab iride vna cum cor-
 nea promouit: cum vt corneam fua vicinitate aleret, tum vt
 prohiberet ne cornea, quæ dura eft, humori cryftallino inci-
 deret, ac denique fpectaculum foret, quod afpectui laboran-
 ti remedio effet. quod in caufa eft, vt ego quidem puto, vt
 omnes, cum lucis splendore offendimur, natura ducti palpe-
 bras repente claudamus, ad innatum nobis remedium pro-
 perantes. Atque ego quidem non poffum non vehementer
 admirari hūc cœruleum colorem, quo hæc tunica tinfta eft.
 nec minus eo admiror afperitatem, quæ intus à tunica hu-
 morem vitreum contētura nutritur, cum enim hæc humida,
 ac mollis inftar fpongiæ fit, humorem cryftallinum contin-
 gens, totius tunicæ vicinitatem ipfi innoxiam præftat: quo
 adhuc multo magis externam eius denfitatem demiror, qua
 duram tunicam corneam contingit, ne ipfa à cornea quic-
 quam læderetur. fed præterea magis admirabile eft tunicæ
 huius foramen ad pupillam. ibi enim tunicam cœruleam v-
 ueam, quam ita appellant, opinor, acino vix læuitatem eius
 externam, & afperitatem internam comparantes, pertudit. &
 qua duntaxat hoc foramen eft, nulla tunica alia eft inter cor-
 neam & cryftallinum media: fed veluti per cornu tenue ad-
 modum, atque album fplendor internus cum externo com-
 municat, & commifcetur. Et ne per hoc foramen cornea tu-
 nica aliquando cryftallinum humorem contingeret, opifex
 nofter prouidit, fimul portionem hanc corneæ foras lōgius
 abducens, fimul autem humorem quendam tenuem & fince-
 rum, qualis in ouis cernitur, cryftallino circumfundens, ac ter-
 tio præter hæc, fpiritu ætherio ac fplendido omnem pupillæ
 implens regionem. de quo quidem fpiritu in commentariis
 de afpectu fatis diximus: & quam lucidus fit, & quam maxi-
 mum, præcipuūque ad oculorum actionem momētum af-
 ferat, demonftrauimus. de humore vero ex his poteris intel-
 ligere, cum non modo ad implendum inane fpatium, verum
 etiam ne humor cryftallinus, ac portio vix interna exficce-
 tur, maxime neceffariū effe: fi tamen prius percipias, in com-
 punctionibus ex copiofiore eius euacuatione, oculos læ-

L I B E R

di: & affectionem, quæ glaucedo à medicis nominatur, esse siccitatem, ac nimiam humoris crySTALLINI concretionem, & cæcitatem maxime, præ omnibus morbis, qui oculis accidunt. inferre. Atque hæc quidem omnia admirabilem quandam providentiam arguunt: & eorum maxime innatū crySTALLINI humoris amiculum, nam ea tunica est tenuibus araneis tenuior, atque candidior: & quod etiam maius est, non est toti humori crySTALLINO prætensa, sed quæ eius pars vitreo humori coniungitur, prorsus sine munimento est, ac tunicæ expers. ea enim parte humores coniungi inter se erat melius: quæ vero eius pars omnis extra prominet, tangitque vucam, tenuem hanc, lucidamque tunicam est induta: atque etiam ipsius pupillæ imago in ea, veluti in speculo quodam consistit: siquidem tunica hæc lævis est, & supra omnia specula fulgens, atque ita videndi instrumentum ex omni parte à natura fuit exornatum. Nervos autem sensificos à cerebro ad oculos descendentes natura prius intra cranium coniungēs ac reflectens, ipsorumque meatus exiguos uniens, & figuram X literæ similem faciens, postea vtrunque rursus ad supernæ rectitudinis productionem ad oculum produxit: ut spiritus, qui à cerebro ad vtrunque oculum proficiscitur, si quando eorum alter clausus fuerit, aut omnino mutilus, in alterū plane commearet. videndi enim facultate eo modo duplicata, acrius erat visurus.

De naso.

Cap. 5.

Cum nasus in medio septum, duoque foramina satis conspicua habeat, quæ cernuntur, & in singulis naribus singula, scire convenit, eorum vtrunque supra media nasi loca in duas partes esse diuisum: quarū altera pars intima oris excipit, altera recta, ut à principio ferebatur, ad cerebrum conscendit. vbi sunt exortus anteriorum cerebri ventriculorum, quæ etiam parte ossium coli similium est situs. membrana autem crassa, quæ ossibus hisce subternitur, minutis est foraminibus traiecta: per quam primam cerebri excrementa crassiora transmittuntur, ut mucus & destillatio primum per crassam membranam, egressæ, postea vero per ossa coli similia traiectæ, denique in ipsas nares incidunt. sed dū hæc ita destuunt, pars eorum in os per ea foramina, quæ à naribus in ipsum

diximus

diximus pertransire, quandoque delabuntur: nasi autem foraminibus, quæ & recta sunt, & ad ossa colo similia ascendunt, itémque iis quæ obliqua sunt, & in ipsum os desinere diximus, tunica exanguis crassior, quàm membrana, subternitur: quæ ei tunicæ continua est, quæ totam oris circumferentiam internam, linguamque, & fauces, & larynga, & asperam arteriam, & gulam complectitur. Facta autè in ore perforatio in palato est, ne principium inspirationis recta ad asperam arteriam fieret: sed deflectio quædam esset, ac veluti ambages prius quam spiritus ad arteriam perueniret. ne cum ambiens nos aer nimis sit frigidus, pulmo aliquo tēpore refrigeraretur: & ne admixtæ moles pulueris, aut cineris, aut alterius eiusmodi ad arteriâ usque peruenirent, sed in illis flexibus corporibus humidis & mollibus prius inciderent.

De odoratus instrumento.

Cap. 6.

Odoratus autem instrumentum, quo res, quæ sub odoratum cadunt, diiudicamus, primo quoque intuitu nasus esse videbitur, ac cum ore quidem inspiramus, nasumque obturamus, nullum odorem sentimus: cum primum vero naribus apertis spiritum trahimus, sentimus. nulla vero fieri videtur odorum dignotio sine inspiratione. etiam si quandoque nares vapore, qui vehementissimam vim habeat, expleantur. ex quo fit, ut si quis in parua domo suffitum ex bitumine, aut casia faciat, eamque vehementissimo odore repleat, deinde ingrediens eundem naribus excipiat, & attrahere per longum temporis spatium conetur, huiusce rei veritatem intelligat. Siquidem eo tantum tempore odorem percipiet, quo spiritum attrahet: reliquo vero, nullum sentiet: quanquam nares vapore sunt repletæ. quam ob rem alia corporis pars esse videtur, quæ odores dignoscit: eaque interius in corpore constituta, & consentaneum est, odorum sensum in anterioribus cerebri fieri vetriculis. cum tota respiratio à cerebro fiat, ut modus caloris, qui in corpore est, cōferuetur, cōsentaneum est, ipsū, prius quàm hoc ei à cerebro tribuatur, statim lædi, cum immoderatus sit redditum aut à calfacientibus, aut à refrigerantibus, quomodo igitur natura ad hæc motum aliquem non dedit, qui ei esset ingentus, qui in inspirationibus ventileret, & cōstringeret, in expirationibus vero efflueret quādoque spiritum

L I B E R

flammeum, mucumque & pituitam, ac talis perspicue videtur esse motus, qui in cerebro conficitur: quem sane motum in infantibus, & iis, qui educantur, persentiscimus: qui quidem motus ei & natura, & semper inest. sed alter quoque accedit, qui euidenter in omnibus animantibus conspicitur. nam incisus capitis ossibus, videmus motum edi, dum filetur, pulsanter eodem rhythmo, quo & arteriæ, & cor pulsanter: dum clamatur vero, exeri, & exsufflari totum cerebrum. id quod mihi videtur contingere propter nimium calorem vocis elatione accensum, & propter materias ad superna detrusas. ergo cerebrum cordis curam gerit, sed prius sibi ipsum prouidet: cum pulmonem causa cordis deducat, & suos ventriculos causa sui ipsius aperiat. quibus sane ventriculis aërem ex naribus trahit: ex thorace vero, ex arteria aspera, & faucibus, quem etiam aër extrinsecus necessario consequitur. quibus quidem fit rebus, vt à nobis inuentum sit, & respirationem cerebri, & odorum instrumentum esse cerebri ventriculos. & præsertim eorum fines inferiores, qui vicini sunt iis ossibus, quæ colo similia nominantur.

De auribus.

Cap. 7.

Instrumentum sensus auditus est eiusmodi, vt in ipso primum meatus qui est in osse lapidoso inuolucrum habeat: ne quid eorum, quæ extrinsecus incidunt, ei noceat: postea vero quemadmodum superciliorum pilos supra oculos natura constituit, qui prius, siquid à capite in ipsos deflueret, exciperent, eodem modo voluit aures auditui præponere: quæ non solum prohiberent, sed aliquid etiam afferre simul possent.

De lingua, de quæ iis, quæ ei sunt adnata.

Cap.

8.

Hoc caput fortasse sumptum est ex libro, quem de voce Galenus conscripsit, qui nunc desideratur: est quæ id tot mēdis refertum, vt elici verus sensus non queat.

Linguae continua sunt ea, quæ tota oris amplitudine ad fauces vsque continentur, isque processus & gulam, & asperam arte-

V I G

ram arteriam
que diximus,
pharyngis, gul
et lingue par
interne, non
vinculum,
quod fact
sensum, lingu
necesse est, vt
ne absoluam
oris partes
et obliquis
dicuntur, mune
voni hac vasa
sunt. exor
que humor p
tunes inferiore
in orbem li
a cerebro
miles ferme vi
per tunica m
dictio ceteris
et linguam & a
nille accomme
amodendū faci
molebat, atque

De laryng

Corpus quod su
tum regione
leat, cum omni
ut idque frang
ut coactio, qu
quillissimus tran
et tribus magni
interior, qui etia
latus vero cau
mod & quæ voca
titudine nome

ram arteriam permeat: estque continuus cum iis omnibus, quæ diximus, & communis linguæ, oris totius, epiglottidis, pharyngis, gulæ, ventriculi, laryngis, atque arteriæ. Ceterum ea linguæ pars quæ in ore est, superne quidem tota videtur: at inferne, non tota, sed id solum ex ea cernitur, quod est extra vinculum, quod ex tunica eius exteriori cum gena efficitur. quod sane vinculum sæpenumero plus quam par est extensum, linguam multiplici motu cieri non sinit: quocirca necesse est, vt vinculum ipsum secemus, & linguam deligatione absoluamus: vt dissoluta ad palatum, & omnes obliquoque oris partes extrudatur. Ad hoc autem vinculum vtrinque ex obliquis partibus ora vasorum, quæ saliuam excipientia dicuntur, inuenies. in quæ descendere stylus posset. initiū ducunt hæc vasa ab radice linguæ, vbi eiusdem quoque glandulæ sunt. exoriuntur enim ex eis forma arteriis persimili: per quæ humor pituitosus comportatus & linguam ipsam, & partes inferiores, & item obliquoque, & denique omnes oris partes in orbem humectat. nam superiores partes habet meatus qui à cerebro descendunt, de quibus dicitur. Radix porro omnibus ferme vicinis corporibus coniungitur. atque etiā id fit per tunicam quæ ei est cum toto ore communis: cuius beneficio ceteris omnibus, quibus adnata est, vnitur. Nunc vero linguam & ad differendum, & ad dignotionem saporum esse accommodatam, inter omnes constat. eadē quoque ad mandendū facere videtur, cū cibos quo quispiā voluerit conuoluat, atque commutet.

De larynge, & epiglottide.

Cap. 9.

Corpus quod sub gena inferiore in media primarum colli partium regione constitutum est, & propensum in faciem videtur, cum omnes norunt, tum vero etiam larynga nominant. idque frangere pancratiastæ conantur, siquidem animalia eo fracto, quamprimū suffocantur: cum ob eam causam angustissimus transitus respirando aëri efficiatur. Larynx autē ex tribus magnis cartilaginibus constat: quarū maxima est anterior, quā etiā contingimus, extrinsecus quidem conuexa, intus vero caua, scuto maxime similis, quod prælōgius sit, quod θυρεὸν vocant: vnde huic cartilagini ab huius scuti similitudine nomen est impositum, vt thyreoides appelletur.

LIBER

Secunda vero cartilago quanto minor est hac, tanto est maior quam tertia, in partibus quidem internis, qua stomachus est, collocata: & quantum magna deficit, ut in circulum perfecte feratur, hæc adiicit. latera enim thyreoideos, quæ partes obliquas determinant, semper lateribus secundæ cartilaginis propinqua conspiciunt: & totam partem infernam infernæ per musculos cōiunctam. Superior vero utriusque cartilaginis pars ita ex aduerso constituta est, ut si duo scuta se se lateribus ita cōtingentia animo coniicias, ut media quædam regio relinquatur. Cum vero quatuor sint thyreoideos anguli ex connexu quatuor linearum ipsum definientium, duo inferiores finibus inferioribus humilium laterū labdoi dis per vinculum nerueum & cartilagineum connectuntur. id vero fini superiori primæ cartilaginis superiacet: rectam, & mediam ipsius lineam per spinæ reſtitutionem habens, tū thyreoideos, tum lineæ quæ in linguæ partibus infernis est: duo vero latera humilia ad superiores primæ cartilaginis angulos extendens. quam cartilaginem siue thyreoidem, siue primam appelles, nihil interest. articulatur autem inter se primæ cartilagine partibus obliquis. atque etiam ligamenta quædam membranosa, & neruea à prima ad secundam perueniunt. ubi vero minor, quæ intus est, cessat, duæ longæ conuexitates superiacent. inde autem incipit tertia cartilago conuenientes exquisitæ illius eminentis cavitates habens: adeo ut harum duarum cartilaginum coniunctio duplicem articulationem faciat. Secunda autem cartilago angustior est, quam basis inferior. ex quo fit, ut ora totius laryngis inferior, quæ arteriam asperam attingit, amplior sit orificio superiore, quod in pharyngem definit. etenim & tertia cartilago in valde angustum ipsa quoque definit: cuius oram superiorem arytenoidem plerique anatomici nominant, quia hæc pars figuram gutturionis asserat, quem aliqui ἀρυταινὸν etiam appellant. huius quoque cartilaginis cavitates ad meatum spiritus cōuersa est: ut veluti fistula quædam fiat id quod ex istis tribus est constat. atque hanc quidem habet fabricam propriam laryngis substantiam, tunica vero, quæ ipsi intus subſternitur, est communis & arteriæ & gulæ. porro eius motum ex animalis voluntate pendere necesse fuit, siquidem futurus erat ad respirationes, expirationes, totius respirationis cohibitiones, efflationes, & voces accommodatus. quæ omnia

fatius

V I G
fatus erat à
plices habent
& comprimant
neque ad prior
tem facta est a
ntiam. ac de
ntem laryngis
in corpus quon
ne figura cuius
sed lingue al
ne eius partem
se connectunt
thyreoideos car
id quod ad ip
quæ & maxime p
at animal, indi
tus partibus re
acui angustior
inter angustior
nol, paulatim q
ue sunt ostensu
que quod mode
in hoc corpus l
dum est, sed
ntia autem no
in præterquam
in musculos et
at reuoluerit
ho tum thoracis
tum. hi nanque
idem cartilagin
ne etiam prædic
tule tum dextra
que exquisitè in
quidam apertu
naret, cum natu
rent, & forami
posuerit. cum q
atur, rursusque e
ntem transito,

fatius erat à nostra volùtate proficisci. Cartilagine vero duplices habent articulationes & motus: alios, qui eas dilatent, & comprimant: alios, qui easdem claudant, atque aperiant. atque ad priorum motuum constitutionem primæ ad secundam facta est articulatio: ad secundorum vero, secundæ ad tertiam. ac de cartilaginibus hæc dicta sint nobis. In spacio autem laryngis interno, per quod spiritus foras, & intus fertur, corpus quoddam est positum, quod neque substãtia, neque figura cuiquam eorum, quæ in toto animali sunt, simile est: sed linguæ alicuius fistulæ est simile: si supernam, infernamque eius partem intuearis. infernã dico, ubi arteria & larynx inter se cõnectuntur: supernã vero, ad orificiũ, quod à sinibus arytænoideos cartilaginis & thyreoideos, qui ibi sũt, efficitur. id quod adipatæ & mēbranosæ substãtiæ est. cæterũ princeps & maxime præcipuũ vocis instrumētũ est. nã ut vocem edat animal, indiget omnino ea spiritus motione, quæ ab infernis partibus repēte simul erũpat, indigētque nihilo minus hac etiã angustiore trãsitu, qui in larynge est: nō tamen simpliciter angustiore, sed qui paulatim ex amplo ad angustius tendit, paulatimque ex angusto amplificatur, ut in libris de voce fuit ostensum: id quod plane facit corpus id, quo de agitur, quod modo lingulam, & laryngis linguam voco. cæterum hoc corpus linguæ non modo laryngis ad voem necessarium est, sed etiam ad spiritus cohibitionem, quam vocant, ita autem nominant, nō solum cum nō respiramus, sed cum præterquam quod thoracem ex omni parte contrahimus, musculos etiam omnes qui ad hypocondria, & costas sunt, vehementer intendimus. violentissima enim tunc est actio tum thoracis totius tum claudentium larynga musculorum. hi nanque magna vi pulso spiritui obstitunt, arytænoideam cartilagine claudentes: ad quam actionem nō parum etiam prædictæ linguæ natura conducit. nam ipsius particule tum dextræ, tum sinistræ in idem coeunt adeo, ut sibi ipsæ exquisite incidant, & meatum occludant, quod si parũ quidpiam apertum relinquatur, ne id quidem improuidum manet, cum natura foramen in utraque linguæ parte vnum fecerit, & foramini ipsi parte interna ventriculũ non parũ apposuerit. cũque aër vias amplas nactus in animal ingreditur, rursusque exit, nihil in ventrem propellitur. obstructo autem transitu, ibi aër obstructus violenter pellitur in obli-

quum, ac foraminis linguæ orificium aperit: quod labiis ad motus claudatur. impletis autem spiritu ventriculis, qui in lingua laryngis sunt, molem in spiritus meatum diffundi necesse est, & exquirite ipsum angustari, etiam si parum antea apertum erat. Larynge vero ita diligenter occluso, ut ne spiritus quidem, qui à thorace vi exprimitur, eum recludat, non est alia causa indaganda, cur potius in pulmonem non feratur. natura enim provide laryngis orificio epiglottida velut operculum quoddam admouit, quæ quidem omni alio tempore, quo respirant animantes, recta est, cum vero aliquid deglutit, ipsa laryngi accumbit. id enim quod transglutitur, ceu primum eius radici incidens, postea vero dorso inuectum inclinare ipsam cogit, & collabi. hancque productionem natura est fabricata, non quo nihil prorsus incideret, sed ne multum, neve affatim. nam modicum potionis in asperam arteriam importatur in orbem circum eius tunicas expressum, non per mediam capacitatem iter faciens: tantæque huius humoris est copia, ut repente ad pulmonem madefaciendum arripiatur. Sed cum larynx cartilagineus, rotundusque ex omni parte sit, angustari stomachum in transitu ciborum necesse est. qui fit igitur, ut stomachus non arctetur nobis transglutientibus? an aliter, quam ut cibus deorsum trahatur, larynx vero sursum recurat? siquidem ita eorum positio commutatur, ut stomachi initium ad asperam arteriam sit, larynx vero sursum ad fauces recurat. scire autem conuenit, quo modo epiglottis in laryngis meatum à cibus compellitur, ita ab iis, quæ euomuntur, cartilaginem arytenoidem. vergit enim & illa in laryngis capacitatem, ut impetu eorum, quæ sursum feruntur è stomacho, dorso ipsius incidens, totam cartilaginem in cedentem locum facile conuertat.

De Gurgulione.

Cap. 10.

Gurgulio ad vocis magnitudinem, atque elegantiam facit, aer enim ingrediens ab ipso prius inciditur, & impetus ipsius vehementia frangitur. & ob id etiam vis frigoris retunditur. proinde nonnulli, quibus ad basim usque fuerat amputatus, non modo noxam in voce perspicue senserunt, verum etiam frigidiores inspirationem: ex quibus plerique pulmone, ac thorace refrigerato perierunt. quocirca non est temere, neque

VIGESIMVS QVARTVS. 298
re, neque vt fors ferat, præcidendus: sed pars quædam basis
relinquenda est. cæterum gurgulio non mediocriter con-
fert, ne pulvis, aut alia quæpiam natura generis eiusdem in
laryngem cadat.

De aspera arteria.

Cap. II.

Particula quædam simplex in corpore animalis est, quæ a-
liarum omnium est durissima quidem, sed solo ossæ est mol-
lior: quam omnes propemodum medici cartilaginem voca-
uerunt. quæ quidem cartilagine plurima natura vsu ad aspe-
ram arteriam construendam, totam in exquisitum circuli s-
bitum contorsit, vt eius pars conuexa, quam etiam tangi-
mus, extra promineat, intus vero caua sit: post autem in lon-
gitudine colli sit continuata serie constituta, & toto eo spa-
cio quod inter laryngem & pulmonem interiacet, interim
referto, validis ligamentis membranosis eos connexit, quæ
ostracis Scarabeorû sût simillima. quæ vero eorum pars erat
subiectû stomachû contactura, eam non item cartilaginem
fecit: sed hac parte deest quidpiam ad circulum efficiendum,
& vnaquæque cartilago figuram literæ sigma Σ refert. com-
muniter autê his ligamentis, & aliis orbiculatis, & ipsis præ-
terea cartilaginibus alia quædâ tunica intrinsecus obiecta est
quæ plane rotunda est, & omnibus substrata, dâ illa quidê
& constricta, sed fibras in longitudine rectas habens, quam
scio me ante côm memorasse, continuâ esse ei, quæ toti ori, &
stomacho, ac toti ventriculo intrinsecus subternitur. Atque
etiâ hæc omnia extrinsecus cõplectitur mēbrana quædâ ve-
lut indumentum quoddam, & arteriæ totius amiculû. Hæc
igitur natura est eius arteriæ quæ in collo inest: per quâ in-
spirant, & itê expirât animalia: vocêque edunt, atque efflât.
Vbi vero primum clauis prætergressa, in thoracis ampli-
tudinem peruenit, ibi diuiditur, & in omnem pulmonis
partem fertur cum vasculis, quæ à corde oriuntur, in om-
nes eius lobos distributa. Et tamen non discedit à natu-
ra, quam parte superna obtinet, neque omnes eius sobo-
les vlla in re dissident, sed similiter omnes cartilagine mul-
tæ sigma formam referentes, membranosis ligamentis con-
tētæ vsque ad extremos visceris lobos cõseruâtur. Hoc solû
vas in pulmone est exacte vacas sanguine, cum animal secû-
dû naturam sit affectum, ac si ruptio aliqua, aut eris apertio,

P ij

aut vasis erosio in pulmone contingat, tunc aliquid sanguinis in hanc etiam arteriam effunditur, qui spiritui molestus est, eius vias occupans: eoque modo tussis habet iam animal infestum, & sanguis sursum per pharynga ad os fertur. Atque hanc quidem tunicam in transglutendo maxime opitulari stomacho, ostendimus: in aspera vero arteria etiam cartilaginibus parte interna subterni, ipsasque sursum, dum animal transglutit, cum larynge ad pharynga trahere modo simillimo, quo instrumenta, quæ ciconiæ dicuntur, talis quidem pulmonis arteriæ est natura, quæ ex bronchiis constat, sic enim appellare eius cartilagines medici consueverunt, quæ admodum & ipsam totam bronchon, & caput, summam eius partem: quæ etiam larynx nominatur.

*De succingente, & thoracem intersepientibus
membranis. Cap. 12.*

Membrana succingens eadem habet cum peritonæo substantiam, & eadem usum omnibus spiritus instrumentis, non secus, quam illud cibi, præstat. succingens vero membrana vocatur, quia costas totas intrinsecus succingit: estque araneæ modo prætenuis, & ex toto sibi similis costas succingit. est etiam indumentum, veluti quædam tunica, omnium spiritus instrumentorum, & omnibus intra thoracem partibus, obducitur, quemadmodum peritonæum his, quæ infra septum habentur, obtenditur. Atque etiam ab ipsa nascuntur membranæ, quæ thoracem intercipiunt. quæ per eius longitudinem superne deorsum feruntur, tuto autem infiguntur, parte quidem posteriore spinæ vertebrae, anteriore vero, medio ossi pectoris: cuius extrema ora inferna est cartilago, quæ ab ensis similitudine xiphoides nominatur, quæ ad os ventriculi est: superna vero clavium compago. Membranarum vero prima, & maxima utilitas est, ut duos ventres thoracis efficiant, & si forte magno vulnere in alterutram eius partem accepto respirationis munus eius partis perierit, alter venter incolumis dimidium actionis conseruet, quam ob rem à magnis vulneribus intro in alterutram pulmonis partem penetrantibus, animal dimidia parte vocis & respirationis repente priuatur: voce autem ac respiratione omnino destituitur, si uterque venter fuerit confossus. cum igitur hanc adeo magnam utilitatem intercipientes thoracem membranæ mortali-

V I C
mortalibus affi
natura etiam al
mentis, ac ligam
mentis tribu
us, & nervos, &
noem toti th
gunt.

D

Thoracis capaci
instrumentum.
in vero respiratione
ind ipsa aëris sub
necesse, refrigerant
tæ qualitate aff
quæ combustum
quo fit, ut duplici
volutum. att
in contrahitur, q
nari. cum enim
ipæ aëre nul
que inutile en
m& cor non pe
noluit, sed vtriusq
rium quoddam
dis pollet. eius p
ro ex vna peculi
na ipsi nonnisi
a aut firmari, aut
in binæ peculiari
rior vero huius
aque, & in transu
ni etiam inest, re
per, nullique tra
unica crassa, d
in continet, rege
in quidem arteri
ne tunica statuat
reluci quibus d

mortalibus afferant, eiusque potissimum rei causa extiterint, natura etiam abusa est ad utilitatem ex ipsis tanquam operimentis, ac ligamentis, omnibus, quæ thorace continentur, instrumentis tribuenda, nam & arterias quæ in eo sunt, & venas, & nervos, & , oesophagum & denique totum ipsum pulmonem toti thoraci colligant, & vndique obductæ conregunt.

De pulmone.

Cap. 13.

Thoracis capacitatem impleuit pulmo vocis ac respirationis instrumentum, cuius motus initium à thorace existit. v. sus vero respirationis in animatibus causa cordis inest, tum quod ipsū aëris substantia indigeat, tum quod feruido calore effervesces, refrigeriū expetat. ipsū autē refrigerat inspiratio frigida ei qualitatē affūdēs: expiratio vero, quod in ipso feruet & quasi combustum, ac fuliginosum est, ex ipso profundens. ex quo fit, vt duplicem habeat motum. ex contrariis partibus conflatum. attrahit enim dum dilatatur, inanitur vero, dum contrahitur. quo loco mihi subit naturæ providentiæ admirari. cum enim vocem in nobis esse satius esset, fieri vero ipsa sine aëre nullo modo posset, quicquid ociosum alioqui, atque inutile erat expirandum, id in materiam vocis cōuertit: & cor non protinus per fauces externum aërem trahe-re voluit, sed vtriusque mediū pulmonem, quasi spiritus proutarium quoddam locavit, qui ambabus simul actionibus seruire posset. eius porro talis est constitutio. venæ totius corporis ex vna peculiari tunica constant. nam exterior membrana ipsis nonnunquam adhærescens, vbi colligari quibusdam, aut firmari, aut tegi debent, illuc solum accedit. arteriæ vero binæ peculiare sunt tunicæ: exterior qualis venæ est: interior vero huius crassitie fere quintupla. quin & durior quoque, & in transversas fibras dissoluta. exterior autem, quæ venis etiam inest, rectis fibris, & quibusdam mediocriter obliquis, nullisque transversis est contexta. Interior vero arteriæ tunica crassa, duraque ceu cutis quandam interna superficiei continet, tele aranearum manifesto persimilem, in magnis quidem arteriis perspicuam, quam nonnulli tertiam arteriæ tunicā statuunt. quarta vero alia peculiaris ei nulla est, sed veluti quibusdā venis, ita etiā arteriis alicubi adhærescit,

P. 11j

L I B E R

& circumtenditur membrana tenuis, quæ eas tegit, stabilit, & propinquis partibus connectit. quales igitur toto corpore sunt arteriæ, tale vas ex dextro cordis sinu progrediens, in totum pulmonem diffunditur: quales autem venæ, tale ex sinistro procedit: ut ex tribus vasis pulmonem intertextentibus, quod à sinistro cordis ventriculo oritur, arteria venosa nominetur, quod vero ex dextro, vena arteriosa dicatur: tertium quod à pharynge proficiscitur, aspera arteria, ex cartilaginibus Σ literam referentibus conflata, nuncupetur. Quod vero orbiculatum est in cartilagine marginæ arteriæ, quæ in collo est, quæque caudicis rationem obtinet, ad pulmonis arterias comparata, & in illis ipsis tanquam ramos quosdam, ex se mittit, in priore parte est collocatum. ubi vero cartilago deest ad circuli perficiendum, in posterioribus partibus situm est: in collo quidem gulæ continuum, in pulmone vero ei venæ, quam paulo ante arteriosam appellauimus. Vasorum autem intercapedines à propria substantia pulmonis implentur: quam Erasistratus parenchyma nominat. Porro lobos pulmonis non impares numero esse, ut iecoris sunt, sed in omnibus animantibus, de quibus loquimur, duos in dextra eius parte haberi, duosque in sinistris, constat inter omnes. nec minus etiam inter omnes conuenit, ac si non inter omnes, saltem inter eos qui diligentius confectiones administrant, in dextra thoracis parte quintum quendam lobum exiguum veluti alterutrius sobolem existere. quem sane facillime comperies ad venam cauam animum aduertens: siquidem illi subiacet; qua primum in thoracem relicto septo incidit. nonnunquam etiam cavitatem quandam in eius superficie clare conspiciamus: cui vena, dum viuit adhuc animal, affirmatur. nam post obitum, pulmo semper collapsus, & paruus apparet, non exigua ipsius & thoracis facta intercapedine, contra quam viuo animali haberet. Hunc vero lobum natura non ut respirandi instrumentum, sed ut venæ causæ molle aliquod stratum pararet, à septo transuerso usque ad cordis auriculam extendit. Iam vero pulmonis caro ærea, spiritusque plena conspicitur, plane indicans se ad æris, ut iecoris caro ad cibi concoctionem, esse comparatam. etenim consentaneum est non confertum, nec repente ærem externum spiritus, qui animali inest, fieri alimentum, sed pau-

V I G
sed paulatim i
nato spiritum
usque immuta
mentum, quæ
mutationis cau
do asperis arter
carne primum
us præsertim, qu
quæ perfectissim
la casie efficacia

De ob

Adenæ maxim
peribus superiori
tine, subiecti, cū
sunt omnia eius
forma, qua prim
ut enim natura
pedulam quæ d

De cor

Cor caro est du
in conferta. ipsu
tum pulmones
vultu in orbē am
a parte sinistra p
que in ea animal
re, est situs: dei
tinet. nō enim ut
neque thoracis p
eius omnino a q
tum est: sed ad
Cordis autem au
tum similitudin
orificia sunt in
in dextra quidem
feriunt, in sinistra
res aperueris, tunc
que ex dictis co
forum incumbit

sed paulatim immutatū, quemadmodū etiā cibi, familiarēq; innato spiritui qualitatē diuturniore tempore recipere: huiusque immutationis carnem pulmonis primum esse instrumentum, quēadmodum iecoris carnem cibi in sanguinem mutationis causam esse ostendimus. Cæterum spiritus, qui ab asperis arteriis extrinsecus intro trahitur, in pulmonis carne primum conficitur: deinde in corde, atque arteriis, & iis præsertim, quæ plexu retiformi cōtinentur. postremo vero ac perfectissime in cerebri ventriculis, vbi utique animalis exacte efficitur.

De thymo.

Cap. 14.

Adenē maximū, & molliissimū, quē thymū vocant, natura partibus superioribus medij pectoris ossis, quod σίρρον vocatur, subiecit, cū vt ne venam cauam os attingeret, tum etiā, vt omnia eius germina, quæ hoc ipso in loco sunt quā plurima, qua primum emergunt, fulta stabilirentur. Vbicunque enim natura vas sublime diuidit, ibi semper mediam glandulam quæ diuisionem oppleat, interponit.

De corde.

Cap. 15.

Cor caro est dura, quæ ægre patitur, ex fibris multiplicibus conflata. ipsumque in media thoracis capacitate collocatum pulmones ambiunt, idque suis lobis ceu digitis quibusdā in orbē amplectuntur. Motus autē eius indicat, quasi in parte sinistra potius sit collocatum, duplici causa: primū quia in ea animalis parte ventriculus, quo spiritus continetur, est situs: deinde quia totum ad eam partem magis inclinatur. nō enim vt basis ipsius media exquisita est læuæ, dextræque thoracis partis, ita etiam vertex: quoniam neque declius omnino à propria basi ad finem inferiorem exporrectum est: sed ad sinistram regionem, vt diximus, deflectit. Cordis autem aures ad quandam aurium proprie nominatarum similitudinem maiores nostri vocauerūt. duo autem orificia sunt in vtroque vasorum materiam inuehentium: in dextra quidem parte, qua vena in cordis sinum inibi inseritur, in sinistra vero, qua venosa arteria. cūque has aures aperueris, tum ipsum cordis corpus apparebit, tum vtrūque ex dictis orificiis: deinde membranæ insertioni ipsorum incumbentes, tres in sinu dextro, duæ in sinistro:

P iij

LIBER

quarum structuræ figura similis est telorum cuspidi, ideóque trifulcas nonnulli anatomici eas vocauerunt. duo alia sunt orificia vasorū materias educentium, ex dextro quidem ventriculo in pulmonem, venæ arteriosæ: ex sinistro vero in totum animantis corpus, grandis arteriæ. in quibus iterū tres membranas vtrinque ad literæ Σ similitudinem factas conspicias, extra cor tendētes, veluti trifulcas intro. Communis autem omnium ipsarum est vsus, vt materias retro cedere prohibeant. In pulmone autem natura tunicas vasorum commutauit, nec frustra venam arteriosam, & arteriam venosam est fabricata. Vnumquodque enim alimento sibi simili nutritur. pulmonis autem corpus leue est, ac rarum, & velut è spuma quadam sanguinea concreta cōstatum: ob eamque causam puro sanguine, vaporoso, & tenui indiguit, non autem, quo modo iecur, limoso, atque crasso. quocirca vasa habet contraria, maxime quidem iis, quæ sunt in iccore, post autem & aliis animantis particulis. in his enim cum tunica vasis, quod sanguinem suppeditat, rara sit, ac tenuis, plurimū crassi sanguinis, atque celeriter partibus circumfusus distribuit: in pulmone vero cū crassa sit, nihil nisi tenue sinit elabi. ac ceteris quidē partibus arteriæ crassæ, & dēfæ generatē paucum omnino, eundēque vaporosum sanguinem vicinis partibus trahere permittunt: pulmoni vero solum, copiosissimum huiusmodi impatiunt. quippe quæ præ raritate, ac tenuitate continere ipsum non possint. ex quo fit, vt nutriendi ratio pulmoni plane contraria sit, ac ceteris omnibus partibus animantis: quemadmodum etiam corporis substantia. Vt igitur magna huius alimenti copia pulmoni suppeteret, ad eum sanguis exquisitè elaboratus, & extenuatus à corde transmittitur. Quod vero in capite cordis os inuenitur, non in cunctis animalibus os exquisitum est: sed in grandioribus est exacta cartilago, in valde grandibus cartilago ossea, in maximis vero, etiam magis ossea. Arteriæ autē & venæ totum cordis corpus in orbem complectuntur. nulus vero nervus in ipsum videtur distribui, sicut neque in iecur, neque in renes, nec lienem. solum enim eius inuolucrū pericardion propagines nervorum tenuium recipere videtur. Cæterum toto corde nudato, videbis sinistrum eius ventriculum ad summum verticem ascendere, dextrum inferius multo cessare, & circumscriptionem propriam sæpe habere:

V I O

re: idque ma
etiam in paru
cortice comp
atem quatuor
dis auriculæ ex
est visceris par
ficiat, is à nobi
ri in sinistro ve
permanet, sed t
nlas discissum e
obos porriguat
are patefacto p
nūque sanguis
multo est, in dext
tus substantia. N
rima regitur, qu
modo ipsius pars
na vritas omni
modi, duo vaso
um medici spirit
am duo orificia
ne sunt in pulmo
anali sunt diffus
no ventriculo co
men hæc quoque
um sanguinem i
pulmonem dedi

De pericardio

Cordis tunica pe
aque harum est,
am ipsi cordis cor
et in aliis omnib
pe motui cordis a
dies est, prodeunti
um est, maxima a
rum, vena à iec
nita aliorum due
etiam arteriosam

re: idque magis in magnis animalibus: nonnunquam vero etiam in paruis, nonnulli igitur duos quandoque vertices in cortice comperientes, duo corda esse existimant. Orificia autem quatuor vasorum esse quatuor dicimus. Cæterum cordis auriculæ extra ventriculos ipsius consistunt. verum si quis eas visceris partes statuens, numerum orificiorum maiorem faciat, is à nobis discrepabit: siquidem vnum venosæ arteriæ os in sinistro ventriculo habetur, quod tamen non diutius permanet, sed statim ima amplitudine in quatuor particulas discissum est, quarum singulæ in singulos pulmonis lobos porriguntur. Vtrique autem cordis ventriculi thorace patefacto pulsare videntur: non eodem tamen modo vtrisque sanguis & spiritus continetur. copiosior enim multo est, in dextro quidem sanguinis, in sinistro autem spiritus substantia. Nunc vero quoniam cor nativi caloris, quo animal regitur, quasi focus quidam, & fons est, omnis hoc modo ipsius pars principem locum tenet: sed magis eæ, quarum utilitas omni animanti vitam conseruat. sunt autem huiusmodi, duo vasorum orificia in sinistro ipsius ventriculo, quem medici spirituosum appellare consueuerunt. per hæc autem duo orificia cor per minus continuum est arteriis iis, quæ sunt in pulmone, per maius vero omnibus, quæ in toto animali sunt diffusæ. minus autem erunt principalia, quæ altero ventriculo continentur, quem sanguineum vocant. & tamen hæc quoque præstantiora sunt cæteris: quorum alterum sanguinem in cor intromittit, alterum vero ex ipso in pulmonem deducit.

De pericardio.

Cap. 16.

Cordis tunica peculiaris pericardios appellata diuersa ab utraque harum est, in vtriusque medio constituta, non tamen ipsi cordis corpori hæc tunica pericardios connexa est: verum in aliis omnibus non parua quedam interiecta est regio motui cordis accommodata, ad basim vero ipsius, quæ circulus est, prodeuntibus ex ea vasis connexa est: quorum alterum est, maxima arteriarum, in sinistra videlicet parte sita: alterum, vena à iecore sursum tendens, ad dextram regionem posita. aliorum duorum alterum arteriam venosam, alterum venam arteriosam nomino.

OEsophagus spinæ vertebris adiectus, ac colligatus, ita totum permeat thoracē, cum totius positionis stabilitate, ac securitate, ut nullā cordi, neque pulmoni, neque alicui earum particularū, quæ thorace cōtinentur, molestiā præbeat. obliquus nanque eius est situs. in mediis enim ad perpendiculū quatuor primis dorsi vertebris extenditur, nusquā deflectens, ad quintā vertebrā desceſcit ab eo cursu, quem rectum facere deorsum cœperat, & ad dexterā digreditur: ut meliorē sedē tribuat, cedatque præstātiori instrumento, maximæ omnium arteriæ: hanc enim ex sinistro cordis ventriculo exortam, & in totum corpus animantis distributā, consentaneū fuit per opportunissimū locum vertebrarum, qui sane medius est, ferri. Ceterū ventriculi stomachus quatuor primis vertebris thoracis inuehitur: propter autem reliquas octo, ad dextrum fertur ob causas antedictas. cum primum vero phrenas attingit, quæ sunt fines inferiores thoracis, membranis robustis sublime admodum elatus supra magnam arteriam rursus transiit in alteram partem, quo loco phrenas prætergressus ori ventriculi infigitur.

De ventriculo.

Cap. 18.

Aliis omnibus animantibus natura nō indidit sensum eorū, quæ defunt: sed instar plantarū à venis semper alimentū attrahentes nutriuntur. soli autem ventriculo, & præsertim eius partibus iis, quæ ad os pertinent, sensum rerum, quarum indigens est, tribuit, qui animal ad cibū sumendū excitaret, & stimulare. Cuius etiam rei causa eidem impartita est par neruorū haud paruorū, quod superne defertur, disseminaturque, & contextit, maxime quidē os eius, & partes ipsi continuas, & in alias etiā partes vsque ad fundū ventriculi protenditur. Positus autem est ventriculus potius in sinistris animalis partibus. eiusque fundum ad dexteras partes protenditur. ei vero à dextris adiacet iecur: quod ipsum suis lobis, quasi digitis ad vnguem complectitur: lien vero à sinistris. sed iecur sublimem positionem habet adeo, ut septum transuersum contingat: lien vero inferiorem. sinistra igitur, dextræque ventriculi partes ab iis caleſcunt: retro vero à musculis spinæ, cū pinguedine sibi ipsis adnata: ante denique ab omento, quod vocant. id quod eius calefaciendi gratia factū esse,

esse, perspicue licet cognoscere ex iis, qui vulnus in abdomi-
ne acceperunt: in quibus omentum per vulnus excidit. deinde
de liuidum factum cogit medicos partem læsam abscindere.
omnes enim hi frigidiores ventriculum sentiunt, minúsque
concoquunt. & plurimis operimentis extrinsecus egent: &
præsertim si magnitudo insignis fuerit abscissa. Ventriculus
rotunda, atque oblonga figura est. qua vero incumbit verte-
bris, comprimitur, & ob id ipsum eius vitiata est conuexi-
tas. Ac fundū quidem in hominibus est orificio latius. porro
manifesta iam tibi erit figura eius vniuersa. spheram nāque
perfectam animo complexus, ipsam parte inferiore latiore
puta, deinde duplicem productionem facito, latiore quæ
ad œsophagum est, strictiorem vero infernam. tum com-
primendo, & simam faciendo gibbositatem posteriorem,
totam ventriculi figuram didiceris. contrario autem modo
se habent ipsæ partes, & explantationes: superne enim, vbi
ventriculus est strictior, stomachus factus est amplior, infer-
ne autem vbi est latior, implantatio ad intestinum strictior
est facta. paulatim quidem à stomachi implantatione dilata-
tur. quæ res perspicue docet, partem ventriculi quandā præ-
longam. ab ipso extensam, œsophagum esse: non paulatim
autem, sed repente & semel ex fundo ventris explantatū in-
testinum, ipsius ventriculi non esse partem, sed aliud quip-
piam ei connatum. Iam vero tunicarum natura ventriculo
quidem & stomacho est similis: dissimilis autem intestinis.
nam interna tunica in ventriculo, & stomacho membranosa
villos rectos superne deorsum tendentes habet: externa ve-
ro carnosior, transversos, quales habent etiam binæ tunicae
intestinatorum. orbiculati namque sunt plerique villi intesti-
norum: cum in eis pauci admodum recti sint protensi: ven-
triculus enim ad se ipsum per stomachum cibum & potum
tanquam manibus, rectis his villis trahat oportet, transuer-
sis vero propellat, quæ circulo contrahunt: quippe singula
instrumenta quæ mouentur in corpore, pro villorum posi-
tione motus habent. intestinis autem (attractrice enim non
indigebant facultate) soli ad propellendum idonei villi sunt
facti. Villis autem transversis tensis, latitudinem contentæ
inter ipsas cavitatis minorem fieri necesse est. rectæ autem
dum trahuntur, ac in se ipsas coguntur, fieri nequit, ut non
minuatur longitudo: at vero deglutientibus nobis, liquido

cernitur sublata. & larynx sursum tantum recurrens, quantū gula deorsum trahitur. cūque completa iam deglutienti functione gula se laxauerit, perspicuo iterū cernitur larynx descendere. quandoquidem interna ventriculi tunica, quæ rectas fibras habet, quæque tum gulam intrinsecus vestit, tum os ipsum: ea super laryngis partibus extenditur. ex quo fieri nequit, ut cum ipsa à ventriculo deorsum trahitur, non simul etiam larynx attrahatur. at breuiare longitudinē, munus instrumentorū, quibus recti sunt villi, quo aliquid attrahāt, est proprium. atqui ostensum est gulā attrahere, cum alias larynga non traheret. perspicuum igitur est ventriculum per gulam cibos attrahere. Quinetiam in vomitione, eorum quæ vomuntur impetus, qui vsque ad os fertur, omnino partes eas gulæ, quæ à subeuntibus dilatantur, hiantes habet: partium vero, quæ à fronte occurrunt, quamcunque apprehendit, hanc hiare incipientem: quæ vero à tergo est, hanc utique contractam relinquit: adeo, ut gulæ affectus hac in parte sit omnino deglutientium affectui consimilis. verū ubi tractus nullus est, longitudo in talibus symptomatis feruatur, atque idcirco deglutire facilius est, quam vomere. causa est, quoniam deglutitur vtrisque ventriculi tunicis agente, interna quidem trahente, externa vero se contrahente, & vna trudente: vomitur vero, altera tantum, quæ foris est, agente, nec vlla in os trahente. non enim sicut venter deglutire cibos expetit, sic etiā in vomitionibus oris pars vlla excitati affectus quippiā appetit. neque enim ea quæ deglutiuntur, ad infernas partes sua gravitate deferuntur, ut nonnulli putauerūt. id quod clare intelligitur ex iis animalibus, quibus longū collum est, quæ quidem inclinata deglutiunt. Quæ res nobis argumento est, facultate quadā vtentem gulam, aut per ipsam ventriculum deglutire. quæ facultas quādoque sine inflammatione resoluta non finit ut animal non modo duri aliquid, sed ne aquam quidem transglutiat. ex quo perspicuū est, hanc resolutionem euenire salubri partiū constitutione læsa, cū intemperies quædā contingit. quam quidē ita denique corrigemus, si partes ad naturalem statū redigamus. siue autem interna, siue externa ventriculi tunica affecta sit, vna adhibetur curatio tum eorū quæ foris imponuntur, tum eorum, quæ ore deglutiuntur: & quandoque eorum, quæ eandem vim habentia loco applicantur.

De

Quemadmodum
menta fecit, si
per eas fertur
dem modum
tutis facultas
testina facta su
ur concoctio
in succum est
intestinarum
venerum multu
cem in ventricu
nam vero vnum
pellunt, ita vnu
vros, & rotund
dem binæ tunica
peracanea danc
der eorum est ru
it valentior, tum
mora. quod vel
Multos sane, a
lus & diuturnis
peresceret: ade
est exesa: qui ta
uoqui non esset
us corruptæ illi
nemo non cont
cusa sunt: quem
multo egerant
modus quidam
he, neve merere
acet, sicis vero
nam inferiorem
tem eius est cæci
definit, illic ad d
colon emergit, d
dem prorsus, ut
cupendis aptum
legit exortus, q

Quemadmodum venis, quas natura distributionis instrumenta fecit, facultatem gignendi sanguinis indidit, ne dum per eas fertur, tempus ipsi alimento frustra periret, ad eundem modum intestinis gratia distributionis in venas institutis facultas quædam concoquendi cibos inest. Ceterum intestina facta sunt, non ut superuacanea prorsus deferantur, aut concoctionis causa, sed ut id omne, quod in ventriculo in succum est mutatum, assumatur in venas. quocirca cum intestinorum circumvolutiones innumerabilem quandam venarum multitudinem ex hepate sibi habeant insertâ, omnem in ventriculo concoctum succum sursum mittunt. Quoniam vero vnum genus motionis inest intestinis, quo propellunt, ita vnum etiam tatummodo tunicæ genus in transversos, & rotundos villos dissolutum nata sunt. sed cur tandem binæ tunicæ extiterunt, siquidem similes ambæ sunt? superuacanea nanque videtur esse altera. at non ita est. nam duplex eorum est tunica, tum ut facultas ipsorum expultrix esset valentior, tum vero ut ipsa instrumenta essent ab iniuriis tutiora, quod vel maxime indicant morbi dysenterici.

Multos sane, ac sæpe vidimus, quibus, cum morbis gravibus & diuturnis fuissent conflictati, maxima intestini pars putresceret: adeo ut cõplurimis locis tunica omnis interior esset exesa: qui tamen vixerunt, & superstites fuerunt: quod alioqui non esset factum, nisi secunda quædã alia extrinsecus corruptæ illi tunicæ accessisset. Cur autem externo alimento non continuo egeamus, inuolucra intestinorum in causa sunt: quemadmodum cur non subinde, sed longo intervallo egeramus, causa est crassi intestini latitudo, seu secundus quidam venter eis subiectus. nam ne egerent assidue, neve meierent animalia, humidis excrementis vesica subiacet, siccis vero intestinum, quod crassum nominant. quod etiam inferiorem ventrem quidam vocant. principium autem eius est cæcum intestinum. vbi enim tenue intestinum desinit, illic ad dextram quidem cæcum, ad sinistram autem colon emergit, dextra prius ilia præteruectû. ac cæcum quidem prorsus, ut venter quidam, est crassum, excrementis recipiendis aptum, cui colon proportionem respondet. Primum igitur exortus, quem ex pyloro intestinum excipit, satis est

angustus: nec in orbes circumflectitur, & ad spinæ partes extenditur. ab hoc, quod à duodecim digitorum longitudine $\delta\omega\delta\epsilon\kappa\alpha\delta\acute{\alpha}\kappa\tau\upsilon\lambda\omicron\nu$ appellant: ut Herophilus vere memorauit, varie in orbes conuoluitur, vasorum complurium serie contextos: quod ieiunum nuncupant, quia semper cibo vacans inuenitur. inde tenue intestinum est, substantia quidem huic simile, sed differens, quia neque vacuum reperitur, neque tantâ vasorum habeat multitudinem. deinde sequitur id, quod cæcum vocant: postea colon: ab hoc denique in extremo rectum appellatum intestinum ad sedem vsque porrigitur.

De Peritoneo.

Cap. 20.

Si musculos omnes, qui abdominis sunt, ab ea cartilagine, quæ ensis formam habet, vsque ad ossa pubis diuides, in corpus quoddam tenue, latæ aranearū telæ simile incidēs, quod peritonæum vocant. hoc enim ei nomen est inditum, & $\pi\delta\tau\omicron\upsilon\ \pi\epsilon\rho\iota\tau\epsilon\iota\tau\alpha\sigma\theta\alpha\iota$, hoc est, quia cunctis visceribus, cunctisque intestinis prætendatur: itémque vasis, quæ inter septū transversum & crura habentur. ita vero & aliis, quæ his interioribus, omnibus obducitur, quorum numero vulua, & vesica continetur. Hanc tenuissimam membranam haud facile est detrahēre citra diuulsionem, præsertim septi transversi, & duorum musculorum abdominis transversorum eam attingentium, singulorum quidem in vtraque parte, sinistra atque dextra, vbi enim hi latum, tenuémque tendinem, puta aponeurosin ediderint, peritonæos membrana soluti cōtumacis cohærescit, ut etiam abdominis suture, quæ $\gamma\alpha\sigma\tau\rho\rho\alpha\phi\iota\alpha$ dicitur, quam solius peritonæi facere licet, cum dicta aponeurosi administrari nouerimus. Peritonæi utilitates plures sunt animantibus. prima quidem ut operimenti omnium subiectarum partium: secunda autem, ut septi transversi inter hæc ipsa, & musculos extra incumbentes: tertia, ut excrementa sicci alimenti citius subeant. velut enim à duabus quibusdam manibus, à peritonæo & septo transverso superne quidem coniunctis, inferne autem distantibus constricta ea, quæ in medio sunt, exprimunt, deorsumque alimenti excrementa pellunt: quarta, ne intestina, & venterculus flatibus facile impleantur. prætensa enim hæc membrana stringit, & contrahit, ac facile flatū partim infra, partim supra exprimit: quinta denique utilitas, ut omnia quæ sub septo transverso sunt,

ab

VIG
bea collige
atum regatur

Omentum, q
si & subtilibus
arteris & venis
inter enim ex di
que media inter
regit, asque stab
Aunt autem et
lignat. Figur
quod orificium et
interiorum ve
inter prædictis
quod ita esse eunde
in nulla alia parte
inter aut liquida, a
libi sibi eorum co
inter erit id etiam
inter conuexus su
inter totis primis
inter dicitur id et
inter ahi, & cuida
inter fors tulerit
inter, ac se iungi
inter, & colo, quib

De

Mesenterium qu
interon appella
interito: ut mese
interitia nominet
inter omnes venas e
inter arteris & ne
inter singula intest
inter simplex est: v
inter indumenti
inter.

VIGESIMVS QVARTVS. 304
ab ea colligentur, & velut pelle quadam vnumquodque pri-
uatim tegatur.

De Omento.

Cap. 21.

Omentum, quod epiploon vocât, ex duabus tunicis den-
sis & subtilibus, sibi ipsi incumbentibus, quamplurimis vero
arteriis & venis & pinguedine non pauca constat. compo-
nitur enim ex duabus veluti plicis peritonæi, tum ex vasis,
que media inter ipsas continentur: eaque ipsum operit, con-
tegit, atque stabilit.

Aiunt autem epiploon fuisse nominatum, quia intestinis
supernatet. Figurâ maxime marsupij, peræ, & sacculi habet:
quod orificium ex ventriculo exortum superius, & inferius
obtinet. totum vero eius spatium vsque ad fundum, quate-
nus ex prædictis principiis consistit, deorsum procedit. id
quod ita esse euidentius cognoscet, si ipsum inibi abscissum,
& nulla alia parte aut perforatum, aut diuulsum cupias im-
plere aut liquida, aut solida re. implebitur enim, si integrum
sit, & sibi totum continuum, instar marsupiorum. Iam vero
facile erit id etiam ab animali perfecte eximere. breues enim
adhuc connexus supersunt ad lienem, & colon, postquam ip-
sum à totis primis processibus fuerit separatum.

Adnascitur id etiam nonnunquam, sed raro iecoris fibræ,
alias alij, & cuidam costæ spurix: neque huic vni perpetuo,
sed vt fors tulerit. Ceterum plerunque ab aliis omnibus li-
beratur, ac seiungitur, præterquam ab his tribus, ventriculo,
liene, & colo, quibus est perpetuo connexum.

De Mesenterio.

Cap. 22.

Mesenterium quonque à peritonæo ortum habet. id etiam
mesercon appellant, vtroque nomine ab accidētibus eidem
imposito: vt mesenterium à situ, mesercon vero à peculiari
substantia nominetur. medium enim inter intestina situm est,
& omnes venas è iecore in ipsum descendentes vna cum vi-
cinis arteriis & neruis in orbem complectitur, quemadmo-
dum singula intestina. Ergo vbi vasis & intestinis obtendi-
tur, simplex est: vbi vero ipsis medium interiacet, non am-
plius indumenti, sed ligamenti vsum præbet. est enim du-
plex.

Vena à iecore descendens, mediâque inter ventriculum & intestina adducta, subiectis vertebris supergreditur, atque in eundem locum vadit ea, quæ cum ipsa in ramos, in totum miserè non spargenda est. itémque arteria, & neruus, qui cum arteria atque vena sese per totum mesenterium diffundit, in hunc locum est perductus: quemadmodû meatus excrementum biliosum ex ea vesica, quæ hepatis inheeret, vacuatu- rum. cum igitur oporteret venam, arteriam, neruum, & quartum cum eis vas bilem continens in hunc locum à natura perducere, earum quoque diuisionis principium ibidem consistere necesse erat. hic igitur locus magno præsidio indigebat, quo vasa in ipso distribuenda, ac discindenda munirentur, quam ob rem natura glandulosum quoddâ corpus fabricata, quod *πάγκρεας* appellamus, subtrauit, ac in orbem omnibus circumdedit, diuisionésque repleuit, vt nihil ipsorum facile findatur, aut sine munitione sit: sed cum in molli, & mediocriter cedente corpore conquiescant, si motu cieantur paulo vehementiore, illæsa, inconcussa, infractâque perpetuo conseruentur. quinetiam robustas membranas tum priuatim singulis vasis, tum communiter ipsis omnibus circumposuit, ea vestientes ac iungentes non modo cum glandula, sed præter eam, in primis ac maxime subiectis corporibus, quæ ad spinam sunt posita: post illa autem, cum aliis etiam omnibus instrumentis circumfusus.

De septo transuerso.

Cap. 24.

Vnus est thoracis musculus non vilissimus, quem phrenas, aut diaphragma, id est septum transuersum nominant. medium vero in phrenibus est musculus, qui in tendinem latum ex omni parte à carnosus comprehensum definit. ex vtraque enim parte inferiore, & superiore tenuis membrana obhærescit, & à membranis hisce thorax intercipitur. Duo autem sunt septi transuersi foramina, alterum qua vertebris via exhibetur, stomacho & magnæ arteriæ præparatum: alterum vero minus, cauam venâ supernis animalis partibus sanguinem deriuantem excipit, & magna cum securitate transmittit. ei enim nexu fere indissolubili cohæret: & membranam simul, quæ in dextra thoracis habetur, emittit. porro ventriculi

VIGESIMVS QVARTVS. 305
culi orificium propter septum transuersum est positum: non
tamen valide connexum, veluti vena caua spectatur, sed est
laxis membranis interceptum.

De Iecore.

Cap. 25.

Iecur in cunctis hominibus nec magnitudine, nec fibra-
rum numero simile spectatur: deque eo diligentissime scri-
bens Herophilus, hæc memoriæ commendauit: Iecur huma-
num perquam magnum est, & maius, quàm sit iecur quorun-
dam aliorum animalium, quæ eiusdem cum homine magni-
tudinis sunt: & qua septum transuersum attingit, gibbum est,
atque læue: qua vero ventriculum, sinum est, & inæquale.
assimilatur autem cuidam rupium interuallo, qua etiam fœ-
tibus ex vmbilico vena in ipsam innascitur. non tamen in
omnibus est simile: sed & latitudine, & longitudine, & cras-
situdine, & altitudine, & fibrarum numero, & inæqualitate
ex parte anteriore, qua crassissimū est, & summitate orbicu-
lata, qua extenuatur, inuicē diuersum est. etenim in quibus-
dam fibras non habet sed totum rotundū, & minus rectum:
in quibusdam duas, in aliis plures, in multis vero etiam qua-
tuor, atque hæc quidem Herophilus recte. præterea iecur si-
nistram occupare partem in paucis hominibus, non autem
in paucis aliis animalibus, idem vere conscripsit. hoc autem
viscus venas à mesenterio ad concauam ipsius partem per-
tinentes excipit: huncque locum, in quem venæ omnes col-
liguntur, portas iecoris vocant. vbi etiā inuenies maximum
venæ os. à portis vero in singulas fibras, quotquot fuerint,
venam vnā magnā porrigi comperies, qua in multas exi-
les diffusa, quantum vasa interiacet, totum est carne visceris
repletum. eam Erasistratus parenchyma nominat, Cæterum
vniuscuiusque iecoris venæ tunica admodū tenuis est, qua-
lis nulla alia in toto animanti. statim vero, si accurate locum
ad portas situm intuebere, meatum ex vesica fel excipienti
conspicies ad intestinorum productionis initiū peruenien-
tem non multo inferius, quam pylorus habetur: vt bilis sepa-
retur. præterea exiguum quandoque de se ramum supra py-
lorum emittit. quinetiam neruum admodum paruum vna
cum vena ad viscus ferri conspicias in membranam extrin-
secus ambientem delatum, præterquam quod profundius
cum ea diffinditur, ne viscus omnino sensus expers esset.

Q

L I B E R

Caro autē iecoris, quæ est primū ipsius corpus, primū sanguinis gignēdi instrumentū est. quapropter & venis quæ ad ventriculum, & vniuersa intestina perueniunt, facultas efficiendi sanguinis inest: qua succum, qui ex cibis distribuitur, prius quam is ad iecur perueniat, in sanguinem permutare aptæ sunt. Coniunctū est iecur ventriculo intestinisque omnibus per venas, & colligantem ipsas tunicā: aliis vero proximis corporibus per tunicam ea contegentem, quæ originem à peritonæo ducit, vt ita omnibus internis coniungeretur: siquidem omnia tunica hac obuoluuntur. magno præterea vinculo cum septo transuerso, aliisque membranosis & paruis quibusdam connexum spuris costis fecit. Verum id vinculum, quo septo transuerso coniungi dictum est, ipsum quoque est corporis substantia peritonæo simile: quippe quod ortum habeat ex tunica ipsum iecur ambiente, & ea quæ septum transuersum inferne succingit. Copulatur enim iecur non solum septo transuerso ibi, sed etiam cordi per septum transuersum. nam venæ cauæ ad cor ascendentes per septum transuersum, vt quod in medio vtriusque visceris est, vinculum vnum durū, & crassum natura præparauit, quod & venæ indumentum, & commune ligamentum ad septum transuersum tum venæ, tum toti visceri esset.

De Liene. Cap. 26.

Lien instrumentum est, quod purgat limosos, & melancholicos succos, qui in iecore gignuntur: hos enim attrahit per vas venosum, tanquam per gulam quandā. attractos autem non protinus in ventriculum excernit, sed ipse prius per multum ocium eosdem conficit, atque commutat. quicquid igitur eorum in succum huic visceri maxime accommodatum fuerit translatus, id spleni sit alimentum. quod autem ab ea confectio, quæ in liene fit, exciderit, neque in sanguinis tenuis atque utilis speciem transmutari potuerit, omninoque fuerit ad nutriendum inutile, hoc ad ventriculum per aliam quandam venosam gulam lien eructat, vtilitatem ipsum quoque non mediocrem præstans. Proprium autem lienis corpus, quod parenchyma à quibusdam dicitur, rarum admodum, & laxum est, inftar spongiæ cuiusdam, vt succos crassos facile trahat, & excipiat. Lien in sinistris est situs, semperque conuersa sunt eius sima ad dexteram ad iecur & ventriculum

VI
ticulum: gibil

Dexterren in
quam magn
inferior. a spi
atur in renis
concaua in fel
clera aduersa
quodam mem
ne non procul
habeat concav
vinctur: qui r
desin patet, licet
notatur vnica pe
aqueconque per
que separantur
vinctam per vres
amantur eo tem
tum habent ren
apas nominatur
quod. in suis ipsi
que sensos cuiq
olans serungo

De

idē, quæ vrian
os, quod lacu
int. proxime nam
vitem, & arteri
arteriæ, & ven
vitem. Alteri vere
tum ab his, quæ
vtrunque adim
quænam venam
omnia corpori
infrat. pari q
collū vasa sex
quo vretres q

De renibus.

Cap. 27.

Dexter ren in omnibus animalibus eminet elatior. is non-
 nunquam magnam iecoris fibram contingit: sinister autem
 est inferior. à spinæ autem vasis vena inquam, & arteria in-
 feruntur in renes non exiguae magnitudinis vasa. insuper ve-
 ro concaua in sese conuersa habent, gibba vero ad animan-
 tis latera aduersa. sinum tamen renis perspicue cernes corpo-
 re quodam membranoso circumdatum: qui in aliqua ipsius
 parte non procul à vasorum insertione aliud quoddam cor-
 pus habeat concauum, & oblōgum, nominatur autem mea-
 tus vrinarius: qui renem vesicæ committit. huiusque meatus
 os sensui patet, licet non adeo grande animal fuerit. Porro
 hic meatus vnica peculiari tunica obductus est, sicut alia om-
 nia, quæcunque peritoneo suspensa sunt. Cæterum vrinæ à
 sanguine separantur, renibus vrinam attrahentibus, indeque
 ad vesicam per vretres transmittentibus. quæ postea inde
 excernuntur eo tempore, quo analogismus iubet. Iam vero
 neruum habent renes, quantum lien, iecur, & vesica quæ fel-
 lis capax nominatur. hæc enim omnia neruos omnino exiles
 recipiunt, in suis ipsorum tunicis extrinsecus conspicuos: na-
 turæque sensus cuique tantum elargita est, quātum par erat,
 vt à plantis seiungerentur, & particulæ animalis essent.

De vesicis.

Cap. 28.

Vesicæ, quæ vrinam excipit, neruos à spinali medulla, qua
 parte os, quod latum siue sacrum vocant, situm est, natura
 infixit. proxime nanque ipsam ea medulla fuit collocata: ve-
 nas autem, & arterias, à propinquis ipsi vasis: qua scilicet pri-
 mum arteriæ, & venæ à magnis spinæ incumbentibus crura
 subeunt. Alteri vero vesicæ, quæ ad iecur sita est, arteriam &
 neruum ab iis, quæ in viscus ipsum inseruntur, deducēs, par-
 uum vtrunque admodum, ac vix conspicuum at sensibilē, &
 perspicuam venam ab iis, quæ sunt ad portas producens, tria
 hæc omnia corpori vesicæ vno in loco, ad id quod collū vo-
 cant, infixit. pari quoq; modo in vesicā aliā maiorem ad ip-
 sum collū vasa sex infixit, vtrinque videlicet tria. Cæterū mo-
 dus quo vretres quidē in vesicā, in intestinū vero meatus qui

Qij

bilem continet, infigitur, admirationē omnem excedit. nam oblique in ipsa inditi & intro vsque amplitudinē obliqui, ac prælongi pertinentes velut membranam quandam eorum, quæ intus sunt, succidunt: quæ ab excrementorum intro irumpentium impetu evertitur, atque aperitur, reliquo vero omni tempore concidit, & contrahitur: atque ita firmum operculum meatui efficitur, ut non solū humoribus, sed etiam flatibus reditus sit omnis interclusus.

De vulua.

Cap. 29.

Vulua intra peritonæum sita est inter vesicam, & rectum intestinum: ut recto intestino toti fere incumbat: ad umbilicum vero, quæ parte fundum eius est, maiore ex parte vesicam excedit: ad cunnum vesicæ collo superatur. Fœminarum vesica ad pubē collocata est, breuiorēque virili cervicem, & latiorē habet, quæ inter ossa, quæ pubis vocatur, in cunnum iuxta exteriorē, superiorēque eius finem pertingit. rectum vero intestinum ossi, quod sacrum appellatur, & quibusdam vertebriis lumborum insidet, sinuatur enim hac in parte intrinsecus spina dorsi. quocirca extrinsecus gibba videtur. Vulvæ magnitudo in omnibus æqualis non est. multo enim minor enixæ est, maior vero prægnantis, eius vero, quæ nunquam concepit, est etiā multo minor. quod in ætatibus etiam iis, quæ nōdum venereorum annos attigerunt, vsu venit. nam alioqui iis, quæ rebus venereis non utuntur, minor semper esse consuevit, atque eius quidem moderatam magnitudinem describere conabimur. superiorē eius partem vterus, hoc est fundum, iuxta umbilicum: inferiorē ad cunnum protendit. à loco autem vnde incipit, ad cunni terminum exteriorē, non æquale in omnibus est: plerunque tamen spatium moderatum est novem, aut decem digitorum. in latitudinem vero ad utraque ilia suis cornibus exportigitur. de finibus eius, quantum ad profundum pertinet, iam dictum est, vesicam & rectum intestinū vuluam terminare, illam supra, hoc infra. Cunus vero ea inanitas est, quæ intra ossa pubis penetrat, extrinsecus pelliculam quandam innatam habens, quæ virorum præputio proportionē responderet. Vulvæ figura cum in reliquo corpore, tum præcipue in eius fundo, vesicæ est similis. nam quatenus à lateribus pro-

VI
cessus quosdā
vesica differt:
in revolutioni
hinc inde xipari
dā cornu dedu

Corpus nervos
cauum simul, &
mus efficit. cum
invenit, ut in co
natus causa, q
quo meatu didu
vultur, quam ol
ora duos musculet
tūdam in vtram
ludo stabili per
modo huiusmodi c
i est, dum semen e
finem exquisitē t
in confertim quā
que vesica prope
modum lotium, al
importaretur, sim
ipsum occupat
tūbat, vsque ad pu
tūbus pudendū
modum erorum nō
nō imminet: in fi
nunt, vnde lotium
tūm esse oportu
nō pharyngi gur
tūm vocat
tūm, quod a
perit.

Ex Sordis de v

bus dicitur pūgna

cessus quosdā mamillis similes ad vtraque ilia emittit, in eo à vesica differt: quorum figuram Herophilus dimidiati globi reuolutioni assimilat: Diocles vero cornibus exorientibus. vnde κέρατος hoc est cornua, nomine ἀπὸ τῶ κέρατος, id est à cornu deducto appellauit.

De pudendū.

Cap. 30.

Corpus neruofum ex ossibus, quæ pubis dicuntur, exorientis, cauum simul, & ab omni humore vacuum genus pudendorum efficit. cum vero hic neruus cauus spiritu impletur, tum euenit, vt in coitu membrum intendatur, idque non solum coitus causa, quod forte quispiam existimarit, tenditur, sed quo meatu diducto & directo semen quam longissime eiacularur. quam ob rem in vtraque parte huius caui nerui natura duos musculos collocauit, quo meatus, ceu à manibus quibusdam in vtranque partem distractus dilaretur, toto pudendo stabili permanente. Futurum sane erat, vt meatus latitudo huiusmodi constructione conseruaretur. Vtile autem est, dum semen excernitur, meatum & latissimum, & rectissimum exquisitè teneri, quo semen totum sibi ipsi continuum, confertim quam celerrime ad vuluæ sinus perueniat. cūque vesica prope esset constituta, non erat melius ad excernendum lotium, alium meatum efficere, quam eo, quo semen importaretur, simul vti. Iure igitur & ipsius collum totum perineum occupauit, vt quod sursum ab ano, cui primo incubabat, vsque ad pudendi exortum feratur. In mulieribus vero, quibus pudendum non est prælongum, ceruix vesicæ huiusmodi exortum non habet: sed pudendum ipsum muliebri ano imminet: in finem vero eius superiorem collum vesicæ definit, vnde lotium profunditur: quod non magno opere inflexum esse oportuit, vt in viris, neque adeo longum. ceterum vt pharyngi gurgulio propugnaculum est, ita vteris, quam nympham vocant: quæ tegit simul, & prohibet ne ceruicis orificium, quod ad muliebri pudendum pertingit, refrigeretur.

Ex Sorano, de vulua, & pudendo muliebri.

Cap. 31.

Vulua dicitur μήτρα, & ὤσις, & δελφύς. ac μήτρα quidem,

Q^{11j}

L I B E R

hoc est matrix, quia mater est fortium, qui ex ipsa eduntur; vel quia eas, quæ vuluam habent, matres efficiat, vel ex quorundam sententia, quia constitutum & definitum tempus ad purgationes, & partus habeat. ἰσῆα vero nominatur, quod omnium viscerum sit extrema. idque cum exquisitè, tum vero latitudine. δῆλα φῆς Porro nuncupatur, quia δῆλα φῶς, hoc est fratres gignat. sita est vulua in coxendicum amplitudine, intra vesicam, & rectum intestinum. huic autem supraposita, vesicæ vero subiecta, quandoque tota, quandoque eius pars: quandoquidem pro eius magnitudine commutatur. nam in infantibus minor est, quam vesica. quocirca tota est vesicæ supposita, in virginibus vero, quæ ætatem florentem agunt, vesicæ est æqualis in iis partibus, quæ supra sunt sitæ. quæ vero ætate progressæ, & venerem expertæ sunt, ac multo magis, quæ iam pepererunt, in iis est maior. ut plerisque ad finem coli intestini conquiescat. * sed dum uterus gestatur, videre licet peritonæum in magnam molem elatū, itémque abdomen, quod etiam ex eo fit, quia tantus est fœtus una cum suis tunicis, atque humoribus, postquam vero fœtus est in lucem editus, contrahitur quidem vulua, sed ita, ut sit maior, quam ante partum. tunc igitur est maior quam vesica, sed non tanto, quantum sub eam graditur. nam in partibus anterioribus ceruix vesicæ est palmo maior, sinémque habet vrinaculum, & tota in muliebrem sinum porrigitur: ab hystera vero ante secessit. in posteriore vero parte, supra vesicæ fundum, vuluæ fundum est, vmbilico subiectū. ex quo fit, ut vesicæ amplitudo collo matricis adhæreat, fundū vero, vesicæ. Cæterum vulua connexa est tenuibus membranis partibus quibus subiecta est, vesicæ, iis vero que ei subiiciuntur, recto intestino: à lateribus vero, connexa est iis, quæ à coxendicibus & osse sacro exoriuntur. quibus sane partibus simul vlceratis inflammatione quadam, trahitur, & retro cedit: iis vero resolutis, & laxatis, concidit. Non est autem, ut quidam putauerunt, animal: loci tamen sensum, æque ac alia est consecuta, quam ob rem à refrigerantibus contrahitur, à rarefacientibus vero relaxatur. Vuluæ figura in mulieribus nō est circūuoluta, ut in animalibus quæ sunt rationis expertia: sed est cucurbitulæ, qua medici vtuntur, ad similes. rotundo enim & lato sine, qui ad fundum est, incipiens ad proportionem in angustum oscillum redigitur. oscillum nanque

namque appellant primam & prominētē eius partem. quod sequitur, collum dicitur: quod remanet, ceruix. horum concurfus, coles: quæ vtrinque post colli angustia dilatata primæ partes, humeri hysterae, quæ post hæc sita sunt, latera: quod subiectum est, basis. tota regio, conceptaculum, & venter & sinus. oscillum vero in medio cunno est. collum enim à labris genitalis muliebris constringitur. ab iis vero seuerum est os, in quibusdam magis, in quibusdam minus pro ætatis ratione: plerūque vero in adultis, quinque aut sex digitis. magis autem depromitur sub pariendi tempus, cum collum protenditur. Est vero eius etiā diuersa magnitudo. quāquam in plurimis secundum naturam tantum est, quantum externa ora amplitudinis audiendi sensus patet. dehiscit etiam quibusdam temporibus, vt cum corporis commiscendi libidine ducitur, vt semen excipiat, & in purgationibus, vt sanguinem excernat. Itēque in conceptionibus, pro ratione fœtus incrementi. in partu autem plurimum dilatatur, ita vt manum etiam totam intra se recipiat. suapte tamen natura delicatum & carnosum est. sed in iis, quæ venereis rebus ad satietatem vtuntur, inanitati pulmonis, aut linguæ molliciei simile redditur. in iis vero quæ sæpe conceperunt, callosius efficitur, capiti polypi, aut summæ gutturis parti, vt Herophilus scribit, persimile. callum enim contrahit tum eorum quæ excernuntur, tum fœtum exeuntium attritu. Vulua ex maiore eius facultate nervosa est. componitur enim non solum ex nervis, sed etiam ex venis, carne, & arteriis. ex quibus nervos à spinali mēbrana ad spinam accipit: venæ autem & arteriæ à vena caua spinæ adhærēte, itēque à crassa arteria in eam deferuntur. nam à vena caua duæ venæ diuaricantur: ab arteria vero crassa, duæ arteriæ. ex quibus vna vena, vnāque arteria ad vtrunque renem feruntur: deinde prius quam renibus committantur, in duos ramos discissæ duobus quidem processibus in vtrunque renem inferuntur, duobus autem vuluam circumplectuntur. ita fit, vt quatuor sint vasorum in eam insertiones, duo arteriarum, duoque venarum. ex iis ipsis in vtrunque testiculum vna vena, vnāque arteria simul implatur. adnati enim extrinsecus sunt testes prope ceruicem in vtroque latere singuli. constant hi molli carne, & glandosa: & propria membrana conteguntur. figura, non vt

Q. iij

in viris, sed oblongi sunt, modice limi, & rotundi, & ad basim paululum dilatantur. Meatus vero seminis à vulua in vtrumque testem procedit: [& * apparatus adiunctus, vsque ad vesicam.] eius collo committitur. hinc videtur foeminarum semen ad gignendum non recipi, quia foras effundatur, qua de re dictum à nobis est in libro de semine. Nonnulli vero, inter quos etiam est Chius, volunt æquales testium appendices, qui cremasteres dicuntur, eis committi. id quod nos propriis oculis intuiti in muliere, cui intestina in scrotum descenderant, historiae mandauimus. in qua cum chirurgiam exerceremus, testiculus ante cecidit, laxatis videlicet vasis ipsum continentibus & circundantibus, & cum eo cremaster concidit. Tota autem vulua ex duabus constat tunicis inter se ita formatis, vt chartarum villis sint per similes. quarum exterior, nervosior, perfectior, durior, leuior, candidiorque est: interior vero carnosior, hirsutior, mollior, & rubicundior: per totum vasis intertexta: sed pluribus & notabilibus in fundo: cum ibi semen agglutinetur, & inde purgator progrediatur. Duæ autem hæ tunice sibi mutuo adhærent, membranis gracilibus & nervis coniunctæ ita, vt sæpenumero his protensis, vterus concidat, cum scilicet nervosa tunica suo loco maneat, interna vero inuersa procidat. Est etiam hoc commune, vt in sterilibus vterus in fundo duo habeat amacula vt plurimum variis modis con duplicata. in iis vero, quæ pepererunt, tota extenditur, & rotunda efficitur. Iam vero Diocles vult in veteri amplitudine & acetabula, vel cirros, & cornua esse: qui processus quidam mamillares sunt, lati quidem ad basim, in summo vero minoribus terminis definiti: vtrique lateri à natura magna providentia adiuncti, vt foetus ante assuescat papillas mammarum ex fugere. sed qui ita sentiunt, in dissectionibus falsi sunt. neque enim acetabula comperiuntur: & omnino superuacanea est de eis instituta oratio. vt in commentariis de genitura animalium est demonstratum. Nunc vero minime existimandum est, vterum principatum ad vitam obtinere: quia is non solum procidit, sed in quibusdam etiam præciditur, nec tamen mortem affert, vt Themiso literarum monumentis commendauit. Præterea in Gallia sues habitiores, & valentioris alimenti fieri aiunt, postquam vterus abscissus fuerit. cum tamen vulua patitur, stomachum & membranas per consensum pati

sum pati ce
sensum qu
magna effi
intumescant
foetum alene
hoc euanesce
tiones nullæ
muri sunt,
do are sunt.
stantur. Ex qu
diuillas, & con
cimus, atque h

De p

Mulierem por
et nervosa, & n
non intus est, &
verunt, eius por
tum etiam in vi
lata carnosior
ta collo adnate
ralia, & superi
neum inferius
sæ subiectum est
recti intestini
travimus, est in
urum, aut conce
et etiam virilis
etiam naturæ ips
propensius, non
plurimis vero ea
les digitorum est
ribus, amiculum
productiones à
orem afferunt a
quis eo importat
membranam qua
tamque in excret
purgationes & c
aortum gignen

sum pati constat. eadem habet cum mammis naturalem consensum quendam. ex quo fit, ut cum florenti ætate vulua magna efficitur, mamme quoque vno & eodem tempore intumescant: ipsa quoque semen perficit: mame vero ad fœtum alendum lac parant. mensibus porro procurrentibus lac euanesceat: vbi vero lac in mammis est, menstrue purgationes nullæ apparent: quemadmodum etiam in iis, quæ amensiam sunt, contracta vulua mame itidem quodammodo arefiunt. si item fœtus patiat, vbera quoque angustantur. Ex quo conficitur, ut cum in prægnantibus mamas diuulsas, & contractas videamus, futurum abortum prædicamus, atque huiusmodi quidem est vuluæ natura.

De pudendo muliebri.

Cap. 32.

Muliebne pudendum, sinus etiam nominatur. membrana est nervosa, & modice rotunda, instar intestini, amplius tamen intus est, & foris angustius. in quo coitus fieri consueuerunt. eius porro interior pars collo matricis, quemadmodum etiam in viris, externa cunni labris, inferior ano: eius latera carnosissimis coxendicum partibus, superior denique vesicæ collo adnascitur. hoc enim, ut ante dixi, incidens sub ore vuluæ, & superne cunno adiunctum, in summo in vrinariū meatum inseritur. apparet ergo sinum muliebne collo vesicæ subiectū esse, ano vero, & constrictiori, & summæ parti recti intestini superstare. eius longitudo, ut supra demonstrauimus, est inæqualis. idque non solum habita ratione ætatum, aut concubitus, in quibus extensum vteri collum, ut est etiam virilis coles, partem quandam sinus occupat: sed etiam naturæ ipsius: quippe cum nonnullæ collum habeant propensius, nonnullæ vero admodum curtum, aut mutilum. plurimis vero earum quæ ad perfectam ætatem peruenerunt sex digitorum est, concidit tamen, angustiusque est in virginibus, amiculis occultatum coniunctis inter se per vasa, quæ productiones à vulua capiunt. quæ quidem in concubitu dolorem afferunt apertis ipsis amiculis. rumpuntur enim, & sanguis eo importatus de more excernitur. Putare autem tenuem membranam quandam exortam esse, quæ sinum intercipiat, eamque in excretionibus rūpi, & dolorem afferre, aut citius purgationes commouere, cumque in corpus euaserit, cum morbum gignere, quæ ἄτερτον, hoc est cum genitalia con-

LIBER XXXIY.

creta sunt, nec foramen vllum habent, falsum est. primum enim ex dissectione nihil tale inuenitur. præterea in virginibus deberet hæc membrana aliquantulum specillo resistere, sed specillum in profundum vsque ingreditur. tertio si cum vitiantur, hæc membrana rupta doloris est causa, necesse profecto erat, vt in virginibus antequam vitiarentur, cum purgationes apparerent, dolor quoque sequeretur: in ipsa vero excretionem, non item. Iam vero si membrana corporea reddita morbum creat, quo genitalia coalescunt, opus esset, vt id perpetuo eodem modo inueniretur, quo cæteras partes suo quasque certo & definito loco sitas intueretur. at in nõ perforatis mulieribus membrana hæc intersepiens quandoque in partibus labrorum, quæ in promptu sunt, inuenitur, quandoque vero in medio cunno, quandoque in medio ore vuluæ. Eiusmodi ergo cunus est. Quæ vero extrinsecus videtur *περιγώματα*, hoc est åbitus genitalis muliebris, tanquam labra sinus adstant. hæcque labra crassa sunt carnosaque: & ad partes inferiores in vtrunque femur desinunt, veluti inter se abscissa: ad superiores vero partes in eam, quæ nymphea vocatur, pertinent: quæ est horum duorum labrorum initiũ, suapte vero natura est caruncula, veluti fœtus. Nymphea autem appellatur, quia collo vesicæ subsultet. Vrinaculum vero nominatur, quod intus rugosum, asperũ, cauumque est, porro vesica virorum diuersa est à foeminarum vesica: liquidem illa maior est, & collum habet flexuosum: hæc vero cum minor est, tum vero etiam rectum eius est collum.

Lyci. moderatum viri pudendum ad os vuluæ non peruenire. Cap. 33.

Ante vuluæ amplitudinem eius collum, & os est situm, eius ori cunus adiacet, cuius tanta magnitudo est, vt magnitudo priapi, qui maximus non sit, ad semen in os vuluæ eiacularum non sufficiat: sed quadam etiam agglutinatione opus esse videatur.

FINIS LIBRI VIGESIMI QUARTI.

ORIBASII

ORI
N

Ex R. A.
ma



hypochondria
palida pertung
pilis tegitur, &
anterior ficipi
capiti imponitur
tera ficipitis
vbi capilli max
sub ficipite fr
crines vero rj,
ma vero frõtis
cilia: eorũ inter
est: cuius extre
natur, a globu
lina: cauitate
cernitur, in vt
na. Spina ver
lumina supra
tum id quod
est sub naso v
prolabia dicit
perculis oculi
vna superio
sunt, rati: è

ORIBASII MEDICI-
NALIVM COLLE-
CTORVM,
LIBER XXV.

Ex Ruffi commentariis, de nominibus partium hu-
mani corporis, Cap. 1.



Vemadmodum singule corporis humani
particule nominentur perdiscere, maxime
est ad medicinalem artem necessarium. ma-
xime autem corporis partes sunt, caput, cer-
uix, thorax, manus, cruræque. thoracé vero
non solum eam partem, quæ à claviculis ad
hypochondria pertinet, sed etiam id totum quod à claviculis ad
pudenda pertingit, appellamus. Caput vero dicimus, quod ca-
pillis tegitur, & simul etiam cum facie. Capillos habetis pars
anterior sinciput, qua coronalis futura sita est, vbi coronæ
capiti imponuntur. posterior pars occiput nominatur. La-
tera sincipitis, tempora appellatur. quod in medio capite est,
vbi capilli maxime inuoluuntur, verticis vocabulo gaudet,
sub sincipite frons est. iuxta tempora pilorum exortus, lanugo,
crines vero ij, qui retro ad occiput sunt, nuncupantur: vlti-
ma vero frontis ruga, episceniū: hirsutæ frontis partes, super-
cilia: eorum interuallū, mesophryon. postea nasus collocatus
est: cuius extrema pars globulus, subiecta vero septū nomi-
natur, a globulo carnosum illud, quod in labia descendit, co-
lūna. cavitates vero myxoteres, hoc est per quos mucus ex-
cernitur. in vtraque nasi parte, vnde odoratus efficitur, pin-
næ. Spina vero, quæ has cavitates continet, cavitās sub co-
lūna supra labrum philtrum, quasi amatorium dicitur. to-
tum id quod post nasum labri superioris est, hyporinō, hoc
est sub naso vocatur. duo deinde sunt labia, quorum extrema
prolabia dicuntur: vbi committuntur, prostomion. sub su-
perciliis oculi positi sunt, quæ oculos tegunt, palpebræ.
vna superior, inferior altera. nexus vero, qui claudendo
sunt, tarsī: è palpebris exorti pili, cilia, tarsorum fines, an-

L I B E R

guli: quorū alter qui ad nasum est situs, magnus: alter qui tē-
pori adiacet, minor vocatur. pupilla, aspectus, & glena dici-
tur id quod in medio oculo est, per quod aspicimus. alij ve-
ro aspectū dicunt, quo cernimus, pupillā vero & glenā ima-
ginem in aspectu esse volunt. quæ deinceps sequuntur ni-
gra, cœcia, aut flaua à colore nomen trahunt. circulus album
contingens, iris dicitur: sub oculis exorientia, hypopia: qui-
bus subiacent eminentiæ quædā, quæ malæ dicuntur, quibus
erubescimus. post malas, maxillæ sunt. quarū genæ desinūt in
acutā maxillæ inferioris partē. inde vsque ad labiū inferius,
quod rotundū eminensque est, barba. hypion quod sub bar-
ba est. carnosam partem mentū voco. alij leucaniā. quidam
hoc mentū, leucaniā vero cauum iugulo proximum vocant.
Aures vocantur eminentiæ, quæ in vtraque temporum par-
te ad foramina sunt exortæ. earū foramina, meatus audiēdi,
quibus audimus. pendulæ partes & carnosæ, fibræ. cartilagi-
næ, & supremæ, pinna. helices, quæ inde ambitum attingūt:
anthelices quæ post helicem, cauitatem in medio extollunt:
cauum post anthelicem, concha. eminentiam oppositā con-
chæ iuxta fines temporis, hircū vocant, quod contra hunc
est, crassus anthelicis finis antitragus, id est, contra hircū di-
citur. Os vocatur prima labiorum sectio, & amplitudo, quæ
vsque ad fauces pertinet. in ore cum alia quedam sunt, tum
præcipue dentes: quorum anteriores, quia secāt, *τεκνικοί* no-
minantur, suntque octo numero. hi deinde quatuor caninis
dentibus cinguntur: vltra quos reliqui omnes viginti maxil-
lares sunt, horum intimi atque vltimi sophronisteres, id est
moderatores quaterni vocantur, quod eo tempore quo mo-
derati esse incipimus, exoriantur. caruncule dentes continē-
tes, gingiue, maxillarum colligatio, habena, mensæ latæ mo-
larium sumitates: mortariola, & præsepia, cauitates maxilla-
rum, in quibus dentes sunt infixi. vnde lingua exoritur, ra-
dix appellatur. ceruix id quod sequitur. prælingua pars ante-
rior: parafyra, quæ ab vtroque linguae sunt latera. hipogios-
sis pars inferior, epiglossis vero intimum gutturis operculū
ad asperam arteriā, ne deglutiendo quippiam in pulmones
delabatur. Cum spiritum ducimus, sublimis epiglossis attol-
litur, ne aëris transitus impediatur. quod orbiculatū in par-
te, quæ supra linguam est, cœlum, & palatum dicitur. inde ad
partes internas pendens caruncula, columella nominatur.
hanc

hanc alij gurg
caput: tum o
arteria, emin
& occiput, cl
dion quasi ce
que in humer
caput. Scapuli
intermedia en
scapularum est
ro est cauitas h
cidit. brachiū c
cumbimus, an
in carpum defic
nus. hypotheca
la manus. Ex di
ceteris, alter qui
medius, quartus
vero ossa scutic
condyli dicunt
consequuntur, t
radices vnguiu
tes, thesar, spari
tum enim hunc
volam videtur.
ris, petro vero d
bi extrema spin
me. earum extr
ossa costæ & sp
ossis pectoris ex
alij præcordium
tra inter costas,
non tangunt. e
partes sub carti
venter dicitur.
imposita est. mi
circundata, ve
gata fenestrate
qualiculus. hui
aut pubes nom
pendens pars,

hanc alij gurgulionē, alij vuā vocant. ei subiectū est bronchi caput: tum collum. eius pars anterior bronchus, & aspera arteria, eminētia quæ in medio est, larynx. posterior ceruix, & occiput, claviculis proximū cauum iugulum, & anticardion quasi cordi oppositum vocant. hoc tendines excipiūt, quæ in humeros pertinent, epomidas, humeros vero brachij caput. Scapulæ vero lata ossa sunt dorso incumbētia, eorū intermedia eminētia, spina, acromion vero clauicularū & scapularum est copula. deinceps cataclides sequūtur. ala vero est cavitās sub humero, in quā saepe humerus luxatus cōcidit. brachiū consequitur. angulus articuli, cui reclinati incumbimus, ancon, aut olecranon. deinde cubitus sequitur. is in carpum definit: post quem metacarpium est: tum vlna manus. hypothenar vero, quod sub pollice est: quod excipit vola manus. Ex digitis vnus pollex dicitur, seiunctusque est à cæteris, alter qui primus aliorum quatuor est, index: tertius medius, quartus anularis, quintus parvus appellatur. horum vero ossa scuticulæ, aut phalanges vocantur. eorum inflexus condyli dicuntur: quorum primi procondyli, qui deinceps consequuntur, metacondyli nuncupantur. vnguium initia, radices vnguium vocant: fines digitorum, acinos aut vertices, thenar, spatium, quod inter indicem, pollicēque est. totum enim hunc locū Hippocrates nominasse thenar, hoc est volam videtur. & claviculis quod ante est, pectus, & os pectoris, retro vero dorsum. à ceruice, qua metaphrenum est, lumbi extrema spinæ ora, carnosæ in pectore eminentiæ, mammarum extrema papillæ. latus id totum quod sub ala est: ossa costæ & spathæ. earum primæ se mutuo contingunt, in ossis pectoris extremo: vbi cor est, tum septum transversum, alij præcordium, alij cor vocant. ex quo est os ventriculi. spatia inter costas, intercostalia vocantur. Spuriæ costæ, quæ sese non tangunt. earum extremitates, cartilagines. musculosæ partes sub cartilaginibus sitæ, hypochondria. tum alius, quæ venter dicitur. quod in medio est, epigastrium, cutis ventri imposita est. media eius cavitās, vmbilicus. cutis vmbilico circumdata, vetula, quæ inde nomen inuenit, quod corrugata senectutem significet. sub vmbilico abdomen est, & aqualiculus. huic continua pars ad pudendum vsque, pecten, aut pubes nominatur. Ex genitalibus mēbris virilibus propendens pars, colis, & stema: quæ non pender, hypostema,

LIBER

aut perinæū. colis extremitas est præputiū: scrotū in quo testiculi sunt. pars superior, caput: inferior, fundū vocatur. pars scroti laxior, laccopedon est. In mulieribus, quod supra est, pecten. prima sectio dicitur scissura: musculosa in medio caruncula, myrton, aut nympha: myrtochila vero, labia utrinque cōstituta. Ossa dorsi vertebræ sunt. tota vertebrarū cōpago, spina: cuius inferior pars lūbus: spinæ terminus, os sacrum: quod alij hypospondylum vocant. huius vltimum os, coccyx, id est, cuculus nominatur. Partes utrinque lūbis adiectæ nates dicuntur: clunes vero carnosæ partes sub lumbis sunt: quæ sedilia quoque nominantur. initia femorum, inguina: internæ partes, femina vocatur. quæ intermedia sunt ad perinæum vsque, interfemina. muscoli genibus inhaerentes, epigunides: ossa vero, patella. Hippocrates mylen vocat. genu articulus est, quo femur cruri committitur. inflexio, poples dicitur. magnus musculus anterior cruris, fura: vnde latus nervus exoritur ad calcem protenditur. ossium cruris quod posterius est, tibia: quod anterius, anticneamium. extrema pedum, malleoli. tali vero non rite vocantur. sunt enim illi quidem, sed tamen non apparent. pars postrema pedis, rotundaque, calx. quæ deinde sequitur, cauum: consequens vero pedion vocatur, cuius superior pars tarsus. planta denique totius pedis positura. digiti vero eiusdem nominibus, quibus digiti manus, nuncupantur.

Ex Galeni lib. de ossibus.

Cap. 2.

Tota omnium corporis humani ossium inter se coniunctorum compages sceletos nominatur. eorum coniungendorum duplex est ratio: altera per articulum, altera per symphyisin, ac per articulum quidem ossium compactio naturalis est: symphysis vero est ossium unio naturalis. Utrique autem definitioni additum est verbum naturalis, quoniam quæ de articulo deciderunt, quæque articulum sunt præteruicta, coherent quidem inter se, sed non natura. in quo genere sunt ea quoque, quæ fracta callum obdaxerunt: siquidem uniuntur, sed non tamen natura. Cæterum ceruices sunt tenues ossium processus: & in crassum, rotundumque finem terminantur: idque caput appellatur. at cum processus in acutum finem desinit, non iam amplius ceruix, sed

coronæ

corone, vel coronon nuncupatur. Ex cavitatibus, quæ caput excipiunt, quæ altius descendit, cotyla, quæ in superficie est, glena ab aliquibus vocatur. Ossa autem tanquam fundamenta quædam ad vniuersam corporis substantiam sustinendam subiiciuntur, & quasi subternuntur. siquidem in eis omnia adnascuntur, & stabiliuntur. ex iis quæ grandia sunt, maximasque cavitates habent, medullæ sunt plena, parua autem plenæque tota sunt, alia, cavitatem nullam habent, quæ sensu dignoscatur. Grandibus magna ex parte in extremo, aliorum ossium appendices adnascuntur: vt brachio superius, cubito inferius. radio vero, ac femori, & cruri, ac suræ, ab vtraque parte. maxillæ vero inferiori medulla inest: sed appendix non adnascitur. verum eius finium alter, qui inferior est, per symphylin, hoc est coalitum vnitur: superior in duos processus, in coronem, ac ceruicem tantum desinit. Differt autem ἀπόφυσις, hoc est processus, τῆς ἐπιφύσεως, id est ab appendice, quia epiphysis est vnio ossis cum alio: apophysis vero est totius ossis pars.

De ossibus capitis.

Cap. 3.

Os capitis caluaria nominatur. naturalis vero figura capitis, est oblongæ sphaeræ potissimum similis: alia vero acuminata est. naturale autem caput anteriorem ac posteriorem partem prominentiorem habet: tresque habet futuras in se, duas transversas, quarum altera in occipite est, altera in syncipite. tertia porro à medio posterioris per capitis longitudinem vsque ad mediam anteriorem extenditur. anteriorem vero coronalem nominant: quod coronæ in ea præcipue capitis parte collocentur: posteriorem labdoidem, propter similitudinem, quam habet ad Λ litteram, vocauerunt. harum trium futurarum figura literæ H est maxime similis. Caluarię igitur, quæ figuram naturalem habet, futuræ sunt huiusmodi. at acuminatæ, sic constitutę sunt, vbi posterior eminentia perit, ibi etiam futura labdoides aboletur. vbi non est anterior, tum ne coronalis quidem: sitque vtraque remanentium futurarum figura T literæ persimilis. harum autem eminentia, quæ vtrinque est, deperdita, duæ futuræ quæ seruantur, ad rectos angulos decussantur ad X literæ figuram. altera nanque transversa per medium caput potissimum extenditur: altera vero à parte posteriore per longitudi-

nem in anteriorem fertur: quemadmodum in aliis omnibus caluariis conspicitur: siquidē ea semper conseruatur: at reliquę cum totius capitis figura variantes intercidūt. Duę præterea ab hac pari interuallo distantes lineę per capitis longitudinem à posteriore in anteriorem partem tendunt. sunt hæ duobus ossibus inter se cohærentibus, non per futuram, sicut quę ante diximus, sed cum os sincipitis paulatim attenuatum in squamā descēdens in id os, quod infra ab auribus ascendit, subintrat. quam ob rem quidā non absolute futuras has, sed futuras lepidoides à squamę similitudine, aut agglutinationes squamis similes vocauerūt. à nobis vero clarioris doctrinę causa futurę squamis similes ad aures nominentur, vt quinque sint proprię capitis futurę, labiodoides, coronalis, quę recta per longitudinem fertur: duę æque distantes, quę in ossibus squamę similibus sunt. Duę quoque alię cōmunes sunt superiori maxillę, & ossi, quod ambarū medium est: quod os aliqui inter ossa capitis numerant, alij vero superiori maxillę attribuunt. situm enim est medium inter caput, & maxillā superiorem tanquam cuneus quidam. huius igitur futurę quicquid sursum ad coronalis finem fertur, id est commune cum capite: quicquid vero ex utroque latere ad palatum descendit, id superiorem maxillā determinat ab ossē, quod à cunei similitudine, qui σφῆν dicitur, sphenoides appellatur. atque ita à nobis, vt clarior doctrina sit, nominetur. Id os processus quosdam habet, qui ab alarum similitudine pterigodes vocantur, vna cum iis cavitatibus, quę eis ab utroque latere adiacent. Alia autem futura capitis, quę ipsum à superiore maxilla discernit, ex cauis temporum initium ducit: atque inde ad oculorum sedes progreditur: & per ipsos medios tendens iuxta medium superciliorum sibi ipsi coniūgitur. Quę cum ita habeant, totius capitis ossa, sphenoide excepto, sex sunt: duo sincipitis, quibus cōmunis est ea futura, quę recta per longitudinem porrigitur: duo infra ad vtranque aurem: quintum post hæc, os occipitis: sextū frontis est. porro sincipitis ossa quatuor habent latera: quę ad vtranque aurem, tria latera: quintum os capitis, quod occiput est, maximum omnium, quę sunt in capite, foramen iuxta primam vertebra[m] habet. Ceterū ex his sex, quę commemorauimus, ossa sincipitis sunt rarissima: densissimum vero firmissimūque occiput. inter hæc me.

me suū locum
ri. eorum enim
cominatur: id
minatur. in ho
ndine appellat
na belenoidem
or auditis cōtin
tus est, quorū
d. altera præter

De ossib.

Masculo tempo
ram habet in me
ossē capitis, quod
alij parte ad parū
num iugale num

De ossib.

Maxillę superio
ri sunt ossa, qui
d. quod ad iuga
læcelis, & sed
ile completur
na est, precedit
oculo habetur
dentes continent
locatum. His
d. magnitudin
d. dentium, præte
d. quę maximi
qui narium forat
ssa duo sunt. hor
cartilagineorum
os restat in fine
num, & alueoli c
detur, quod ossa
tatur: quandoq
siccatis futura m
per totum palat

mediū locum tenet os frontis, duo reliqua inferiora sunt varia. eorum enim pars quædam lapidosa, vt etiam re vera est, nominatur: idque protensis labdoidos futuræ finibus terminatur. in hoc est processus styloides à columnæ similitudine appellatus, quem nos ab acus, aut styli scriptorij forma belenoidem, aut graphoidem vocamus. & in eodē meatu auditus cōtinetur. altera deinceps eius pars iuxta eos exortus est, quorū alter mamillaris vocatur, alter ossis iugalis est. tertia præterea pars est, quæ à temporibus occupatur.

De osse iugali.

Cap. 4.

Musculo temporis prepositum est os, quod obliquam futuram habet in medio ita, vt omnis eius pars posterior cum osse capitis, quod ad aurem est, anterior cum extrema supercilij parte ad paruum oculi angulum cōtinuetur. id vero os totum iugale nuncupatur.

De ossibus maxilla superioris.

Cap. 5.

Maxillæ superioris in vtraque parte & dextra, & sinistra tria sunt ossa, quibus capiti adiungitur. eorum maximum est, quod ad iugale est situm. nam & aliquid temporis, & supercilij, & sedis oculorum, & totum paruum angulum in se complectitur, & ad eam vsque partem, cui malo nomen est, preceedit. deinceps situ, ac magnitudine os in ipso oculo habetur, quo nerui ad superiorem maxillam tendentes continentur. omniū minimū ad magnū angulū oculi est locatum. His omnibus tribus in vtraque parte os notabilis magnitudinis subiacet. hæc enim pars malum dicitur: & dentium, præterquam incidentium, alucoli. His item ossibus, quæ maxima sunt, vt diximus, duo alia parua adiacent: qua narium foramina ad palatum tendunt. quinetiam nasi ossa duo sunt. horum ora inferior exortum habet corporum cartilagineorum, atque tenuium, quæ alæ vocantur. vnum os restat in fine maxillæ, in quo radices dentium incidentium, & alucoli continentur. id quod plerunque simplex videtur, quod ossa, ex quibus constat, exquisitissime committantur: quandoque tamen in sceletis mirum in modum exsiccatis futura manifesto cōspicitur: quæ illi directa est, quæ per totum palatum fertur.

R

De dentibus.

Cap. 6.

Dentes sexdecim vtraque maxilla continet. ex his quaterni primi, qui vnicam radicem habent, incisores nominantur. hi deinde caninis dentibus ex vtraque parte cinguntur. quorum vnica etiam est radix. vltra quos vtrinque maxillares quini sunt: qui in superiore maxilla ternis, in inferiore binis radicibus nituntur. præter eos, qui in superiore quaternis radicibus fulti sunt, & in inferiore tribus hærent: ac præsertim duo omnium primi interiores. tertius autem per raro ita inuenitur. quibusdam vero non quini maxillares, sed quaterni, aut seni oriuntur. hos vero non solum maxillares, sed etiam molares vocant. omnes autem in suorum ossium cauis infiguntur. nam ossa eos continentia phatnia dicuntur, caua autem, quæ subeunt, bothria nominantur. Ex ossibus porro dentes tantummodo mollium cerebri neruorum sunt participes: quam ob rem ipsi soli perspicue sentiunt.

De maxilla inferioris ossibus.

Cap. 7.

Neque etiam inferioris maxillæ os simplex est, vt alicui fortasse videbitur. siquidem etiam costum dissoluitur in summa meti extremitate: vt ipsum coaluisse plane appareat. eius pars quæ quasi ad caput protenditur, in duo extrema desinit: quorum altero, quod acutum est, tendinem ex musculo temporis descendente recipit: altero vero articulatur capituli ossi sub eo exortu, quem mamillarem vocant: atque ibi in paruulum sinum rotundo quasi tuberculo sese inserit.

De osse labdoide.

Cap. 8.

Os labdoides hac forma est præditum, vt media eius pars, quæ ad occiput est, collum & totum corpus in duas partes fecet. ipsum vero os breui longitudine videbis. latitudinem vero, altitudinemque ita habet exigua, vt à partibus finis inferioris duo latera ad sublimes angulos cartilaginis, quæ scuti formam præfert, obliqua, vt nuper dicebam, procedant. superior vero labdoide ossis terminus duo alia habet latera processus mutuos facientia, infernis partibus tenuia, angusta, orbiculata, crassa instar acus, aut styli scriptorij extremitatis. substantia vero horum laterum obliquorum, quæ ipsa quo-

quoque leuiter deorsum verſum vergunt, eſt exquiſita mem-
brana, & quoddam teres, vt nerui ſunt, ligamētum, quod ab
extremo vtriuſque exoritur. ſiniſque ad proceſſus capitis ſty-
li ſcriptorij ſimiles, qui ſimillimi ſunt ſublimibus labdoideos
lateribus, extenditur: ſiquidem eorum ſubſtantia ex carti-
laginibus cōtat: eadēque figura in omnibus cernitur. Sed
exortus ſtyli ſcriptorij ſimilis, minor eſt, quam laterum lab-
doidis oſſis longitudo.

De ſpina.

Cap. 9.

Totius ſpinę vertebrę ſunt quatuor & viginti. ſi vero plu-
res aut pauciores fuerint, id præter naturam erit, vt etiā ſunt
acuminata capita, eorum compago omnis in collum, dor-
ſum, lumbos, & os ſacrum diuiditur. collum capiti anne-
ctitur, collo deinceps dorſum, quod tanta longitudine eſt, quā-
ta eſt etiam thorax. quod reliquum ſubeſt, lumborum no-
mine continetur. quorum pars vltima ſacro, aut vt quibuſ-
dam placet, lato oſſe finitur. Vertebrę aut ad collum, aut
cervicem (ita enim etiam appellatur) ſeptem ſunt nume-
ro: ad dorſum duodecim: ad lumbos quinque. Ex colli
vertebris primę duę inter ſe vndique articulantur: reli-
quarum vero quinque pars anterior vinculo conſtricta fir-
mo coaleſcit. neque enim (vt quidam arbitrantur) per car-
tilāginem coaleſcunt, ſed ea tunica, quę geminas ſpinalis
medullę membranas extrinſecus complectitur, ſeſe in me-
diam ipſarum ſedem inſinuans, commune vtriſque vinculū
efficitur, eodēque modo vertebrę omnes ſe habent, præ-
ter duas primas, vt diximus. Cūque capitis duplex ſit mo-
tus, alter qui annuendo, abnuendōque ſit, alter, quo in late-
ra caput mouetur: primum ſecundę vertebrę proceſſus qui
pyrenoides, id eſt turbinatus dicitur, potiffimum effici: alte-
rum vero primę vertebrę ad capitis coronem articulationis
oblique ſcilicet partes & ipſius primę vertebrę, & item ca-
pitis. Proceſſus autem pyrenoides accliuſ eſt: & ab anteriori-
bus ſecundę vertebrę partibus initium ducēs, valido quo-
dam, rotundōque ligamento capiti alligatur: eique prima
vertebra locum, in quo apte, & tuto innitatur, præbet: & ex
eadem prima vertebra tranſuerſum quoddam ligamentum
oritur, quod ei intus obducitur. hęc nonnulli à dētis ſimili-
tudine odondoidē proceſſum vocāt. Hippocrates vero to-

R ij

L I B E R

tam vertebram aliquando dentem nominat. sunt etiam in parte primæ vertebræ inferiore duæ cavitates, quas ab oculi sinus similitudine glenoidas vocant, similes superioribus. suntque non ab re maiores superne, ut capiti articulatae: inferne autem minores: quibus secunda vertebra obducta est. prima vertebra est latissima: secunda angustior, validiorque est, atque ita deinceps cæteræ omnes. quanto enim spinalis medulla, dum in nervis gignendis consumitur, fit tenuior, tanto vertebrarum inferiorum foramina minuuntur: quorû singula medullæ, quam ambiunt, crassitudini respondent. id quod in omnibus vertebris est commune: quemadmodum transverso quoque processuum, eorûque qui deorsum sursumque versum spectant, quibus inter se articulantur, cõmunis est ratio.

De osse sacro.

Cap. 10.

Hoc etiam os, quæ cum vertebra, quæ supra est posita, articulatur, vertebris proportionem responder. nã declives eius vertebræ processus ab osse sacro excipiuntur, sicut ipsa recipit eos, qui supra se sunt siti. quinetiam eius spina est similis ei, quam reliquæ eadem vertebræ habent. ipsius autem processus, qui ad latera pertinent, grandes, latique sunt: quibus in parte exteriori sinus est quidam glenoides, in eumque ossa illi ingrediuntur. id os ex tribus particulis, tanquam ex propriis quibusdam vertebris constat. quibus in extremis accedit quartum aliud os, quod coccyx dicitur. Hæc si coquendo dissolvantur, eorum compages vertebrarum constructioni similis videbitur.

De coccyge, id est cuncto osse.

Cap. 11.

Ad imum sacri ossis alterum os est, quod coccyx nominatur: quod ex tribus propriis particulis est cõflatum. sunt tamen magis cartilaginose, ac præsertim in extremo, quam os sacrum sit.

De ossibus thoracis.

Cap. 12.

Os pectoris, costæ, & vertebræ spinæ docti ossa thoracis sunt. costæ ab utroque latere duodecim sunt. sicut etiam vertebræ: singulæ enim singulis articulantur. ossa vero pectoris per synarthrosim inter se copulantur. eaque septem sunt numero:

numero: quod
storis ossi tri
storis figura e
nullis appellat
cartilaginem.
non vna simp
sunt, in anterio
rum progreffe
obrem quicqu
sed cartilago. q
turce cum sepe
quidam cartilag
mo delinguitat
in, neque alius ex
breiores sunt, m

De ossibus

Scapula posita
spinae apert. & el
gemini, per muscul
un dicens hunc
minij locum pi
hunc compagem
præter hanc amb
est, quod in hunc
& acromion ad
cessus quidam se
in extremo in a
tenduntur. Est etia
te interiore pro
ndent, ideo à no
ro coracoides, q
exterioris vergit

Iugula ab ver
tari articulantur
ne inequali.

numero: quot etiam costæ, quæ cum eo articulantur. imo pectoris ossi triangula cartilago adnascitur. tota vero ossis pectoris figura ensi est similis, quam ob rem Xiphoides à nonnullis appellatur. quidam vero non totum sed eam tantum cartilaginem, quæ in imo eius est, ita nominant. costarum non vna, simplèxque figura est. nam ubi vertebris articulate sunt, in anteriora & inferiora pariter feruntur, atque ita multum progressæ, ad os pectoris protinus versæ recurrunt. quam ob rem quicquid cum pectoris ossè committitur, non os est, sed cartilago. quinque autem reliquæ costæ nothæ appellantur: eæ cum septo transverso atque inter se connatæ in exquisitam cartilaginem delinunt: postrema ab aliis tantum in imo distinguitur: & re vera est spuria. longitudo vero neque his, neque aliis costis est eadem: sed supernæ, atque infernæ breuiores sunt, mediæ longiores.

De ossibus scapularum.

Cap. 13.

Scapulæ post thoracem sunt sitæ. eæ cum ossè occipitis, & spinæ apicæ, & thoracis costis, & eo ossè, quod ante laryngem est, per musculos copulantur. os vero scapulæ à spina iniunctum ducens humile est, paulatimque augefcit, donec ad acromij locum peruenerit: ibique cum iugulo connectitur. hanc compagem nonnulli anatomici acromion vocant. alij præter hæc ambo, quæ coniunguntur, aiunt aliud tertium os esse, quod in hominibus tantum inueniatur: quod caraclida, & acromion appellant. ea vero parte, scapularum ossi processus quidam subest: quem scapulæ cervicem vocant. isque in extremo in acetabulum definens, cum humeri capite articulatur. Est etiam huic ossi alter exiguus, acutusque in parte interiore processus, qui quoniam anchoræ similitudinem refert, ideo à nonnullis ancyroides, nuncupatur. ab aliis vero coracoides, quia extrema eius pars, vt corniculæ rostrum exterius vergitur.

De iugulis.

Cap. 14.

Iugula ab utraque parte supernæ pectoralis ossis extremi tati articulantur: eaque fistulosa sunt, & figura, & crassitudine inæquali.

R. iij.

Manus in tres maximas partes diuiditur, in brachium, cubitum, & eam, quæ extrema manus appellatur. ergo brachij os, excepto femore, est omnium maximum. estque vtrinque supra, infraque articulatam. nam ad humerum habet caput grandiusculum parue cervici adnatum. in eo iuxta partem anteriorem sinus quidam est, cuidam quasi latæ scissuræ similis: qui totum caput in duo quasi tubercula bipartito diuidit. pars inferior in tubercula inæqualia desinit: quorum ei, quod extrinsecus est, radij capitulum articulatur. cum eo vero quod interna in parte est, nullum os penitus committitur. rotundum autem brachium est, non rectum tamen, & vndique simile: sed in anteriore, exterioréque parte gibbū, posteriore vero, & interna, simum.

Id totum, quod inter brachium & carpum situm est, cuiusque etiam partis os maius, cubitus appellatur. isque alteri subest os i, quod radium nominant. huius autem extrema pars superior leniter caua exterius brachij tuberculum complectitur. huius autem articulationis id munus est, vt totam manum modo in primum, modo in supinum adducat. Cubitus duarum coronarum processus habet: quorum anterior est minor: alter maior: & ab iis cubiti sinus sigmæ literæ similis circumdatur. in hunc sinum orbita brachij, quæ trochleæ similis inter eius tubercula est posita, inseritur. huius articulationis officium est, vt totam manum extendat, & incuruet. Cubitus vero infra, supraque validis copulis radio alligatur. media inter se omnino dehiscunt. vterque ipsorum habet appendicem iuxta brachialis partes, in parte exteriori gibbam, interiore vero cauam, cubitus minimo digito, radius pollicis responder. brachiale nanque in eiusmodi sinum sese insinuat, & articulatur. Inest etiam cubito ex abundantia quadam processus, qui à columnæ similitudine styloides nominatur: qui brachiali itidem articulatur. huius munus est, brachiale in latera perducere, alterius in rectum: cuius opera summam manum extendimus, atque inflectimus.

Brachiale ex octo ossibus duplici ordine distinctis constat.

ea vero dura,
figura. pars bra-
chijque in rotu-
dioque articula-
metacarpio arti-
culus insidet, qui
sunt sitæ.

De me-

Inter digitos &
tribus gaudent.
legi (sic enim os
vocat) adnecti
intermedium à lat-
qui digiti ex tribus
modo in sinum
tum, vt pollicem
hæ alteramus: pri-
mo non esse num-
mum quod primis d-
carpij non item
tum. at qui terti-
porum ossa qua-
a quinque const-

De ossibus

Rectis ab utroque
quo quedam ossi-
nem impositum.
teriores vero p-
tumque inde
aperforatæ, que
his nuncupantur
tabulum inest,
coalescit.

Femoris os m-
te sunt. id vero
tus autem fem-
gibba, posterior

ea vero dura, paruaque sunt, nec medullosa, multiplicisque figure. pars brachialis superior ex tribus ossibus est constructa: quæ in rotundam quasi formam redacta, cum cubito, radioque articulatur: pars vero inferior quatuor suis ossibus metacarpio articulatur. quintum denique iis brachialis partibus insidet, quæ ad processum styloidæ cubiti potissimum sunt sitæ.

De metacarpio, & digitis. Cap. 18.

Inter digitos & brachiale ossa interiecta metacarpij vocabulo gaudent. metacarpion vero primæ digitorum phalangi (sic enim ossa digitorum nominantur, aliisque scuticulas vocant) adnectitur, & coalescit. pollicis solum primum internodium à lateribus brachiali est articulatum. quare singuli digiti ex tribus ossibus sunt conflati, priore semper internodio in sinum subsequenti subeunte. estque consentaneum, ut pollicem quoque ex tribus constructum esse ossibus asseramus: primumque eius internodium cum metacarpio non esse numerandum, cum ab utraque parte articuletur: quod primis digitorum ossibus accidit, ossibus vero metacarpij non item. quinque autem digitorum ossa sunt quindecim. at qui tertium pollicis os metacarpio adscribunt, digitorum ossa quatuordecim esse volunt, metacarpium vero ex quinque constare.

De ossibus nomine vacantibus. Cap. 19.

Rectis ab utroque latere, magnisque lati ossis processibus duo quædam ossa adiacent, quibus integris nullum est nomen impositum. superiores eorum amplæ partes, ilium ossa: exteriores vero post femoris ingressum, inferioresque coxendicum: quæ inde in anteriora protenduntur, tenuisque sunt, ac perforatæ, quæque inter se in extremo coalescunt, ossa pubis nuncupantur. Vtrique autem coxendici prægrande acetabulum inest, quod cum femoris capite nexu validissimo coalescit.

De Femore. Cap. 20.

Femoris os maximum est eorum omnium, quæ in animalibus sunt. id vero supra coxendici, infra tibiæ articulatur. Totius autem femoris forma in parte anteriore, exteriorisque gibba, posteriore vero, & interiore sima est. Duos processus

R iiij

habet, quos trochanteras vocant: minorem sub ceruice, multo maiorem vero exteriorem, quem $\chi\alpha\tau\acute{o}\nu$, hoc est natem appellant.

De tibia.

Cap. 21.

Tibia vocatur tota pars cruris, quæ inter genu, & talum intercedit: eodémque nomine os grandius eiusdem, appellatur. tibia autem exteriore in parte sita est, eisque tantummodo femur articulatur. os quod extrinsecus est, sura nominatur: quæ crassitudine tibix mirum in modum cedit, nec ita protenditur, ut genu attingat: sed infra, supraque tibix per synarthrosin annectitur. media vero inter se penitus dehiscent. quicquid autem tibix in parte anteriore tenue, & carnis est experte, ocrea dicitur: imæ ab utraque parte tibix & suræ, partes malleoli dicuntur. qui gibbi rursus, & omnino carnis expertes, extra alia prominent. hos plerique talos vocant: sed errant vehementer. nam talus sub his utrinque continetur, & unde quaque contegitur, ut ne eum tangere quidem possis. porro malleoli sunt extremæ partes tibix, suræque processuum: gibbæ quidem in parte exteriore, ut etiam patet, interiore cavæ.

De Patella.

Cap. 22.

Ad tibix femorisque articulationem os cartilaginofum, rotundumque extrinsecus est, quod gibba & veluti tubercula subiectorum ossium accommodatis sinibus comprehendit: paulumque intumescens eam amplitudinem quæ inter femur tibiæque est, complectitur. hoc os à nonnullis patella, à nonnullis vero mola nominatur.

De ossibus pedis.

Cap. 23.

Ab iis processibus, de quibus nuper dixi, qui in ima tibia, suræque sunt, talus comprehenditur. eius pars, quam $\tau\acute{\iota}\tau\alpha\phi\omega\nu$, hoc est quatrionem vocant, sursum vergit. huic subest os pedis maximum, quod calcem vocant. idque & rotundas partes à talo recipit, & geminas eminentias, quas habet, in sinu eius commode inserit. Ex partibus eius anterioribus, quæ è regione magni digiti sita est, ipsius tali capiti subiacer: nec cum altero osse copulatur: eius vero extremitas, quæ minimo digito respondet, cum eo osse, quod à tessere similitudi-

ne cyboide
tem positum
qua cū talo
ceps sequunt
ti per synarth
ex parte cybo
rior ossa, tarsi
ex quinis ossib
cipiunt: qui sin
guli manus, cor
eos ex duobus
ne esse puto, qu
alibi comperiat
nime necesse est

De mu

Musculi labro
re, quatuor nun
obliqui duo des
est id, quod men
parte singuli col
ambo superiore
versus alter dunt
rum est ratio. na
trahitur, si alter
exteriores exten
ribus vero conti
conducitur, ut ab
obliqui, & recti

De mu
moue

Vt autem nor
tam motus buc
culum natura se
locavit: qui cum
anatomicè disci
munt à spina q
collum est, in o
quiescente max

ne cyboides vocatur, per synarthrosin connectitur. hoc autem positum est à parte exteriori iuxta scaphoides: sed hoc qua cū talo articulatur, cauū est: cyboides vero gibbū. Deinceps sequuntur tria ossa parua, quæ inferiori scaphoidis parti per synarthrosin iunguntur: cum quibus etiam exteriori ex parte cyboides pariter exporrigitur, post autem hæc quatuor ossa, tarsus pedis finitur. atque inde incipit planta, quæ ex quinque ossibus constituitur. quæ deinceps digiti pedis excipiunt: qui singuli ex tribus internodiis, non secus quam digiti manus, constant: pollice tamen excepto, qui solus inter eos ex duobus est ossibus conflatus. Atque hæc quidem satis esse puto, quæ de ossibus sciantur. nam si quod ossiculum alibi comperiat, ut in corde, aut aliud huius generis, minime necesse est, ut hoc loco à nobis exponatur.

De musculis labiorum.

Cap. 24.

Musculi labiorum, qui ipsi etiam cuti exquiste permiscuntur, quatuor numero sunt. superne quidem vtrique à malis obliqui duo deferuntur: inferne autem à summa maxilla quæ est id, quod mentum vocat, totidem sunt, ibique in vtraque parte singuli collocati, alter à dextris, à sinistris alter. si enim ambo superiores tendantur, labrum superius sursum trahitur: si alter duntaxat, versus illum attrahitur. eadem inferiorum est ratio, nam si ambo tendantur, labrum inferius infra trahitur: si alter tantum, ad illum attrahitur. Iam vero si villi exteriores extendantur, fit, ut labra inuertantur: ab interioribus vero conuertantur, & in rugam contrahantur. ex quo conficitur, ut ab his quatuor musculis octo motus, quatuor obliqui, & recti totidem edantur.

De musculis sub colli cute latentibus, ac buccas mouentibus.

Cap. 25.

Vt autem non solum labia plurimum diducerentur, sed etiam motus buccarum perficerentur, latum, tenuemque musculum natura foris produxit, & vnum in vtraque parte collocauit: qui cum in buccas, labraque desinant, ab omnibus anatomice disciplinæ peritis sunt ignorati. initium enim sumunt à spina quæ ad collum est sita: totique cuti, quæ circa collum est, in orbem subtenduntur. ij musculi vna cum labris quiescente maxilla inferiore buccas mouent. Licet etiam ei

qui velit dentes inter se committendo ambas buccas in contrarias partes, ad latera colli distorquere. in quo eueniet, vt ipsa etiam cutis tendatur: & potissimum ad humeri caput, & extremū inibi clauiculæ, denique ad omnia colli latera. Præterea qui conuellendi sunt, in eis hi muscoli primi omnium intenduntur. & conuulsiones quæ caninæ dicuntur, sunt horum præcipue musculorū affectiones, hæc autem pars clarioris doctrinæ causa, musculosa dilatatio à nobis appelletur.

De nasi musculis.

Cap. 26.

Musculos, qui nariū pinnas mouent, tales natura esse pronunciare perspicue oportet, qualis est & latus musculus, quē nos inuenimus. nam & hic villi subter cutem coherescunt, à quibus mouetur. sunt autem admodum perexigui: & à malis ipsi quoque sumunt initium, & vnus vtrinque in suam quisque nasi pinnam inseritur, ipsamque aperit. ac nasus quidem à nullo musculo contrahitur: veruntamen cum prædicti muscoli cessant ab actione, tunc medium statum nasus acquirit. extra prædictam vero apertionē à nullo musculo nasus adducitur: sed in vehementioribus inspirationibus pinnæ spiritus impetum sequuntur. Cæterum nasus deorsum trahitur labra ex appensione consequens.

De muscolosa frontis natura, quæ sub cute est.

Cap. 27.

Quinetiam frontis cuti musculosa quædā natura, tenuisque subtenditur, quæ cum ea coalescit. quocirca tota frontis cutis, maxilla etiam quiescente, mouetur.

De musculis oculorum.

Cap. 28.

Musculus, qui ad basim est, siue quis vnum, siue duplicem, siue etiam duos, aut tres, qui coalescant, esse dicat, ad firmandum oculum valet: vbi præsertim exiguum aliquod corpus directo cernere diligenter oporteat. Præterea vero constringit, munitque nerui mollis immissionem. quod si vnquam alius oculum prominētiorem vidisti, si quidem cernit adhuc, & affectus ipse absque plaga occidit, scito hunc mollem neruum propter musculi resolutionem extensum esse: sin vero amplius non videt, iam ipse itidem neruus affectus est.

est. si vero propter vehementem percussione[m] prominere oculum contigerit, siquidem adhuc aspicit, musculus ipse solus: si non, nervus quoque est ruptus. Ceteri omnes, qui oculum movent, sex numero sunt: quorum quatuor rectis motibus præsunt: duo reliqui totum orbem circumvertunt. sed hi à maioris anguli partibus prodeuntes ad minorem perveniunt: ex cæteris quatuor vnus sursum attollit, alter deorsum trahit, tertium naso admouet, quartus foras versus oculum extrahit.

De musculis palpebras mouentibus.

Cap. 29.

Sub cute palpebras contingente membranæ tenues sunt, quæ musculos etiam palpebram mouentes, qui parui plane sunt, tegunt. extenduntur autem ipsæ ab aponeurosis, quæ in tarsum inferuntur. porro alter musculorum in maiore angulo oculi, apud nasum ad latera constitutus, ad tarsi partem dimidiam, quæ illic est, peruenit. alter vero obliquus & ipse, sed ad minorem angulum extensus, ad reliquam tarsi partem dimidiam sibi propinquam prorumpit. Cum igitur musculus qui prius est dictus, agit, partem palpebræ sibi continuam quæ est ad nasum, deorsum trahit: cū vero alter, reliquā sursum trahit. si vero ambo vno tempore iuxta palpebram tendant, sursum quidem ea ipsius pars, quæ ad minorem angulum est, trahetur: quæ vero ad maiorem, deorsum, adeo ut oculus nō magis elausus sit, quam apertus. eaque palpebra est quam καμύλον, hoc est reflectā Hippocrates appellauit. quam in morbis magni mali signum statuit. quinetiā hanc palpebræ euerisionem alibi λαοσι vocat: sit quæ huiusmodi affectio cum vterq; musculus conuellitur, & sibi continuā tarsi partē ad se trahit. si vero alter musculus agat, & ad se palpebrā trahat, alter vero prorsus quiescat, aperiri tunc, & claudi totam palpebram contingit. semper enim pars altera tarsi, quæ mouetur, trahit secum & reliquā. ita ergo in superiore palpebra res habet, inferior autē non est motus particeps: sed est oculo semper adstricta, atque appressa, & ad vnguem circumplectens, & excrementa omnia facile potest exprimere. Præstantissimi autem anatomicorum naturæ artificium in palpebris inuenisse, & recte exposuisse mihi videtur, ut nunc diximus: quibus ego omnino assentirer, si mihi persuadere possem, me perspicue eum musculum, qui est ad maiorem angulum,

conspexisse. nunc autem neque illum aperte vnquam vidi, & in egilopum chirurgica curatione non modo plerunque abscinditur, sed totus etiam ille locus sic aduritur, vt squamæ à subiectis ossibus abscedant: cum interim motui palpebræ nullum impedimentum afferatur. ex quo fit, vt animaduersione indigere, mihi videatur.

De musculis maxillam inferiorem mouentibus.

Cap.

30.

Quatuor coniugationes musculorum inferiorem maxillam mouent. qui sursum eam tendunt, temporales vocantur, & qui intra os siti sunt. qui vero ad latera adducunt, in buccis sunt, quos masticatores vocant, nomine eis ab usu, quem præstant, imposito. reliqui duo deorsum trahunt. sed hi cum angusti sunt, tum etiam oblongi: & post, infraque aures incipiunt, & per collum prorsum tendunt: deinde in idem mutuo, quæ maxillæ inferuntur, coeuntes ipsam aperiunt, cum tenduntur. hi soli inter omnes musculos carnosas habent ambas partes extremas, mediam vero, tendinem exquisitum. ex tribus reliquis coniugationibus, quæ & valide, & magnæ sunt temporales singuli in extremas maxillæ cornices & in ipsam maxillam pertingunt. ad cornicis vero exortum validis aponeurosis, quibus tum sursum maxillam trahunt, tum os ipsum claudunt, inferuntur. quocirca hos musculos quidam masseteres vocant. Maxime autem hi muscoli, qui oculorum sunt vbi pariuntur, & conuulsiones, & febres, & caros, & deliria inuehere consueuerunt: propterea quod proxime principio nervorum oriuntur. Musculi vero, qui ore continentur, latis, concavisque maxillæ inferioris partibus incumbunt. ad palatum vero ascendunt inserti cauis ossibus, quæ inibi sunt, quæ ab exortibus, qui ab alarum similitudine pterigoides vocantur, ambiuntur. ibidem etiam validus quidam tendo est situs. Tota porro horum musculorum pars, quæ vergit ad latera, cum temporibus coalescit: & eandem, quam illi actionem obeunt: inferiorem scilicet maxillam in parte inferiore sursum trahentes. reliqui duo muscoli extrinsecus longitudini maxillæ inferioris insident: præteruerti autem, atque inserti ad mandibulæ in masticationibus circumactionem à natura comparati, carnosam quoque buccarum partem

tem consueuerunt
cutores non
bus non mi
tionem in
se vehementer
ter eos fuerint
conteri a mo
rum actio, h
exiderunt, re
trahi, cum in
nem consueuerunt
nem consueuerunt
per trahere, &
teratur. Extrinsecus
culus, vt alia
rus, maximo a
carum inferiores
tenues, ac lati

De ma

Abata prim
ex osse capitis
alter alter a si
n conspicunt
per lineam tra
men non per
duo muscoli, s
scapularum v
aliquid etiam
musculos, an
re possumus, s
prehendunt. I
Post dissectum
musculorum
quæ tenuis quæ
greditur, sem
qualis hi max
in angulorum

tem constituunt. Conuenienter igitur hos musculos masti-
catores nominant: tametsi hæc etiam musculis temporali-
bus non minus conueniat appellatio. illi enim eam vnã a-
ctionem in masticationibus tantum obeunt, vt dentes inter
se vehementer committant, ex quo consequitur, vt siquid in-
ter eos fuerit, id comminuatur. cibum præterea læuigari ac
conteri à molaribus, quasi molis, est masticatorum musculo-
rum actio. hi enim ipsi & cibos mutant, & qui à dentibus
exciderunt, rursus eisdem commissis adducunt densi, ac con-
tracti, cum interim temporales muscoli nihil ad masticatio-
nem conferunt. lingua vero non mediocriter ad hanc actio-
nem confert: vt quæ instar manus cuiusdam cibos in ore sem-
per transfert, ac voluit, quo pars omnis ipsorum æque con-
teratur. Extrinsicus vero vnus vtrunque masticator hic mus-
culus, vt alia quædam manus linguæ adiutor est compara-
tus. maximo autem ad eam rem ei adiumento sunt fines buc-
carum inferiores, qui cutacei sunt, & ad labia spectant: ad quos
tenues, ac lati muscoli perueniunt.

De musculis quia à capite in scapulas inseruntur.

Cap.

31.

Ablata prima omnium musculosa latitudine duo muscoli
ex osse capitis, quod in occipite est, vtrunque vnus, à dextris
alter, alter à sinistris animalis partibus, sese contingentes ori-
ri conspiciuntur. gracilis autem eorum exortus est, latiusque
per lineam transversam ad aures procedens, ad vtranque ta-
men non peruenit: est multo breuior. hinc prorumpentes
duo muscoli, semper magis amplificantur: & tandem spinis
scapularum vsque ad vtrunque humeri caput inseruntur, &
aliquid etiam clauicularum comprehendunt. Hos autem
musculos, ante dissectionem in gymnasticis euidenter cerne-
re possumus. sunt enim plenissimi, & totam cervicem com-
prehendunt. Eorum munus est, vt scapulas ad caput trahant.
Post dissectionem horum musculorum exortum altera quædam
musculorum exilium, & longorum subiacet coniugatio,
quæ tenuis quidem & lata in exortu est: sed tamen dum pro-
greditur, semper magis fit teres. longitudo est prædictis æ-
qualis. hi nanque ex loco occipitis ossis capitis incipientes
in angulum inferiorem basis, quæ ad scapulas est, inseruntur.

corum non est æqualis latitudo . sed in aliquo multum minuitur. porro masculus vterque ad finem tenuem tendinem producit, ad principium basis scapularum, exquisitè tererem instar nerui: qui tendo ab interioribus partibus prope basim prouectus, & vsque ad eius dimidium progressus ita demum in ipsius basis os inseritur. Huius utilitas est, basim scapularum è directo capitis extollere. at priores musculi non solū basim, sed totas etiam scapulas sursum tollunt.

De musculis scapulas mouentibus.

Cap.

32.

Musculi vtranque scapulam mouentes septē numero sunt: duo ab occipite deorsum feruntur, de quibus supra est dictū. tertius ex obliqua eminentia primę vertebrę exoritur: quartus ab ossē laryngē continente: alij duo exortū habent à spina dorsi: septimus à lumbo in articulationem inferiorē ascendit maximus musculus, cuius omnem naturam in ea libri parte exponam, in qua de musculis articulum humeri mouentibus agetur. Exoritur enim à prima vertebra, & in extremitatem spinę scapularum, qua elatior est, apud humeri caput in tertiam fere ipsius vniuersę partem inseritur. Hic musculus carnosus est, minimèque latus: & scapulam in latera ad partes colli adducit, qui vero ex ossē laryngem continente exortum habet, is in eam præcipue altioris costę scapularum partem inseritur, vbi est processus illius initium, qui ab anchorę similitudine ancyroides nominatur. angullus, longūque hic musculus est, & scapulam ad anteriorem colli partem versus proprium principium adducit, quod est commune musculorum omnium. qui vero à costis, & à lumbo in humeri articulationem ascendit, ac toti basi, simisq; scapulę partibus ad humiliorem costam adhæret, ex inferiore atque anteriore parte totam scapulam his apprehensionibus deorsum, atque antorsum in seipsum trahit. Ex reliquis vero duobus musculis, alter in superficie ex omnibus thoracis vertebris exoritur in partem ipsius spinę inferiorem inseritur. alter qui huic subiacet, tū ex septem vertebris thoracis, tum vero etiam ex quinque cervicis exoritur: inseritur vero in totam cartilaginosa basis partem. vterque autem ipsorum scapulam retro abducit. sed is, de quo primo loco dixi, trahit

V I
trahit etiam
trahit. si an
scapulam a
ipsi sunt ex

Capitis pro
desque insunt:
nes habet: alter
in anteriora im
qui vna cum cer
pulo post agetu
mus musculis loq
musculorum, que
mus sursum tol
simque, & latoru
cu etiam altera c
artibus est, ducit
m oblique feru
inter coalescūt, a
sunt quam ob r
que cervicis later
& rior. & motus d
obliquus est motu
conuegat. huius
gu sunt adeo, ut
preterim in gremi
re retro ex occipite
numero quāplures,
quorū alterū collo
pius propriū. Quo
musculos diuiditur
prima conuagatio la
agultatur, ut fiat v
si sunt æguli, simili
si quā plures quā di
quido musculorū
vero duæ: quarum

VIGESIMVS QVINTVS. 320
trahit etiam deorsum, secundus veluti ad ceruicem sursum
trahit. si ambo simul tendantur, retro versus spinam totam
scapulam ad septē priores thoracis vertebrae, quibus etiam
ipsi sunt exporrecti, abducunt.

De musculis caput mouentibus.

Cap.

33.

Capitis proprii motus, citra colli motum, breuissimi, dupli-
cesque insunt: quemadmodum duplices quoque articulatio-
nes habet: alteram, qua ad latera circumuertitur: alteram, qua
in anteriora anuit, in posteriora renuit. Capitis vero motus,
qui vna cum ceruice eduntur, multo plures sunt, de quibus
paulo post agetur copiosius. in praesentia vero de propriis
eius musculis loquar. praedictę igitur coniugationi graciliū
musculorum, quos ex occipitis osse exorientes scapulam di-
ximus sursum tollere, succedit altera, quę trāsuer sum, carno-
sumque, & latum exortum habet vsque in aures pertinentē:
cui etiam altera coalescit, quę principium à parte, quę sub
auribus est, ducit. hæ per totum collum ad anteriorem par-
tem obliquę feruntur: atque in primo quidē exortu medio-
criter coalescūt, at in loco deinceps subsequētī magis dehi-
scunt. quam ob rem nonnullis fortasse duo musculi in vtro-
que ceruicis latere, nō vnus, esse videbuntur. amborum vero
& vsus, & motus, & villorum positura est similis. nā & eorū
obliquus est motus, & vsus, vt animalis caput antorsum cir-
cumagant. huius igitur coniugationis musculi admodū ma-
gni sunt adeo, vt etiam ante dissectionem in hominibus, ac
praesertim in gymnasticis perspicue internoscantur. Qui ve-
ro retro ex occipite exoriuntur, sunt his multo minores, &
numero quāplures, ac dicet quispiam, eorū esse genera duo:
quorū alterū collo & capiti cōmune sit, alterū vero solius ca-
pitis propriū. Quod vero colli, capitisq; cōmune est, in octo
musculos diuiditur: in vtroq; spinę latere quatuor: quorum
prima cōiugatio latos in occipite exortus habēs descēdēdo
agustatur, vt fiat vtriusque musculi figura triāgulo, cuius re-
cti sint āguli, similis. hi sane musculi, ex vtraque parte vnus,
tāquā plūcæ quēdā aliis superiacēt. quibus sublati tres ali-
quādo musculorū cōiugationes euidenter apparēt. plerūque
vero duæ: quarum altera secundum spinā extensa musculo;

leniter latos habet, qui obliqui ab osse occipitis ad spinę latera feruntur. altera teretes, cum illi muscoli villos ex partibus capitis, quę ad latera sunt, vnde etiam exoriuntur, è contrario habeant in spinę apicem tendentes, quos vbi sustuleris, sub aspectum perspicue cadent ij, qui ex capitis articulatione nascuntur: qui ex communi principio ad occipitis finem articulationem contingunt. quorum qui robustior est, in posteriorem processum secundę vertebrę, alter obliquus in latera primę porrigitur. tertius vero musculus hos ambos coniungit, à latere processus primę vertebrę in posteriorem secundę pertingens. inseritur autem hic musculus in ipsius exortus latera. alius, qui prius est dictus, in ipsum processum apicem, quam acantham vocant. Huic alius musculus parvus subiacet qui ex occipite prodiens in primam vertebra[m] pertinet. Horum octo musculorum exiguorum, quos postremo loco memorauimus, actio est, vt solum capitis articulū: eorum vero, qui his incumbunt, totum collum vna cum capite moueāt. Caput igitur abnuendo recta solum muscoli mouent, qui in primam ac secundam vertebra[m] recti procedūt: cum parua autem in latera inclinatione ceteri quatuor: quorum duo à capite exorti lenitēque obliqui in latera abducunt. ceteri duo huic etiam motui adiumento sunt: & eam obliquam extensionem quę ex musculorum sibi oppositorum, quos modo diximus, motu facta fuerat, in caput cum partibus continuis primę vertebrę ad naturalem situm reducunt. Est autem perspicuum ex vno tantum musculo agēte motiones obliquas effici: si vero vterque vnus coniugationis musculus agat, vnum rectum motum reddi. simili quoque modo in musculis, qui his incumbunt, totum collum occupantibus, obliqui obliquum abnuendo mouent, recti vero rectum faciunt. Duo præterea ex prioribus partibus musculi sunt caput vna cum cervice mouentes, robusti, & longi. hique ad quintam vsque thoracis vertebra[m] progrediuntur, omnibus cervicis vertebra[s] parte anteriore incumbentes, & stomacho subiecti. horum exortus ab inferioribus capitis partibus exiit: isque carnosus est, eamque occupat regionē, quę capitis articulatione & inferiore labdoidis future fine continetur: cum toti agunt hi muscoli, caput cum cervice flectunt: cum vero superior tantum eorum pars, quę à capite in primam & secundam vertebra[m] inseritur, ipsum solum caput

caput annue
& perspicua
musculis
circa articulat
motiones: q
nectit, altera se
et perspicua. I
bre articulat
sum paruorum
inquam choru
sem ignorauit.

De mus

Asperæ arteria
tur, & compr
larynx reuellit
inferiore recte li
arterie longitud
m inferuntur,
dehinde videbu
si sunt scutiform
bus exorti ad os
bus comprehend

De propriis

In anteriorib
prefert, duo mu
construitur, hi re
et humilioribus
solum profu
musculi a sinibu
limentis singuli
que perinde vt
nem cogunt, &
de cartilaginib
tuor ex secund
retorsum, parti
rem laryngis ei
qui prius quant
ginē scuti form
quant: ei vero q
hi musculi acti

caput annuendo mouet. hæcque pars quandoque propriam & perspicuam descriptionem habet, quæ posterioribus paruis musculis proportionem respondet. sunt etiam ad latera circa articulum capitis aliæ duæ paruorum musculorum coniugationes: quarum altera primam vertebra capitis adnectit, altera secundam primæ coniungit: eaque non semper est perspicua. Horum actio est, vt ipsas solas primæ vertebræ articulationes ad latera annuendo moueant. Horum omnium paruorum musculorum, qui articulationem capitis tanquam chorus ambientes, coronant, alius aliam esse actionem ignorauit.

De musculis asperæ arteriæ Cap. 34.

Asperæ arteriæ proprii musculi sunt quatuor à quibus arctatur, & comprimitur, cum hi fuerint extenti: & os hyoides, & larynx reuellitur. quorum maiores initium sumunt ab inferiore rectæ lineæ ossis hyoidis termino: tum in totam arteriæ longitudinem porriguntur, & in os pectorale interius inferuntur. Quandoque etiam hi duo musculi tibi esse bifidi videbuntur. alij vero duo ex partibus, quæ ad latera sunt scuti formæ cartilaginis. & ex partibus eius inferioribus exorti ad os pectorale terminantur, & arteriam à lateribus comprehendunt.

De propriis laryngis musculis. Cap. 35.

In anterioribus partibus eius cartilaginis, quæ scuti formam præfert, duo musculi sunt, alter ad dextram, alter ad sinistram constitutus. hi recti ad eius longitudinem incumbunt, atque ex humilioribus ossis labdoideos lateribus exoriantur. hi sursum prorsumque cartilaginem trahunt. Duo autem alij musculi à sinibus posterioribus cartilaginis scuti formam referentis singuli vtrinque exorientes gulæ inferuntur, ipsamque perinde vt constrictores, comprehendunt. hi cartilaginem cogunt, & contrahunt. Alij duo bifidi primæ & secundæ cartilaginis fines coniungunt, & cogunt. post quos alij quatuor ex secunda cartilagine in tertiam se insinuant: qui partim retrorsum, partim in latera articulationem contrahunt: superiorem laryngis extremitatem aperientes. hos sequuntur alij duo, qui prius quam larynx apertus sit, non apparent. hi cartilaginem scuti formam referentem aritenoidi perpetuo coniungunt: ei vero quæ vacat nomine, non perpetuo. habent autem hi musculi actionem prædictorum quatuor actioni contra-

etiam. diligenter enim stringunt una cum duobus bifidis in
feriorem laryngis extremitatem. Iam vero ad basim tertiæ
cartilaginis musculus est bifidus, aut duo coalescentes, qui
cartilaginem cogunt, & laryngis partem eis proximam
claudunt.

*De propriis musculis ossis Labdoideos, quod etiam
hyoides nominatur.* Cap. 36.

Duo lati musculi os hyoides inferiori maxillæ conjun-
gunt, ex partibus quæ sunt ad latera rectæ lineæ ipsius hyoi-
deos enati: atque in partes quæ ad latera sunt inferioris ma-
xille, post exortum musculorum, qui maxillæ sunt proprii,
inseruntur. Alij duo musculi in extremam maxillam mutuo
coniuncti se insinuant. horum principium est superior extre-
mitas ossis labdoideos. alij vero duo à radice ossis quod à
styli scriptorij similitudine graphoides dicitur incipiunt, at-
que in rectas labdoideos ossis lineas infernæ extremitati, v-
trinque vnus, inseruntur. Hæ solæ tres conjugationes sunt
soliis labdoideos propriæ: cique breues quosdam motus im-
perant. atque vna quidem à basi belenoideos processus in-
cipiens in posteriorem regionem ipsum abducit: alia ad late-
ra maxillæ ascendunt, atque id ad maxillam sursum trahunt.
Cæteri musculi ex osse hyoide orientes, aliarum particularū
causa potius sunt facti, hi quidem in scapulas, vt eas moue-
rent, vt ante docuimus, hi vero in linguam, vt de ea dicetur:
& reliquis deinde post hos ad fauces extrinsecus adiectus: si-
ue quis vnum bifidum, siue duos coalescentes, quod mihi
quidem potius probatur, malit dicere. hi nanque asperam ar-
teriam contrahunt, & os labdoideos infra retrahunt.

De musculis mouentibus linguam. Cap. 37.

Ex musculis, qui linguam mouent, duo à basibus proces-
sum, qui belenoides ab acus similitudine appellantur, initiū
ducentes, angusti & longi progrediuntur, & in partes quæ
sunt ad latera linguæ vtrinque singuli, inseruntur, ac moti-
bus obliquis præfunt. cæteri omnes ex osse caput laryngis
ambiēte, quod hyoides appellatur, exoriuntur: tū in linguam
per duas conjugationes sese quatuor inserunt: eamque eui-
denter mouent. quintus qui bifidus est, quiq; à superio-
re sine rectæ hyoideos lineæ principium sumit, sub linguam
inseritur secundum eius longitudinem ad extremum vsque
maxillæ inferioris in id quod mentum vocant, qua maxillæ
ossa

ossa coalescunt, pertingens. hic musculus sursum ad maxillā os hyoides retrahit: illisque oppositus est, qui os ipsum ad pectorale os deorsum trahunt: nullum tamen in lingua perspicuum motū facit. alii vero quibus euidenti motu cietur, quatuor sunt: quorū duo ē finibus superioribus hyoideos exoritur, vnde etiā musculus ille bifidus, de quo diximus, verū ad eius latera potius fere: ceteri duo deinceps ex obliquis recte lineæ, & humilibus eiusdem ossis lateribus enascuntur: quorum maiores in mediam linguæ regionem sese perpetuo contingentes inferuntur, & ad eum anteriorem linguæ locum perueniunt, quem *στέφανον*, hoc est ligatum vocant: minores vero in latera inter hos & eos, qui ab vtraque basi processus belenoideos procedunt. ceterum horum musculorum motus posituræ pro portione respondent, vt obliquorum obliqui, rectorūque recti sint motus: quemadmodum eorum, de quibus prius diximus, ad latera. Prædictis autem omnibus musculis subiiciuntur ab imis partibus ii, qui transuersos villos habent, à tota lingua exerti, & in totum fere maxillæ os, præterquam in mentum inserti. hi musculi extenti extollere, & curuare linguam possunt.

De musculis faucium.

Cap. 38.

Locus quidam gulæ & laryngi communis est antepositus, in quem vtriusque os ascendit. eum locum isthmū, quia angustus, oblongusque est. vocant corpus eum ambiens fauces nominant, ad cuius vtranque partem musculus est, qui in edenda voce, & in deglutiendo munere fungitur suo.

De musculis, collum mouentibus.

Cap. 39.

Hoc loco de propriis colli musculis agemus. duo ab vtraque eius parte musculi sunt: quorum alter posterior potius, anterior alter censetur, ac posterior quidem ex eminentia quæ ad latera est primæ vertebræ, exoritur ea parte præcipue, quæ ipsa conuexa est, vel maxime. nam ex anteriore eminentia potius musculus, de quo supra verba sunt facta, exortum ducit, qui ad scapulæ principium ascendit. hic vero posterior colli musculus, de quo instituta oratio est, ad scapulas vsque peruenit, ex omnibus vertebris per ligamenta valida exortus, vt multi esse musculi videantur: inferiorque ipsius orator thoracis musculo in scapulæ simis posito est exquisitè continuus. alter vero colli musculus anterior, initium ducit à perforato secundæ vertebræ processu, & simul cū aliis muscu

S ij

L I B E R

lis cervicis exoritur. illinc autem per axillas ad quintam usque thoracis costam peruenit, sextam etiam nonnunquam attingens. eius etiam portio quedam in primam claviculae costam, quae deinceps succedit, inseritur. rotundus autem est potius hic musculus, & longus. eius vero actio, in eo quod cervici admotus est, eo pertinet, ut ipsam ad anteriora obliquam flectat, in eo vero, quod ad vertebrae thoracis peruenit, ut thoracem dilatat. quocirca praestabit, ut vel duos musculos inter se unitos eo modo, quo praedictos, existimemus, vel si vnus censendus est, ut in numerum musculorum thoracis referatur. euidenter enim thoracem dilatare perspicitur: collum vero annuendo, non ita euidenter mouere. oppositam vero ei motionem habet praedictus musculus: qui & ipse in latera, & ad posteriora magis totum collum flectit. Si vero ambo vna tendantur, media colli totius inflectio in latera efficitur. Si vero anteriores duntaxat qui ad vtrunque latus sunt, nimirum dexter & sinister, tendantur, totum collum antorsum annuere: si posteriores, totum retrorsum reuere cogunt. Si vero omnes quatuor simul tendantur, collum in nullam partem vergens tum euadit, quemadmodum itidem in ea affectione contingit, quae tetanus nominatur.

De musculis in simis scapularum thoracem dilatantibus Cap. 40.

Musculum qui magna dilatatione thoracem diducit in vtraque parte vnum, siue scapulae, & thoracis communem appellare ipsum quis velit, siue thoracis solius ex iis, qui ad scapulam sunt, nullum erit discrimen. exoritur hic à basi scapulae, toti simae parti extensus. siquidem haec ipsius pars delitescit. quod vero deinceps sequitur, totum patet. quod quidem thoraci ad eum usque musculus, qui à ceruice in sextam costam descendit, inseritur. quinetiam hic musculus duas costas ex iis, quae nothae dicuntur, iam prope cartilaginosos processus conscendit. non est autem continua eius insertio: sed tanquam in quosdam paruos discissa musculos: qui singulatim singulis costis attribuuntur. deinceps vero post omnes huiusce musculi anteriores extremitates principium exortus sumit maximus abdominis musculorum, qui discissus ipse quoque simili modo exortibus appenditur.

De

Vbi musculos scapulæ mouentes abstuleris, tum eum, qui in simis scapulæ partibus est, de quo nuper dictum est, facillime numerum omnium brachium mouentium musculorū consequere. Cum enim omnes vndecim sint, tres à pectore in brachium ascendentes, duos ex illius sedibus, quinque ex ipsa scapula prodeuntes, & vndecimum postea præter hos omnes, qui epomida occupat, intueberis, paruum vero musculum, qui ad articulationem est, ab hoc omni sermone reijicio. horum motus sunt hi, musculus epomida occupas brachium sursum potissimum ad rectam lineam attollit. ex iis, qui ad vtranque huius partem sunt, ab ipsa exorti scapula, is qui prope altiore costam est, attollit quidem, sed inclinat ad anteriora: ex iis autem qui prope humiliorem costam siti sunt, maior supra ipse quoque tollit, sed ad exteriora vergit, qui vero est tanquam eius pars, oblique ad exteriora brachium abducit. hos motus excipiunt intrinsecus quidem musculi à pectore ascendentes, hi que, siue tres siue quatuor esse dicuntur: extrinsecus vero is qui ab inferiore humilioris costæ termino sursum fertur. ergo ex omnibus musculis, qui à pectore nascentes ad interiora brachium adducunt, qui altissimus est, caput brachij magis attrahit: qui vero maximus est, & bifidus, totum artum pectori adducit. Si ergo vterque eius musculus æque tendatur, motus equalis efficietur: si alter tantum agat, altior altiore, humiliorque humiliorem adductionem molietur. Musculus vero qui secundum mammam est, cum brachium ad pectus adducit, tum deorsum detrahit. post hos vero qui in superficie est tenuis musculus versus illa leniter ad latera trahit: qui post hunc est maximus, brachium recta ad costas extendit. reliqui postea duo musculi ab ipsa scapula excepti, brachium ad exteriora, posterioraque circumagunt: alter qui à simis enascitur, eius caput retrorsum circumuertit: alter ab inferiore humilis costæ extremitate, eam potissimum partem in quam inseritur, extrorsum abducit. Si vterque munere suo simul fungatur, brachij circumductione, quæ fit in duplicatione, quam vocant, efficiunt.

De paruo musculo, qui in articulatione humeri est. Cap. 42.

Hunc musculum aliquis partem magni illius, qui in brachio est, & etiam ipsum per se musculum esse statuet. potest enim obliquæ extensioni aliquantulum conducere.

S iij

LIBER

De musculis articulationem quæ in gibbo cubiti est,
mouentibus. Cap. 43.

Articulatio quæ in gibbo cubiti est, à quatuor musculis totum brachij os in orbem cōplectentibus mouetur. duo priores articulum non recto exquisire flexu vtrique, sed alter extrorsum, alter introrsum inclinando flectunt. si vtrique tendantur, medius flexus fit, qui carpum ad humeri caput adducit, qui vero introrsus magis flectit maior musculus, euidēter etiam ante dissectionem, totam anteriorem brachij partem complectens conspicitur: incipit autem à sublimiore ceruicis scapulæ supercilio: inde per anteriores brachij partes descendens, ipsum vsque ad medium tangit. hinc sublimis alteri musculorū qui inibi sunt, incūbens, in gibbi cubiti articulationem se insinuat: alter vero ex brachio solo exoritur, & initium à posterioribus partibus habet prope brachij caput, & illinc per externas partes obliquus ad anteriores partes vsque ad gibbi cubiti articulationem progrediens, in os cubiti inseritur: quemadmodum prædictus ille maior, in os radii, perro musculorum, qui articulationem in gibbo cubiti extendunt, alterum principium ab humilis costæ scapularum dimidio, quod versus humerum ascendit, incipit: alterum vero post brachij caput ex posterioribus eius partibus exoritur. ambo autem hi musculi articulationem quæ in gibbo cubiti est, extendunt: sed primus vna etiam extrorsum inclinat, secundus vero introrsum & ipse inclinationem facit. musculi autem, quem secundo loco nominauimus, pars (est enim vt bifidus quidam) carnosa tota permanens in posteriore gibbi cubiti partē inseritur: & rectā quodā modo magis extensionē ad os cubiti, introrsum leniter vergētem efficit.

De cubiti musculis.

Cap. 44.

In cubiti partibus internis septem musculi sunt constituti: in exteriore autem parte minimus numerus ad octo peruenit. Si vero connati musculi distinguātur, maximus numerus erit denarius, medius nonarius. quatuor igitur digitos, excepto pollice, vnus musculus magnus extendit in media præcipue totius brachij regione constitutus, & quatuor tendines in vnunquenque digitum singulos producens. duo autē musculi ab vtraque huiusce musculi parte collocati sunt, quorum alter paruum digitum oblique ab aliis abducit, alter huic adducit reliquos. Si exquisite loqui velis, duos musculos

V I
sculos esse
vtraque ha
extrinsecus
tum est, per
partem, que
os tendines
os carpi apu
tibus magni
gitum, vbi ex
natur: ad polli
est medius int
vtrunque med
summa manus
nem obeant, e
ut dictum est
rum esse plat
at, ipsumque
oblique quini
lis fieri dixim
et cubiti musc
di partibus ob
perus ei proli
definit. eamqu
num reddat. r
stus, in super
fuit memoratu
eorum illam ra
bo simul agant
dent, post prim
lus, toti cubito
musculorum g
sculi septem m
ali duo radiu
omnium grac
præcipue artu
culum mouens

De musculis

Musculorū,
duplex est gen

sculos esse hos dices sibi mutuo connatos. Alij præterea ab utraque horum parte musculi sunt. quorum alter cubito extrinsecus porrectus in metacarpium. quæ ante parvum digitum est. per vnum tendinem inseritur: alter in eâ metacarpij partem, quæ ante indicem, & medium digitum est, per duos tendines: tertius denique per vnum tendinem in primum os carpi apud magnum digitum. Ac carpus quidem ab his tribus magnis musculis extenditur, ad parvum quidem digitum, ubi extrema manus, veluti in pronam figuram inclinatur: ad pollicem vero, ubi in supinam. qui autem inter hos est medius interiectus musculus, is carpi extensionem inter utrunque mediam facit: ut etiam mediam constitutionem summa manus acquirit, si reliqui duo musculi simul actionem obeant. ceterum ei musculo, qui carpum ad pollicem, ut dictum est nobis, mouet, alter est adnatus ita, ut ambos vnum esse plane appareat, qui in primum os pollicis pervenit, ipsumque in alteram partem ea motione movet, quæ obliquæ quinque digitorum motioni, quam à tribus musculis fieri diximus, proportionem respondet. Restant adhuc ex cubiti musculis exterioribus & is, qui superioribus radij partibus obliquus inseritur, totus carnosus, & is, qui superius ei prolixus incumbit: qui nec ipse in exquisitum tendinem definit. eamque actionem plerunque obit, ut supinam manum reddat. reliquus vero musculus, qui ante hunc est dictus, in superiores radij partes, non ut is, qui postremo fuit memoratus, in inferiores inseritur. quâ ob rem uterque eorum illam radii partem movet, in quam insinuat. si ambo simul agant, totius manus constitutionem supinam reddent. post primum autem exortum conscendens hic musculus, toti cubito adnascitur. cuiusmodi igitur est exteriorum musculorum positus, atque motus. Cum autem interni musculi septem numero sint, duo carpum flectunt, duo digitos, alii duo radium pronum circumagunt: reliquus vero qui est omnium gracillimus, sub cute summa porrigitur, per medium præcipue artum superne deorsum tendens, nec vllum articulum movens.

De musculis, qui in summa sunt manu. Cap. 45.

Musculorū, qui in internis summæ manus partibus sunt, duplex est genus. parvi quidē necessario omnes sunt, attamē

S iij

inter se nō parum cū in aliis, tum vero in magnitudine differunt, quinque igitur sunt, qui oblique introrsum, sursum quē digitos mouent, singuli singulis distributi: sextus pollicē, qui magnus vocatur, ad indicem adducit: septimus parū digitum ab aliis longissime abducit. Alij autem musculi in metacarpio siti sunt, qui omnibus dissectionis peritis, mihi quē etiam diu fuerunt ignoti, qui cum quadam in latus inclinatione primum cuiusque digiti articulum flectunt: binique sunt in singulis digitis. In magno vero digito nō est æqualis numerus, est enim vnus minor, digitoque prope secundā articulationem inseritur, eam non admodum perspicue, sed magis primam mouens. Reliqui deinceps duo secundam articulationem flectunt, alter quidem ipsum maiorem, qui prædictus est, tangens, & sursum versus flexionem faciens, alter post hunc, in latus leniter inclinans. horum autem omnium vndecim musculorum commune est munus, vt coarticulationem quæ ab vnoquoque ossē metacarpij cum carpo est, eo vsque flectat, quousque vnaquæque flecti suapte natura queat, id quod est sane breuissimum, quæ enim ibi sunt ossa, inter sese coarticulata sunt, nec quemadmodū ossa digitorū, sunt dearticulata. quocirca prima pollicis dearticulatio euidētē habet motū: quæ vero est metacarpij cū carpo, latētē penitus, atque obscurum. in magno nāque digito nonnunquā duo soli musculi apparent: qui affecti sunt æque ac musculi aliorum digitorū: iidēque ita sæpe coalescunt, vt in vnoquoque digito vnus esse videatur.

De musculis, qui sub clauiculis sunt. Cap. 46.

Sub vnaquaque clauicula musculus subiacet: qui perspicue videri, antequam auferatur clauicula, non potest. habent eādem actionem hi, quam intercostales habent. quemadmodū enim quilibet eorum suis villis exterioribus humiliore costam ad superiorem attrahit, ita hi primi costam ad clauiculam attrahunt.

De musculis thoracis. Cap. 47.

Ex musculis thoracis ij, qui in locis, quæ intercostalia dicuntur, positi sunt, duo & viginti sunt, quorū villi sunt longitudine contrarij. neq; enim vt musculi à spina in os pectoris desinūt, ita etiā corū villi eo pertinet: sed ex costa in costam ob

V I
oblique
ad X litera
villi a supe
thoracē di
his contrar
ad os pecto
siti, dilatare
latū notat
quidē in
sculorū con
due decima
colla extra se
minori conat
musculi, a qu
ro tres muscu
racē dilatare
ante ipsam
posita: atq; hi
sculos, etiam
villis contra
harum sunt
abdominis p
trahunt, qui
sculi abdom
De

Musculi si
quidem, sed
initium du
ab vtraque
nōm autem
tur, singula
vero ambo
tebra sunt,
partem ver
totam spin
ditur: viol
gibbositati
quantū vsq
duo muscu

obliquæ cōtraria inter se positione exteriores, & interiores ad X literæ similitudinē inseruntur. Atq; exteriores quidem villi à superioribus in inferiores costarū partes procedentes thoracē dilatāt: qui vero in profundo sunt, ipsum cōtrahūt. his contrarij sunt, qui ad cartilagineas costarū partes, quæ ad os pectorale sunt, vergunt. nam qui in superficie sunt positi, dilatāt: qui in imo sunt, cōstringunt. At in musculis costarū notharū ad extremū vsque, eadē est villorū natura: si quidē inflexionē nullā habent. Altera porro exiguorū musculorū coniugatio primas costas sursum trahit: vt etiā aliæ duæ decimæ, & vndecimā trahunt deorsum. nam duodecima costā extra septū transuersum obliquo abdominis musculo minori cōnata est: quandoq; tamen circūscriptionē proprij musculi, à quo deorsum trahitur, habere cōspicitur. alię vero tres musculorū coniugationes à collo descendētes, thoracē dilatāt: maxima, quæ in sinus scapularū est: minor, quæ ante ipsam coniugationē est sita: minima quæ posterius est posita: atq; hi musculi omnes thoracē dilatāt: & præter musculos, etiam phrenes. intercostales vero dimidijs ipsorum villis contrahunt, itēque ij, qui spinalibus ad radices costarum sunt exporrecti: & superior rectorum musculorum abdominis pars, & denique ij, qui costas vltimas deorsum trahunt, quin thoracis etiam contractioni nonnunquā musculus abdominis aliquantulum conducunt.

De musculis spine.

Cap. 48.

Musculi spinales à secunda vertebra ceruicis incipiunt illi quidem, sed vel tot sunt, quot & ipsę vertebrae, a secunda initium ducendo, sibi inuicē connati, aut vnus maximus est ab vtraque spinæ parte ex multis musculis compositus. omnium autem villi sunt leuiter obliqui, siquē parum tendantur, singulas vertebrae sibi continuas ad seipsos inclinant: si vero ambo tū qui à dextris, tum qui à sinistris cuiusque vertebrae sunt, tendantur, tunc recta permanens, & in nullam partem vergens spina ad posteriora recuruat: siquē per totam spinam ita fiat, cum moderata tensione tota extenditur: violentius autē tensis retrorsum recuruat: & statum gibbositati contrariū acquirit. At in tota parte superiore ad quartā vsque, & quādoque etiā quintā thoracis vertebra, duo musculi sunt, qui stomacho subiecti spinā flectunt. par-

tibus vero inferioribus, quæ ad lumbos sunt, tota interior lumborū regio binos maximos musculos habet: quos omnes anatomici *ψῶες* vocāt. hi supra septū trāuersum ad decimam, aliquando ad vndecimam thoracis vertebram inferuntur, eam spinæ partem, quæ ad eos est, flectentes. Id vero quod inter hos & antedictos interiacet, quod medium thoracis est, nullum proprium musculum est nactum: sed simul cum partibus quæ vtrinque sunt, mouetur.

De musculis abdominis.

Cap. 49.

In abdomine octo sunt musculi, quatuor vtrinque. omnium exteriores ac primi sunt, qui à thorace obliqui descendunt vsque ad ossa pubis, maximi musculorum, qui ibi sunt, omnium: secundi sub his, qui ab ilibus ascendunt: tertij, qui hos contingunt, recti sunt: quarti, qui peritona o connati, transuersum situm habent. idque corpus quod ex his & peritona o conflatum est, multos medicos latuit, qui peritonæum esse existimabant. quinetiam in ventris futuris, quas *γαστροφαίτες* vocant, tanquam membranā ipsum corpus cōsuunt, sed in partibus inferioribus peritonæū hæc aponeurosis relinquit, ipsūque solum nudum ibidem apparet. vtilis hi musculi sunt ad exsufflationes, & ad spiritus cohibitiones, quas vocant, magnas item voces, & acutas, vomitusque, & ventris deiectiones. eorū præterea pars inferior, ac præcipue illorum, qui vesicæ incumbunt, hypogastrium introrsum contrahendo mingendi actionem adiuuat.

De musculis in testes descendantibus.

Cap. 50.

Duo graciles musculi in vtrunque testiculum perueniūt. exoriuntur autem alter à pubis, alter ab ilium ossē per tenue ligamentum membranofum. deorsum autem illuc feruntur per meatum, qui ad testem deuenit: tum dilatati arthroide membranā complectūtur. ipsorum munus est, testem sursum attollere, vnde nonnulli cremasteras, hoc est suspensores eos nominant.

De musculo, qui in collo vesicæ est.

Cap. 51.

Musculus carnosus collo vesicæ circūiectus est. maior ipsius pars inferius subiecta est. hic musculus vesicæ os claudit, ne quid contra voluntatem effluat: & vrinam quæ per ipsum

v
ipsum fer

Pudend
habet, qui
natos, aut
gis subie
dentes, cr
ueniunt: al
tur. Omne
intenditur,
uetur, suppo

Vnus est
versus, sed
rectum intel
tangit: ex o
huic ipsi ad
ismodi est
culum, vel
rfus idem si
robore a
coli, qui me
cati. exor
quod latom
hunt, cum
rit: cum eni
testina com
eis continet
sepe adeo e
retrahi stat
ti aut alioq
sum retrahi
etiam sub
nicationem
sursum atter

Musculi

De musculis pudendi.

Cap. 52.

Pudendum duos musculos obliquos admodum paruos habet, qui in eius exortum inseruntur. duos item alios con-
natos, aut vnum bifidum carnosum, inferne quidem ipsi ma-
gis subiectos, nihilo tamen secius ipsum in orbem comple-
ctentes, cæterum horum capita in nullum os manifeste per-
ueniunt: aliorum vero duorum, in ossa, quæ pubis nominan-
tur. Omnes hi musculi tum rigidum facere pudendum, cum
intenditur, tum motiones, cum in latera, & ad superiora mo-
uetur, suppeditare possunt.

De musculis sedis.

Cap. 53.

Vnus est musculus qui parem non habet, rotundus, trans-
uersus, sedi circumiectus, qui si tendatur, diligenter & valide
rectum intestinum claudit: & in medio sui ipsius os coccyga
tangit: ex omni vero parte in pudendi exortum terminatur.
huic ipsi ad vltimam oram incumbit musculus cutaceus, cu-
iusmodi est labiorum pars vltima: quem vel cutaceum mus-
culum, vel musculosam cutim licet appellare. huius quoque
usus idem fere, ac musculi est: præterquam quod viribus, &
robore actionis à musculo superatur. porro ceteri duo mus-
culi, qui membranosi sunt, supra rotundum musculi sunt lo-
cati. exoriuntur hi ex internis partibus ossis pubis, & ossis,
quod latum, aut sacrum appellatur, sursúmque sedem retra-
hunt, cum in magnis contentionibus sedem euerti contige-
rit: cum enim à musculis hypogastrii vna cum phrenibus in-
testina comprimuntur, & illorum opera quicquid etiam in
eis continetur, euenit, vt sedes quoque foras propellatur, &
sepe adeo euertatur, vt à prædictis duobus musculis sursum
retrahi statim non queat, cumque huiusmodi musculi resolu-
ti aut alioqui imbecilli sint redditi, ægre, & vix sedem sur-
sum retrahi contingit: quin etiam omnino euerfa maneat, vt
etiam subsidio manuum sit opus. Iam vero propter commu-
nicationem ante dictam hi musculi pudendi exortum simul
sursum attrahunt.

*De musculis coxendicis articulationem mouen-
tibus. Cap. 54.*

Musculi, qui coxendicis articulationem mouent, decem

LIBER

sunt. psoa enim quæ non parvus est musculus, incipitque à decima thoracis costa, aëtit simul, & ✱ extrorsum magis totum femur inuertit. alius quoque exiguus musculus inseritur ab ossis coxendicis basi incipiens prope eam partem natium, quæ nuda, carnisq; expers est. hic musculus adductionis est auctor. maximus autem musculus qui ad femur est, qui omnes eos qui sunt in corpore, magnitudine superat, toti ossi pubis incumbit, & partem etiam quandam coxendicis ex lateribus, & inferne ad nudam vsque & carnis expertem regionem comprehendit. & in totum femur in orbem carnosus ansis ipsum complectens inseritur: atque iis fibris, quæ ex imis partibus apud nudam, & carnis expertem regionem nascuntur, & proxime ad genu articulationem perueniunt, retrorsum magis femur abducit. ad alterum simul femur leniter adducens, iis autem quæ altiores sunt, adducit solum: iis vero, quæ altissimæ sunt, & superne incipiunt, atque in primas femoris partes inseruntur, & adducit, & sursum etiam ipsum attollit. hoc musculo intersecto, is qui antedictus est, euidenter sub aspectum cadit: & aliæ quedam musculorum descriptiones, quæ non euidentes sunt, apparent, aliquando duorum, aliquando vero trium. quos si quis inter musculos numerarit, is plures quam decem esse musculos coxendicis articulationem mouentes dixerit. Ex posterioribus vero natium partibus primus est, qui extrema in cute collocatus est musculus, qui femur exquisitè extendit, & retrorsum trahit. post musculum, quem in extrema situm esse cute diximus, secundus est alius musculus admodum crassus, & carnosus, qui totum ipsum femur simul extendit, & introsum eius caput trahit. Huic musculus alius subnascitur, qui extendit simul, & extrorsum caput trahit femoris. alius præterea musculus exiguus, crassusque ab exterioribus, & imis iliū coxendicis ossis partibus exorietis prædicto magno musculo subnascitur. qui ipse quoque, attollit & caput femoris euertit extrorsum. Reliqui sunt duo musculi femur mouentes, qui ex totis pubis ossibus exoriuntur, alter intrinsecus, extrinsecus alter. hi musculi naturale etiam ossis pubis foramen occupant, quorum media pars membranofum ligamentum est. parte vero posteriore in idem inter se coeunt, coxendicis ossi carnosus ansis adnati. horum musculorum munus est, ut caput femoris circumagant, introsum quidem & antor-

V
antorsum
& retrorsum
sunt, muscu
lortasse eui
trorsum ad
culis genu a
rum sit num

De mus

Musculi, q
uem sunt, pri
media, recta q
terna femoris
articulatione
dit, & sursum
garam totum
euerentes iq
proximus est
issimum inf
ni, & eandem
ternis partib
cum illi con
insetur, is &
que, ut etiā e
tinentem hal
ribus partib
cit: reliqui d
rum qui num
ceps post du
multo post a
sam per tene
hunc deince
ticationem
retrorsum a
rum, qui co
tionem in h
collocatur,
his ipsis dis
teriores art
ficie sunt d

antorsum vno eodémque tempore primus, extrorsum vero & retrorsum alter. Decimus præter eos, qui commemorati sunt, musculus ab internis femoris partibus locatus est: qui fortasse etiam tibiā nonnihil mouet. is totum femur introrsum adducit. sed qualis quantusque sit, mox, cum de musculis genu articulationem mouentibus loquar, cum is in eorum sit numero constitutus, exponam.

De musculis genu articulationem mouentibus. Cap. 55.

Musculi, qui tibiæ inferioris articulationem mouent, non ueniunt. primus qui angustissimus, longissimusque est, ex media, rectaque ossis ilium spina exortum habet, & per interna femoris ad genu delatus illic in ocreā, non multo post articulationem, inseritur. hic musculus ad interiora tibiā flectit, & sursum altam quodammodo attollit: atque ad eam figuram totum crus agit, in qua præcipue statuitur, cū nos & euercentes ipsum attollimus super femur alterius. qui huic proximus est, ab ossibus pubis incipit, & in ipsam ocreā potissimum inseritur. introrsumque tibiā hic quoque inuertit, & eandem in rectum attollit. qui vero plerunque ab internis partibus, & quandoque paulo infra musculum prædictum illi continuus est, & per tendinem in ocream pariter inseritur, is & flectit tibiā, & extrorsum eam inuertit oblique, ut etiā eius obliquus est situs. Huic autem musculo continentem habent exortum alij tres musculi: alius ab exterioribus partibus cruris admodū validus extrorsum tibiā euercit: reliqui duo superiorē originē ex internis partibus duorum, qui nunc dicti sunt, habent. descendunt vero, alter deinceps post duos ante dictos in internam tibiæ regionem non multo post articulationem, flectens simul, & ad exteriora ipsam per tendinem leniter rotundū euertens: alter vero post hunc deinceps internis femoris partibus primis ad genu articulationem inseritur, femurque introrsum, & parum etiam retrorsum abducit. hunc ego decimum supra nominavi eorum, qui coxendicis articulationem mouent. eius ego tractationem in hunc locum reieceram, ut quoniam in musculis collocatur, qui genu articulationem mouet, de eo una cum his ipsis dislicerem. Reliqui autem tres musculi femoris anteriores articulationem genu extendunt. qui vero in superficie sunt duo robusti in robustum, latumque tēdinem de-

finunt. qui vero sub his delitefcit, is & in principium inferitur patellæ, & ligamentis, quæ ad articulationem sunt, in hærefcit. omnes hi muscoli superne deorsum lati per femur articulationem genu mouent. & vt meæ fert opinio, melius nouem dicerentur: sed ne in minimis rebus ab antiquioribus dissentire videamur, octo, alius vero quidam exiguus sub articulatione latet, in ipso poplite ligamentum habens, capite valido, ac rotundo, quod prope externum femoris tuberculum exoritur. hic in tibiæ os se insinuat, obliquus magis quodammodo per partes posteriores articulationi superuectus, & ad ipsam flectendam natus.

De musculis, qui in tibia insunt, à quibus totus pes, & digiti mouentur. Cap. 56.

Tibiæ circumiecti sunt in orbem muscoli quatuordecim, septem ex posterioribus partibus, totidémque ex anterioribus, ex iis qui positi in posteriore parte sunt, tres in calcis os finiunt: tres alij totius pedis digitos flectunt: septimus in tendinem desinens sub nuda & carnis experte tota pedis parte in latitudinem expansus nascitur: & ossi calcis inferne dilata tus, deinde, vt dixi, toti pedi subternitur. Huius utilitas est, vt solidum, ac tensum, & durum, & pilis nudum, & facile sentiens pedis vestigium efficiat: eorum vero qui in calcem se insinuant, usus est, vt simul cum calce totum pedem retrorsum abducant. atque ita quidem posteriores tibiæ muscoli sunt locati. Ex anterioribus vero, qui totum pedem sursum tendit & in tarsum inferitur, omnium anteriorum musculorum est maximus: qui vero ei adiacet, eiusque pars esse existimatur, in primum magni digiti os inferitur, ipsúmque leniter sursum trahit oblique. post hos sequitur aponeurosis, quæ in totum magnum digitum à qua extenditur, per longitudinem inserta est. huius autem aponeuroseos exortum musculus admodum gracilis ex media inter fibulam tibiam sede molitur, ambo hæc ossa comprehendens. cùmque prope magnum digitum fuerit, ligamentum quoddam prætergreditur, quod eundem usum præstat, quod in curribus circuli, per quos habenas aurigæ traiciunt. possêtque hos tres musculos quispiam vnum censere, qui post hunc est, à quo digiti extenduntur, medius inter omnes anteriores musculos est situs. Post hos alii tres muscoli sunt, qui ab osse fibu-

le exoritur
cilis paruo
dem sursum
fibulæ me
simum red
partibus, cu
trorsum ab
nem tres su
plite muscul
cilus est, &
nem non pla
facit. hic aut
rum, qui in te
ter eos, qui an

De m

In pede sur
admodum in
in superio
que sunt, qui
proportione
sunt locati. se
cum septenis
gulum dig
manu à prim
primis tarli
ob aliis abdu
placabuntur
qui sunt: qui
tendines sing
lorum moue
stant. nam
iis qui intus
peditant. pro
numero qua
extremos ab
vnóque qui
adducit: tot
tium genus
hærefcunt, &
respondent

le exoriuntur. vnus magnum pedis digitum flectit: alter gracilis paruum extrorsum abducit: tertius denique totum pedem sursum tendit. post hunc vero, fere proximum iam est fibulæ medium, vnde tertius musculus exoritur, qui pedem sursum reddit. hicque bifidus in exortu fit, inæqualibus fere partibus. eumque medium transit is, qui paruum digitum extrorsum abducit. hi tres musculi propter exortus cōmunionem tres fuerunt à quibusdam existimati. Est etiam in poplite musculus breui quidem longitudine, non tamen imbecillus est, & leniter quodammodo obliquus, & tibiæ flexionem non plane rectam, sed leniter extrorsum inclinantem facit. hic autem quintusdecimus musculus numeratur eorum, qui in tibia sunt: qui vltimo loco fuit memoratus inter eos, qui articulationem genu mouent.

De musculis, qui sunt in pede.

Cap. 57.

In pede sunt quatuor genera musculorum, nō duo, quemadmodū in manu. tria in partibus pedis inferioribus: vnum in superioribus, quod tarso exporrigitur. ex iis musculis quique sunt, qui obliquis digitorum pedis motibus præsent, & proportionem respondent iis, qui in exteriore manus regione sunt locati. septem vero qui in parte inferiore pedis sunt, & cum septenis qui in manu visuntur, conueniunt, motus singulorum digitorum obliquos gignunt. quorum duo, vt in manu à primis carpi ossibus exoriebantur, ita hi in pede à primis tarli ossibus enati, exteriores digitos plurimum ab aliis abducunt. reliqui autem quinque paulo post explicabuntur. alij vero musculi in partibus inferioribus exigui sunt: qui ex tendinibus digitos flectentibus prius, quam tendines singillatim discindantur, procedunt. eorum musculorum munus est, vt medium articulum cuiusque digiti flectant. nam scissis iam tendinibus alij musculi adhærescunt, iis qui intus in manu motum obliquum singulis digitis suppeditant, proportionem consimiles. hi nō secus quam illi sunt numero quatuor: duobus autem accedentibus, qui digitos extremos ab aliis plurimum abducunt, de quibus diximus, vnōque qui magnum digitum ad secundū, qui fere index est, adducit: totus numerus septenarius efficitur. Est aliud tertium genus musculorum, qui subter pedem ipsis ossibus inherescunt, & musculis in manu plane incognitis proportionem respondent. eos conspicias, si omnes tendines, quemadmo-

dum etiam in manu, excindas. Eorum vero positura omnis, figuræque, & utilitas eadem est, quæ prædictorum in manibus, duo enim cuiusque digiti articulo præpositi, leniter ipsos flectunt. sique simul agant, in nullum latus inclinando movent: si priuatim alteruter, in latus sensim declinat. quandoque vero ita continui inter se comperiuntur, ut vnum in singulis digitis esse plane putes.

De nervorum distributione.

Cap. 58.

Nulla est animantium particula, quæ aut motum, quem voluntarium vocant, aut sensum habere, sine nervis queat, sique nervus præcidatur, particula & motu, & sensu statim priuatur. cerebrum vero est nervorum, quæ admodum etiam spinalis medulla, principium. alii porro à cerebro, alii à spinali medulla oriuntur. nam anteriores ventriculi cerebri ad partes anteriores delati, paulatim conistat, angustantur, quousque ad nasi principium perveniant: qui quidem inter se ita coniuncti sunt, & perpetuo se contingunt, ut nihil inter eos medium, nisi membrana tenuis, intercedat. Hanc ipsam membranam inter processus non statuunt, quia neque nervi ex ipsa exoriuntur, ut ab aliis, neque extra ossa excidit. ab utraque autem horum ventriculorum parte & dextra, & sinistra nervus est crassitudine notabili ex ipso cerebro exoritur in oculos extra calvariam per foramen quoddam, cuius tanta exquisita latitudo est, quanta est nervi crassitudo, progreditur. hoc autem foramen est situm, qua primum sedes oculorum incipit oriri: tibi que intuiti veluti radices quedam oculorum huiusmodi nervi esse videbuntur. non tamen in multos villos dissoluuntur, sicut alii nervi omnes, qui instrumentis eos suscipiuntur, sed alio quodam modo admirabili, quæ nec oratione facile est exponere, nec qui audierit, fortasse credet, nisi prius suis ipsemet oculis hoc mirificum spectaculum perlustrarit. Dum enim uterque intra oculum, qui directio ad eum est situs, immergitur, in latitudinem extenditur: & humorem, qui vitreus appellatur, in orbem instar globi circuit, nihil quicquam à cerebri natura ibidem diuersus. sed solis his nervis, antequam in oculos inserantur, meatus quidam sensibilis intus aperte est. quam ob rem nonnulli dissectionum professores hos ipsos meatus, non nervos, appellauerunt: nonnulli vero nervos opticos, ab actione nomen eis imponentes, nominant: hancque primam con-

v
coniugati
numera
coniugati
bura: quæ
ta: & ex cal
fia, emergit
per calvaria
initium duci
iungitur, hos
quampures
mis radicibus
multifariam
dit, in partem
comicos latum
quod ea pars
quia ad cereb
Quomodo
tas, quæ infra
sit eorum di
reliquas ter
pars etiam a
tem aurium
gatione origi
hec est exigu
est omnium
& virgultor
scinditur: qu
cuntur: alter
catores non
tribuitur, gi
toti cuti fac
hi nervi sen
tium, qui in
modum ra
culos scind
atque illud
in lingue t
gustatorio
Nervi aut
declinibus

coniugationem neruorum à cerebro originem trahentium numerant, quæ ceterorum omnium est mollissima. Altera coniugatio est, quæ musculis oculos mouentibus est distributa: quæque & durior, & longior multo est, quam prædicta: & ex caluaria prope illam, ossæ tenuissimo ab illa distincta, emergit. huic non in primo quidem eius exortu, sed dum per caluariam fertur, tertia neruorum adiacet coniugatio, quæ initium ducit, qua anterior cerebri pars cum posteriore coniungitur, hos neruos molles vocant. qui ad primam radicem quamplures esse videntur. & quemadmodum ex multis primis radicibus videtur constare hæc coniugatio, ita quoque multifariam discinditur. prima igitur ipsorum particula fecedit, in partem capitis inferiorem tendens: quæ quidem anatomicos latuit. Commune autem est caluariæ foramen, per quod ea pars deorsum fertur, & ipsius carotidis arteriæ reliquæ ad cerebrum conscendunt: vna sane ab utroque latere. Quomodo igitur hi nerui per collum & thoracem in partes, quæ infra septum transversum sunt, ferantur, & quam sit eorum distributio, progrediens declarabit oratio. nunc ad reliquas tertiæ coniugationis partes reuertamur. eius namque pars etiam apud maxillæ articulationem in anteriorem partem aurium emergit. quæ quomodo neruis à quinta coniugatione orientibus misceatur, paulo post intelliges. cæterum hæc est exigua eius particula quædam. at qui veluti truncus est omnium partium ab ipsa nascentium, quæ & ramorum, & virgultorum rationem obtinent, in duas partes primum scinditur: quarum singulæ rursus in multas particulas diducuntur: alteraque in musculos qui temporales, quique masticatores nominantur, & in eos, qui à maxilla exoriuntur, distribuitur. gingiuis præterea, dentibus, palpebris, superciliis, toti cuti faciei, & nasi tunice interiori, quæ ei substrata est, hi nerui sensum suppeditant: altera vero pars ad radices dentium, qui inferiori maxillæ insunt, scinditur, eadem prope modum ratione, qua pars altera in superioris maxillæ musculos scindebatur: & in gingiuas, & labra inferiora perinde atque illud in superiora propagatur. plurima tamen eius pars in linguae tunicam dispergitur. hocque par neruorum aliqui gustatorios appellant, quia per eos gustandi sensus efficitur. Nerui autem qui maxillæ inferiori & lingue insuntur, viis decliuibus merito sunt vsi, propter partium eos excipien-

T

L I B E R

tium positionem. qui vero in maxillam superiorem ferebantur, iis natura viam aliam conuenientem secuit. ac primum quidem prorsum etiam eos traduxit, ac propter oculorum regiones deduxit, tum autem illic foramine simul est vfa, per quod nerui oculorum musculis infigebantur. vt duo nerui per vnum foramen ferrentur: quorum alter in musculos diuiditur oculorum, alter ad superiorē maxillam peruenit: qui simul excidit cum altero. cūque ad oculorū cavitatem peruenerit, recta ad appellatū malum fertur, perforatis illic ossibus, quæ sub oculis sunt, ac transitum ei præbētibus. atque hæc quidem est tertię coniugationis distributio. Quarta vero neruorum coniugatio, paulo posterius est locata: atque in totam palati tunicam inseritur. nerui autem hi sunt admodum exigui. ac neruis tertię coniugationis paulo duriores. Alia deinceps coniugatio neruorum sequitur, quæ processus ex partibus quæ ad latera sunt, habet: quam Marinus quintam vocat. & tamen non ex vna exquisita radice expululat: sed sibi inuicem sunt vicinæ: aliūque neruus exoritur ex altero: & in parte magis anteriore, qui vocatur auditorius, vna cum dura cerebri membrana simul exoriente, in foramen auditus excidit: cum qua dilatatus illinit mearum. ex posteriore vero parte alter in aliud quoddam lapidosi ossis foramen incidit, quod cæcum nominatur. veteres enim anatomici foramen hoc ita nuncupauerunt, cum perfecte perforare anfractum illum non possent, per quem neruus post aures foras excidit. atque hic neruus statim illi neruo tertię coniugationis, qui foras excidere ad maxillæ articulationem dictus est, commiscetur: non quod ille ad hunc perueniat, sed quod hunc ipsum expectet, dum ad se aduenit. Ex vtriusque autem mixtis maxima pars, vel vt melius dicam, omnis scinditur in latum musculum, qui sub cute nascitur, & buccam sine maxilla mouet. qui à nobis quoque vnus vtrinque inuentus est. Hic igitur neruus maxima sui parte latum buccarum musculum aperit, exiguum autem eius quippiam neruis auxiliatur, qui à tertia coniugatione ad musculos temporales progrediuntur. quantum enim illis, vtpote minus duris, quam par erat, ad robur motionis deerat, tantum eis à seipso adiungit. Feruntur autem quædam eius propagines ad glandulas, & alias partes, quæ circa aures sunt, & ad partes buccarum tenues: ipsa vero pilosa cutis sensus gratia dun-

taxat, velut
cas, tenues,
bus subiecti
nares intus
quæ ad oculi
men ipsorum
etiam ad iuce
videre est os
bus, & oculis
neruum non
primum neru
ro neruus is d
inest, dispergi
nim vna tunica
munionem, &
in idem delin
bet hæc con
Marini gratia
orientium et
feram extre
litum. statim
rum principi
ram inter se
mifcentur. I
que ad os lat
torem. maxi
prorumpere
sensu est præ
eos aggregat
brans tortile
nunt. Iam v
tes, vbi pul
primę con
cum arteriis
illis per coll
colligans: i
ventriculum
macho vtri
triculum d
uam: qui ve

taxat, veluti reliqua quæ in toto animali est, propagines pau-
cas, tenues, raras, instar filorum araneæ cuiusdam ex omni-
bus subiectis partibus recipit. Quoniam vero tunicam, quæ
nares intus subliniit, dicebamus eius neruorum portionis,
quæ ad oculorum cauitatem fertur, esse participem, viam ta-
men ipsorum non indicauimus, consentaneum fuerit, eam
etiam adiicere. In maioribus igitur viriusque oculi angulis
videre est os in narium capacitates pertusum, quod & nari-
bus, & oculis est commune, ferrique per vtrunque foramen
neruum non exiguum ab oculorum cauitate scissum, cum
primum nerui tertiæ coniugationis in eam peruenerint. por-
ro neruus is cernitur non solum in membrana, quæ naribus
inest, dispergi, sed etiam ad palatum vsque progredi. hæc e-
nim vna tunica communis est naribus, & ori ob eam com-
munionem, & continuitatem, quam habet ex foraminibus
in idem desinentibus: per quæ etiam spiritum ducimus. Sed
licet hæc coniugatio euidenter duplex sit, vna tamen esse in
Marini gratiam statuatur. Sexta vero neruorum à cerebro
orientium coniugatio vno foramine vitur, quod prope in-
fernam extremitatem futuræ, quæ labdoides appellatur, est
situm. statim vero ex basi cerebri oriens habet trium neruo-
rum principia: qui cum extra caluariam emergunt, multifa-
riam inter se, & cum vicinis, de quibus paulo post dicam, cõ-
misercentur. Descendit autem vna pars horum neruorum vs-
que ad os latum in omnia fere intestina, & viscera distribu-
torem, maxima vero sui parte in ventriculum, atque eius os
prorumpere apparent: quam ob causam hæc pars acutissimo
sensu est prædita: naturæque neruis septimæ coniugationis
eos aggregauit: & simul atque à capitis osse excefferint, mem-
branis fortibus circundedit, & ex omni parte ad vnguë mu-
niuit. Iam vero quoniã hos neruos ad stomachum acceden-
tes, vbi paululum progressi essent, ad linguam delatos à se-
ptimæ coniugationis neruis seiungere necesse erat, rursus eos
cum arteriis carotidibus, quæ prope erant, cõiunxit, & cum
illis per collum perduxit, communibus membranis cum illis
colligans: in thorace vero cum arteriæ ad sinistrum cordis
ventriculum essent locatæ, rursus eos diuisit, vbi denuo sto-
macho vtrunque connexuit, & cum ipsos primum in ven-
triculum diuisura esset natura, qui dextra in parte erat, ad læ-
uam: qui vero in sinistra erat, ad dextram obliquos, vt tutio-

T ij

res essent, circumegit. Ab his igitur nervis etiam muscoli laryngis propagines suscipiunt. reliquorum vero duorum alter tum in musculos faucium, tum in linguæ radicem pervenit: alter in latum scapulæ musculum, & nonnullos alios, qui inibi sunt. Laryngis vero muscoli, qui cum aliis partibus sunt cōmunes, non semper à sexta coniugatione nervos capiūt: quēadmodum nec in os labdoides, & hyoides, quod appellant, ossi pectorali connectunt. quanquam nervorum carotidibus arteriis adhaerescantium non pauca propagines multos latuerunt: quos quidem solos sextam esse coniugationem sunt rati: quas sane propagines illi dum per collū & thoracem feruntur, faciunt, antequam in os ventriculi incidant, ac ne id etiam sciunt, vicissim ex medio thorace nonnullas horum nervorū particulas ad quosdam laryngis musculos venire: nec etiam quam vim habeant: quanquam si legantur, in causa sunt, ut animal voce destituatur. Varia quoque est horum nervorum infra septum transversum distributio. nam & quasdam particulas à spinali medulla, quæ in ea parte est, suscipit, & in viscera quæ ibi sunt, disseminatur: & iis, quæ à tertia coniugatione per collum ac thoracem deferri supra diximus, admiscetur. & tamen hi ipsi nervi, qui ad costarum radices procedunt, sextæ cōiugationis propagines omnibus esse videtur. varia quoque est horum nervorū permixtio cum nervis intercostalium, & cum iis fere omnibus, qui ad intestina omnia, lumbosque parvi feruntur, & cum reliquis nervorum, qui ad os ventriculi perveniunt. Varia denique est ea quoque distributio, quæ intra peritonæū cōtinetur. quam nunc exquisitè tractare, non est propositum. Satis autem erit id solum scire, ad iecur, ad lienem, ad renes, itēque ante hæc, ad totū vētrem, & ad omnia intestina nervos à cerebro partim à tertia coniugatione, ut diximus, partim à sexta provenientes conspici. pulmonem vero & cor à sexta quoque coniugatione quādam nervorum portionem suscipere, omnes sane recte dixerunt. Vtrum vero stomachus & arteria, & venæ maximæ earū, quæ in collo sunt, suscipiant, omnes norunt. Reliqua est septima nervorum à cerebro exorientium coniugatio. quæ distributionem habet, ubi cerebrum desinit, & medulla spinalis incipit. progrediētes enim nervi quādātenus vna cum iis, qui sextæ cōiugationis sunt, tum à seipsis seiuncti maxima sui parte in linguæ musculos distri-

distribui
semper ve
specie præ
communes
tem, ut dix
tum qui à t
ditiis prone
rum à spinal
inceptis ne
inationis p
prædictorum
he tamen q
vorum, qui
nere. Senli
tu debent
que subiecto
sepius con
noscit per

Prima hor
prima verteb
mos in duas
altera ad lac
lum musculo
tur. Secunda
rugatio a pos
tate per vlla
parte locus q
nodatus ossi
quādā sui pat
& tertia cōi
rugatio, cōp
musculos dū
& cum capite
lis buccas tū
ell, ad caput
que partes, o
incipitis ossi
gatio à spin

distribuantur. nam quædam parua ipsorum particula in eos
semper venit musculos, qui cartilagini laryngis, quæ scuti
speciè præfert, & humilibus ossis labdoideos lateribus sunt
communes. in alios autem quosdam, non semper. Inter se au-
tem, uti diximus, commiscuntur nervi infra caput tendentes,
tum qui à tertia coniugatione, tum etiam qui à duabus nunc
dictis proveniunt. Præterea vero prima, & secunda neruo-
rum à spinali medulla orientium, coniugatio magnopere cū
hisce ipsis nervis commiscuntur. Nervi autem septimæ con-
iugationis primi inter nervos exquisitè sunt iam duri. nam
prædictorum omnium alij minus, alij magis sunt molles: nul-
lus tamen eque, ac hi, durus est. quin & illorum quoque ner-
uorum, qui musculis inferuntur, manifestè sunt alii du-
riores. Sensifici autem nervi simul, atque in linguam inferun-
tur, dilatati, exteriorem eius tunicam pertexunt, musculòs-
que subiectos minime contingunt: ibi enim nervi motorii
septimæ coniugationis in multas fibras soluti, omnes lingue
musculos pertexunt.

De nervis à spinali medulla nascentibus.

Cap.

59.

Prima horum nervorum coniugatio nascitur perforata
prima vertebra. quæ unam radicem apud medullam habet:
mox in duas partes scinditur: alteraque eius particula retro,
altera ad latus procedit. prima autem coniugatio in eos so-
lum musculos qui ad capitis articulationem sunt, distribui-
tur. Secunda vero à spinali medulla nascentiū nervorū con-
iugatio à posterioribus ipsa quoque partibus emergit: non
tamē per vlla foramina, veluti prima. in utraque enim spinæ
parte locus quidā est in medio primæ & secundæ vertebræ
nudatus ossib⁹ vertebrarū, in quo nervi exoriūtur: qui & ipsi
quadā sui parte ad anteriora per latera ferūtur, nervis primæ
& tertiæ coniugationis à cerebro nascētib⁹, ut etiā tertiā cō-
iugatio, cōplicati. maxima vero portione in posteriores colli
musculos distribuūtur. à quibus primarū vertebrarū inter se,
& cum capite motiones sunt, idē simul quidpiā latis muscu-
lis buccas movētib⁹ impertiūt. quicquid vero ex eis super-
est, ad caput ascendit, totā eius partē posteriorem pertexēs: nēm
quæ partes, quæ circa aures sunt, quæque usque ad verticē &
sincipitis ossis initium pertinent. Tertia nervorum coniu-
gatio à spinali medulla nascentium ex partibus quæ ad latera

T iij

sunt, ositur: vbi secunda & tertia vertebra inter se congregantes commune, rotundumque foramen efficiunt, cuius latitudo nervi crassitudini equalis est. ea statim scissa, altera parte retrorsum fertur, distributiones quasdam imis partibus musculorum, qui ibi sunt, impertiens, deinde ad spinæ apicem exurgit: atque illinc iterum hic nervus obliquus antorsum fertur, in musculos, qui secundum aures sunt, disseminatus: musculisque buccas mouentibus, & iis, qui collum totum cum capite retro erigunt, distribuitur. pars vero quæ prorsum fertur, utrique coniugationi secundæ scilicet, cuius iam meminimus, & quartæ, de qua mox loquemur, permiscetur. porro exquisitam distributionem, quam in anterioribus colli partibus habet earum coniunctio, alibi explicabimus. nunc vero id modo intellexisse satis erit, tertiam, quartamque coniugationem nervos communibus colli, capitisque musculis ac præterea musculis buccas mouentibus: quemadmodum certe & partibus quæ sunt post aures, suppeditare. Coniugationes vero, quæ subsequuntur, id commune omnes habent foramen, per quod nervi emergunt. commune etiam eis hoc est, ut statim in exortu scindantur. & ut altera parte, quæ minor est, antorsum, altera quæ maior est, per fundum feratur. ac primum quidem ad spinæ apicem, inde vero rursus ad anteriora feruntur per latum musculus, qui buccas una cum labiis, maxillæ inferioris os non mouendo, ad latera abducit. præterea hoc etiam commune est omnibus coniugationibus, quæ deinceps consequuntur, ut statim post primum exortum, quandam brevem nervorum distributionem in musculos spinales præbeant. atque etiam commune omnibus his nervis est, ut ad spinam retrorsum ferantur: ac nonnullos processus communibus colli capitisque musculis impertiant. omnes enim tum qui in partibus colli anterioribus, tum qui ad eiusdem latera sunt muscoli, nervos ab his coniugationibus capiunt, præter eos musculos, in quos à cerebri coniugationibus, distribui nervos diximus. Hæc igitur omnium nervorum, qui in collo habentur, communia sunt, quod sane collum ex septem vertebribus constat. Quæ cum ante cognouerimus, iam perspicuum erit, quicquid in singulis deinceps coniugationibus sit proprium: cui nunc animum adhibeto. A quarta coniugatione, quæ inter tertiam, & quartam vertebram nascitur, brevis admodum nervus

v
vulus ad
primum
quartam
fertur: qu
nibus por
evadet. ex
telæ aranea
misit. ex qu
huius mino
ior particul
nia, cum co
Ceterum ex
serta post q
communibu
ipæ permitt
tendunt, ali
vertebris int
sui partem
gationis tu
porales post
extensa ner
tur. tū hoc
alam in sim
dammodo
brachij &
est reliquæ
maxime su
nervi qui a
hunc ad cui
sublimiore
riorum co
omnibus t
distribution
intercostal
dit, ad brac
tiones sim
musculis t
quoque à
ticatione
parte per

vulus ad consequentem coniugationem peruenit: illi, qua
 primum emergit, permixtus. quintæ vero cōiugationis post
 quartam vertebram exortæ portio quædam exigua decliuis
 fertur: quæ si paruas quasdam à succedentibus coniugatio-
 nibus portiunculas assumpserit, in septi transuersi neruum
 euadet. ex quarta vero coniugatione portionem quandam
 telæ araneæ similem ad septem transuersum natura trās-
 misit: ex quinta vero notabilem: deinde aliam ex sexta: sed
 huius minorem, prioris vero maiorem: altera vero hac ma-
 ior particula ad summū scapulæ ascendit. reliqua vero om-
 nia, cum cōmunis scissionis sermo haberetur, exposita sunt.
 Ceterum ex coniugationibus, quæ deinceps consequuntur,
 sexta post quintam vertebram, octaua post septimam, ex
 communibus, vt dictum est, foraminibus emergentes, sibi
 ipsæ permixtæ ad sima scapularū, & ad brachium per alam
 tendunt, aliæ vero coniugationes iis quæ ex thoracis iam
 vertebris inter primam & secundam exoriuntur, plurimam
 sui partem permiscunt. nec parua sane portio ipsius coniu-
 gationis tum in primum intercostale, tum in musculos tem-
 porales posteriores peruenit: altera vero supra primam costā
 extensa neruo, qui post septimā colli vertebrā est, connecti-
 tur. tū hoc modo ambæ hæ, & ceteræ partes antedictæ per
 alam in sima scapularū, & brachium feruntur, inter se quo-
 dammodo mixtæ, & complicatæ: ac magna eorum pars in
 brachij & cubiti musculos distribuitur. quod vero adhuc
 est reliquum, in summā manū disseminatur. è directo autem
 maxime sunt extremo exortui ex his, qui prædicti sunt, ij
 nerui qui ad summam manum pertingunt. ei vero, qui supra
 hunc ad cubitū est, nerui qui sunt in brachio, & qui adhuc
 sublimiores sunt, ad scapulāsque perueniunt, è directo supe-
 riorum coniugationum sunt locati. Eodémque modo ex
 omnibus thoracis vertebris nerui exoriuntur, qui similē di-
 stributionē sortiti sunt omnes, eo excepto, qui ad secundū
 intercostale progreditur. inde enim perspicuo neruus exci-
 dit, ad brachij cutim tendens. ceteræ vero omnes coniuga-
 tiones simul atque exortæ sunt, portionē quandā spinalibus
 musculis tribuunt: itémque aliis, qui sunt in dorso: velut iis
 quoque à quibus scapulæ mouētur, & iis, qui ad humeri ar-
 ticationē ascendūt. ad summā vero reliqua, & maxima sui
 parte per intercostalia ad os pectoris vsque progredientes

LIBER XXV.

tum eos musculos, qui sunt in intercostalibus, tum eos, qui extrinsecus thoraci sunt obducti, suas ipsarum particulas per medium eorum emittentes, pertexunt. Quæ porro à spinali medulla ad spurias costas pertingunt nervorum coniugationes, propterea quod costæ nethe ad os pectoris non excurrunt, parum quidpiã intercostali, quod prope eas singulas est, distribuunt, reliqua vero tota sui parte ad hypochondriũ excidunt, tum in eos musculos qui primi extrinsecus adherescunt obliqui, superne ex thorace deorsum lati, distributæ, tum in eos, qui declives descendunt, carnosæque sunt. Post has coniugationes, sunt ij nervorum exortus, qui ex lumbis progrediuntur: qui non ex cõmuni foramine, quemadmodũ qui in collo sunt, prædeunt. hic enim superior tantum vertebra perforata commodũ exitũ neruo suppeditat. Est autẽ his nervis omnibus commune, vt & in spinales musculos, & in eos qui in abdomine sunt, & ad carnes lumborũ, quæ dicuntur, progrediantur. à coniugationibus vero quæ ex primis post septũ transversum vertebri exoriuntur: & nervis qui à cerebro superne deorsum feruntur, cõplicantur, nervus parvulus in vnaquaque distribuitur. In vltimis autem lumborum vertebri duo maximi nervorum processus nascuntur, qui ad crura pertinent: quibus alij parvi exortus commiscuntur: quorum vnus superpositus est, alter vero inferior priore, ex foramine, quod in osse, quod latum vocatur, est, exoritur: hique statim secedentes in primos musculos coxæ dicis articulationem mouentes inseruntur, reliqua pars omnis ad crura descendit, discissa ad finem vsque ipsorũ in singulos musculos eadem proportionẽ, qua in manuũ musculis vsu venit. Simili quoque modo, quicunque nerui per lati ossis foramina exoriuntur, in musculos, qui inibi sunt, disseminantur.

FINIS VIGESIMI QVINTI LIBRI,

ET VLTIMI.



5814504

in eos, qui
articulas per
se et spinale
in coniunctio
non excur
que eas in epu
in pectore dicit
in mēte ad h
in dicitur
que sunt. Por
que et lumbis
in mēte dicit
in mēte ve
it. Est autē
in mēte, &
in, que dicit
in que ex pri
it. & dicitur
canon. per
in autem lum
cellus nescun
notus comi
in vero mēte
in vocatur, et
in mēte corē.
inque pars om
in pectore in lin
in mēte
in per laci
in sunt, dicitur.

B K 1



